

CHIMIE • 1ÈRE D

MODULE 2 : OXYDORÉDUCTION

LEÇON 06

COUPLE OXYDANT-RÉDUCTEUR ET CLASSIFICATION ÉLECTROCHIMIQUE

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit la notion de couple oxydant-réducteur et montre comment comparer expérimentalement les couples entre eux. À partir de réactions entre métaux et ions métalliques ou ions H_3O^+ , on établit une classification électrochimique qualitative permettant de prévoir le sens des réactions d'oxydoréduction.

- À la fin de cette leçon, je sais définir un couple oxydant-réducteur et écrire sa demi-équation électronique
- identifier l'oxydant et le réducteur dans un couple Ox/Red et dans une réaction donnée
- réaliser et interpréter des expériences mettant en jeu des métaux et des ions métalliques (couples Mn^+/M)
- réaliser et interpréter des expériences mettant en jeu le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ avec différents métaux
- déduire d'une réaction spontanée la comparaison des pouvoirs oxydant et réducteur de deux couples
- établir une classification électrochimique qualitative des couples étudiés

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Couple oxydant-réducteur : définition et écriture
2. Réaction entre un métal et un ion métallique : couples $Mn+/M$
3. Action des ions H_3O^+ sur les métaux : le couple H_3O^+/H_2
4. Construction de la classification électrochimique qualitative
5. Utilisation de la classification : prévision des réactions
6. Synthèse et applications au quotidien camerounais
7. Travaux pratiques
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir un couple oxydant-réducteur et écrire sa demi-équation électronique
- identifier l'oxydant et le réducteur dans un couple Ox/Red et dans une réaction donnée
- réaliser et interpréter des expériences mettant en jeu des métaux et des ions métalliques (couples $Mn+/M$)
- réaliser et interpréter des expériences mettant en jeu le couple H_3O^+/H_2 avec différents métaux
- déduire d'une réaction spontanée la comparaison des pouvoirs oxydant et réducteur de deux couples
- établir une classification électrochimique qualitative des couples étudiés
- placer correctement le couple H_3O^+/H_2 dans cette classification
- prévoir si une réaction d'oxydoréduction entre deux couples donnés est possible ou non
- expliquer des phénomènes quotidiens (corrosion, protection des métaux) à l'aide de la classification

PRÉREQUIS

- Notion d'oxydation et de réduction (transfert d'électrons) vue dans la leçon précédente
- Écriture et équilibrage des demi-équations électroniques
- Équilibrage d'une équation-bilan d'oxydoréduction par combinaison des demi-équations
- Ions courants en solution aqueuse : Cu^{2+} , Zn^{2+} , Fe^{2+} , Ag^{+} , H_3O^{+}
- Tests d'identification simples des ions et du dihydrogène (détonation à la flamme)

1 COUPLE OXYDANT-RÉDUCTEUR : DÉFINITION ET ÉCRITURE

Au marché Mokolo à Yaoundé, un vendeur de clous observe chaque semaine le même phénomène : ses clous en fer, exposés à l'air humide de la saison des pluies, se couvrent rapidement d'une poudre brun-rougeâtre — la rouille. À quelques mètres, sa voisine vend des ustensiles en cuivre qui, eux, conservent longtemps leur bel éclat rosé. Intrigué, notre vendeur plonge un jour un clou en fer dans une solution bleue de sulfate de cuivre : en quelques minutes, le clou se recouvre d'un dépôt rougeâtre de cuivre métallique, et la solution bleue pâlit. Mais l'expérience inverse — un fil de cuivre plongé dans une solution de sulfate de fer(II) — ne produit strictement rien.

Pourquoi certains métaux s'oxydent-ils facilement et d'autres non ? Pourquoi le fer arrache-t-il le cuivre à ses ions, alors que le cuivre est incapable de faire de même avec le fer ? Peut-on prévoir à l'avance quelles réactions d'oxydoréduction sont possibles ?

Pour répondre à ces questions, il nous faut d'abord un outil conceptuel fondamental : la notion de **couple oxydant-réducteur**. C'est l'objet de cette première section. Une fois cet outil maîtrisé, nous construirons expérimentalement, dans les sections suivantes, la **classification électrochimique** qui permet de prévoir toutes ces réactions.

1.1 Rappels : oxydation, réduction, oxydant, réducteur

Avant de définir les couples, remettons en place le vocabulaire de base de l'oxydoréduction, déjà rencontré dans les leçons précédentes. Toute l'oxydoréduction repose sur un seul phénomène microscopique : le **transfert d'électrons** d'une espèce chimique vers une autre.

DÉFINITION Oxydation, réduction, oxydant, réducteur

- Une **oxydation** est une perte d'électrons par une espèce chimique.
- Une **réduction** est un gain d'électrons par une espèce chimique.
- Un **oxydant** est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons (il est donc réduit).
- Un **réducteur** est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons (il est donc oxydé).

Un moyen mnémotechnique très utilisé : « le réducteur se réduit à céder ses électrons, et c'est lui qui est oxydé ». Plus simplement : l'oxydant **prend**, le réducteur **donne**.


ATTENTION Les deux pièges du vocabulaire

Deux erreurs reviennent chaque année au Probatoire :

- Croire qu'un oxydant s'oxyde. C'est l'inverse : l'oxydant captant des électrons est ré-

duit. L'oxydant subit une réduction ; le réducteur subit une oxydation.

- Croire qu'une espèce peut être oxydée seule. Une oxydation ne se produit jamais seule : si une espèce perd des électrons, une autre doit obligatoirement les gagner. Oxydation et réduction sont toujours simultanées, comme les deux faces d'une même pièce.



Le cœur de toute réaction d'oxydoréduction : un transfert d'électrons du réducteur (qui donne) vers l'oxydant (qui prend).

1.2 Notion de couple oxydant-réducteur


Revenons au clou du marché Mokolo. Lorsque le fer Fe s'oxyde en ions Fe^{2+} , il perd deux électrons. Mais l'opération inverse est-elle possible ? Oui : dans une électrolyse, par exemple, des ions Fe^{2+} peuvent capter deux électrons et redevenir du fer métallique. L'ion Fe^{2+} et le métal Fe sont donc deux formes d'un même élément, séparées par un simple échange d'électrons : on dit qu'ils sont conjugués. C'est exactement l'idée de couple.

DÉFINITION Couple oxydant-réducteur

Un **couple oxydant-réducteur** (ou couple rédox) est l'ensemble formé d'un oxydant Ox et de son réducteur conjugué Red , qui se transforment l'un en l'autre par transfert d'électrons.

On le note Ox/Red : l'oxydant s'écrit toujours en premier, séparé du réducteur par une barre oblique.

À chaque couple est associée une **demi-équation électronique** :



où n est le nombre d'électrons échangés ($n \in \mathbb{N}^*$).

La double flèche $\rightleftharpoons$ est essentielle : elle traduit le fait que, selon les conditions expérimentales, la transformation peut se faire dans un sens (réduction de Ox en Red) ou dans l'autre (oxydation de Red en Ox). Dire qu'une espèce est « un oxydant » n'a donc de sens que par rapport

à une autre espèce : le même ion Cu^{2+} est un oxydant face au fer, mais le cuivre métallique Cu est un réducteur face aux ions Ag^+ .

ATTENTION Convention d'écriture : l'oxydant d'abord !

L'erreur la plus fréquente consiste à écrire le réducteur en premier dans la notation du couple. Ainsi, écrire Cu/Cu^{2+} est incorrect : la seule écriture acceptée est Cu^{2+}/Cu . Astuce : on lit le couple « Cu^{2+} sur Cu », et l'oxydant est « au-dessus », comme s'il dominait. De même, on écrit $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ et jamais $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$.

1.3 Demi-équations électroniques : écriture et équilibrage


Écrire la demi-équation d'un couple, c'est traduire le passage de l'oxydant au réducteur par un gain de n électrons. Comme toute équation en chimie, elle doit respecter deux lois de conservation : la **conservation des éléments** et la **conservation de la charge électrique**.

MÉTHODE Écrire et équilibrer une demi-équation électronique

1. Identifier l'oxydant et le réducteur du couple, puis écrire l'oxydant à gauche et le réducteur à droite : $\text{Ox} \rightleftharpoons \text{Red}$.
2. Équilibrer l'élément caractéristique (métal, hydrogène, etc.) en ajustant les coefficients stœchiométriques.
3. Équilibrer les charges en ajoutant n électrons du côté de l'oxydant (à gauche), de sorte que la charge totale soit la même des deux côtés.
4. Vérifier : même nombre d'atomes de chaque élément et même charge totale des deux côtés.


EXEMPLE Demi-équations de quelques couples usuels

- Couple Cu^{2+}/Cu : l'ion cuivre(II) capte deux électrons pour donner le métal cuivre :




Vérification des charges : à gauche $+2 + (-2) = 0$; à droite 0. L'équation est équilibrée.


- Couple Zn^{2+}/Zn :




- Couple Fe^{2+}/Fe :



- Couple Ag^+/Ag : un seul électron échangé :



- Couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$: l'ion oxonium, responsable de l'acidité, peut être réduit en dihydrogène gazeux. On équilibre l'oxygène par l'eau, l'hydrogène par H_3O^+ , puis la charge par les électrons :



Vérification : atomes H ($6=2+4$), O ($2=2$), charges ($+2 - 2 = 0$ à gauche, 0 à droite).

Le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ occupe une place particulière : il servira de **référence** dans la classification électrochimique que nous construirons dans les sections suivantes. Retiens bien sa demi-équation.

EXERCICE RÉSOLU 1 Écrire les demi-équations des couples Ag^+/Ag et $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$

Énoncé. Pour chacun des couples oxydant-réducteur suivants, identifier l'oxydant et le réducteur, puis écrire la demi-équation électronique équilibrée : a) Ag^+/Ag ; b) $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$.

SOLUTION


Solution détaillée.

a) Couple Ag^+/Ag .

Étape 1 : dans la notation du couple, l'oxydant est écrit en premier : l'oxydant est Ag^+ , le réducteur conjugué est Ag .

Étape 2 : l'élément argent est déjà équilibré (un atome de chaque côté) : $\text{Ag}^+ \rightleftharpoons \text{Ag}$.

Étape 3 : équilibrons les charges. À gauche, la charge est +1 ; à droite, elle est nulle. Il faut donc ajouter un électron à gauche :




Vérification : charges $+1 - 1 = 0$ à gauche, 0 à droite. L'argent métallique déposé sur le clou de certaines expériences de chimie vient précisément de cette réduction.

b) Couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$.

Étape 1 : l'oxydant est Fe^{3+} (écrit en premier), le réducteur conjugué est Fe^{2+} . Remarque importante : ici, les deux formes sont des ions en solution ; il n'y a pas de métal.

Étape 2 : l'élément fer est équilibré : $\text{Fe}^{3+} \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$.

Étape 3 : charges : +3 à gauche, +2 à droite. Il faut ajouter un électron à gauche :



Vérification : $+3 - 1 = +2$ à gauche, +2 à droite. C'est cette réduction qui explique le virage au vert pâle d'une solution jaune-orangée de chlorure de fer(III) lorsqu'on y plonge un réducteur.

1.4 Couples métalliques et couples en solution : deux grandes familles

Les exemples précédents révèlent une distinction importante qu'il faut savoir faire.

DÉFINITION Couples métalliques et couples en solution

- Un **couple métallique** est de la forme M^{n+}/M : l'oxydant est un cation métallique en solution et le réducteur est le métal solide correspondant. Exemples : Cu^{2+}/Cu , Zn^{2+}/Zn , Fe^{2+}/Fe , Ag^+/Ag , Al^{3+}/Al .
- Dans d'autres couples, les deux formes sont des espèces dissoutes en solution : l'oxydant et le réducteur ne diffèrent que par leur degré d'oxydation. Exemple : Fe^{3+}/Fe^{2+} , où l'ion fer(III) jaune-orangé est l'oxydant et l'ion fer(II) vert pâle le réducteur.

Cette distinction aura des conséquences pratiques : dans un couple métallique, la réduction se manifeste par un **dépôt solide** (le métal qui se forme, comme le dépôt rougeâtre de cuivre sur le clou du marché Mokolo) ou par la **disparition d'un solide** (le métal qui s'oxyde et « fond » dans la solution). Dans un couple en solution, seule la **couleur de la solution** change, ce qui est souvent plus délicat à observer.


Couple Ox/Red	Oxydant	Réducteur	Demi-équation électronique
Cu^{2+}/Cu	Cu^{2+} (bleu)	Cu (rougeâtre)	$Cu^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Cu$
Zn^{2+}/Zn	Zn^{2+} (incolore)	Zn (gris)	$Zn^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Zn$
Fe^{2+}/Fe	Fe^{2+} (vert pâle)	Fe (gris)	$Fe^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Fe$
Ag^+/Ag	Ag^+ (incolore)	Ag (argenté)	$Ag^+ + e^- \rightleftharpoons Ag$
Fe^{3+}/Fe^{2+}	Fe^{3+} (orangé)	Fe^{2+} (vert pâle)	$Fe^{3+} + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}$
H_3O^+/H_2	H_3O^+ (incolore)	H_2 (gaz incolore)	$2 H_3O^+ + 2 e^- \rightleftharpoons H_2 + 2 H_2O$

1.5 Des demi-équations à l'équation-bilan : une réaction, deux couples

Voici maintenant l'idée qui donne toute sa puissance à la notion de couple. Reprenons l'expérience du marché : le clou en fer plongé dans la solution de sulfate de cuivre. Que se passe-t-il au niveau microscopique ?

- Le fer Fe , réducteur du couple Fe^{2+}/Fe , **cède** deux électrons : $Fe \longrightarrow Fe^{2+} + 2 e^-$ (oxydation, demi-équation lue de droite à gauche).
- Les ions Cu^{2+} , oxydant du couple Cu^{2+}/Cu , **captent** ces deux électrons : $Cu^{2+} + 2 e^- \longrightarrow Cu$ (réduction).


Les électrons ne circulent pas librement dans la solution : ils passent directement du fer aux ions cuivre. En additionnant membre à membre les deux demi-équations, les électrons s'éliminent (autant sont cédés que captés) et on obtient l'**équation-bilan** :



Cette équation rend compte de toutes les observations : le clou se recouvre de cuivre rougeâtre, la solution bleue (ions Cu^{2+}) pâlit en verdissant (ions Fe^{2+}), et le clou s'amincit.

À RETENIR Une réaction d'oxydoréduction = deux couples


Toute réaction d'oxydoréduction met en jeu deux couples oxydant-réducteur : le réducteur de l'un (Red_1) cède des électrons à l'oxydant de l'autre (Ox_2) :



Pour obtenir l'équation-bilan, on écrit les deux demi-équations, on les multiplie si nécessaire par des coefficients pour que le nombre d'électrons cédés égale le nombre d'électrons captés, puis on les additionne : les électrons ne doivent jamais apparaître dans l'équation-bilan finale.

EXEMPLE Quand les nombres d'électrons diffèrent

L'argent se dépose sur un fil de cuivre plongé dans une solution de nitrate d'argent. Les couples sont Cu^{2+}/Cu et Ag^+/Ag . Le cuivre cède deux électrons, mais chaque ion Ag^+ n'en capte qu'un. Il faut donc multiplier la demi-équation de l'argent par deux :



d'où le bilan : $\text{Cu} + 2\text{Ag}^+ \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Ag}$. Le fil de cuivre se couvre de beaux cristaux argentés et la solution bleuit lentement.

ATTENTION Les électrons n'apparaissent jamais dans le bilan

Une équation-bilan d'oxydoréduction contenant des électrons est fautive : c'est le signe que les deux demi-équations n'ont pas été correctement combinées. Vérifie toujours, avant d'additionner, que le nombre d'électrons cédés par le réducteur est exactement égal au nombre d'électrons captés par l'oxydant.

LESAVAIS-TU ? D'où vient le mot « rédox » ?

Les électriciens et les électrochimistes parlent souvent de « réactions rédox » ou de « potentiel rédox ». Ce mot, qui n'existe pas dans le dictionnaire classique, est simplement la

contraction de RÉDUCTION et OXYDATION — les deux moitiés inséparables de toute réaction d'oxydoréduction. Il rappelle à lui seul la leçon essentielle de cette section : on ne peut pas réduire sans oxyder, ni oxyder sans réduire. C'est aussi ce principe qui fait fonctionner les batteries des téléphones portables que l'on recharge chaque soir à Yaoundé comme à Douala : au sein de la batterie, deux couples rédox échangent des électrons... que le chargeur force à circuler dans le circuit !

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une oxydation est une perte d'électrons ; une réduction est un gain d'électrons. L'oxydant capte, le réducteur cède.
- Un couple oxydant-réducteur Ox/Red associe un oxydant et son réducteur conjugué ; l'oxydant s'écrit toujours en premier.
- La demi-équation électronique s'écrit $\text{Ox} + n e^- \rightleftharpoons \text{Red}$; on l'équilibre d'abord pour les éléments, puis pour les charges avec les électrons.
- On distingue les couples métalliques M^{n+}/M (métal solide + cation) des couples dont les deux formes sont en solution, comme $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$.
- Toute réaction d'oxydoréduction met en jeu deux couples ; l'équation-bilan s'obtient en combinant les deux demi-équations de façon à éliminer les électrons.

Nous disposons désormais de l'outil « couple ». Mais une question demeure : face à deux couples donnés, quel réducteur cède ses électrons à quel oxydant ? Pourquoi le fer attaque-t-il les ions Cu^{2+} et pas l'inverse ? C'est ce que l'expérience va nous révéler dans la section suivante, en étudiant la réaction entre un métal et un ion métallique.

2 RÉACTION ENTRE UN MÉTAL ET UN ION MÉTALLIQUE : COUPLES M^{N+}/M

Dans la section précédente, tu as découvert la notion de **couple oxydant-réducteur** : deux espèces chimiques, un oxydant et un réducteur, reliées par une demi-équation électronique du type $\text{Ox} + n e^- \rightleftharpoons \text{Red}$. Mais une question fondamentale reste en suspens : comment savoir si une réaction d'oxydoréduction peut réellement se produire entre deux espèces données ? Un bijoutier de Douala qui plonge un fil de cuivre dans une solution contenant des ions argent voit un magnifique dépôt gris se former. En revanche, un clou en fer plongé dans une solution contenant des ions zinc ne subit aucune transformation. Pourquoi ? C'est toute la problématique de cette section : en étudiant expérimentalement les réactions entre un **métal** et un **ion métallique**, nous allons découvrir que certaines réactions sont **spontanées** et d'autres impossibles, et en tirer une règle de comparaison des couples M^{n+}/M .

2.1 Expérience 1 : le fer déplace le cuivre de sa solution

EXPÉRIENCE **Lame de fer dans une solution de sulfate de cuivre(II)**


Dispositif et protocole. On introduit une lame de fer bien décapée (à la laine de fer) dans un tube à essai contenant une solution de sulfate de cuivre(II) CuSO_4 , de couleur bleue caractéristique due aux ions Cu^{2+} .

Observations. Au bout de quelques minutes :


- la lame de fer se recouvre d'un dépôt rouge-orangé : c'est du cuivre métallique Cu ;
- la solution, initialement bleue, se décolore progressivement (les ions Cu^{2+} disparaissent) ;
- un test à la soude sur un prélèvement de la solution donne un précipité vert, caractéristique des ions Fe^{2+} : le fer est passé en solution sous forme d'ions fer(II).

Interprétation. Le fer métal a cédé des électrons (il a été oxydé en Fe^{2+}) et les ions cuivre(II) ont capté ces électrons (ils ont été réduits en cuivre métal). Il s'agit bien d'une réaction d'**oxydoréduction**.


Écrivons les deux demi-équations électroniques mises en jeu :



Le nombre d'électrons cédés (2) est égal au nombre d'électrons captés (2) : on additionne directement les deux demi-équations pour obtenir l'équation-bilan :



Cette réaction est **totale et spontanée** à température ambiante, sans aucun apport d'énergie extérieur. Les deux couples mis en jeu sont :



ATTENTION **Les ions spectateurs**

Dans l'équation-bilan, les ions sulfate SO_4^{2-} n'apparaissent pas : ils ne participent pas à la réaction, ce sont des **ions spectateurs**. On écrit donc l'équation sous forme ionique, et non $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \longrightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ (forme « moléculaire » acceptée mais qui masque le mécanisme réel). Retiens : en oxydoréduction, on raisonne toujours sur les espèces qui échangent réellement des électrons.

2.2 Expérience 2 : le cuivre ne déplace pas le fer


Réalisons maintenant l'expérience « inverse ».

EXPÉRIENCE **Lame de cuivre dans une solution de sulfate de fer(II)**

Protocole. On plonge une lame de cuivre bien décapée dans une solution de sulfate de fer(II) FeSO_4 , de couleur vert pâle.

Observation. Même après plusieurs heures, aucun changement n'est observable : pas de dépôt sur le cuivre, pas de modification de la couleur de la solution. Le test à la soude ne révèle aucun ion Cu^{2+} .

Interprétation. La réaction $\text{Cu} + \text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Fe}$ ne se produit pas. Le cuivre métal est incapable de céder ses électrons aux ions Fe^{2+} .



2.3 Conclusion : une réaction spontanée n'a lieu que dans un sens

La comparaison des deux expériences est capitale :

- le fer **réduit** les ions Cu^{2+} : la réaction $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}$ se produit spontanément ;
- le cuivre **ne réduit pas** les ions Fe^{2+} : la réaction inverse est impossible.

À RETENIR **Règle de comparaison des couples**

Si le métal M_1 réduit l'ion M_2^{n+} (c'est-à-dire si la réaction $\text{M}_1 + \text{M}_2^{n+} \longrightarrow \text{M}_1^{n+} + \text{M}_2$ se produit spontanément), alors :

- M_1 est un réducteur plus fort que M_2 ;
- M_2^{n+} est un oxydant plus fort que M_1^{n+} .

Autrement dit : le métal qui déplace un autre métal de sa solution est le réducteur le plus fort.

Dans notre exemple : le fer déplace le cuivre, donc **le fer est un réducteur plus fort que le cuivre** et l'ion Cu^{2+} **est un oxydant plus fort que l'ion Fe^{2+}** . On dit aussi que le couple Cu^{2+}/Cu est « plus élevé » que le couple Fe^{2+}/Fe dans la classification que nous construirons à la section 4.

PROPRIÉTÉ Réaction spontanée entre deux couples

Une réaction d'oxydoréduction spontanée se produit toujours entre le réducteur d'un couple et l'oxydant d'un autre couple, à condition que le réducteur soit plus fort que le réducteur conjugué de cet oxydant. Le réducteur fort « impose » ses électrons à l'oxydant fort ; les espèces formées (réducteur faible et oxydant faible) ne peuvent pas réagir en sens inverse.

2.4 Expérience 3 : l'arbre de Diane, le cuivre déplace l'argent



EXPÉRIENCE Fil de cuivre dans une solution de nitrate d'argent

Protocole. On plonge un fil de cuivre (par exemple un fil de cuivre enroulé en spirale) dans une solution incolore de nitrate d'argent AgNO_3 .


Observations. Après quelques minutes, le fil de cuivre se recouvre d'un magnifique dépôt gris-argenté, cristallisé en aiguilles, qui évoque les branches d'un arbre : c'est le célèbre « **arbre de Diane** ». Simultanément, la solution, initialement incolore, bleuit progressivement : des ions Cu^{2+} apparaissent.

Interprétation. Le cuivre métal est oxydé en ions Cu^{2+} et les ions argent Ag^+ sont réduits en argent métal Ag. Les couples mis en jeu sont Ag^+/Ag et Cu^{2+}/Cu .

Écrivons les demi-équations :




Ici, le cuivre cède **deux** électrons alors que chaque ion argent n'en capte qu'un. Il faut donc multiplier la deuxième demi-équation par 2 avant d'additionner :



Le cuivre déplace l'argent de sa solution : **le cuivre est un réducteur plus fort que l'argent**, et l'ion Ag^+ est un oxydant plus fort que l'ion Cu^{2+} .

ATTENTION Erreur fréquente : l'équilibrage des électrons

Le piège classique consiste à écrire $\text{Cu} + \text{Ag}^+ \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Ag}$. Cette équation est fautive : elle n'est équilibrée ni en charge (+1 à gauche, +2 à droite) ni en électrons échangés. Vérifie toujours que le nombre d'électrons cédés par le réducteur est exactement égal au nombre d'électrons captés par l'oxydant. Ici : 2 électrons cédés par Cu, donc 2 ions Ag^+ nécessaires.



L'arbre de Diane : un fil de cuivre plongé dans une solution de nitrate d'argent se recouvre de cristaux d'argent gris brillant, tandis que la solution bleuit par formation d'ions Cu^{2+} .

LESAVAIS-TU ? L'arbre de Diane, merveille des alchimistes

Dès le Moyen Âge, les alchimistes connaissaient cette réaction spectaculaire. Ils l'appelaient « arbre de Diane », du nom de la déesse romaine de la Lune, car l'argent était le métal associé à la Lune dans leur symbolique. Ils y voyaient une « croissance végétale » du métal, preuve selon eux que les métaux pouvaient « pousser » et se transmuter. Aujourd'hui, cette réaction illustre simplement la différence de pouvoir réducteur entre le cuivre et l'argent. C'est d'ailleurs un principe voisin qui est utilisé dans la récupération des métaux précieux : on peut faire précipiter l'argent contenu dans des bains de traitement de photographies usagés en y plongeant du cuivre !

2.5 Méthode d'interprétation et exemple chiffré

MÉTHODE Interpréter une expérience métal / ion métallique

Face à l'expérience « métal M_1 plongé dans une solution contenant des ions M_2^{n+} », applique systématiquement les quatre étapes suivantes :

1. Observer : y a-t-il un dépôt sur le métal ? La couleur de la solution change-t-elle ? Si rien ne se passe, conclure immédiatement : pas de réaction, M_1 est un réducteur plus faible que M_2 .
2. Identifier les produits : le dépôt est le métal M_2 ; le métal M_1 passe en solution sous forme d'ions M_1^{n+} (à confirmer par un test caractéristique, par exemple à la soude).
3. Écrire les demi-équations : oxydation $M_1 \longrightarrow M_1^{n+} + n e^-$ et réduction $M_2^{n+} + n e^- \longrightarrow M_2$.
4. Équilibrer puis additionner : multiplier chaque demi-équation pour égaliser les électrons échangés, puis écrire le bilan et conclure sur la force comparée des réducteurs.


EXERCICE RÉSOLU 2 Masse de cuivre déposée par le fer

Énoncé. On plonge une lame de fer de masse $m(\text{Fe}) = 1,12 \text{ g}$ dans un volume important d'une solution de sulfate de cuivre(II) en excès. La lame est entièrement consommée. Calculer la masse de cuivre déposée sur la lame avant sa disparition. On donne $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(\text{Cu}) = 64 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : équation-bilan. La réaction spontanée est :



Étape 2 : tableau d'avancement. Les ions Cu^{2+} étant en excès, le fer est le réactif limitant.

	Fe	Cu^{2+}	Fe^{2+}	Cu
État initial (mol)	n_0	excès	0	0
État final (mol)	0	excès	n_0	n_0

Étape 3 : quantité de fer consommée.

$$n_0 = \frac{m(\text{Fe})}{M(\text{Fe})} = \frac{1,12}{56} = 0,020 \text{ mol}$$

Étape 4 : masse de cuivre déposée. D'après la stœchiométrie, $n(\text{Cu}) = n_0 = 0,020 \text{ mol}$, d'où :

$$m(\text{Cu}) = n(\text{Cu}) \times M(\text{Cu}) = 0,020 \times 64 = 1,28 \text{ g}$$

Conclusion. Il se dépose 1,28 g de cuivre. Remarque : la masse de cuivre déposée (1,28 g) est supérieure à la masse de fer consommée (1,12 g) car le cuivre a une masse molaire plus grande que le fer, à quantité de matière égale.

EXERCICE 1 À toi de jouer

On plonge un fil de cuivre de masse $m = 0,64$ g dans une solution de nitrate d'argent en excès. Le fil est entièrement consommé. Calculer la masse d'argent déposée. On donne $M(\text{Cu}) = 64 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(\text{Ag}) = 108 \text{ g mol}^{-1}$.

CORRIGÉ Exercice

L'équation-bilan est $\text{Cu} + 2 \text{Ag}^+ \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2 \text{Ag}$. La quantité de cuivre consommée est :

$$n(\text{Cu}) = \frac{0,64}{64} = 0,010 \text{ mol}$$

D'après la stœchiométrie, $n(\text{Ag}) = 2 n(\text{Cu}) = 0,020 \text{ mol}$ (attention au coefficient 2!).
Donc :

$$m(\text{Ag}) = 0,020 \times 108 = 2,16 \text{ g}$$

Il se dépose 2,16 g d'argent. L'erreur à éviter était d'oublier le facteur 2 issu de l'équilibre des électrons.

En résumé, les expériences métal/ion métallique nous ont appris que les réactions d'oxydo-réduction sont **sélectives** : elles ne se produisent que dans un sens, celui où le réducteur le plus fort cède ses électrons à l'oxydant le plus fort. Nous avons déjà pu classer trois couples : Fe^{2+}/Fe , Cu^{2+}/Cu et Ag^+/Ag , du réducteur le plus fort (Fe) au réducteur le plus faible (Ag). Mais où placer l'hydrogène, ce non-métal si particulier, dans cette hiérarchie ? C'est l'objet de la section suivante, consacrée à l'action des ions H_3O^+ sur les métaux.

3 ACTION DES IONS H_3O^+ SUR LES MÉTAUX : LE COUPLE $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$

Dans la section précédente, nous avons vu qu'un métal peut réduire les ions d'un autre métal : le zinc réduit les ions Cu^{2+} , le cuivre réduit les ions Ag^+ , etc. Ces expériences ont fait apparaître des couples du type M^{n+}/M . Mais une question surgit naturellement : que se passe-t-il lorsqu'on verse un acide sur un métal ? Tout le monde a vu, au laboratoire du lycée, le zinc « bouillonner » dans l'acide chlorhydrique en dégageant un gaz. Ce gaz, c'est du dihydrogène. Cette observation banale cache une information précieuse : les ions oxonium H_3O^+ , présents dans toute solution acide, constituent l'oxydant d'un nouveau couple, le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$, qui

va nous servir de **référence** pour classer tous les couples métalliques. C'est l'objet de cette section.

3.1 Expérience : action de l'acide chlorhydrique sur quelques métaux


EXPÉRIENCE Action de l'acide chlorhydrique dilué sur le zinc, le fer, l'aluminium, le cuivre et l'argent

Dispositif et protocole. On dispose de cinq tubes à essais contenant chacun quelques millilitres d'une solution diluée d'acide chlorhydrique ($\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$). On introduit dans chaque tube un petit morceau de métal différent : zinc (grenaille), fer (clou décapé), aluminium (récupéré sur une feuille de marmite), cuivre (fil de câble électrique dénudé) et argent (bijou ou fil). On bouche éventuellement le tube et on recueille le gaz dégagé, que l'on approche d'une flamme.

Observations.

- Avec le zinc : réaction vive, effervescence abondante, le tube chauffe légèrement ; le gaz recueilli produit une légère détonation (un « aboiement ») à l'approche de la flamme.
- Avec le fer : dégagement gazeux net mais plus lent ; même test positif à la flamme.
- Avec l'aluminium : réaction parfois lente à démarrer (à cause de la couche d'alumine protectrice), puis effervescence ; même test positif.
- Avec le cuivre et l'argent : aucune réaction observable, même après plusieurs minutes.

Interprétation. Le gaz qui détone est le **dihydrogène** H_2 . Les métaux zinc, fer et aluminium ont donc réduit les ions H_3O^+ en dihydrogène, tandis qu'ils ont été eux-mêmes oxydés en ions métalliques (Zn^{2+} , Fe^{2+} , Al^{3+}). Le cuivre et l'argent, eux, sont incapables de réduire H_3O^+ .




Action de l'acide chlorhydrique dilué sur le zinc : dégagement de dihydrogène, recueilli et identifié par le test de la détonation à la flamme.

3.2 Identification du gaz : le test de la détonation

MÉTHODE Identifier le dihydrogène : le test de l'aboiement

1. Recueillir le gaz dégagé dans un petit tube à essais renversé (le dihydrogène est beaucoup moins dense que l'air, il « monte »).
2. Approcher rapidement la flamme d'une bougie ou d'une allumette de l'ouverture du tube.
3. Observer : si le gaz est du dihydrogène, on entend une légère détonation, caractéristique, appelée « aboiement ». Le dihydrogène s'enflamme au contact de l'air selon :





réaction très exothermique, d'où la détonation.

Précaution : travailler avec de petites quantités de gaz et un acide dilué. Un mélange H_2 /air en grand volume est explosif.


3.3 Interprétation : les couples mis en jeu

Prenons le cas du zinc. Le métal zinc disparaît progressivement : il est oxydé en ions Zn^{2+} qui passent en solution (on peut d'ailleurs les caractériser ensuite par la soude, qui donne un précipité blanc d'hydroxyde de zinc). Les ions oxonium, eux, sont réduits en dihydrogène. Deux couples sont donc en jeu : Zn^{2+}/Zn et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$.

Écrivons les demi-équations :




En additionnant membre à membre (les deux électrons échangés s'éliminent), on obtient l'équation-bilan :



Cette réaction est **totale**, **exothermique** (le tube chauffe) et se déroule à température ambiante, sans catalyseur. Remarque que les ions chlorure Cl^{-} ne participent pas : ce sont des **ions spectateurs**.

DÉFINITION Le couple $\text{H}_3\text{O}^{+}/\text{H}_2$

L'ion oxonium H_3O^{+} est l'oxydant et le dihydrogène H_2 est le réducteur du couple $\text{H}_3\text{O}^{+}/\text{H}_2$, dont la demi-équation électronique s'écrit :



Ce couple joue un rôle de référence dans la classification électrochimique : c'est par rapport à lui que l'on situe tous les couples métalliques M^{n+}/M .

ATTENTION Erreurs fréquentes sur la demi-équation du couple $\text{H}_3\text{O}^{+}/\text{H}_2$


- Ne jamais écrire H^{+} en solution aqueuse. Le proton H^{+} n'existe pas librement dans l'eau : il se fixe sur une molécule d'eau pour donner l'ion oxonium H_3O^{+} . Écrire $2 \text{H}^{+} + 2 \text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{H}_2$ est toléré dans certains ouvrages étrangers, mais au programme camerounais, c'est bien H_3O^{+} qu'il faut écrire.
- Ne pas oublier les molécules d'eau. La demi-équation correcte est $2 \text{H}_3\text{O}^{+} + 2 \text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{H}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$. Si tu écris $2 \text{H}_3\text{O}^{+} + 2 \text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{H}_2$, l'équation n'est équilibrée ni en oxygène ni en hydrogène.
- Vérifier toujours la double conservation : conservation des éléments (6 H à gauche, $2 + 4 = 6$ à droite ; 2 O de chaque côté) et conservation de la charge ($+2 - 2 = 0$ à gauche, 0 à droite).

3.4 Exemples chiffrés et équilibrage des équations

EXEMPLE Équilibrer l'action de l'acide sur le fer

Le fer s'oxyde en ions Fe^{2+} . Cherchons l'équation-bilan de la réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique dilué.

Étape 1 — demi-équations :



Étape 2 — les électrons échangés sont déjà en même nombre (2) : on additionne directement. Étape 3 — bilan :



Vérification : 1 Fe de chaque côté ; 6 H à gauche et 2 + 4 = 6 à droite ; charge +2 de chaque côté. L'équation est correcte.

EXERCICE RÉSOLU 3

Action de l'acide chlorhydrique sur l'aluminium

On plonge une plaque d'aluminium de masse $m = 2,7 \text{ g}$ dans un excès d'acide chlorhydrique dilué. L'aluminium s'oxyde en ions Al^{3+} .


1) Écrire l'équation-bilan de la réaction.

2) Calculer le volume de dihydrogène dégagé, mesuré dans les conditions où le volume molaire vaut $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$.

On donne : $M(\text{Al}) = 27,0 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

1) Équation-bilan. Demi-équations :



Pour égaliser les électrons, on multiplie la première par 2 et la seconde par 3 (6 électrons échangés) :



2) Volume de dihydrogène. Quantité d'aluminium :

$$n(\text{Al}) = \frac{m}{M} = \frac{2,7}{27,0} = 0,10 \text{ mol}$$


D'après les coefficients stœchiométriques, $n(\text{H}_2) = \frac{3}{2} n(\text{Al}) = 0,15 \text{ mol}$.

$$V(\text{H}_2) = n \times V_m = 0,15 \times 24,0 = 3,6 \text{ L}$$

La plaque d'aluminium dégage donc 3,6 L de dihydrogène : c'est un volume considérable, qui explique l'effervescence spectaculaire observée.

3.5 L'expérience inverse : le cuivre et l'argent ne réagissent pas

Reprenons nos tubes : avec le cuivre et l'argent, rien ne se passe, même en chauffant légèrement, même en attendant longtemps. Aucune bulle, aucune détonation, aucune dissolution du métal. La réaction



ne se produit pas : le cuivre est incapable de céder ses électrons aux ions oxonium. Dit autrement, le cuivre est un réducteur plus faible que le dihydrogène, tandis que le zinc, le fer et l'aluminium sont des réducteurs plus forts que H_2 .

À RETENIR Ce que l'expérience nous apprend

- Les métaux zinc, fer, aluminium (comme le magnésium) réduisent les ions H_3O^+ : ils sont attaqués par les acides dilués non oxydants, avec dégagement de dihydrogène. On dit que leurs couples M^{n+}/M sont placés au-dessus (côté réducteurs forts) du couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$.
- Les métaux cuivre, argent (comme le mercure et l'or) ne réduisent pas H_3O^+ : ils résistent aux acides dilués non oxydants. Leurs couples sont placés en dessous du couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$.
- Le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ apparaît ainsi comme une frontière dans la classification électrochimique : il sépare les métaux « attaquables par les acides » des métaux « nobles ».

Métal	Observation avec H_3O^+ dilué	Équation-bilan
Zinc Zn	Effervescence vive, détonation	$\text{Zn} + 2 \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$
Fer Fe	Dégagement modéré, détonation	$\text{Fe} + 2 \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$
Aluminium Al	Effervescence après amorçage	$2 \text{Al} + 6 \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow 2 \text{Al}^{3+} + 3 \text{H}_2 + 6 \text{H}_2\text{O}$
Cuivre Cu	Aucune réaction	—
Argent Ag	Aucune réaction	—

ATTENTION Précautions expérimentales et vocabulaire

- Toujours utiliser des acides dilués : un acide concentré réagit violemment avec les métaux et les projections sont dangereuses. Manipuler avec des lunettes et des gants.
- Attention : l'acide nitrique HNO_3 est un cas particulier. Même dilué, c'est l'ion nitrate NO_3^- (oxydant puissant) qui attaque le cuivre, et non H_3O^+ : le gaz dégagé n'est alors pas H_2 mais des oxydes d'azote. Notre classification ne s'applique qu'aux acides non oxydants comme HCl ou H_2SO_4 dilués.
- Ne confonds jamais H_3O^+ (ion oxonium, oxydant du couple) avec H^+ (notation simpli-

fiée à éviter) ni avec H_2 (le réducteur du couple).

LE SAVAIS-TU ? Le dihydrogène des piles artisanales

L'action d'un acide sur un métal est parfois exploitée dans des démonstrations artisanales : en plongeant une lame de zinc et une lame de cuivre dans un citron, un jus de bissap acidulé ou un vinaigre (qui contiennent des ions H_3O^+), on fabrique une pile rudimentaire capable d'allumer une petite diode électroluminescente. Le zinc, réducteur plus fort que H_2 , s'oxyde et fournit des électrons ; le cuivre, lui, ne sert que d'électrode collectrice. Ce principe — deux métaux de pouvoirs réducteurs différents plongés dans une solution acide — est exactement celui de la pile Volta, inventée en 1800, et tu le retrouveras en classe de Terminale. Le dihydrogène est d'ailleurs aujourd'hui étudié comme carburant propre : sa combustion ne produit que de l'eau !

En résumé, l'expérience de cette section nous a offert un **point de repère universel** : le couple H_3O^+/H_2 . Nous savons désormais placer les couples Zn^{2+}/Zn , Fe^{2+}/Fe et Al^{3+}/Al d'un côté de cette frontière, et les couples Cu^{2+}/Cu et Ag^+/Ag de l'autre. Il ne reste plus, dans la section suivante, qu'à assembler toutes ces observations expérimentales en une classification électrochimique qualitative cohérente.


4 CONSTRUCTION DE LA CLASSIFICATION ÉLECTROCHIMIQUE QUALITATIVE

Dans la section précédente, nous avons vu que les ions H_3O^+ des solutions acides attaquent certains métaux (fer, zinc, aluminium) avec dégagement de dihydrogène, alors que le cuivre et l'argent restent inertes. Cette différence de comportement n'est pas un caprice de la nature : elle révèle une **hiérarchie** entre les couples oxydant-réducteur. L'objectif de cette section est ambitieux et magnifique : à partir d'un petit nombre d'expériences simples, nous allons construire une **échelle** sur laquelle tous les couples seront rangés, comme des équipes de football sur un classement. Cette échelle, appelée **classification électrochimique**, nous permettra ensuite de prévoir les réactions sans même les réaliser.

4.1 Le principe : chaque réaction spontanée est un verdict

Intuition d'abord.

Imagine deux lutteurs traditionnels du Nord-Cameroun qui s'affrontent : le vainqueur est déclaré « plus fort » que le vaincu. En oxydoréduction, c'est exactement pareil. Quand on met en présence deux couples, par exemple Cu^{2+}/Cu et Fe^{2+}/Fe , une réaction spontanée peut se produire :



Le fait que cette réaction se produise dans ce sens-là (et pas dans l'autre) est un verdict expérimental : l'ion Cu^{2+} a « arraché » des électrons au fer. On dit que Cu^{2+} est un oxydant **plus fort** que Fe^{2+} , et que le fer est un réducteur **plus fort** que le cuivre. Chaque expérience réussie impose donc une inégalité entre deux couples.

DÉFINITION Classification électrochimique qualitative

La **classification électrochimique qualitative** est le classement des couples oxydant-réducteur selon le pouvoir oxydant croissant de leurs oxydants (ou, ce qui est équivalent, selon le pouvoir réducteur croissant de leurs réducteurs). On la construit expérimentalement : chaque réaction d'oxydoréduction spontanée observée impose une inégalité entre les deux couples mis en jeu.

MÉTHODE Construire la classification pas à pas

1. Réaliser l'expérience : mettre en contact le réducteur d'un couple avec l'oxydant d'un autre couple (par exemple un clou en fer dans une solution de sulfate de cuivre).
2. Observer : s'il y a réaction (dépôt métallique, dégagement gazeux, changement de couleur), écrire l'équation bilan.
3. Tirer le verdict : l'oxydant qui a réagi est plus fort que l'oxydant de l'autre couple ; le réducteur qui a réagi est plus fort que l'autre réducteur.
4. Cumuler les inégalités : enchaîner les résultats de plusieurs expériences pour obtenir un classement complet, comme on enchaîne les résultats d'un tournoi.

4.2 Les résultats expérimentaux cumulés

Reprenons, sous forme de bilan, toutes les expériences réalisées dans les sections précédentes. Chacune d'elles est une « rencontre » dont nous connaissons le vainqueur.


Expérience	Observation	Verdict
Fer dans une solution de Cu^{2+}	Dépôt rouge de cuivre sur le clou : $\text{Cu}^{2+} + \text{Fe} \longrightarrow \text{Cu} + \text{Fe}^{2+}$	Cu^{2+} oxydant plus fort que Fe^{2+} ; Fe réducteur plus fort que Cu
Cuivre dans une solution de Ag^+	Dépôt gris d'argent, solution qui bleuit : $2 \text{Ag}^+ + \text{Cu} \longrightarrow 2 \text{Ag} + \text{Cu}^{2+}$	Ag^+ oxydant plus fort que Cu^{2+} ; Cu réducteur plus fort que Ag
Zinc dans une solution de Fe^{2+}	Dépôt de fer sur le zinc : $\text{Fe}^{2+} + \text{Zn} \longrightarrow \text{Fe} + \text{Zn}^{2+}$	Fe^{2+} oxydant plus fort que Zn^{2+} ; Zn réducteur plus fort que Fe
Zinc dans un acide dilué	Dégagement de dihydrogène : $2 \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Zn} \longrightarrow \text{H}_2 + \text{Zn}^{2+} + 2 \text{H}_2\text{O}$	H_3O^+ oxydant plus fort que Zn^{2+} ; Zn réducteur plus fort que H_2
Fer dans un acide dilué	Dégagement de dihydrogène : $2 \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Fe} \longrightarrow \text{H}_2 + \text{Fe}^{2+} + 2 \text{H}_2\text{O}$	H_3O^+ oxydant plus fort que Fe^{2+} ; Fe réducteur plus fort que H_2
Cuivre dans un acide dilué	Aucune réaction	Cu^{2+} oxydant plus fort que H_3O^+ ; H_2 réducteur plus fort que Cu

ATTENTION Une absence de réaction est aussi un verdict

Lorsque le cuivre plongé dans l'acide chlorhydrique ne réagit pas, ce n'est pas une expérience ratée : c'est une information précieuse ! Elle prouve que la réaction inverse, $\text{Cu}^{2+} + \text{H}_2 \longrightarrow \text{Cu} + 2 \text{H}_3\text{O}^+$, serait spontanée. Donc Cu^{2+} est un oxydant plus fort que H_3O^+ . En oxydoréduction, « rien ne se passe » signifie « la réaction spontanée irait dans l'autre sens ».


4.3 Le classement obtenu

Enchaînons les inégalités comme les maillons d'une corde. Pour les **réducteurs**, du plus faible au plus fort :



D'autres expériences (que nous admettons) montrent que l'aluminium et le magnésium réduisent les ions Zn^{2+} : ce sont des réducteurs **encore plus forts que le zinc**, ils se placent donc **en dessous du zinc** dans le classement (pouvoir réducteur croissant vers le bas).

Pour les **oxydants**, l'ordre est exactement inversé (c'est logique : un couple dont le réducteur est très fort possède un oxydant très faible, et réciproquement) :



À RETENIR La règle d'or de la classification

Dans un couple oxydant-réducteur, plus l'oxydant est fort, plus le réducteur conjugué est faible, et inversement. C'est pourquoi les deux échelles de la classification sont toujours tracées en sens opposés : la force des oxydants croît vers le haut, celle des réducteurs croît vers le bas.


	Oxydants		Réducteurs
pouvoir oxydant croissant ↑ métaux nobles	Ag^+	/	Ag
	Cu^{2+}	/	Cu
	H_3O^+	/	H_2
	Fe^{2+}	/	Fe
	Zn^{2+}	/	Zn
	Al^{3+}	/	Al
			pouvoir réducteur croissant ↓ couple de référence

Classification électrochimique qualitative : les oxydants sont classés par force croissante vers le haut, les réducteurs par force croissante vers le bas. Le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ (encadré vert) sépare les métaux attaqués par les acides des métaux nobles (encadré doré).

4.4 La place capitale du couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$

Le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ joue le rôle de **frontière** dans la classification, un peu comme la ligne de milieu de terrain sur un terrain de football :

- **Au-dessus de H_2** (du côté des réducteurs forts) : Zn , Fe , Al , Mg ... Ces métaux sont des réducteurs plus forts que H_2 , donc ils **réduisent les ions H_3O^+** : ils sont attaqués par les acides non oxydants (HCl dilué, H_2SO_4 dilué) avec dégagement de dihydrogène.
- **En dessous de H_2** : Cu , Ag , Au , Pt ... Ce sont les **métaux nobles**. Leur pouvoir réducteur est plus faible que celui de H_2 : ils **ne réduisent pas H_3O^+** et restent inattaqués par les acides non oxydants.



Frise verticale de la classification : le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ sépare les métaux attaqués par les acides dilués (Fe, Zn) des métaux nobles (Cu, Ag).

EXEMPLE Trois expériences suffisent à classer quatre couples

À partir des trois seules expériences Fe/Cu^{2+} , Cu/Ag^+ et $\text{Zn}/\text{H}_3\text{O}^+$, complétées par l'absence de réaction entre Cu et H_3O^+ , établissons l'ordre des couples.

- Fe réduit $\text{Cu}^{2+} \Rightarrow \text{Fe} > \text{Cu}$ (réducteurs).
- Cu réduit $\text{Ag}^+ \Rightarrow \text{Cu} > \text{Ag}$.
- Cu ne réduit pas $\text{H}_3\text{O}^+ \Rightarrow \text{H}_2 > \text{Cu}$.
- Zn réduit $\text{H}_3\text{O}^+ \Rightarrow \text{Zn} > \text{H}_2$.

En chaînant : $\text{Ag} < \text{Cu} < \text{H}_2$ et $\text{Zn} > \text{H}_2$, $\text{Fe} > \text{Cu}$. L'expérience Fe/acide précise $\text{Fe} > \text{H}_2$, et Zn/Fe^{2+} donne $\text{Zn} > \text{Fe}$. D'où le classement complet : $\text{Ag} < \text{Cu} < \text{H}_2 < \text{Fe} < \text{Zn}$.

EXERCICE RÉSOLU 4 Classifier trois couples à partir d'observations expérimentales

Énoncé. On réalise trois expériences à 25 °C :


1. Un fil de cuivre plongé dans une solution de nitrate d'argent se recouvre d'un dépôt gris et la solution bleuit.
2. Une lame de zinc plongée dans une solution de sulfate de cuivre se recouvre d'un dépôt rouge.
3. Un fil de cuivre plongé dans une solution de chlorure de zinc ne subit aucune transformation.

Écrire les équations des réactions et établir le classement des trois couples Ag^+/Ag , Cu^{2+}/Cu , Zn^{2+}/Zn par pouvoir oxydant croissant.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le dépôt gris est de l'argent et la teinte bleue révèle les ions Cu^{2+} :



Ag^+ est donc un oxydant plus fort que Cu^{2+} (et Cu un réducteur plus fort que Ag).


2. Le dépôt rouge est du cuivre :



Cu^{2+} est un oxydant plus fort que Zn^{2+} (et Zn un réducteur plus fort que Cu).

3. Aucune réaction entre Cu et Zn^{2+} : cela confirme que Cu est un réducteur plus faible que Zn, donc que Zn^{2+} est un oxydant plus faible que Cu^{2+} . Cohérent avec l'expérience 2!

Classement par pouvoir oxydant croissant :



et, en sens inverse, par pouvoir réducteur croissant : $\text{Ag} < \text{Cu} < \text{Zn}$.

ATTENTION Le piège classique : inverser les flèches

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est d'inverser le sens des flèches de force croissante. Retiens bien :

- côté oxydants : la force croît vers le haut (Ag^+ en haut est le plus fort oxydant) ;
- côté réducteurs : la force croît vers le bas (Zn, Al, Mg en bas sont les plus forts réducteurs).

Astuce de mémorisation : « l'oxydant monte, le réducteur descend ». Et n'oublie jamais qu'un couple placé haut côté oxydant est forcément placé haut côté réducteur faible :

les deux membres d'un couple sont toujours sur la même ligne horizontale du tableau.

LESAVAIS-TU ? L'or et le platine, champions de l'inertie

Tout en bas de l'échelle des réducteurs se trouvent l'or (Au) et le platine (Pt). Leur pouvoir réducteur est si faible qu'ils ne s'oxydent jamais à l'air, même chauffés, et résistent à presque tous les acides. Seule l'« eau régale » (mélange concentré d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique) parvient à dissoudre l'or ! C'est précisément cette inertie chimique qui explique leur usage en joaillerie : une bague en or traverse les générations sans ternir, contrairement à un bijou en fer qui rouille en quelques saisons des pluies. À Yaoundé comme ailleurs, quand on dit qu'une amitié est « en or », on dit donc, en langage de chimiste, qu'elle est tout en bas de la classification électrochimique : inoxydable !

À RETENIR Ce qu'il faut retenir de cette section

- La classification électrochimique range les couples selon le pouvoir oxydant croissant de leurs oxydants ; chaque réaction spontanée observée impose une inégalité.
- Classement des réducteurs (croissant) : $\text{Ag} < \text{Cu} < \text{H}_2 < \text{Fe} < \text{Zn}$ (puis Al, Mg).
- Classement des oxydants (croissant) : $\text{Zn}^{2+} < \text{Fe}^{2+} < \text{H}_3\text{O}^+ < \text{Cu}^{2+} < \text{Ag}^+$.
- Le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ est la frontière : au-dessus de H_2 , les métaux sont attaqués par les acides dilués ; en dessous se trouvent les métaux nobles (Cu, Ag, Au, Pt).
- Une absence de réaction est un verdict expérimental aussi précieux qu'une réaction observée.

5 UTILISATION DE LA CLASSIFICATION : PRÉVISION DES RÉACTIONS

Dans la section précédente, nous avons construit pas à pas la **classification électrochimique qualitative** : à partir d'expériences simples (une lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre(II), un clou en fer dans l'acide chlorhydrique), nous avons rangé les couples oxydant-réducteur les uns par rapport aux autres, en plaçant le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ comme repère central. Mais une classification n'est pas une fin en soi : c'est un **outil de prévision**. C'est précisément ce que nous allons apprendre ici : à partir du seul tableau de classification, dire si une réaction entre deux espèces est possible, et écrire son équation-bilan. C'est une compétence incontournable au Probatoire.

5.1 La règle fondamentale

Intuition : qui cède, qui prend ?

Une réaction d'oxydoréduction est un **transfert d'électrons** : le réducteur donne des électrons, l'oxydant les prend. Pour que la réaction ait lieu spontanément, il faut un donneur généreux et un receveur avide. Or la classification range précisément les espèces selon cette générosité : plus un réducteur est placé haut dans la classification, plus il donne facilement ses électrons ; plus un oxydant est placé bas, plus il les capte facilement.

PROPRIÉTÉ Règle fondamentale

Une réaction d'oxydoréduction **spontanée** a lieu entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort présents dans le milieu. Elle produit l'oxydant le plus faible et le réducteur le plus faible. Autrement dit : la réaction naturelle va toujours du couple le plus « haut placé » (pour le réducteur) vers le couple le plus « bas placé » (pour l'oxydant).

ATTENTION Deux oxydants ou deux réducteurs : rien ne se passe


L'erreur la plus fréquente au Probatoire est de vouloir faire réagir deux oxydants entre eux (par exemple Cu^{2+} avec Fe^{3+}) ou deux réducteurs entre eux (par exemple le zinc métallique avec le fer métallique). C'est impossible : un oxydant ne peut que capter des électrons, un réducteur ne peut que les céder. Deux capteurs ou deux donneurs face à face : aucun transfert d'électrons n'est possible, donc aucune réaction. Avant tout calcul, vérifie que ton mélange contient bien un oxydant et un réducteur.

5.2 La règle du « gamma »

Il existe une image très pratique pour appliquer la règle fondamentale sans se tromper : la **règle du gamma** (du nom de la lettre grecque γ , dont la forme rappelle la diagonale).

PROPRIÉTÉ Règle du gamma

On écrit les couples en colonne, l'oxydant le plus fort en bas, le réducteur le plus fort en haut. La réaction spontanée possible se produit entre les espèces situées en diagonale : l'oxydant du couple inférieur réagit avec le réducteur du couple supérieur. Si les deux espèces mises en présence ne sont pas en diagonale (oxydant du couple supérieur face au réducteur du couple inférieur), il n'y a pas de réaction.



Règle du gamma : le réducteur le plus fort (Zn, en haut à droite) réagit spontanément avec l'oxydant le plus fort (Cu^{2+} , en bas à gauche) : la flèche diagonale dessine un γ . En revanche, Cu et Zn^{2+} ne réagissent pas entre eux.

MÉTHODE**Prévoir une réaction d'oxydoréduction en quatre étapes**

1. Repérer les espèces présentes dans le milieu (métal, ions, solution acide) et identifier les deux couples mis en jeu.
2. Placer les deux couples dans la classification électrochimique (du réducteur le plus fort en haut à l'oxydant le plus fort en bas).
3. Appliquer la règle du gamma : si l'oxydant et le réducteur présents sont en diagonale (oxydant du couple du bas, réducteur du couple du haut), la réaction est possible ; sinon, il ne se passe rien.
4. Écrire l'équation-bilan en combinant les deux demi-équations électroniques de façon à éliminer les électrons, puis vérifier la conservation des atomes et des charges.

5.3 Application 1 : quel récipient pour quelle solution ?




Voici une question typique de Probatoire, et aussi un vrai problème de laboratoire : peut-on stocker une solution dans un récipient métallique sans que le récipient soit attaqué ?

EXEMPLE**Un récipient en cuivre peut-il contenir une solution de Fe^{2+} ? de Ag^+ ?**

Cas de la solution de Fe^{2+} . Les espèces présentes sont Fe^{2+} (oxydant du couple Fe^{2+}/Fe) et Cu (réducteur du couple Cu^{2+}/Cu). Dans la classification, Cu est placé au-dessous de Fe (le cuivre est un réducteur plus faible que le fer) : les deux espèces ne sont pas en diagonale. Il n'y a pas de réaction : le récipient en cuivre peut contenir la solution de Fe^{2+} sans être attaqué.

Cas de la solution de Ag^+ . Les espèces présentes sont Ag^+ (oxydant du couple Ag^+/Ag ,


placé tout en bas de la classification, donc oxydant fort) et Cu (réducteur). Cette fois, les deux espèces sont en diagonale : la réaction est spontanée. Le cuivre s'oxyde et les ions argent se réduisent :



Le récipient se dissout lentement et se recouvre d'un dépôt gris d'argent métallique : la solution est perdue et le récipient détruit. Conclusion : jamais de solution de Ag^{+} dans un récipient en cuivre.

5.4 Application 2 : choix du métal pour stocker une solution acide

Une solution acide contient des ions H_3O^{+} , oxydant du couple $\text{H}_3\text{O}^{+}/\text{H}_2$. D'après la règle du gamma, tout métal placé **au-dessus** de H_2 dans la classification (zinc, fer, aluminium, magnésium...) est un réducteur assez fort pour être attaqué par l'acide, avec dégagement de dihydrogène :



En revanche, les métaux placés **au-dessous** de H_2 (cuivre, argent, or) ne sont pas attaqués par les acides non oxydants comme HCl dilué.

ATTENTION Conséquence pratique

On ne conserve jamais une solution acide dans un bidon en fer ou en zinc : le récipient serait rongé et le dégagement de dihydrogène (gaz inflammable !) créerait un risque d'explosion. C'est pourquoi les acides du laboratoire sont stockés dans des flacons en verre ou en matière plastique, chimiquement inertes.

5.5 Application 3 : corrosion du fer et protection par le zinc

Le fer est partout autour de nous : tôles de nos maisons, carrosseries, pylônes, charpentes. Or le fer, réducteur assez fort, s'oxyde facilement au contact de l'air humide : c'est la **corrosion**, qui produit la rouille. Comment protéger le fer ? L'idée, géniale, consiste à lui associer un métal **réducteur plus fort que lui**, qui s'oxydera à sa place.

PROPRIÉTÉ Protection par un métal plus réducteur

Le zinc est placé au-dessus du fer dans la classification : c'est un réducteur plus fort. Si du zinc est en contact avec du fer exposé à l'humidité, c'est le zinc qui s'oxyde ($\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^{-}$) et non le fer. Le zinc « se sacrifie » pour protéger le fer : on parle de **protection**

cathodique ou d'anode sacrificielle.

C'est le principe de la **galvanisation** : on recouvre les tôles de fer d'une fine couche de zinc (tôles « galvanisées » très utilisées pour les toitures au Cameroun). Même si la couche de zinc est rayée, le fer reste protégé tant qu'il reste du zinc à proximité. Le **fer blanc** (boîtes de conserve) est, lui, recouvert d'étain : protection moins durable, car l'étain est un réducteur plus faible que le fer — si le revêtement est rayé, le fer rouille alors plus vite.



À gauche, le fer galvanisé : le zinc, réducteur plus fort que le fer, s'oxyde à sa place, même en cas de rayure. À droite, le fer non protégé s'oxyde directement au contact de l'air humide : il se couvre de rouille.

LES AVAIS-TU ? Les anodes sacrificielles

Les coques des navires, les pipelines enterrés et les chauffe-eau sont protégés par des blocs de zinc ou de magnésium fixés sur la structure métallique : ce sont des anodes sacrificielles. Le magnésium et le zinc, réducteurs plus forts que le fer, s'oxydent à sa place et sont « rongés » à la place de la coque. On les remplace périodiquement. Sans elles, un navire rouillerait en quelques années ! Le même principe protège les pipelines qui transportent le pétrole, par exemple ceux de la SONARA ou du corridor Tchad-Cameroun.

5.6 Exemple chiffré complet : zinc et acide chlorhydrique




EXERCICE RÉSOLU 5 Réaction du zinc avec l'acide chlorhydrique

On plonge une masse $m = 6,5 \text{ g}$ de zinc en grenaille dans un volume $V = 200 \text{ mL}$ d'acide chlorhydrique de concentration $C = 1,0 \text{ mol L}^{-1}$. On donne $M(\text{Zn}) = 65 \text{ g mol}^{-1}$ et le volume molaire $V_m = 24 \text{ L mol}^{-1}$ dans les conditions de l'expérience.

1. La réaction est-elle possible ? Écrire son équation-bilan.
2. Déterminer le réactif limitant.
3. Calculer le volume de dihydrogène dégagé.

SOLUTION

1. Possibilité de la réaction. Le zinc est placé au-dessus du couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ dans la classification : c'est un réducteur plus fort que H_2 . Les espèces Zn et H_3O^+ sont en diagonale (règle du gamma) : la réaction est spontanée. Demi-équations :



On observe une effervescence (dégagement de H_2) et la dissolution progressive du zinc.

2. Réactif limitant. Quantités initiales :

$$n(\text{Zn}) = \frac{m}{M} = \frac{6,5}{65} = 0,10 \text{ mol} \quad n(\text{H}_3\text{O}^+) = C \times V = 1,0 \times 0,200 = 0,20 \text{ mol}$$

Tableau d'avancement :

État	Zn	$2\text{H}_3\text{O}^+$	Zn^{2+}	H_2
Initial (mol)	0,10	0,20	0	0
Final (mol)	$0,10 - x_{\text{max}}$	$0,20 - 2x_{\text{max}}$	x_{max}	x_{max}

Hypothèses : si le zinc est limitant, $x_{\text{max}} = 0,10 \text{ mol}$; si H_3O^+ est limitant, $x_{\text{max}} = \frac{0,20}{2} = 0,10 \text{ mol}$. Les deux valeurs sont égales : les réactifs sont en proportions stœchiométriques, $x_{\text{max}} = 0,10 \text{ mol}$. Les deux réactifs disparaissent entièrement.

3. Volume de dihydrogène.

$$n(\text{H}_2) = x_{\text{max}} = 0,10 \text{ mol} \quad \Rightarrow \quad V(\text{H}_2) = n \times V_m = 0,10 \times 24 = 2,4 \text{ L}$$

Le dégagement de dihydrogène est de 2,4 L.

5.7 Limites de la classification qualitative

La classification électrochimique qualitative est un outil puissant, mais il faut connaître ses limites pour ne pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas.

ATTENTION Ce que la classification ne prévoit pas

- Elle prévoit le sens de la réaction spontanée, mais pas sa vitesse : certaines réactions prévues sont infiniment lentes à température ordinaire (l'aluminium, pourtant réducteur très fort, résiste à l'air grâce à une couche protectrice d'alumine : c'est la passivation).

- Elle ne dit rien du rendement ni des conditions expérimentales (température, concentration, catalyseurs).
- Elle est qualitative : elle classe les couples sans mesurer l'écart de force entre eux.

LESAVAIS-TU ?**Complément Probatoire : vers la classification quantitative**

En Terminale, tu rendras cette classification quantitative : à chaque couple on associera un nombre, le potentiel standard d'électrode E° (en volts), mesuré par rapport au couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ pris comme référence ($E^\circ = 0,00 \text{ V}$). On pourra alors non seulement prévoir le sens des réactions, mais aussi calculer des constantes d'équilibre et comprendre le fonctionnement des piles. En Première, restons qualitatifs : la règle du gamma suffit à résoudre tous les exercices du programme.

À RETENIR**L'essentiel de la section**

- Une réaction spontanée a lieu entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort présents en solution.
- Règle du gamma : la réaction se produit entre les espèces placées en diagonale dans la classification ; sinon, il n'y a pas de réaction.
- Deux oxydants (ou deux réducteurs) ne réagissent jamais entre eux.
- Applications : choix des récipients (pas de Ag^+ dans le cuivre, pas d'acide dans le fer), protection du fer par le zinc (galvanisation, anodes sacrificielles).
- La classification prévoit le sens de la réaction, mais ni sa vitesse ni son rendement.

6**SYNTHÈSE ET APPLICATIONS AU QUOTIDIEN CAMEROUNAIS**


Dans la section précédente, nous avons appris à utiliser la classification électrochimique pour prévoir si une réaction d'oxydoréduction peut avoir lieu entre deux couples. Il est temps maintenant de rassembler toutes les pièces du puzzle : qu'est-ce qu'un couple oxydant-réducteur ? Comment lire une classification ? Et surtout, à quoi tout cela sert-il concrètement, du bidon de fongicide du cultivateur de Fombot aux tôles des cases de Kribi ? Cette section de synthèse est aussi ta fiche de révision idéale pour le Probatoire.

6.1 Bilan des savoirs essentiels

6.2 Le couple oxydant-réducteur

DÉFINITION Couple oxydant-réducteur

Un **couple oxydant-réducteur**, noté **Ox/Red**, est constitué de deux espèces chimiques, un **oxydant** Ox et un **réducteur** Red, qui se transforment l'un en l'autre par gain ou perte d'électrons. On l'associe à une **demi-équation électronique** :



L'oxydant est l'espèce qui capte des électrons (il se réduit) ; le réducteur est l'espèce qui cède des électrons (il s'oxyde).

Retiens l'ordre d'écriture : on écrit toujours le couple sous la forme **Ox/Red**, l'oxydant en premier. Ainsi on écrit Cu^{2+}/Cu et jamais Cu/Cu^{2+} . Quelques couples rencontrés dans cette leçon :




Couple Ox/Red	Demi-équation électronique
Cu^{2+}/Cu	$\text{Cu}^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons \text{Cu}$
Zn^{2+}/Zn	$\text{Zn}^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons \text{Zn}$
Fe^{2+}/Fe	$\text{Fe}^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons \text{Fe}$
Ag^+/Ag	$\text{Ag}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{Ag}$
$\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$	$2 \text{H}_3\text{O}^+ + 2 e^- \rightleftharpoons \text{H}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$

6.3 Réaction spontanée entre deux couples

PROPRIÉTÉ Règle de la réaction spontanée

Une réaction d'oxydoréduction **spontanée** a lieu entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple : c'est toujours l'oxydant le plus fort qui réagit avec le réducteur le plus fort. Dans l'équation bilan, les électrons n'apparaissent jamais : on multiplie chaque demi-équation par un coefficient tel que le nombre d'électrons cédés égale le nombre d'électrons captés, puis on additionne.

Par exemple, entre les couples Cu^{2+}/Cu et Fe^{2+}/Fe :



Les deux électrons cédés par le fer sont captés par l'ion cuivre : la comptabilité électronique est équilibrée.


6.4 Classification électrochimique qualitative et place de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$

À RETENIR Classification qualitative


La **classification électrochimique qualitative** range les couples Ox/Red par pouvoir oxydant croissant (ou pouvoir réducteur décroissant). Elle se construit expérimentalement : si le métal A déplace le métal B de ses ions (A s'oxyde, les ions B se réduisent), alors le réducteur A est plus fort que B, et le couple B^{n+}/B est placé au-dessus du couple A^{m+}/A . Le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ sert de frontière :

- les métaux situés au-dessous de H_2 (Fe, Zn, Al, Pb...) sont attaqués par les ions H_3O^+ des acides avec dégagement de dihydrogène ;
- les métaux situés au-dessus de H_2 (Cu, Ag, Au...) ne réagissent pas avec les acides non oxydants.

Ordre obtenu expérimentalement (pouvoir oxydant croissant) :



La carte mentale ci-dessous résume l'architecture de toute la leçon.



6.5 Démarche type d'un exercice au Probatoire

Les exercices de classification électrochimique suivent presque toujours le même schéma : on

te décrit des expériences (dépôt, dégagement gazeux, changement de couleur) et on te demande de classer des couples. Voici la méthode infallible.

MÉTHODE Résolution d'un exercice de classification en 5 étapes

1. Analyser les observations. Traduire chaque observation en langage chimique : un dépôt rouge sur le fer = du cuivre métallique formé ; un dégagement qui détone à la flamme = H_2 ; une solution qui se décolore = disparition d'un ion.
2. Identifier les produits et les réactifs. Déterminer quelle espèce a disparu (réactif) et quelle espèce est apparue (produit) pour chaque élément concerné.
3. Écrire les demi-équations. Une oxydation (perte d'électrons, le métal devient ion) et une réduction (gain d'électrons, l'ion devient métal ou H_3O^+ devient H_2).
4. Écrire l'équation bilan. Multiplier pour équilibrer les électrons, additionner, vérifier la conservation des atomes et des charges.
5. Conclure sur la classification. Si la réaction a lieu, le réducteur qui s'oxyde est plus fort : son couple est placé plus bas. Si rien ne se passe, conclure à l'impossibilité de la réaction spontanée dans ce sens (et donc à l'ordre inverse).

ATTENTION Erreur fréquente : conclure trop vite

Ne conclus jamais sur la position relative de deux couples à partir d'une seule expérience sans vérifier le sens de la réaction observée. Si tu observes un dépôt de cuivre sur une lame de fer plongée dans $CuSO_4$, c'est bien Fe qui s'oxyde et Cu^{2+} qui se réduit : le couple Cu^{2+}/Cu est donc au-dessus de Fe^{2+}/Fe . Inverser la conclusion (placer le fer au-dessus parce qu'il « réagit ») est la faute la plus fréquente au Probatoire. Autre piège : l'absence de réaction est aussi une information précieuse — elle signifie que la réaction spontanée aurait lieu dans le sens inverse. Vérifie toujours la cohérence avec au moins deux expériences croisées.

EXERCICE RÉSOLU 6 Classement de trois couples à partir d'expériences

On réalise trois expériences à $25^\circ C$:

- Expérience 1 : une lame de zinc plongée dans une solution de sulfate de cuivre se recouvre d'un dépôt rouge et la solution bleue se décolore.
- Expérience 2 : une lame de cuivre plongée dans une solution de nitrate d'argent se recouvre d'un dépôt gris brillant et la solution bleuit.
- Expérience 3 : une lame de cuivre plongée dans une solution de sulfate de zinc : aucune transformation observable.

Écrire les équations des réactions et classer les trois couples Zn^{2+}/Zn , Cu^{2+}/Cu , Ag^+/Ag par pouvoir oxydant croissant.

SOLUTION

Étape 1 — Observations. Exp. 1 : dépôt rouge = Cu formé, décoloration = disparition de Cu^{2+} . Exp. 2 : dépôt gris = Ag, bleuissement = apparition de Cu^{2+} . Exp. 3 : rien.

Étapes 2 et 3 — Demi-équations.


Expérience 1 : $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$ (réduction) et $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ (oxydation).

Expérience 2 : $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$ (réduction, à multiplier par 2) et $\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$ (oxydation).

Étape 4 — Bilans.



Étape 5 — Classification. Exp. 1 : Zn s'oxyde, donc Zn est un réducteur plus fort que Cu : Cu^{2+}/Cu est au-dessus de Zn^{2+}/Zn . Exp. 2 : Cu s'oxyde devant Ag^+ : Ag^+/Ag est au-dessus de Cu^{2+}/Cu . L'expérience 3 confirme : Cu ne peut pas réduire Zn^{2+} , ce qui est cohérent. D'où, par pouvoir oxydant croissant :





6.6 Applications au quotidien camerounais

6.7 Pourquoi les tôles en fer rouillent-elles plus vite à Kribi et Douala ?

Tout habitant du littoral le sait : une tôle neuve posée à Kribi ou à Limbe se perce de rouille en quelques années, alors qu'à Bafoussam ou à Ngaoundéré, elle tient bien plus longtemps. La classification électrochimique explique ce phénomène.

Le fer est un réducteur : son couple Fe^{2+}/Fe est placé au-dessous de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ et du couple $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$. Le dioxygène de l'air, en présence d'eau, peut donc oxyder le fer spontanément :



Les ions Fe^{2+} formés s'oxydent ensuite en rouille, un oxyde de fer hydraté. Deux facteurs accélèrent tout sur la côte :

- **l'humidité permanente** : l'eau est indispensable, elle transporte les ions et permet la circulation des charges ;
- **le sel marin** : les ions Na^+ et Cl^- du brouillard salin rendent l'eau bien plus conductrice, ce qui accélère le transfert d'électrons, exactement comme un pont salin accélère le fonctionnement d'une pile.


D'où les protections usuelles : peinture (barrière contre O_2 et H_2O) ou galvanisation — le recouvrement de la tôle par du zinc, métal plus réducteur que le fer, qui s'oxyde à sa place : c'est la **protection sacrificielle**.

6.8 Le bidon en fer et le sulfate de cuivre : un mélange interdit

Le sulfate de cuivre CuSO_4 est un fongicide très utilisé par les maraîchers (bouillie bordelaise pour traiter les tomates et les pommes de terre). Un cultivateur qui stockerait sa solution dans un bidon en fer aurait une mauvaise surprise : le bidon se perce et le produit perd son efficacité. En effet, Cu^{2+}/Cu est au-dessus de Fe^{2+}/Fe , donc la réaction spontanée est :



Le fer du bidon se dissout (trous, fuites) tandis que le cuivre se dépose en poudre rouge au fond : le fongicide est détruit. Il faut donc utiliser des récipients en plastique ou en inox.




Dégradation d'un bidon en fer contenant une solution de sulfate de cuivre :
le fer, réducteur plus fort que le cuivre, s'oxyde et le bidon se perce.


EXEMPLE Marmites en cuivre et jus acides : pourquoi le cuivre résiste

Dans certaines cuisines traditionnelles et chez les confiseurs, on utilise des marmites en cuivre. Or le jus de bissap, le jus de citron ou la sauce tomate contiennent des acides, donc des ions H_3O^+ . Pourquoi la marmite n'est-elle pas attaquée, alors qu'une marmite en fer s'userait vite ?

La réponse tient en une ligne de classification : le couple Cu^{2+}/Cu est placé au-dessus de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$. Le cuivre est donc un réducteur trop faible pour céder ses électrons aux ions H_3O^+ : la réaction



n'est pas spontanée : elle n'a pas lieu. À l'inverse, le couple Fe^{2+}/Fe est au-dessous de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$: le fer est attaqué par les acides avec dégagement de dihydrogène :



C'est exactement le critère expérimental qui a permis de placer le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ dans la classification. Remarque pratique : à l'air, le cuivre finit quand même par se recouvrir lentement de vert-de-gris, car le dioxygène est un oxydant plus puissant que H_3O^+ — c'est pourquoi on étame (on recouvre d'étain) l'intérieur des marmites en cuivre.


6.9 La cimentation : récupérer un métal précieux par déplacement

La **cimentation** consiste à récupérer un métal noble d'une solution en le faisant déplacer par un métal moins noble et bon marché, presque toujours le fer (souvent de la ferraille recyclée : vieilles tôles, clous, chutes de ferblanterie). Le principe est une application directe de la classification : tout métal placé au-dessous dans la classification réduit les ions d'un métal placé au-dessus.

Exemple chiffré : un artisan fait passer 10 L d'une solution contenant $0,05 \text{ mol L}^{-1}$ d'ions Cu^{2+} sur de la ferraille. La quantité d'ions cuivre est $n(\text{Cu}^{2+}) = C \times V = 0,05 \times 10 = 0,5 \text{ mol}$. D'après l'équation $\text{Cu}^{2+} + \text{Fe} \longrightarrow \text{Cu} + \text{Fe}^{2+}$, il se dépose $n(\text{Cu}) = 0,5 \text{ mol}$, soit une masse :

$$m(\text{Cu}) = n \times M = 0,5 \times 63,5 \approx 32 \text{ g de cuivre récupéré,}$$

en consommant $m(\text{Fe}) = 0,5 \times 55,8 \approx 28 \text{ g}$ de ferraille sans valeur. Avec des ions argent Ag^+ (couple Ag^+/Ag , encore plus haut dans la classification), le même principe permet de récupérer l'argent des bains de photographie ou de radiographie usagés :



LESAVAIS-TU ?

La cimentation, une technique vieille de plusieurs siècles

La cimentation du cuivre par le fer est connue depuis l'Antiquité : les mineurs chinois de la dynastie Song et, plus tard, les exploitants des mines de Rio Tinto en Espagne récupéraient le cuivre des eaux de mine en y plongeant des fers de lance ou de la ferraille. Au XIX^e siècle, ce procédé fournissait une part importante du cuivre mondial. Il est encore utilisé aujourd'hui dans l'industrie minière moderne (hydrométallurgie) et dans le traitement des déchets d'ateliers de bijouterie et de galvanoplastie. Au Cameroun, où la ferraille abonde et où l'artisanat de récupération est très développé, ce principe illustre parfaitement comment une loi de chimie — la classification électrochimique — se transforme en technique économique : un déchet de fer contre un métal de valeur.

6.10 Vers la suite du programme : piles et dosages

Tout ce que tu viens d'apprendre est le socle de deux grands chapitres à venir.

- **Les piles électrochimiques (Terminale).** Quand on sépare physiquement les deux couples d'une réaction spontanée et qu'on force les électrons à passer par un circuit extérieur, on fabrique une **pile** : la réaction $\text{Cu}^{2+} + \text{Zn} \longrightarrow \text{Cu} + \text{Zn}^{2+}$ devient la pile Daniell, qui débite un courant électrique. La classification qualitative de Première deviendra quantitative grâce au **potentiel standard d'électrode** E° (en volts), mesuré par rapport au couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ pris comme référence ($E^\circ = 0,00 \text{ V}$). Tu comprends maintenant pourquoi ce couple joue un rôle si central : c'est la « borne zéro » de toute l'électrochimie.
- **Les dosages d'oxydoréduction.** De la même façon qu'on dose un acide par une base, on pourra doser un réducteur par un oxydant de concentration connue (par exemple le fer(II) par le permanganate de potassium, dont la couleur violette sert d'indicateur). L'équivalence correspondra à l'égalité des quantités d'électrons échangés.

À RETENIR L'essentiel de la leçon

- Un couple Ox/Red est lié par la demi-équation $\text{Ox} + n e^- \rightleftharpoons \text{Red}$.
- La réaction spontanée oppose l'oxydant le plus fort au réducteur le plus fort.
- La classification électrochimique se construit par des expériences de déplacement ; le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ sépare les métaux attaqués par les acides (Fe, Zn...) de ceux qui y résistent (Cu, Ag...).
- Applications directes : corrosion et protection des métaux, choix des récipients, cimentation, et bientôt les piles et les dosages.


EXERCICE 2 Pour vérifier ta maîtrise

Un bijoutier artisan de Douala récupère l'argent de ses bains usagés contenant des ions Ag^+ en y plongeant de la ferraille.

1. Écrire les deux demi-équations et l'équation bilan de la réaction.
2. Justifier, à l'aide de la classification, que cette réaction est spontanée. Pourrait-on utiliser du cuivre à la place du fer ?
3. Calculer la masse d'argent récupérée à partir d'un bain contenant 0,20 mol d'ions Ag^+ (on donne $M(\text{Ag}) = 107,9 \text{ g mol}^{-1}$).

CORRIGÉ Exercice : récupération de l'argent

1. Réduction : $\text{Ag}^+ + e^- \longrightarrow \text{Ag}$. Oxydation : $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2 e^-$. En multipliant la première par 2 puis en additionnant :



2. Le couple Ag^+/Ag est placé au-dessus de Fe^{2+}/Fe : Ag^+ est un oxydant plus fort que Fe^{2+} et Fe un réducteur plus fort que Ag, donc la réaction est spontanée. Oui, le cuivre conviendrait aussi, car Ag^+/Ag est également au-dessus de Cu^{2+}/Cu : $2 \text{Ag}^+ + \text{Cu} \longrightarrow 2 \text{Ag} + \text{Cu}^{2+}$. 3. $m(\text{Ag}) = n \times M = 0,20 \times 107,9 = 21,6 \text{ g}$ d'argent récupéré.

7 TRAVAUX PRATIQUES

7.1 Objectifs du TP

Ce travail pratique te permet de passer de la théorie à l'expérience. À l'issue de la séance, tu devras être capable de :

- réaliser des expériences de mise en évidence de quelques **couples oxydant-réducteur** ;
- réaliser des expériences mettant en jeu les couples M^{n+}/M et H_3O^+/H_2 ;
- identifier expérimentalement les produits formés (dépôt métallique, dégagement de dihydrogène) ;
- écrire les **demi-équations électroniques** et le **bilan** de chaque réaction observée ;
- établir une **classification électrochimique qualitative** des couples étudiés et y placer le couple H_3O^+/H_2 .

7.2 Matériel et produits

Matériel	Produits chimiques
6 tubes à essai + portoir	Solution de sulfate de cuivre(II) $CuSO_4$ à $0,5 \text{ mol L}^{-1}$ (bleue)
1 clou en fer décapé (ou limaille de fer)	Solution de sulfate de fer(II) $FeSO_4$ à $0,5 \text{ mol L}^{-1}$ (verdâtre)
Fil de cuivre dénudé (câble électrique)	Solution de nitrate d'argent $AgNO_3$ à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ (incolore)
Grenaille de zinc (ou lame de zinc)	Acide chlorhydrique dilué HCl à 1 mol L^{-1}
Pipettes compte-gouttes, spatule	Eau distillée
Allumettes ou bec Bunsen	
Lunettes de protection, gants, blouse	


ATTENTION Alternatives avec du matériel local

Si le nitrate d'argent n'est pas disponible (produit coûteux), remplace l'expérience 3 par un fil de cuivre plongé dans une solution de sulfate de zinc : l'absence de réaction fournit aussi une information de classement. Le zinc peut être récupéré sur le boîtier d'une vieille pile usagée (électrode de zinc des piles Leclanché), soigneusement nettoyé. Le cuivre provient d'un câble électrique dénudé, le fer d'un clou de menuiserie frotté à la toile émeri.

7.3 Sécurité

ATTENTION Consignes de sécurité obligatoires

- Lunettes et blouse portées pendant toute la séance ; cheveux longs attachés.
- Acide chlorhydrique : produit corrosif (pictogramme : deux gouttes rongeant une surface et une main). Verser toujours l'acide doucement le long de la paroi du tube, jamais le visage au-dessus. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes et prévenir l'enseignant.
- Nitrate d'argent : produit tachant (taches noires tenaces sur la peau) et dangereux pour l'environnement. Manipuler avec des gants, ne pas rejeter à l'évier : récupérer les résidus dans un bidon prévu à cet effet.
- Test à la flamme : le dihydrogène est un gaz inflammable (pictogramme flamme). N'approcher la flamme que de l'extrémité du tube à essai, jamais du flacon d'acide. Tenir le tube incliné, ouverture dirigée vers personne.
- Ne jamais goûter ni sentir directement un produit ; signaler immédiatement toute casse de verrerie.

7.4 Schéma du dispositif

Dispositifs expérimentaux : métaux plongés dans des solutions d'ions métalliques ou d'acide chlorhydrique dilué, avec test d'identification du dihydrogène à la flamme.

7.5 Protocole

1. **Expérience 1 — Fer et ions cuivre(II).** Verser environ 5 mL de solution de sulfate de cuivre(II) dans un tube à essai. Y plonger le clou en fer préalablement décapé. Attendre 5 minutes en agitant doucement de temps en temps. Observer la surface du clou et la couleur de la solution.
2. **Expérience 2 — Cuivre et ions fer(II).** Verser environ 5 mL de solution de sulfate de fer(II) dans un deuxième tube. Y plonger le fil de cuivre dénudé. Attendre 5 minutes. Observer.
3. **Expérience 3 — Cuivre et ions argent.** Verser environ 3 mL de solution de nitrate d'argent dans un troisième tube. Y plonger le fil de cuivre. Observer pendant 5 minutes (dépôt gris-argenté en « aiguilles »).
4. **Expérience 4 — Action de l'acide sur les métaux.** Dans trois tubes séparés, introduire respectivement quelques grains de zinc, un petit clou en fer et un morceau de fil de cuivre. Ajouter dans chacun environ 3 mL d'acide chlorhydrique dilué. Observer l'effervescence éventuelle et comparer sa vigueur.
5. **Test du gaz.** Pour les tubes où un dégagement gazeux est visible, boucher le tube avec un bouchon (ou le pouce ganté) pendant 30 secondes, puis approcher rapidement une flamme d'allumette de l'ouverture : une **détonation** caractéristique (petit « aboiement ») prouve la présence de dihydrogène H_2 .
6. Noter immédiatement toutes les observations dans le tableau des résultats.

7.6 Observations et résultats attendus

Expérience	Observations	Conclusion immédiate
1. Fe dans $CuSO_4$	Dépôt rougeâtre de cuivre sur le clou ; la solution bleue pâlit progressivement	Le fer réduit les ions Cu^{2+} ; réaction spontanée
2. Cu dans $FeSO_4$	Aucun changement visible après 5 min	Pas de réaction : le cuivre ne réduit pas Fe^{2+}
3. Cu dans $AgNO_3$	Dépôt gris-argenté (cristaux d'argent) sur le fil ; la solution bleuit lentement	Le cuivre réduit les ions Ag^+ ; réaction spontanée
4a. $Zn + HCl$	Effervescence vive ; détonation à la flamme	Dégagement de H_2 ; le zinc est attaqué
4b. $Fe + HCl$	Effervescence modérée ; détonation à la flamme	Dégagement de H_2 ; le fer est attaqué
4c. $Cu + HCl$	Aucune effervescence	Le cuivre n'est pas attaqué par H_3O^+

7.7 Exploitation

EXERCICE RÉSOLU 7 Questions guidées d'exploitation

Question 1. Écrire les demi-équations électroniques et l'équation-bilan de la réaction de l'expérience 1. Quels couples interviennent ?

Question 2. L'expérience 2 montre-t-elle que le cuivre est un réducteur plus fort ou plus faible que le fer ? Justifier.

Question 3. Écrire le bilan de l'expérience 3 et classer les couples Ag^+/Ag et Cu^{2+}/Cu .

Question 4. Écrire le bilan de l'action de l'acide chlorhydrique sur le zinc. Quel couple contenant H_3O^+ intervient ?

Question 5. Dédurre de l'ensemble des expériences la classification qualitative des cinq couples étudiés, du réducteur le plus fort au réducteur le plus faible. Où se situe le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$?

SOLUTION


Réponse 1. Le fer perd des électrons (oxydation) : $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$. Les ions cuivre(II) les captent (réduction) : $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$. Bilan :



Couples mis en jeu : Cu^{2+}/Cu et Fe^{2+}/Fe .

Réponse 2. Aucune réaction n'a lieu entre le cuivre et les ions Fe^{2+} : le cuivre est incapable de céder ses électrons à Fe^{2+} . Le cuivre est donc un réducteur plus faible que le fer. On écrit : Cu^{2+}/Cu est au-dessus de Fe^{2+}/Fe dans la classification.

Réponse 3. Oxydation du cuivre : $\text{Cu} \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$; réduction de l'argent : $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$ (à multiplier par 2). Bilan :




Le cuivre réduit Ag^+ , donc Ag^+/Ag est classé au-dessus de Cu^{2+}/Cu .

Réponse 4. Oxydation : $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$; réduction : $2\text{H}_3\text{O}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$. Bilan :



Le couple contenant l'ion oxonium est $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$.

Réponse 5. Le zinc et le fer réduisent H_3O^+ (dégagement de H_2), mais pas le cuivre ; le fer réduit Cu^{2+} ; le cuivre réduit Ag^+ . La classification, du réducteur le plus fort au plus faible, est donc :



Le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ se situe entre les couples Fe^{2+}/Fe et Cu^{2+}/Cu : c'est la frontière entre les métaux attaqués par les acides (Zn, Fe) et ceux qui ne le sont pas (Cu, Ag).


MÉTHODE Règle du gamma pour prévoir une réaction

1. Placer les deux couples sur l'axe de classification vertical (réducteur le plus fort en bas, oxydant le plus fort en haut).
2. Tracer le « gamma » (γ) : le réducteur le plus fort (en bas à droite) réagit avec l'oxydant le plus fort (en haut à gauche), placés en diagonale.
3. Conclure : la réaction spontanée est celle qui relie ces deux espèces ; l'autre sens est impossible.

Exemple : Fe (bas) et Cu^{2+} (haut) sont en diagonale $\Rightarrow$ réaction. Cu et Fe^{2+} sont sur l'autre diagonale $\Rightarrow$ aucune réaction.

À RETENIR À retenir de la séance

- Un **couple oxydant-réducteur** s'écrit Ox/Red (ex. Cu^{2+}/Cu). L'oxydant capte les électrons, le réducteur en cède.
- Une réaction d'oxydoréduction spontanée met en jeu un oxydant et un réducteur tels que l'oxydant est plus fort que l'oxydant du couple réducteur (règle du gamma).
- La **classification électrochimique qualitative** ordonne les couples par pouvoir oxydant/réducteur croissant. Pour les couples métalliques M^{n+}/M et le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$:



- Les métaux situés au-dessous de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ (Zn, Fe, Mg, Al...) sont attaqués par les acides avec dégagement de H_2 . Ceux au-dessus (Cu, Ag, Au...) ne le sont pas.

LES AVAIS-TU ? Applications au quotidien camerounais


- Corrosion et protection : Le fer (toitures, charpentes, fûts à bili-bili) rouille car Fe^{2+}/Fe est sous $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$. La galvanisation (zinc sur fer) protège : le zinc (Zn^{2+}/Zn plus bas) s'oxyde à la place du fer (anode sacrificielle).
- Cuisine et conservation : Le vinaigre (acide acétique, source de H_3O^+) attaque les casseroles en aluminium (Al^{3+}/Al très bas) mais pas celles en inox (fer passivé) ni en cuivre. C'est pourquoi le vin de palme ou le bissap acides ne se conservent pas longtemps dans des récipients métalliques non adaptés.
- Bijouterie et monnaie : L'argent et le cuivre (alliages) résistent aux acides faibles (jus de fruit, sueur) car leurs couples sont au-dessus de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$. En revanche, le nitrate d'argent (rayons X, pharmacopée) noircit la peau par réduction en Ag métallique au contact.

des réducteurs organiques.

- Piles et batteries : Les piles alcalines (Zn/MnO₂) et les accumulateurs plomb-acide (voitures, groupes électrogènes CIMENCAM/SONARA) reposent sur des couples choisis aux extrémités de la classification pour maximiser la tension.

7.8 Conclusion

Les expériences réalisées montrent qu'un métal ne réagit avec les ions d'un autre métal que s'il est un **réducteur plus fort** que celui-ci. En comparant deux à deux les couples M^{n+}/M , on construit une **classification électrochimique qualitative** :



Le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ occupe une place charnière : les métaux situés en dessous de lui (Zn, Fe, Mg, Al, etc.) sont attaqués par les acides à ions H_3O^+ avec dégagement de dihydrogène ; ceux situés au-dessus (Cu, Ag, Au, Pt) y sont inertes. C'est précisément pourquoi les bijoux en cuivre ou en argent ne sont pas rongés par le vinaigre de la cuisine, alors qu'un clou en fer laissé dans un jus acide (bissap, vin de palme) se dégrade rapidement. La classification électrochimique est donc un outil de prévision puissant : elle permet d'annoncer, sans refaire l'expérience, si une réaction d'oxydoréduction entre un métal et un ion est possible ou non.


8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 LEÇON 06 : COUPLE OXYDANT-RÉDUCTEUR ET CLASSIFICATION ÉLECTROCHIMIQUE

9.1 1. Couple oxydant-réducteur : définition et écriture

DÉFINITION Couple oxydant-réducteur

Un **couple oxydant-réducteur** (noté Ox/Red) est un ensemble de deux espèces chimiques (l'**oxydant** Ox et le **réducteur** Red) qui ne diffèrent que par un nombre entier n d'électrons. L'oxydant est l'espèce qui capte les électrons (il s'**réduit**), le réducteur est l'espèce qui cède les électrons (il s'**oxyde**). La transformation s'écrit sous forme de **demi-équation électronique** (ou demi-réaction) dans le sens de la réduction :



PROPRIÉTÉ Écriture et équilibrage d'une demi-équation

Pour écrire la demi-équation d'un couple Ox/Red en milieu aqueux :

1. Écrire l'oxydant à gauche, le réducteur à droite, séparés par $\rightleftharpoons$.
2. Équilibrer les atomes autres que O et H.
3. Équilibrer l'oxygène en ajoutant H_2O .
4. Équilibrer l'hydrogène en ajoutant H_3O^+ (milieu acide) ou OH^- (milieu basique).
5. Équilibrer la charge en ajoutant des électrons e^- du côté le plus positif.

Le couple se note toujours Ox/Red (ex. : Cu^{2+}/Cu , $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$, $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$).

PROPRIÉTÉ Couples métalliques M^{n+}/M

Pour un métal M et son cation M^{n+} , le couple s'écrit M^{n+}/M . La demi-équation est : $\text{M}^{n+} + n e^- \rightleftharpoons \text{M}$.

- L'oxydant est le cation métallique M^{n+} .
- Le réducteur est le métal M (solide, état standard).

MÉTHODE Identifier un couple oxydant-réducteur et écrire sa demi-équation

Pour reconnaître et écrire correctement un couple Ox/Red :

1. Repérer dans l'énoncé les deux espèces conjuguées : l'une contient l'élément à un degré d'oxydation élevé (l'**oxydant**), l'autre à un degré d'oxydation plus faible (le **réducteur**).
2. Vérifier que les deux espèces ne diffèrent que par des électrons (éventuellement avec H_3O^+ et H_2O pour équilibrer O et H en milieu acide).
3. Écrire la demi-équation dans le sens oxydant $+n e^- \rightleftharpoons$ réducteur : l'oxydant est toujours écrit à gauche, les électrons à côté de lui.
4. Équilibrer dans l'ordre : les atomes autres que O et H, puis O avec H_2O , puis H avec H_3O^+ , enfin la charge avec les électrons.
5. Noter le couple sous la forme Ox/Red : Cu^{2+}/Cu , Zn^{2+}/Zn , $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$.

Réflexe : dans un couple M^{n+}/M , le cation métallique est l'oxydant, le métal est le réducteur.

EXERCICE RÉSOLU 8 Reconnaître les couples et écrire les demi-équations

Lors d'une séance de travaux pratiques au lycée de Nkongsamba, on réalise les expériences suivantes : (a) un clou en fer plongé dans une solution de sulfate de cuivre(II) se recouvre d'un dépôt rougeâtre ; (b) une lame de zinc plongée dans une solution de sulfate de fer(II) se recouvre d'un dépôt gris foncé.

1. Identifier les couples oxydant-réducteur mis en jeu dans chaque expérience.
2. Écrire la demi-équation électronique de chaque couple.
3. Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'expérience (a).




SOLUTION

1. Identification des couples.

Expérience (a) : le dépôt rougeâtre est du cuivre métallique Cu ; le fer Fe s'est transformé en ions Fe^{2+} . Couples mis en jeu : Cu^{2+}/Cu et Fe^{2+}/Fe .


Expérience (b) : le dépôt gris est du fer Fe ; le zinc Zn s'est transformé en ions Zn^{2+} . Couples mis en jeu : Fe^{2+}/Fe et Zn^{2+}/Zn .

2. Demi-équations électroniques (oxydant à gauche, électrons à gauche) :




3. Équation-bilan de l'expérience (a).

Le fer est le réducteur qui cède des électrons (oxydation) : $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$.
 L'ion cuivre(II) est l'oxydant qui capte des électrons (réduction) : $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$.
 Les électrons échangés sont au même nombre (2e^-) : on additionne membre à membre et on simplifie les électrons :



Conclusion : le fer, réducteur plus fort que le cuivre, réduit les ions Cu^{2+} ; l'équation-bilan est $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}$.

Pouvoir réducteur croissant Pouvoir oxydant croissant



Représentation schématisée de la règle du γ (diagonale) dans une classification où le pouvoir réducteur croît vers le haut.

9.2 2. Réaction entre un métal et un ion métallique : couples M^{n+}/M

PROPRIÉTÉ Règle du γ (gamma) et déplacement

Dans une classification électrochimique où les réducteurs sont classés par pouvoir réducteur croissant vers le bas (ou vers la gauche) :

- L'oxydant le plus fort est en haut (ou à droite).
- Le réducteur le plus fort est en bas (ou à gauche).
- La réaction spontanée (naturelle) a lieu entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort : c'est la **règle du γ** (diagonale descendante).
- Un métal M_1 réduit les ions M_2^{n+} si et seulement si M_1 est un réducteur plus fort que M_2 (c'est-à-dire placé au-dessous de M_2 dans la classification « réducteur fort en bas »).

- On dit que M_1 déplace M_2 de sa solution.

MÉTHODE Prévoir si un métal réagit avec un ion métallique (couples M^{n+}/M)

Pour savoir si un métal M_1 peut réduire les ions M_2^{n+} :

1. Écrire les deux couples concernés : M_1^{n+}/M_1 et M_2^{n+}/M_2 .
2. Placer les deux couples dans la **classification électrochimique** (de mémoire ou fournie) : le réducteur le plus fort est le métal placé le plus bas (convention « réducteur fort en bas »).
3. Appliquer la **règle du γ** : la réaction naturelle a lieu entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort, c'est-à-dire en diagonale.
4. Conclure : le métal M_1 réduit les ions M_2^{n+} uniquement si M_1 est un réducteur plus fort que M_2 (M_1 placé au-dessous de M_2).
5. Écrire l'équation-bilan en égalisant le nombre d'électrons échangés.

Réflexe : un métal déplace de ses solutions tout métal situé au-dessus de lui dans la classification (réducteur moins fort).

EXERCICE RÉSOLU 9 Le métal zinc peut-il débarrasser une eau de ses ions cuivre(II) ?

Pour traiter une eau de rejet d'un atelier de gravure contenant des ions Cu^{2+} , un technicien de Douala propose d'y plonger de la grenaille de zinc. On donne l'extrait de classification électrochimique (réducteur de plus en plus fort vers le bas) : Cu^{2+}/Cu puis Zn^{2+}/Zn .


1. Justifier que le zinc réduit les ions Cu^{2+} et écrire l'équation-bilan.
2. On plonge 6,54 g de zinc dans 500 mL d'une solution de sulfate de cuivre(II) de concentration $C = 0,20 \text{ mol L}^{-1}$. Déterminer le réactif limitant.
3. Calculer la masse de cuivre déposée.


Données : $M(Zn) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$; $M(Cu) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

1. Préviation de la réaction.

Dans la classification, le zinc est placé au-dessous du cuivre : Zn est un réducteur plus fort que Cu, et Cu^{2+} est un oxydant plus fort que Zn^{2+} . Par la règle du γ, la réaction spontanée a lieu entre Cu^{2+} (oxydant le plus fort) et Zn (réducteur le plus fort) :





Le procédé du technicien est donc valable.

2. Réactif limitant.

Quantités de matière initiales :

$$n(\text{Zn}) = \frac{m}{M} = \frac{6,54}{65,4} = 0,100 \text{ mol}$$

$$n(\text{Cu}^{2+}) = C \times V = 0,20 \times 0,500 = 0,100 \text{ mol}$$

Tableau d'avancement :

État	Zn	Cu^{2+}	Zn^{2+}	Cu
Initial (mol)	0,100	0,100	0	0
En cours (mol)	$0,100 - x$	$0,100 - x$	x	x
Final (mol)	$0,100 - x_{\text{max}}$	$0,100 - x_{\text{max}}$	x_{max}	x_{max}

Les deux réactifs donnent la même valeur $x_{\text{max}} = 0,100 \text{ mol}$: le mélange est stœchiométrique, il n'y a pas de réactif en excès.

3. Masse de cuivre déposée.

$$n(\text{Cu}) = x_{\text{max}} = 0,100 \text{ mol}$$


$$m(\text{Cu}) = n \times M = 0,100 \times 63,5 = 6,35 \text{ g}$$

Conclusion : la réaction est totale, les deux réactifs sont entièrement consommés et il se dépose 6,35 g de cuivre métallique sur la grenaille de zinc.

9.3 3. Action des ions H_3O^+ sur les métaux : le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$

DÉFINITION Couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$

En milieu acide aqueux, le couple de référence est $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ (souvent noté H^+/H_2 par simplification). Sa demi-équation de réduction est :



L'oxydant est l'ion hydronium H_3O^+ (ou proton H^+), le réducteur est le dihydrogène H_2 (gaz).

MÉTHODE Étudier l'action des ions H_3O^+ sur un métal (couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$)

Pour savoir si un métal M est attaqué par un acide (HCl , H_2SO_4 dilué) :

1. Repérer les deux couples en présence : $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ et M^{n+}/M .
2. Localiser le métal par rapport à l'hydrogène dans la classification (réducteur fort en bas) :
 - métal placé au-dessous de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ (Zn, Fe, Al, Mg...) : il réduit H_3O^+ , il y a dégagement de dihydrogène et dissolution du métal ;
 - métal placé au-dessus de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ (Cu, Ag, Au...) : aucune réaction avec les acides non oxydants.
3. Écrire les demi-équations : $2\text{H}_3\text{O}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ et $\text{M} \longrightarrow \text{M}^{n+} + n\text{e}^-$, puis équilibrer les électrons.
4. Caractériser le gaz formé : le dihydrogène produit une détonation (« aboiement ») à l'approche d'une flamme.

Réflexe : seuls les métaux placés au-dessous de l'hydrogène (réducteurs plus forts que H_2) dégagent H_2 avec les acides non oxydants.

EXERCICE RÉSOLU 10 Zinc, fer et cuivre face à l'acide chlorhydrique

Dans trois tubes à essais, on verse 10 mL d'acide chlorhydrique à $1,0\text{ mol L}^{-1}$ et on introduit respectivement de la grenaille de zinc, de la limaille de fer et de la tournure de cuivre.

1. Décrire ce qu'on observe dans chaque tube et identifier le gaz éventuellement dégagé.
2. Écrire l'équation-bilan de chaque réaction qui a lieu.
3. Calculer le volume de gaz dégagé (mesuré dans les conditions où $V_m = 24,0\text{ L mol}^{-1}$) dans le tube contenant 1,31 g de zinc, l'acide étant en excès.

Donnée : $M(\text{Zn}) = 65,4\text{ g mol}^{-1}$. Classification : Cu^{2+}/Cu ; $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$; Fe^{2+}/Fe ; Zn^{2+}/Zn (réducteur croissant vers le bas).

SOLUTION


1. Observations.

- Tube au zinc : le zinc est au-dessous de l'hydrogène, donc réducteur plus fort que H_2 : effervescence vive, dégagement de H_2 (détonation à la flamme), dissolution progressive du zinc.
- Tube au fer : le fer est aussi au-dessous de l'hydrogène : effervescence (plus lente qu'avec le zinc), dégagement de H_2 , la solution verdit légèrement (apparition des ions Fe^{2+}).


- Tube au cuivre : le cuivre est au-dessus de l'hydrogène, réducteur plus faible que H_2 : aucune réaction observable.

2. Équations-bilans.

Tube au zinc : $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2 e^-$ et $2 H_3O^+ + 2 e^- \longrightarrow H_2 + 2 H_2O$, d'où :



Tube au fer :



3. Volume de dihydrogène.

L'acide est en excès, le zinc est le réactif limitant :

$$n(Zn) = \frac{1,31}{65,4} = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

D'après l'équation, $n(H_2) = n(Zn) = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol}$.

$$V(H_2) = n \times V_m = 2,00 \times 10^{-2} \times 24,0 = 0,480 \text{ L} = 480 \text{ mL}$$

Conclusion : le zinc et le fer sont attaqués par l'acide chlorhydrique avec dégagement de dihydrogène, contrairement au cuivre ; le tube au zinc dégage 480 mL de H_2 .

LESAVAIS-TU ?

Le dihydrogène, énergie propre et industrie camerounaise

La réaction des métaux avec les acides pour produire du H_2 est à la base de la production industrielle d'hydrogène (vapeur + méthane CH_4 à haute température chez SONARA ou engrais). Au laboratoire, c'est une méthode classique de préparation du gaz. Le H_2 est un vecteur d'énergie prometteur (pile à combustible, voiture H_2) car sa combustion ne donne que de l'eau : $2 H_2 + O_2 \longrightarrow 2 H_2O$. Au Cameroun, la corrosion des toitures en tôle (fer) par l'acidité des pluies (gaz CO_2 , SO_2) libère lentement de l'hydrogène et forme de la rouille (Fe_2O_3), d'où l'importance des peintures protectrices ou de la galvanisation (zinc).

9.4 4. Construction de la classification électrochimique qualitative

MÉTHODE

Construire une classification électrochimique qualitative à partir d'expériences

Pour classer des couples à partir d'observations expérimentales :

1. Pour chaque expérience « métal A + ion B^{n+} », noter si une réaction a lieu (dépôt, coloration, effervescence) ou non.

2. Traduire chaque observation en inégalité de pouvoir réducteur :
 - si A réduit B^{n+} (réaction observée) : A est réducteur plus fort que B ;
 - si rien ne se passe : A est réducteur moins fort que B.
3. Utiliser les expériences avec les acides pour placer le couple H_3O^+ / H_2 : les métaux attaqués par H_3O^+ sont au-dessous de l'hydrogène, les autres au-dessus.
4. Croiser toutes les inégalités et ranger les couples par pouvoir réducteur croissant (ou décroissant) en respectant une convention claire et en l'indiquant explicitement.
5. Vérifier la cohérence : toute réaction observée doit correspondre à la règle du γ dans la classification obtenue.

EXERCICE RÉSOLU 11 Établir une classification à partir de quatre expériences

On réalise les expériences suivantes :

- Exp. 1 : une lame de zinc plongée dans une solution de $CuSO_4$ se recouvre de cuivre.
 - Exp. 2 : une lame de fer plongée dans une solution de $ZnSO_4$: aucune réaction.
 - Exp. 3 : une lame de fer plongée dans l'acide chlorhydrique dilué : dégagement gazeux.
 - Exp. 4 : une lame de cuivre plongée dans l'acide chlorhydrique dilué : aucune réaction.
1. Interpréter chaque expérience par une inégalité de pouvoir réducteur.
 2. Classer les couples Cu^{2+} / Cu , H_3O^+ / H_2 , Fe^{2+} / Fe , Zn^{2+} / Zn par pouvoir réducteur croissant du métal.

SOLUTION**1. Interprétations.**

Exp. 1 : le zinc réduit les ions Cu^{2+} ($Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu$), donc Zn est un réducteur plus fort que Cu : $Zn > Cu$.

Exp. 2 : le fer ne réduit pas les ions Zn^{2+} , donc Fe est un réducteur moins fort que Zn : $Zn > Fe$.

Exp. 3 : le fer réduit les ions H_3O^+ en H_2 , donc Fe est un réducteur plus fort que H_2 : $Fe > H_2$.

Exp. 4 : le cuivre ne réduit pas H_3O^+ , donc Cu est un réducteur moins fort que H_2 : $H_2 > Cu$.

2. Classification.

En croisant les inégalités : $Zn > Fe > H_2 > Cu$.

Classification par pouvoir réducteur croissant (du métal le moins réducteur au plus réducteur) :

Couple Ox/Red	Pouvoir réducteur du métal
Cu^{2+}/Cu	le plus faible
$\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$	intermédiaire (référence)
Fe^{2+}/Fe	fort
Zn^{2+}/Zn	le plus fort

Conclusion : le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ se place entre les couples Cu^{2+}/Cu et Fe^{2+}/Fe ; le zinc est le réducteur le plus fort des quatre.

À RETENIR Classification électrochimique de référence (extrait)

Rang	Couple Ox/Red	Pouvoir réducteur du Red
1	K^+/K ; Ca^{2+}/Ca ; Na^+/Na ; Mg^{2+}/Mg	Très fort (métaux alcalins/alcalino-terreux)
2	Al^{3+}/Al ; Zn^{2+}/Zn ; Fe^{2+}/Fe ; Ni^{2+}/Ni ; Sn^{2+}/Sn ; Pb^{2+}/Pb	Fort (réduisent H_3O^+)
3	$2\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$	Référence
4	Cu^{2+}/Cu ; Ag^+/Ag ; Au^{3+}/Au	Faible (ne réduisent pas H_3O^+)

Convention : dans ce tableau, le pouvoir réducteur croît vers le bas. L'oxydant le plus fort est en haut (K^+), le réducteur le plus fort est en bas (Au... non, K). Attention : certains tableaux inversent le sens. Indiquez toujours votre convention.

9.5 5. Utilisation de la classification : prévision des réactions

MÉTHODE Prévoir une réaction et choisir les bons matériaux grâce à la classification

Pour exploiter la classification dans un problème concret (protection, corrosion, choix de matériau) :

1. Identifier toutes les espèces susceptibles de réagir (métaux, ions, acide).
2. Écrire tous les couples présents et les classer selon la convention adoptée.
3. Appliquer la règle du γ : seule la réaction entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort est spontanée.
4. Pour protéger un métal M de la corrosion : le mettre en contact avec un métal plus réducteur que lui (anode sacrificielle, galvanisation au zinc) qui s'oxydera à sa place.

5. Pour stocker une solution d'ions M^{n+} : choisir un récipient en métal moins réducteur que M, sinon le récipient est attaqué.

EXERCICE RÉSOLU 12 Peut-on stocker une solution de sulfate de cuivre dans une cuve en fer ?

Une coopérative agricole de l'Ouest camerounais utilise une solution de sulfate de cuivre(II) (bouillie bordelaise) comme fongicide pour les cacaoyers. Le responsable propose de la stocker dans une cuve en fer.


1. Montrer, à l'aide de la classification, que ce choix est mauvais et écrire l'équation-bilan de la réaction qui se produirait.
2. Proposer deux métaux, parmi Cu, Ag, Zn, Fe, convenant pour fabriquer la cuve. Justifier.
3. La cuve en fer contient 200 L de solution à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ en Cu^{2+} . Quelle masse de fer serait consommée si toute la solution réagissait ?

Donnée : $M(\text{Fe}) = 55,8 \text{ g mol}^{-1}$. Classification (réducteur croissant vers le bas) : Cu^{2+}/Cu ; Ag^+/Ag au-dessus; Fe^{2+}/Fe ; Zn^{2+}/Zn .

SOLUTION

1. Incompatibilité fer / ions Cu^{2+} .

Le fer est un réducteur plus fort que le cuivre : par la règle du γ, Fe réduit spontanément Cu^{2+} :



La cuve serait rongée (corrosion, fuites) et la solution épuisée en ions Cu^{2+} : le choix est mauvais.

2. Choix du matériau.

Il faut un métal réducteur moins fort que le cuivre, c'est-à-dire placé au-dessus du couple Cu^{2+}/Cu : le cuivre lui-même (même couple, aucune réaction) ou l'argent (réducteur plus faible que Cu, incapable de réduire Cu^{2+}). Le zinc et le fer, plus réducteurs, seraient attaqués.

3. Masse de fer consommée.

$$n(\text{Cu}^{2+}) = C \times V = 0,10 \times 200 = 20 \text{ mol}$$

D'après l'équation, $n(\text{Fe}) = n(\text{Cu}^{2+}) = 20 \text{ mol}$.

$$m(\text{Fe}) = n \times M = 20 \times 55,8 = 1116 \text{ g} \approx 1,12 \text{ kg}$$

Conclusion : la cuve en fer est inadaptée : elle perdrait environ 1,12 kg de fer et toute la solution serait détruite ; il faut une cuve en cuivre (ou en matière plastique inerte type PEHD).

LESAVAIS-TU ? Corrosion et protection au Cameroun : du Mont Cameroun aux pipelines

La corrosion du fer (rouille) est une réaction d'oxydoréduction où le fer s'oxyde en $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ par l'oxygène de l'air et l'eau. Au Cameroun, l'humidité et l'acidité des sols (région du Mont Cameroun, zones volcaniques) accélèrent ce phénomène.

- Galvanisation : les pylônes électriques (ENEO), les toitures et les gaines de forage sont en acier galvanisé (zinc). Le zinc (réducteur plus fort que le fer) s'oxyde à la place du fer : protection sacrificielle.
- Anodes sacrificielles : les pipelines de SONARA (pétrole) et les coques de navires au port de Douala/Kribi sont protégés par des anodes en magnésium ou aluminium (encore plus réducteurs que le zinc).
- Passivation : l'aluminium (casseroles, structures) forme une couche d'alumine Al_2O_3 imperméable qui le protège, malgré sa position forte dans la classification.

9.6 6. Synthèse et applications au quotidien camerounais**À RETENIR Synthèse : les 4 piliers de l'oxydoréduction en Première**

1. Couple Ox/Red : deux espèces conjuguées différant par $n e^-$. Écriture $\text{Ox} + n e^- \rightleftharpoons \text{Red}$. Notation Ox/Red.
2. Classification : rangement des couples selon le pouvoir oxydant/réducteur. Convention explicite (ex. : réducteur fort en bas). Place du couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ comme référence.
3. Règle du γ : réaction spontanée = diagonale (Ox fort + Red fort). Prévoir le sens d'une réaction, le réactif limitant, les produits.
4. Calculs quantitatifs : équation-bilan $\rightarrow$ quantités initiales $\rightarrow$ tableau d'avancement $\rightarrow x_{\text{max}} \rightarrow$ bilan final (masses, concentrations, volumes gazeux).

MÉTHODE Exploiter quantitativement une réaction d'oxydoréduction (tableau d'avancement)

Pour les calculs de quantités de matière en oxydoréduction :

1. Écrire et équilibrer l'équation-bilan ionique de la réaction (égalité des atomes et des charges).
2. Calculer les quantités initiales : $n = \frac{m}{M}$ pour un solide, $n = C \times V$ pour un soluté (attention : V en litres).

3. Dresser le tableau d'avancement et déterminer $x_{\max}$ en annulant chaque quantité de réactif : la plus petite valeur trouvée est $x_{\max}$.
4. En déduire le bilan final : masses ($m = n \times M$), concentrations ($C = \frac{n}{V}$), volumes de gaz ($V = n \times V_m$).
5. Vérifier la cohérence (unités, chiffres significatifs, réactif restant positif ou nul).

EXERCICE RÉSOLU 13 Dépôt d'argent sur une lame de cuivre

On plonge une lame de cuivre de masse $m = 3,18 \text{ g}$ dans $V = 100 \text{ mL}$ d'une solution de nitrate d'argent de concentration $C = 0,50 \text{ mol L}^{-1}$. Il se forme un dépôt gris d'argent et la solution bleuit.



1. Écrire l'équation-bilan de la réaction.
2. Déterminer l'avancement maximal et le réactif limitant.
3. Calculer la masse d'argent déposée et la concentration finale en ions Cu^{2+} (volume supposé constant).

Données : $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Ag}) = 107,9 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

1. Équation-bilan.

Couples : Ag^+ / Ag et $\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}$. Le cuivre, réducteur plus fort que l'argent, réduit Ag^+ :



2. Avancement maximal.

Quantités initiales :

$$n(\text{Cu}) = \frac{3,18}{63,5} = 5,01 \times 10^{-2} \text{ mol} \quad n(\text{Ag}^+) = 0,50 \times 0,100 = 5,00 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

Tableau d'avancement :

État (mol)	Cu	Ag^+	Cu^{2+}	Ag
Initial	0,0501	0,0500	0	0
Final	$0,0501 - x_{\max}$	$0,0500 - 2x_{\max}$	$x_{\max}$	$2x_{\max}$

Si Cu limitant : $x_{\max} = 0,0501 \text{ mol}$. Si Ag^+ limitant : $x_{\max} = \frac{0,0500}{2} = 0,0250 \text{ mol}$.

La plus petite valeur est retenue : $x_{\max} = 2,50 \times 10^{-2} \text{ mol}$; le réactif limitant est l'ion Ag^+ .

3. Bilan final.

Masse d'argent déposée :

$$m(\text{Ag}) = 2x_{\text{max}} \times M(\text{Ag}) = 0,0500 \times 107,9 = 5,40 \text{ g}$$

Concentration finale en Cu^{2+} :

$$[\text{Cu}^{2+}]_f = \frac{x_{\text{max}}}{V} = \frac{0,0250}{0,100} = 0,250 \text{ mol L}^{-1}$$

Conclusion : il se dépose 5,40 g d'argent, la solution atteint $[\text{Cu}^{2+}] = 0,250 \text{ mol L}^{-1}$ et il reste $0,0501 - 0,0250 = 2,51 \times 10^{-2} \text{ mol}$ de cuivre non attaqué.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Inverser oxydant et réducteur dans le couple. Un couple s'écrit toujours Ox/Red : Cu^{2+}/Cu et jamais Cu/Cu^{2+} . Le métal est le réducteur, l'ion est l'oxydant.
2. Placer les électrons du mauvais côté. Dans la demi-équation écrite en réduction, les électrons sont à gauche, avec l'oxydant : $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$. Des électrons à droite dans l'écriture du couple est une faute.
3. Oublier d'égaliser les électrons avant d'additionner. Avec Ag^+/Ag et Cu^{2+}/Cu , il faut multiplier la demi-équation de l'argent par 2 : $\text{Cu} + 2\text{Ag}^+ \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Ag}$. Écrire $\text{Cu} + \text{Ag}^+ \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Ag}$ est doublement faux (charge et matière non conservées).
4. Croire que tout métal réagit avec les acides. Le cuivre, l'argent, l'or (au-dessus de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ dans la classification « réducteur fort en bas ») ne sont pas attaqués par les acides non oxydants. Toujours comparer la position du métal à celle de l'hydrogène avant de conclure.
5. Confondre le sens de la classification. Avant d'appliquer la règle du γ , vérifie la convention du tableau (réducteur fort en haut ou en bas?). Une classification lue à l'envers donne la prévision exactement inverse. Indique toujours le sens choisi dans ta copie.

EXERCICE 3 Entraînement : Prévoir et calculer

1. On plonge une lame d'argent dans une solution de nitrate de fer(II) $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$. Prédire ce qui se passe. Justifier par la classification.
2. On souhaite produire du dihydrogène en faisant réagir de l'acide chlorhydrique sur un métal. Parmi Cu, Zn, Ag, Fe, lesquels conviennent ? Écrire l'équation-bilan pour celui qui réagit le plus vite.

3. Problème Probatoire type : On introduit 2,00 g de poudre de zinc dans 100,0 mL d'une solution de nitrate d'argent AgNO_3 à $0,100 \text{ mol L}^{-1}$.

- Écrire l'équation-bilan de la réaction.
- Faire le tableau d'avancement et déterminer le réactif limitant.
- Calculer la masse d'argent métallique obtenue et la concentration finale en ions Zn^{2+} .

Données : $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Ag}) = 107,9 \text{ g mol}^{-1}$.

CORRIGÉ Exercice n

1. Couples : Ag^+ / Ag et $\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}$. Dans la classification, Ag est au-dessus de Fe (réducteur plus faible). L'argent ne réduit pas Fe^{2+} . Aucune réaction.

2. Métaux au-dessous de $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2$: Zn et Fe. Le zinc réagit plus vite (plus réducteur).
Équation : $\text{Zn} + 2 \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$.

3.

- Couples : Ag^+ / Ag , $\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}$. Zn plus réducteur que Ag. Réaction : $\text{Zn} + 2 \text{Ag}^+ \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2 \text{Ag}$.
- $n(\text{Zn}) = 2,00 / 65,4 = 3,06 \times 10^{-2} \text{ mol}$. $n(\text{Ag}^+) = 0,100 \times 0,100 = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol}$.
- Tableau : Initial Zn ($3,06 \times 10^{-2}$), Ag+ ($1,00 \times 10^{-2}$). Final Zn ($3,06 \times 10^{-2} - x$), Ag+ ($1,00 \times 10^{-2} - 2x$).
- $x_{\max}(\text{Zn}) = 3,06 \times 10^{-2}$; $x_{\max}(\text{Ag}^+) = 5,00 \times 10^{-3}$. Limitant = Ag⁺. $x_{\max} = 5,00 \times 10^{-3} \text{ mol}$.
- $m(\text{Ag}) = 2x_{\max} \times M(\text{Ag}) = 0,0100 \times 107,9 = 1,08 \text{ g}$.
- $[\text{Zn}^{2+}]_f = x_{\max} / 0,100 = 0,0500 \text{ mol L}^{-1}$.

10 EXERCICES

11 COUPLE OXYDANT-RÉDUCTEUR ET CLASSIFICATION ÉLECTROCHIMIQUE

11.1 1. Couple oxydant-réducteur : définition et écriture


DÉFINITION Couple oxydant-réducteur

Un **couple oxydant-réducteur** est un ensemble de deux espèces chimiques (l'une chargée, l'autre neutre ou différemment chargée) qui se transforment l'une en l'autre par gain ou perte d'**électrons**. On le note sous la forme Ox/Red (ou Ox/Red avec une barre oblique), où :

- Ox est la **forme oxydée** (l'**oxydant**) : elle accepte des électrons.
- Red est la **forme réduite** (le **réducteur**) : elle donne des électrons.

PROPRIÉTÉ Demi-équation électronique

La transformation d'un couple s'écrit sous forme d'une **demi-équation électronique** (ou demi-réaction) équilibrée en atomes et en charges :



- Sens direct (de gauche à droite) : **réduction** (gain de n électrons par l'oxydant).
- Sens inverse (de droite à gauche) : **oxydation** (perte de n électrons par le réducteur).

EXEMPLE Écriture des couples usuels

Couple	Oxydant (Ox)	Réducteur (Red)	Demi-équation électronique
Cu^{2+}/Cu	Cu^{2+}	Cu	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$
Fe^{2+}/Fe	Fe^{2+}	Fe	$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$
Zn^{2+}/Zn	Zn^{2+}	Zn	$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}$
Ag^+/Ag	Ag^+	Ag	$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}$
Al^{3+}/Al	Al^{3+}	Al	$\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Al}$
$\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$	H_3O^+	H_2	$2\text{H}_3\text{O}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
$\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$	MnO_4^-	Mn^{2+}	$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	Cr^{3+}	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$

ATTENTION Pièges à éviter

- Ne pas confondre oxydant (espèce qui s'oxyde ? NON, qui oxyde l'autre, donc qui se réduit) et réducteur (espèce qui réduit l'autre, donc qui s'oxyde).
- La barre oblique / sépare l'oxydant (à gauche) du réducteur (à droite) : Ox/Red.
- Dans la demi-équation, les électrons sont à gauche (réduction). Pour l'oxydation, on retourne la flèche et les électrons passent à droite.
- Vérifier systématiquement l'équilibre des charges (somme des charges à gauche = somme des charges à droite).

11.2 2. Réaction entre un métal et un ion métallique : couples Mn^+/M **EXPÉRIENCE** Mise en évidence de la réactivité des métaux vis-à-vis des ions métalliques

Matériel : Bêchers, lames de métaux (Zn, Fe, Cu, Al), solutions de sels (CuSO_4 bleu, FeSO_4 vert pâle, AgNO_3 incolore, ZnSO_4 incolore), papier émeri, pince à épreuve.

Protocole :

1. Décaper chaque lame de métal avec du papier émeri (éliminer la couche d'oxyde passivante).
2. Plonger une lame de zinc dans CuSO_4 , une lame de fer dans CuSO_4 , un fil de cuivre dans AgNO_3 , une lame de cuivre dans ZnSO_4 , etc.
3. Observer pendant 5 à 10 min : aspect du métal (dépôt, ternissement), couleur de la solution.

Observations types :



- Zn dans CuSO_4 : La lame se recouvre d'un dépôt rouge-orangé (cuivre métallique), la solution bleue se décolore. Réaction.
- Fe dans CuSO_4 : Le clou se recouvre de cuivre, solution se décolore. Réaction.
- Cu dans AgNO_3 : Le fil se recouvre d'un dépôt gris-noir (argent), solution reste incolore. Réaction.
- Cu dans ZnSO_4 : Aucune transformation visible. Pas de réaction.
- Fe dans ZnSO_4 : Aucune transformation. Pas de réaction.

Interprétation : Une réaction a lieu si le métal mis en présence (réducteur) est plus fort réducteur que le métal de l'ion en solution (réducteur associé à l'oxydant). Le réducteur le plus fort donne ses électrons à l'oxydant le plus fort.

MÉTHODE Écrire l'équation-bilan d'une réaction entre un métal et un ion métallique

Exemple : Lame de fer dans solution de Cu^{2+} .

1. Identifier les deux couples en présence : Fe^{2+}/Fe et Cu^{2+}/Cu .
2. Écrire les deux demi-équations de réduction :



3. Déterminer le sens spontané : le réducteur le plus fort (celui qui donne le plus facilement ses électrons) s'oxyde. Ici, le fer réduit les ions $\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Fe}$ s'oxyde (oxydation), Cu^{2+} se réduit (réduction).
4. Retourner la demi-équation de l'oxydation (électrons à droite) : $\text{Fe} \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$
5. Additionner les deux demi-équations (électrons s'annulent) :



6. Vérifier : atomes et charges équilibrés.

11.3 3. Action des ions H_3O^+ sur les métaux : le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$

EXPÉRIENCE Réaction des métaux avec une solution acide diluée

Matériel : Tubes à essai, acide chlorhydrique dilué (HCl $0,5 \text{ mol L}^{-1}$), acide sulfurique dilué

(H_2SO_4 $0,5 \text{ mol L}^{-1}$), grenaille de zinc, limaille de fer, fil de cuivre, lame d'aluminium, allumette, entonnoir à gaz ou tube retourné.


Protocole :

1. Introduire 2 mL d'acide dans chaque tube.
2. Ajouter le métal (bien décapé pour l'Al).
3. Observer : dégagement gazeux (vitesse, abondance), échauffement, aspect du métal.
4. Recueillir le gaz et tester à la flamme (détonation caractéristique = dihydrogène H_2).

Observations et interprétations :

Métal	Observation	Interprétation
Zinc (Zn)	Dégagement gazeux rapide et abondant, solution reste incolore.	Zn réduit H_3O^+ : $\text{Zn} + 2 \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$. Couple Zn^{2+}/Zn au-dessus de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$.
Fer (Fe)	Dégagement gazeux lent, solution verdit (Fe^{2+}).	Fe réduit H_3O^+ : $\text{Fe} + 2 \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$. Couple Fe^{2+}/Fe au-dessus de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$.
Cuivre (Cu)	Aucune réaction (même à chaud).	Cu ne réduit pas H_3O^+ . Couple Cu^{2+}/Cu en-dessous de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$.
Argent (Ag)	Aucune réaction.	Ag ne réduit pas H_3O^+ . Couple Ag^+/Ag en-dessous de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$.
Aluminium (Al)	Pas de réaction immédiate (couche Al_2O_3 passivante), puis réaction violente si décapé.	Al est un très fort réducteur (au-dessus de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$), mais passivé par l'oxyde.

PROPRIÉTÉ Demi-équation du couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ en milieu aqueux



- H_3O^+ (ion oxonium) est l'oxydant.
- H_2 (dihydrogène) est le réducteur.
- C'est le **couple de référence** de la classification électrochimique.

LESAVAIS-TU ? Le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ au quotidien : vinaigre et bissap

Au Cameroun, le vinaigre de palme ou le jus de bissap (hibiscus) sont acides ($\text{pH} \approx 3-4$). Ils contiennent des ions H_3O^+ . Si l'on y plonge un métal comme le zinc (galvanisation) ou le fer (casserole non émaillée), une réaction lente se produit : dégagement d' H_2 et formation de sels métalliques (zincates, ferreux). C'est pour cela que les ustensiles en aluminium ou en fer émaillé sont préférés pour la cuisine acide. L'argent et le cuivre, eux, ne réagissent pas : ils sont "nobles" vis-à-vis de l'acide.

11.4 4. Construction de la classification électrochimique qualitative**DÉFINITION** Classification électrochimique

C'est un **tableau** qui range les couples oxydant-réducteur par ordre croissant de force d'oxydant (ou décroissant de force de réducteur).

- En haut : Les réducteurs les plus forts (donnent facilement leurs électrons). Les oxydants associés sont les plus faibles.
- En bas : Les oxydants les plus forts (acceptent facilement les électrons). Les réducteurs associés sont les plus faibles.
- Le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ est placé au milieu (référence).

MÉTHODE Construire une classification à partir d'expériences

1. Lister tous les couples mis en jeu dans les expériences.
2. Pour chaque expérience où une réaction a lieu : identifier le réducteur qui réagit (s'oxyde) et l'oxydant qui réagit (se réduit).
3. Appliquer la règle : Le réducteur qui réagit est PLUS FORT que le réducteur de l'autre couple. Il se place AU-DESSUS dans le tableau.
4. Pour les expériences sans réaction : le réducteur mis en présence est PLUS FAIBLE que le réducteur de l'oxydant en solution. Il se place EN-DESSOUS.
5. Classer tous les couples du plus fort réducteur (haut) au plus faible (bas).

À RETENIR Règle de prévision (Règle du "diagonal")

Une réaction d'oxydoréduction est spontanée (a lieu) si l'on met en présence :

Un réducteur placé AU-DESSUS d'un oxydant dans la classification.

Graphiquement : on trace une flèche descendante du réducteur vers l'oxydant.

- Red_1 (haut) + Ox_2 (bas) $\rightarrow$ Ox_1 + Red_2 Réaction OUI.
- Red_2 (bas) + Ox_1 (haut) $\rightarrow$ Pas de réaction Réaction NON.

11.5 5. Utilisation de la classification : prévision des réactions

EXEMPLE Application de la règle de prévision

Classification de référence (simplifiée) : K^+/K ; Ca^{2+}/Ca ; Mg^{2+}/Mg ; Al^{3+}/Al ; Zn^{2+}/Zn ; Fe^{2+}/Fe ; $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$; Cu^{2+}/Cu ; Ag^+/Ag ; Au^{3+}/Au .

1. $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+}$: Zn (haut) au-dessus de Cu^{2+} (bas) $\rightarrow$ OUI. $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$.
2. $\text{Cu} + 2\text{H}_3\text{O}^+$: Cu (bas) en-dessous de H_3O^+ (haut) $\rightarrow$ NON.
3. $\text{Fe} + 2\text{Ag}^+$: Fe (haut) au-dessus de Ag^+ (bas) $\rightarrow$ OUI. $\text{Fe} + 2\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{Ag}$.
4. $\text{Al} + 3\text{H}_3\text{O}^+$: Al (très haut) au-dessus de H_3O^+ $\rightarrow$ OUI. $2\text{Al} + 6\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow 2\text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$.

ATTENTION Cas particuliers et pièges du Probatoire

- Acides non oxydants (HCl , H_2SO_4 dilué) : Seul le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ joue. Les métaux au-dessus de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ dégagent H_2 . Ceux en dessous ne réagissent pas.
- Acides oxydants (HNO_3 , H_2SO_4 concentré à chaud) : L'oxydant n'est plus H_3O^+ mais NO_3^- ou SO_4^{2-} (couples bien plus forts, placés très bas). Même le cuivre et l'argent réagissent ! (Produits : NO_2 , NO , SO_2 , pas H_2).
- Passivation : L'aluminium, le chrome, le fer (dans HNO_3 concentré) forment une couche d'oxyde protectrice qui empêche la réaction malgré une position favorable dans la classification.
- Équilibrage : Toujours vérifier l'équilibre des charges et des atomes (surtout O et H en milieu acide/basique) dans l'équation-bilan finale.

11.6 6. Synthèse et applications au quotidien camerounais

LESAVAIS-TU ? Applications industrielles et domestiques au Cameroun

- Galvanisation (Douala, Yaoundé) : Tôles en fer recouvertes de zinc (**galvanisation à chaud**). Le zinc (au-dessus du fer) se sacrifie pour protéger le fer de la corrosion (rouille) sous le climat tropical humide. Voir exercice "Galvanisation des tôles".
- Protection cathodique (Pipeline Tchad-Cameroun, SONARA) : Anodes sacrificielles en magnésium ou zinc (très forts réducteurs) enterrées le long des canalisations en acier. Elles s'oxydent à la place du fer.
- Piles et batteries : Pile Leclanché (Zn/MnO_2), pile alcaline, accumulateurs plomb-acide (voitures, onduleurs). Le principe est toujours : couple réducteur fort (anode -) / couple oxydant fort (cathode +).
- Métallurgie extractive : Réduction des minerais (oxydes) par le coke (C/CO) ou l'aluminium (thermite) dans les hauts-fourneaux (projet Mbalam/Nabeba pour le fer).
- Conservation alimentaire : Boîtes de conserve (fer étamé). L'étain (Sn^{2+}/Sn au-dessus de Fe^{2+}/Fe ? Non, Sn est légèrement au-dessus, mais surtout inerte chimiquement). Si rayure : le fer se sacrifie pour l'étain ? Vérification : Fe^{2+}/Fe (-0,44 V) vs Sn^{2+}/Sn (-0,14 V). Fe est plus fort réducteur. Si rayure, le fer s'oxyde (protège l'étain). C'est l'inverse de la galvanisation !
- Pharmacopée traditionnelle : Préparation de certains remèdes par décoction acide (libération d'ions métalliques Fe^{2+} , Zn^{2+} , Cu^{2+} depuis les casseroles ou mortiers).

À RETENIR Résumé des compétences clés pour le Probatoire

1. Écrire correctement un couple Ox/Red et sa demi-équation électronique (équilibrée atomes + charges).
2. Identifier l'oxydant et le réducteur dans un couple.
3. Construire une classification à partir de résultats expérimentaux (réaction / non-réaction).
4. Placer le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ comme référence.
5. Prévoir si une réaction a lieu entre un réducteur et un oxydant (règle de la diagonale descendante).
6. Écrire l'équation-bilan de la réaction prévue (tableau d'avancement si calculs quantitatifs).
7. Calculer les quantités de matière, réactif limitant, masse de dépôt, volume de gaz, concentration finale.

11.7 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 4 QCM : notions fondamentales

Pour chaque question, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s) et justifier brièvement.

- Un couple oxydant-réducteur est :
 - un couple d'espèces qui échangent des protons H^+ ;
 - un couple d'espèces qui échangent des électrons ;
 - un couple formé d'un acide et d'une base.
- Dans le couple Cu^{2+}/Cu , l'oxydant est :
 - Cu^{2+} ;
 - Cu ;
 - H_2O .
- La demi-équation électronique du couple Zn^{2+}/Zn s'écrit (sens de la réduction) :
 - $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2 e^-$;
 - $Zn^{2+} + 2 e^- \longrightarrow Zn$;
 - $Zn^{2+} \longrightarrow Zn + 2 e^-$.
- Le couple de référence de la classification électrochimique est :
 - Cu^{2+}/Cu ;
 - H_3O^+/H_2 ;
 - Ag^+/Ag .

EXERCICE 5 Vrai ou faux

Répondre par vrai ou faux en justifiant chaque réponse.

- Dans une réaction d'oxydoréduction, le réducteur gagne des électrons.
- Le fer réduit les ions Cu^{2+} : le couple Fe^{2+}/Fe est donc placé au-dessus du couple Cu^{2+}/Cu dans la classification électrochimique.
- Le cuivre est attaqué par l'acide chlorhydrique dilué avec dégagement de dihydrogène.
- Un métal placé au-dessus du couple H_3O^+/H_2 est attaqué par les solutions acides diluées.
- L'argent réduit les ions Cu^{2+} en cuivre métallique.

EXERCICE 6 Texte à trous

Compléter le texte suivant avec les mots ou expressions : oxydant, réducteur, électrons, oxydation, réduction, $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$, plus fort.

Un couple oxydant-réducteur est formé de deux espèces chimiques qui se transforment l'une en l'autre par transfert d'... La forme oxydée est l'..., la forme réduite est le La perte d'électrons est une ... ; le gain d'électrons est une Dans la classification électrochimique, les couples sont classés du réducteur le ... (en haut) vers l'oxydant le ... (en bas). Le couple de référence est le couple

EXERCICE 7 Définitions et demi-équations

1. Définir : couple oxydant-réducteur ; oxydant ; réducteur.
2. Écrire les demi-équations électroniques des couples suivants : Fe^{2+}/Fe ; Ag^+/Ag ; Al^{3+}/Al ; $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ (en milieu aqueux).
3. Pour chaque couple, préciser l'oxydant et le réducteur.

11.8 Je m'entraîne**EXERCICE 8** lame de zinc dans le sulfate de cuivre

Au laboratoire du lycée, on plonge une lame de zinc bien décapée dans un bécher contenant une solution bleue de sulfate de cuivre CuSO_4 .

1. Décrire les observations attendues au bout de quelques minutes (aspect de la lame, couleur de la solution).
2. Écrire les demi-équations électroniques mises en jeu.
3. En déduire l'équation-bilan de la réaction.
4. Conclure sur la position relative des couples Zn^{2+}/Zn et Cu^{2+}/Cu dans la classification électrochimique.

EXERCICE 9 Construction d'une classification

On réalise les quatre expériences suivantes :

- Expérience 1 : une lame de fer plongée dans une solution de CuSO_4 se recouvre de cuivre ;

- Expérience 2 : un fil de cuivre plongé dans une solution de nitrate d'argent AgNO_3 se recouvre d'un dépôt gris d'argent ;
 - Expérience 3 : de la grenaille de zinc versée dans une solution d'acide chlorhydrique dilué produit un dégagement gazeux qui détone à la flamme ;
 - Expérience 4 : un fil de cuivre plongé dans l'acide chlorhydrique dilué ne subit aucune transformation.
1. Pour chaque expérience, écrire l'équation-bilan de la réaction lorsqu'elle a lieu.
 2. Établir la classification des cinq couples Fe^{2+}/Fe , Cu^{2+}/Cu , Ag^+/Ag , Zn^{2+}/Zn et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$, du réducteur le plus fort au réducteur le plus faible.
 3. Placer précisément le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ et justifier sa position.

EXERCICE 10 Prévion de réactions

On donne la classification électrochimique simplifiée (du réducteur le plus fort au plus faible) : Zn^{2+}/Zn ; Fe^{2+}/Fe ; $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$; Cu^{2+}/Cu ; Ag^+/Ag .

Prévoir si une réaction a lieu dans chacun des cas suivants. Justifier la réponse et écrire l'équation-bilan des réactions possibles :

1. $\text{Ag} + \text{Cu}^{2+}$;
2. $\text{Zn} + \text{Fe}^{2+}$;
3. $\text{Cu} + \text{H}_3\text{O}^+$;
4. $\text{Fe} + \text{Ag}^+$.

EXERCICE 11 Le choix du bidon

Un artisan de Nkongsamba dispose d'un bidon en fer. Peut-il l'utiliser sans risque pour stocker :

1. une solution de sulfate de fer(II) FeSO_4 ?
2. une solution de sulfate de cuivre CuSO_4 ?
3. de l'acide chlorhydrique dilué HCl ?

Justifier chaque réponse à l'aide de la classification électrochimique et écrire les équations-bilans des réactions éventuelles.

11.9 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 12 Le fer et le sulfate de cuivre

Un élève de Première C du Lycée de Bafoussam réalise l'expérience suivante : il plonge un clou en fer de masse $m = 5,6 \text{ g}$ dans un volume $V = 250 \text{ mL}$ d'une solution de sulfate de cuivre(II) de concentration $C = 0,5 \text{ mol L}^{-1}$.

Données : $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$.

Classification (réducteur le plus fort en haut) : Fe^{2+}/Fe puis Cu^{2+}/Cu .

1. Expliquer pourquoi une réaction se produit. Écrire les demi-équations électroniques et l'équation-bilan de la réaction.
2. Calculer les quantités de matière initiales de fer et d'ions Cu^{2+} . Construire le tableau d'avancement et déterminer le réactif limitant.
3. En déduire la masse de cuivre déposée sur le clou à la fin de la réaction.
4. Calculer la concentration finale en ions Fe^{2+} dans la solution (on supposera le volume constant).
5. Décrire deux observations expérimentales qui permettent de suivre l'avancement de cette réaction.

EXERCICE 13 La galvanisation des tôles à Douala

Dans les quartiers de Douala, les toitures en tôle sont exposées à un climat chaud et humide qui favorise la corrosion du fer. Pour protéger les tôles, on les recouvre d'une couche de zinc : c'est la galvanisation.

On donne la classification électrochimique simplifiée (réducteur le plus fort en haut) : Zn^{2+}/Zn ; Fe^{2+}/Fe ; $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$; Cu^{2+}/Cu .

Données : $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Une tôle galvanisée est rayée : le fer est mis à nu au contact de l'eau de pluie légèrement acide. En utilisant la classification, expliquer pourquoi c'est le zinc qui est attaqué et non le fer. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre le zinc et les ions H_3O^+ .
2. Justifier l'expression : « le zinc joue le rôle de réducteur sacrificiel ».
3. On fait réagir une masse $m = 13,08 \text{ g}$ de zinc avec un excès d'acide chlorhydrique dilué. Calculer le volume de dihydrogène dégagé, mesuré dans les conditions normales de température et de pression ($V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$).
4. Un fabricant peu scrupuleux propose des tôles recouvertes de cuivre. Montrer, à l'aide de la classification, que ce choix ne protège pas le fer : écrire l'équation-bilan de la réaction qui se produirait entre le fer et les ions Cu^{2+} .

EXERCICE 14 Étude comparative de trois métaux

Au laboratoire du Lycée Classique de Dschang, on dispose de trois métaux : fer, zinc et cuivre, ainsi que de solutions de sulfate de zinc ZnSO_4 , de sulfate de fer(II) FeSO_4 et d'acide chlorhydrique dilué. On réalise les expériences suivantes :

N°	Expérience	Observation
1	Lame de zinc dans FeSO_4	Dépôt grisâtre de fer sur le zinc
2	Lame de fer dans ZnSO_4	Aucune transformation
3	Grenaille de zinc dans HCl dilué	Dégagement gazeux abondant
4	Fil de cuivre dans HCl dilué	Aucune transformation
5	Clou en fer dans HCl dilué	Dégagement gazeux lent

Données : $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$; $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$ (CNTP).

- Interpréter les expériences 1 et 2 : écrire l'équation-bilan de la réaction de l'expérience 1 et expliquer l'absence de réaction dans l'expérience 2.
- Identifier le gaz dégagé dans les expériences 3 et 5 et proposer un test expérimental pour le caractériser.
- Établir la classification des quatre couples Zn^{2+}/Zn , Fe^{2+}/Fe , $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ et Cu^{2+}/Cu , du réducteur le plus fort au réducteur le plus faible. Justifier la place du couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$.
- On plonge une lame de fer de masse $m = 2,8 \text{ g}$ dans $V = 200 \text{ mL}$ d'acide chlorhydrique de concentration $C = 0,5 \text{ mol L}^{-1}$. Déterminer le réactif limitant à l'aide d'un tableau d'avancement, puis calculer le volume de gaz dégagé (CNTP) et la concentration finale en ions Fe^{2+} .
- Citer une application industrielle ou domestique camerounaise qui exploite la classification électrochimique.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : notions fondamentales

1. Bonne réponse : (b). Un couple oxydant-réducteur met enjeu un transfert d'**électrons** entre un oxydant et un réducteur. L'échange de protons H^+ (réponses a et c) caractérise un couple acide-base, ce qui est hors sujet ici.
2. Bonne réponse : (a) Cu^{2+} . Dans la notation conventionnelle Ox/Red, l'oxydant (forme oxydée) est écrit à gauche de la barre oblique. Cu^{2+} peut capter 2 électrons : $Cu^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cu$.
3. Bonne réponse : (b) $Zn^{2+} + 2e^- \longrightarrow Zn$. Une demi-équation électronique s'écrit par convention dans le sens de la réduction : l'oxydant et les électrons sont à gauche de la flèche. La réponse (a) est une oxydation ; la réponse (c) n'est pas équilibrée en charges (+2 à gauche, -2 à droite).
4. Bonne réponse : (b) H_3O^+/H_2 . C'est le **couple de référence** de la classification électrochimique : il sépare les métaux attaqués par les acides dilués non oxydants (au-dessus) des métaux nobles (en dessous).

Point de vigilance : au Probatoire, une justification même brève est souvent exigée au QCM ; une réponse juste non justifiée peut ne rapporter que la moitié des points.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

1. Faux. Le réducteur cède (perd) des électrons : il subit une oxydation. C'est l'oxydant qui gagne des électrons (réduction). Moyen mnémotechnique : le réducteur réduit l'autre, donc il s'oxyde lui-même.
2. Vrai. Si le fer réduit les ions Cu^{2+} , c'est que Fe est un réducteur plus fort que Cu. Or la classification range les réducteurs du plus fort (en haut) au plus faible (en bas) : le couple Fe^{2+}/Fe est donc placé au-dessus du couple Cu^{2+}/Cu .
3. Faux. Le cuivre est placé en dessous du couple H_3O^+/H_2 : c'est un métal noble. Il ne peut pas réduire H_3O^+ en H_2 . L'acide chlorhydrique dilué (non oxydant) est sans action sur le cuivre. (Attention : l'acide nitrique, lui, attaque le cuivre, mais c'est NO_3^- qui joue le rôle d'oxydant, pas H_3O^+ .)
4. Vrai. C'est une conséquence directe de la règle de prévision : tout métal dont le couple est au-dessus de H_3O^+/H_2 est un réducteur plus fort que H_2 ; il réduit donc H_3O^+ avec dégagement de dihydrogène : $M + nH_3O^+ \longrightarrow M^{n+} + (n/2)H_2 + nH_2O$.
5. Faux. Le couple Ag^+/Ag est placé en dessous de Cu^{2+}/Cu : l'argent est un réducteur

plus faible que le cuivre. C'est la réaction inverse qui est spontanée : $\text{Cu} + 2 \text{Ag}^+ \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2 \text{Ag}$.

Point de vigilance : dans un vrai/faux, la justification vaut autant que la réponse. Toujours appuyer la réponse sur la position relative des couples dans la classification.

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

Un couple oxydant-réducteur est formé de deux espèces chimiques qui se transforment l'une en l'autre par transfert d'électrons. La forme oxydée est l'oxydant, la forme réduite est le réducteur. La perte d'électrons est une oxydation ; le gain d'électrons est une réduction. Dans la classification électrochimique, les couples sont classés du réducteur le plus fort (en haut) vers l'oxydant le plus fort (en bas). Le couple de référence est le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$.





Point de vigilance : ne pas inverser oxydation et réduction : l'oxydation est la perte d'électrons (le nombre d'oxydation augmente), la réduction est le gain d'électrons (le nombre d'oxydation diminue).

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions et demi-équations

1. Définitions :

- Couple oxydant-réducteur : ensemble de deux espèces chimiques, noté Ox/Red, qui se transforment l'une en l'autre par transfert d'électrons selon $\text{Ox} + n \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Red}$.
- Oxydant : espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons (forme oxydée du couple).
- Réducteur : espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons (forme réduite du couple).

2. Demi-équations électroniques (sens de la réduction) :



Vérification des charges (exemple du couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$) : à gauche $2 \times (+1) + 2 \times (-1) = 0$; à droite $0 + 2 \times 0 = 0$. L'équilibre est respecté.

3. Identification oxydant / réducteur :

Couple	Oxydant (capte e^-)	Réducteur (cède e^-)
Fe^{2+}/Fe	Fe^{2+}	Fe
Ag^+/Ag	Ag^+	Ag
Al^{3+}/Al	Al^{3+}	Al
$\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$	H_3O^+	H_2

Point de vigilance : pour le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$, l'erreur classique est d'écrire $\text{H}_3\text{O}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{H}_2$: l'atome d'hydrogène n'est pas équilibré. Il faut $2 \text{H}_3\text{O}^+$ pour former 1H_2 , et on ajoute H_2O pour équilibrer l'oxygène.

CORRIGÉ Exercice 5 — Lame de zinc dans le sulfate de cuivre


1. Observations attendues :

- Sur la lame de zinc : apparition d'un dépôt rouge-orangé (cuivre métallique) ; la lame s'amincit progressivement (le zinc se dissout).
- Dans la solution : la teinte bleue caractéristique des ions Cu^{2+} pâlit puis disparaît (les ions Zn^{2+} formés sont incolores).

2. Demi-équations électroniques :

- Le zinc métallique cède des électrons (oxydation) : $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2e^-$
- Les ions cuivre(II) captent des électrons (réduction) : $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \longrightarrow \text{Cu}$

3. Équation-bilan : on additionne les deux demi-équations ; les 2 électrons échangés s'éliminent :



Vérification : atomes équilibrés (1 Zn, 1 Cu de chaque côté) ; charges : +2 de chaque côté.

4. Conclusion : puisque le zinc réduit les ions Cu^{2+} , le zinc est un réducteur plus fort que le cuivre. Le couple Zn^{2+}/Zn se place donc au-dessus du couple Cu^{2+}/Cu dans la classification électrochimique.

Point de vigilance : ne pas écrire SO_4^{2-} dans l'équation-bilan : c'est un ion spectateur, il ne participe pas au transfert d'électrons.

CORRIGÉ Exercice 6 — Construction d'une classification


1. Équations-bilans :

- Expérience 1 (réaction) : $\text{Fe(s)} + \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cu(s)}$
- Expérience 2 (réaction) : $\text{Cu(s)} + 2 \text{Ag}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{Ag(s)}$ (multiplier la demi-équation $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$ par 2 pour compenser les 2 électrons cédés par Cu).
- Expérience 3 (réaction, gaz qui détone = H_2) : $\text{Zn(s)} + 2 \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O(l)}$
- Expérience 4 : aucune réaction.

2. Raisonnement expérience par expérience :

- Exp. 1 : Fe réduit $\text{Cu}^{2+} \Rightarrow \text{Fe}$ réducteur plus fort que Cu $\Rightarrow \text{Fe}^{2+}/\text{Fe}$ au-dessus de Cu^{2+}/Cu .
- Exp. 2 : Cu réduit $\text{Ag}^+ \Rightarrow \text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$ au-dessus de Ag^+/Ag .
- Exp. 3 : Zn réduit $\text{H}_3\text{O}^+ \Rightarrow \text{Zn}^{2+}/\text{Zn}$ au-dessus de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$.
- Exp. 4 : Cu ne réduit pas $\text{H}_3\text{O}^+ \Rightarrow \text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$ en dessous de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$.

Classification obtenue (réducteur le plus fort en haut) :



3. Place du couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$: il se situe entre Fe^{2+}/Fe et Cu^{2+}/Cu . Justification : le zinc (et le fer, de façon analogue) dégage H_2 au contact de l'acide dilué, donc leurs couples sont au-dessus ; le cuivre et l'argent n'y réagissent pas, donc leurs couples sont en dessous. Le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ joue ainsi son rôle de frontière de référence entre métaux « attaquables » et métaux « nobles ».

Point de vigilance : une absence de réaction est une information au même titre qu'une réaction : elle permet de placer le couple du métal introduit en dessous du couple de l'ion en solution.


CORRIGÉ Exercice 7 — Prévion de réactions

On applique la règle de prévision : une réaction spontanée a lieu entre le réducteur d'un couple placé au-dessus et l'oxydant d'un couple placé en dessous (diagonale descendante).

Classification rappelée (haut $\rightarrow$ bas) : Zn^{2+}/Zn ; Fe^{2+}/Fe ; $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$; Cu^{2+}/Cu ; Ag^+/Ag .


1. $\text{Ag} + \text{Cu}^{2+}$: le réducteur Ag (couple Ag^+/Ag , tout en bas) est en dessous de l'oxydant Cu^{2+} . $\Rightarrow$ Aucune réaction.

2. $\text{Zn} + \text{Fe}^{2+}$: Zn est au-dessus de Fe^{2+} . $\Rightarrow$ Réaction :



3. $\text{Cu} + \text{H}_3\text{O}^+$: Cu est en dessous de H_3O^+ . $\Rightarrow$ Aucune réaction (le cuivre est noble vis-à-vis des acides dilués non oxydants).

4. $\text{Fe} + \text{Ag}^+$: Fe est au-dessus de Ag^+ . $\Rightarrow$ Réaction :




Détail de l'équilibrage : $\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + 2 \text{e}^-$ et $2 \times (\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag})$; les 2 électrons s'éliminent.

Point de vigilance : toujours équilibrer les électrons échangés avant d'additionner les demi-équations ; pour Ag^+/Ag (1 électron) face à un métal qui cède 2 électrons, le coefficient 2 sur Ag^+ et Ag est obligatoire.


CORRIGÉ Exercice 8 — Le choix du bidon

Le bidon est en fer, réducteur du couple Fe^{2+}/Fe , placé au-dessus de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ et de Cu^{2+}/Cu .

1. Solution de FeSO_4 : OUI, stockage possible. Le fer métallique est mis en présence des ions Fe^{2+} , c'est-à-dire l'oxydant de son propre couple. Il n'y a pas de transfert spontané d'électrons au sein d'un même couple : aucune réaction. Le bidon n'est pas attaqué.
2. Solution de CuSO_4 : NON, stockage dangereux. Fe est au-dessus de Cu^{2+} : le fer réduit les ions cuivre(II). Le bidon se perce lentement (le fer se dissout) et du cuivre se dépose sur les parois :






3. Acide chlorhydrique dilué : NON, stockage dangereux. Fe est au-dessus de H_3O^+ : le fer réduit les ions oxonium. Le bidon est rongé et il se dégage du dihydrogène, gaz inflammable (risque d'explosion en milieu confiné) :



Conclusion pratique : l'artisan ne peut stocker sans risque que la solution de FeSO_4 . Pour l'acide ou le sulfate de cuivre, il devra utiliser un récipient en matière plastique ou en verre.

CORRIGÉ Exercice 9 — Le fer et le sulfate de cuivre (type Probatoire)

1. Justification et équations : la classification place Fe^{2+}/Fe au-dessus de Cu^{2+}/Cu : le fer, réducteur le plus fort, réduit spontanément les ions Cu^{2+} .



2. Quantités initiales :

$$n_i(\text{Fe}) = \frac{m}{M(\text{Fe})} = \frac{5,6}{56} = 0,10 \text{ mol}$$

$$n_i(\text{Cu}^{2+}) = C \times V = 0,5 \times 0,250 = 0,125 \text{ mol}$$

Tableau d'avancement :

Équation	Fe +	$\text{Cu}^{2+} \rightarrow$	$\text{Fe}^{2+} +$	Cu
État initial ($x = 0$)	0,10	0,125	0	0
En cours (x)	$0,10 - x$	$0,125 - x$	x	x
État final (x_{max})	$0,10 - x_{\text{max}}$	$0,125 - x_{\text{max}}$	x_{max}	x_{max}

Réactif limitant : hypothèse 1 : $0,10 - x_{\text{max}} = 0 \Rightarrow x_{\text{max}} = 0,10 \text{ mol}$; hypothèse 2 : $0,125 - x_{\text{max}} = 0 \Rightarrow x_{\text{max}} = 0,125 \text{ mol}$. On retient la plus petite valeur : $x_{\text{max}} = 0,10 \text{ mol}$. Le fer est le réactif limitant ; il reste $0,125 - 0,10 = 0,025 \text{ mol}$ d'ions Cu^{2+} en solution.

3. Masse de cuivre déposée : $n(\text{Cu}) = x_{\text{max}} = 0,10 \text{ mol}$, d'où :

$$m(\text{Cu}) = n \times M(\text{Cu}) = 0,10 \times 63,5 = \boxed{6,35 \text{ g}}$$

4. Concentration finale en Fe^{2+} : $n_f(\text{Fe}^{2+}) = x_{\text{max}} = 0,10 \text{ mol}$ dans $V = 0,250 \text{ L}$:

$$[\text{Fe}^{2+}]_f = \frac{0,10}{0,250} = \boxed{0,40 \text{ mol L}^{-1}}$$

5. Observations permettant de suivre la réaction :


- la décoloration progressive de la solution bleue (consommation des ions Cu^{2+}) ;
- la croissance du dépôt rouge-orangé de cuivre sur le clou (on peut aussi peser le clou séché : sa masse évolue).

Barème indicatif (sur 5 pts) : justification + équation-bilan (1 pt) ; quantités initiales (1 pt) ; tableau d'avancement + réactif limitant (1 pt) ; masse de cuivre (1 pt) ; concentration finale + observations (1 pt).

Points de vigilance : convertir V en litres ; vérifier que la solution reste bleue pâle à la fin (il reste des Cu^{2+} : le fer est limitant) ; ne pas confondre la masse de cuivre déposée avec la variation de masse du clou.

CORRIGÉ Exercice 10 — La galvanisation des tôles à Douala (type Probatoire)

1. Explication : au niveau de la rayure, zinc et fer sont en contact et baignent dans l'eau de pluie acide (présence d'ions H_3O^+). Or la classification place Zn^{2+}/Zn au-dessus de Fe^{2+}/Fe : le zinc est un réducteur plus fort que le fer. C'est donc le zinc qui s'oxyde préférentiellement ; le fer, mis à nu, reste intact tant qu'il reste du zinc. Équation-bilan :




2. « Réducteur sacrificiel » : le zinc se sacrifie : il s'oxyde (se consomme) à la place du fer. Tant qu'il reste du zinc en contact avec le fer, le fer ne peut pas être oxydé : il est protégé. On parle aussi d'**anode sacrificielle** (protection cathodique).
3. Volume de dihydrogène :

$$n(\text{Zn}) = \frac{m}{M(\text{Zn})} = \frac{13,08}{65,4} = 0,200 \text{ mol}$$

D'après l'équation : $n(\text{H}_2) = n(\text{Zn}) = 0,200 \text{ mol}$ (acide en excès)

$$V(\text{H}_2) = n \times V_m = 0,200 \times 22,4 = \boxed{4,48 \text{ L}}$$

4. Tôle recouverte de cuivre : le couple Cu^{2+}/Cu est en dessous de Fe^{2+}/Fe : le cuivre est un réducteur plus faible que le fer. En cas de rayure, c'est le fer qui s'oxyde au contact du cuivre (corrosion galvanique accélérée) ; au contact d'ions Cu^{2+} :




Le cuivre ne protège pas le fer, il aggrave sa corrosion : ce choix est à rejeter.

Barème indicatif (sur 5 pts) : explication + équation (1,5 pt) ; rôle sacrificiel (0,5 pt) ; calcul de $n(\text{Zn})$ (1 pt) ; volume de H_2 (1 pt) ; comparaison Cu/Fe + équation (1 pt).

Points de vigilance : bien vérifier le calcul $13,08/65,4 = 0,200$ exactement ; préciser « acide en excès » pour justifier $n(\text{H}_2) = n(\text{Zn})$; ne pas écrire que le cuivre « s'oxyde à la place du fer » : c'est l'inverse.

CORRIGÉ Exercice 11 — Étude comparative de trois métaux (type Probatoire)

1. Expérience 1 : un dépôt grisâtre de fer apparaît sur le zinc : le zinc a réduit les ions Fe^{2+} :



Expérience 2 : aucune transformation : le fer est un réducteur plus faible que le zinc (conséquence de l'expérience 1) ; il ne peut donc pas réduire les ions Zn^{2+} . Pas de réaction.


2. Gaz dégagé : le dihydrogène H_2 . Test : on approche une flamme (allumette enflam-

mée) de l'ouverture du tube : le gaz produit une détonation caractéristique (petite explosion avec bruit sec). Sécurité : effectuer le test sur un petit volume de gaz.

3. Classification :

- Exp. 1 : Zn réduit $\text{Fe}^{2+} \Rightarrow \text{Zn}^{2+}/\text{Zn}$ au-dessus de Fe^{2+}/Fe ;
- Exp. 3 et 5 : Zn et Fe réduisent $\text{H}_3\text{O}^+ \Rightarrow$ leurs couples sont au-dessus de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$;
- Exp. 4 : Cu ne réduit pas $\text{H}_3\text{O}^+ \Rightarrow \text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$ en dessous de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$.

D'où, du réducteur le plus fort au plus faible :



Place de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$: entre Fe^{2+}/Fe et Cu^{2+}/Cu , car le fer et le zinc sont attaqués par l'acide dilué (dégagement de H_2) alors que le cuivre ne l'est pas.

4. Étude quantitative : équation-bilan : $\text{Fe(s)} + 2 \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O(l)}$.

$$n_i(\text{Fe}) = \frac{2,8}{56} = 0,050 \text{ mol}$$

$$n_i(\text{H}_3\text{O}^+) = C \times V = 0,5 \times 0,200 = 0,100 \text{ mol}$$

Tableau d'avancement :

Équation	Fe +	$2 \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow$	$\text{Fe}^{2+} +$	H_2
État initial	0,050	0,100	0	0
En cours	$0,050 - x$	$0,100 - 2x$	x	x
État final	$0,050 - x_{\text{max}}$	$0,100 - 2x_{\text{max}}$	x_{max}	x_{max}

Réactif limitant : hypothèse 1 (fer) : $x_{\text{max}} = 0,050 \text{ mol}$; hypothèse 2 (H_3O^+) : $x_{\text{max}} = \frac{0,100}{2} = 0,050 \text{ mol}$. Les deux valeurs sont égales : les réactifs sont en proportions stœchiométriques et sont entièrement consommés. $x_{\text{max}} = 0,050 \text{ mol}$. Volume de gaz (CNTP) : $n(\text{H}_2) = x_{\text{max}} = 0,050 \text{ mol}$:

$$V(\text{H}_2) = 0,050 \times 22,4 = \boxed{1,12 \text{ L}}$$

Concentration finale en Fe^{2+} : $n_f(\text{Fe}^{2+}) = 0,050 \text{ mol}$ dans $V = 0,200 \text{ L}$:

$$[\text{Fe}^{2+}]_f = \frac{0,050}{0,200} = \boxed{0,25 \text{ mol L}^{-1}}$$


5. Application camerounaise : la galvanisation des tôles de toiture (Douala, Yaoundé) : le zinc, réducteur plus fort que le fer, protège la tôle de la corrosion sous le climat tropical humide. Autre exemple : les anodes sacrificielles en magnésium ou zinc protégeant les canalisations en acier (pipeline Tchad-Cameroun, installations de la SONARA).

Barème indicatif (sur 10 pts) : interprétation exp. 1-2 + équation (1,5 pt) ; gaz + test (1 pt) ; classification justifiée (2 pts) ; quantités initiales (1 pt) ; tableau d'avancement + réactif limitant (1,5 pt) ; volume de H_2 (1 pt) ; concentration finale (1 pt) ; application (1 pt).

Points de vigilance : attention au coefficient 2 devant H_3O^+ dans le tableau d'avancement ($0,100 - 2x$) ; reconnaître le cas particulier des proportions stœchiométriques (les deux réactifs disparaissent ensemble) ; ne pas oublier les unités (L , $mol\ L^{-1}$) et la conversion $V = 200\ mL = 0,200\ L$.

13 FICHE BILAN

14 LEÇON 06 : COUPLE OXYDANT-RÉDUCTEUR ET CLASSIFICATION ÉLECTROCHIMIQUE



Carte mentale de la leçon : les sept idées forces à retenir.


LESAVAIS-TU ? Situation déclenchante : la corrosion et la récupération des métaux

Au Cameroun, les infrastructures métalliques (ponts sur la Sanaga, toitures en tôle, armatures du barrage de Lom Pangar) subissent la **corrosion** : le fer se transforme en rouille ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n \text{H}_2\text{O}$) au contact de l'air humide. Comment l'éviter ? On utilise le **zinc** (galvanisation) ou la **protection cathodique**. À l'inverse, en métallurgie (ex. traitement des minerais à Figuil ou récupération de l'argent en bijouterie), on cherche à faire réagir un métal avec des ions métalliques. Tous ces phénomènes relèvent d'une même logique : les **réactions d'oxydoréduction** entre couples **oxydant/réducteur**. Cette leçon te donne les outils pour les comprendre et les prévoir.

14.1 1. Couple oxydant-réducteur : définition et écriture

DÉFINITION Couple oxydant/réducteur (couple redox)

Un **couple oxydant/réducteur** (noté **Ox/Red**) est un ensemble de deux espèces chimiques conjuguées : un **oxydant (Ox)** et un **réducteur (Red)**, qui peuvent se transformer l'un en l'autre par échange de n électrons ($n \in \mathbb{N}^*$). La transformation s'écrit sous forme de **demi-équation électronique** (ou demi-réaction) :



L'oxydant est l'espèce qui capte les électrons (il s'réduit) ; le réducteur est l'espèce qui cède les électrons (il s'oxyde).

PROPRIÉTÉ Conventions d'écriture

- Le couple se note toujours Ox/Red (l'oxydant en premier, le réducteur en second), séparés par une barre oblique : Cu^{2+}/Cu , $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$, $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$.
- Pour un métal M et son cation M^{n+} , le couple s'écrit M^{n+}/M .
- La demi-équation s'équilibre en atomes et en charges.

MÉTHODE Écrire et équilibrer une demi-équation $\text{Ox} + n e^- \rightleftharpoons \text{Red}$

1. Écrire les formules de l'oxydant et du réducteur (données par le couple).
2. Équilibrer l'élément principal (autre que O et H).
3. Équilibrer l'oxygène en ajoutant des molécules d'eau H_2O .
4. Équilibrer l'hydrogène en ajoutant des ions H_3O^+ (milieu aqueux acide).
5. Équilibrer les charges en ajoutant des électrons e^- toujours du côté de l'oxydant (celui qui les capte).
6. Vérifier : même nombre d'atomes de chaque élément et même charge totale des deux côtés.

EXEMPLE Demi-équations classiques à connaître par cœur


- Couple Cu^{2+}/Cu : $\text{Cu}^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons \text{Cu}$

- Couple Ag^+/Ag : $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}$
- Couple Zn^{2+}/Zn : $\text{Zn}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}$
- Couple Fe^{2+}/Fe : $\text{Fe}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$
- Couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$: $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$
- Couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ (milieu acide) : $\text{MnO}_4^- + 8 \text{H}_3\text{O}^+ + 5 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 12 \text{H}_2\text{O}$
- Couple $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ (milieu acide) : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14 \text{H}_3\text{O}^+ + 6 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{Cr}^{3+} + 21 \text{H}_2\text{O}$
- Couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$: $2 \text{H}_3\text{O}^+ + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$

14.2 2. Réaction entre un métal et un ion métallique : couples M^{n+}/M

EXPÉRIENCE Mise en évidence de la réaction $\text{Cu} + \text{Ag}^+$: « l'arbre d'argent »

- Matériel : Bécher, solution de nitrate d'argent AgNO_3 ($0,1 \text{ mol L}^{-1}$), lame de cuivre brillante, pince.
- Protocole : Plonger la lame de Cu dans la solution incolore d' AgNO_3 . Observer pendant quelques minutes.
- Observations : La lame de cuivre se couvre d'un dépôt grisâtre brillant (cristaux d'argent métallique). La solution devient bleue (apparition des ions Cu^{2+}).
- Interprétation : Le cuivre métal (Cu, réducteur) cède des électrons aux ions argent (Ag^+ , oxydant). Il y a réaction spontanée.
- Couples en jeu : Ag^+/Ag et Cu^{2+}/Cu .
- Demi-équations :



- Équation bilan : $\text{Cu} + 2 \text{Ag}^+ \longrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2 \text{Ag}$

EXPÉRIENCE Réaction $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+}$

- Observation : Un morceau de zinc plongé dans une solution de sulfate de cuivre (CuSO_4 , bleue) se couvre de cuivre rouge ; la solution se décolore.
- Équation bilan : $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$

- Conclusion : Le zinc est un réducteur plus fort que le cuivre (il « chasse » le cuivre de sa solution).

PROPRIÉTÉ Règle générale pour les couples M^{n+}/M

Lorsqu'on met en présence un métal M_1 (réducteur) et un ion métallique M_2^{n+} (oxydant), une réaction spontanée a lieu si le métal M_1 est un meilleur réducteur que le métal M_2 (c'est-à-dire si le couple M_2^{n+}/M_2 est un meilleur oxydant que M_1^{n+}/M_1). On verra comment classer cela précisément à la section 4.




14.3 3. Action des ions H_3O^+ sur les métaux : le couple H_3O^+/H_2

EXPÉRIENCE Action d'un acide sur différents métaux

- Matériel : Tubes à essai, acide chlorhydrique dilué (HCl), 1 mol L^{-1} , morceaux de zinc (Zn), fer (Fe), cuivre (Cu), argent (Ag), allumette.
- Protocole : Introduire chaque métal dans un tube contenant 5 mL d'acide. Observer. Approcher une flamme de l'embouchure si dégagement gazeux.
- Observations :

Métal	Observation	Test à la flamme
Zn, Fe, Al, Mg	Dégagement gazeux rapide (bulles), solution qui s'échauffe	Détonation caractéristique (« aboiement ») → Dihydrogène H_2
Cu, Ag, Au, Pt	Aucune réaction visible, pas de bulles, pas de chauffage	—

- Interprétation : Les ions H_3O^+ (oxydant) sont réduits en H_2 (réducteur) par les métaux Zn, Fe, etc. (réducteurs). Le couple en jeu est H_3O^+/H_2 .
- Demi-équation : $2 H_3O^+ + 2 e^- \rightleftharpoons H_2 + 2 H_2O$
- Équations bilan (exemples) :



À RETENIR Identification du dihydrogène H_2

Le gaz H_2 est incolore, inodore, peu soluble dans l'eau. Il se reconnaît par le test de l'abolement : une flamme approchée de l'embouchure du tube provoque une petite explosion sèche (détonation) avec formation d'eau $2 H_2 + O_2 \longrightarrow 2 H_2O$. Attention : ne jamais faire ce test sur un gros volume de gaz (risque d'explosion violente).

ATTENTION Piège fréquent : « L'acide attaque le métal »

On dit souvent « l'acide attaque le métal ». Rigoureusement, ce sont les ions H_3O^+ (l'oxydant du couple H_3O^+/H_2) qui oxydent le métal. L'anion de l'acide (Cl^- , SO_4^{2-} , NO_3^-) est spectateur (sauf cas particuliers comme HNO_3 concentré ou H_2SO_4 chaud où l'anion devient oxydant). En Première, on travaille avec des acides dilués : seul H_3O^+ oxyde.

14.4 4. Construction de la classification électrochimique qualitative**DÉFINITION** Classification électrochimique qualitative

C'est un tableau classant les couples oxydant/réducteur par pouvoir oxydant décroissant de l'oxydant (donc par pouvoir réducteur croissant du réducteur), établi à partir de résultats expérimentaux (réactions métal/ion métallique, métal/acide).

MÉTHODE Construire la classification à partir d'expériences

1. Lister les couples étudiés : Ag^+/Ag , Cu^{2+}/Cu , H_3O^+/H_2 , Zn^{2+}/Zn , Fe^{2+}/Fe , etc.
2. Pour chaque paire de couples, noter si réaction il y a (expériences sections 2 et 3).
3. Règle : Si Ox_1 réagit avec Red_2 , alors Ox_1 est un meilleur oxydant que Ox_2 (donc Ox_1/Red_1 se place au-dessus de Ox_2/Red_2).
4. Ranger les couples du plus fort oxydant (haut) au plus faible oxydant (bas).


EXEMPLE Construction pas à pas (résumé des résultats expérimentaux)

1. Cu réduit $Ag^+ \rightarrow Ag^+/Ag$ au-dessus de Cu^{2+}/Cu .
2. Zn réduit $Cu^{2+} \rightarrow Cu^{2+}/Cu$ au-dessus de Zn^{2+}/Zn .

3. Zn, Fe réduisent H_3O^+ (dégagent H_2) $\rightarrow \text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ au-dessus de Zn^{2+}/Zn et Fe^{2+}/Fe .

4. Cu, Ag ne réduisent pas $\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$ et Ag^+/Ag au-dessus de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$.

Ordre final (haut $\rightarrow$ bas) : $\text{Ag}^+/\text{Ag} > \text{Cu}^{2+}/\text{Cu} > \text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2 > \text{Fe}^{2+}/\text{Fe} > \text{Zn}^{2+}/\text{Zn} > \text{Al}^{3+}/\text{Al} > \text{Mg}^{2+}/\text{Mg}$.



Classification électrochimique qualitative simplifiée (extrait). Les couples réels en contiennent beaucoup plus (ex. K^+/K , Ca^{2+}/Ca , Cl_2/Cl^- , $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$).

PROPRIÉTÉ Position du couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ et distinction nobles / non nobles

Le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ occupe une position charnière (repère central).

- Au-dessus (oxydants plus forts que H_3O^+) : Ag^+ , Cu^{2+} , Au^{3+} , Pt^{2+} ... Les métaux correspondants (métaux nobles) ne sont pas attaqués par les acides dilués (pas de H_2).
- En-dessous (oxydants plus faibles que H_3O^+) : Fe^{2+} , Zn^{2+} , Al^{3+} , Mg^{2+} , Ca^{2+} ... Les métaux correspondants (métaux non nobles) sont attaqués par les acides dilués avec dégagement de H_2 .

14.5 5. Utilisation de la classification : prévision des réactions (Règle du γ)

DÉFINITION Règle du gamma (γ) — Prévision d'une réaction d'oxydoréduction

Soit deux couples Ox_1/Red_1 et Ox_2/Red_2 placés dans la classification avec Ox_1/Red_1 au-dessus de Ox_2/Red_2 .

- L'oxydant du couple du haut (Ox_1) peut oxyder le réducteur du couple du bas (Red_2).
- La réaction spontanée est : $\text{Ox}_1 + \text{Red}_2 \longrightarrow \text{Red}_1 + \text{Ox}_2$.
- Graphiquement, on trace un γ (gamma) partant de Ox_1 (haut gauche) vers Red_2 (bas droite). Les produits (Red_1 , Ox_2) se trouvent aux autres extrémités du γ et ne réagissent pas entre eux.

ATTENTION Erreur fatale : sens du gamma

Le gamma part toujours de l'oxydant du couple DU HAUT vers le réducteur du couple DU BAS.

- FAUX : « Le réducteur du couple du haut réagit avec l'oxydant du couple du bas. » (Ce serait l'inverse, réaction non spontanée).
- FAUX : « On trace le gamma du bas vers le haut. »
- Astuce : L'oxydant « tombe » sur le réducteur (haut $\rightarrow$ bas).

MÉTHODE Prévoir et écrire l'équation bilan d'une réaction redox

1. Identifier les deux couples mis en présence (ex : Fe^{2+}/Fe et Cu^{2+}/Cu).
2. Les placer dans la classification électrochimique.
3. Appliquer la règle du γ : l'oxydant du couple le plus haut réagit avec le réducteur du couple le plus bas.
4. Écrire les deux demi-équations (réduction pour l'oxydant du haut, oxydation pour le réducteur du bas).
5. Multiplier les demi-équations par les coefficients nécessaires pour avoir le même nombre d'électrons des deux côtés.
6. Additionner les deux demi-équations et simplifier les électrons (et les espèces communes).
7. Vérifier la conservation des éléments et des charges.



EXERCICE RÉSOLU 14 Prévoir la réaction entre Fe et Cu^{2+}

Énoncé : On plonge un clou de fer dans une solution de sulfate de cuivre (CuSO_4). Prédire ce qui se passe et écrire l'équation bilan.

SOLUTION

Solution :

1. Couples : Cu^{2+}/Cu et Fe^{2+}/Fe .
2. Classification : Cu^{2+}/Cu est au-dessus de Fe^{2+}/Fe .
3. Gamma : Cu^{2+} (oxydant du haut) + Fe (réducteur du bas) $\rightarrow$ Cu + Fe^{2+} .
4. Demi-équations :



5. Électrons déjà équilibrés (2 et 2).
6. Bilan : $\text{Cu}^{2+} + \text{Fe} \longrightarrow \text{Cu} + \text{Fe}^{2+}$.
7. Vérif : Charges : $2 + +0 = 0 + 2+$ (OK). Atomes : 1 Cu, 1 Fe (OK).
8. Observation attendue : Le clou se couvre de cuivre rouge, la solution bleue se décolore (devient verte Fe^{2+}).

EXERCICE RÉSOLU 15 Réaction entre Ag et H_3O^+

Énoncé : Une pièce en argent est plongée dans de l'acide chlorhydrique dilué. Y a-t-il réaction ?

SOLUTION

Solution :

1. Couples : Ag^+/Ag et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$.
2. Classification : Ag^+/Ag est au-dessus de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$.
3. Gamma : L'oxydant du haut est Ag^+ ; le réducteur du bas est H_2 .
4. Les réactifs mis en présence sont Ag (réducteur du haut) et H_3O^+ (oxydant du bas). Ce n'est PAS le sens du gamma.
5. Conclusion : Pas de réaction spontanée. L'argent ne « dissout » pas dans l'acide chlorhydrique dilué. (C'est pour cela qu'on l'utilise en bijouterie et qu'il ne rouille pas).

14.6 6. Synthèse et applications au quotidien camerounais

LES AVAIS-TU ? Applications concrètes au Cameroun

- Corrosion du fer (rouille) : Fe (réducteur) + O₂ (oxydant, couple O₂/H₂O très haut dans la classification) + H₂O → Fe²⁺ puis Fe₂O₃ · n H₂O. C'est une réaction redox spontanée (gamma immense).
- Galvanisation (toitures, pylônes ENEO, barrages) : On recouvre le fer d'une couche de zinc (Zn). Zn est plus bas que Fe dans la classification (Zn meilleur réducteur). Si la couche craque, Zn s'oxyde à la place du fer (anode sacrificielle) : Zn → Zn²⁺ + 2 e⁻ protège Fe.
- Récupération de l'argent (bijouterie, déchets électroniques) : On utilise du cuivre (fil de Cu) pour précipiter l'argent depuis une solution d'Ag⁺ : Cu + 2 Ag⁺ → Cu²⁺ + 2 Ag (arbre d'argent).
- Piles et batteries : Toute pile (pile saline, alcaline, lithium-ion, batterie de voiture au plomb) fonctionne sur le principe de deux couples redox séparés (anode et cathode) reliés par un fil (électrons) et un pont salin (ions). La tension (E) dépend de l'écart dans la classification.
- Métallurgie (Figuil, fer) : Réduction du minerai de fer (Fe₂O₃) par le coke (C / CO) à haute température : Fe₂O₃ + 3 CO → 2 Fe + 3 CO₂. Le carbone/CO est un réducteur très fort (très bas dans la classification à haute T).
- Vinaigre et bissap : L'acidité (ions H₃O⁺) du vinaigre ou du jus de bissap (acide citrique, acide malique) peut attaquer les casseroles en aluminium (Al est non noble, au-dessus de H₂) → 2 Al + 6 H₃O⁺ → 2 Al³⁺ + 3 H₂ + 6 H₂O. Préférer l'inox (fer + chrome, passivé) ou l'émail.

À RETENIR L'essentiel de la leçon — Synthèse structurée

1. Couple Ox/Red

- Deux espèces conjuguées Ox (oxydant) et Red (réducteur) liées par Ox + n e⁻ ⇌ Red.
- Écriture : Ox/Red (ex : Cu²⁺/Cu, H₃O⁺/H₂).
- Demi-équation : équilibrer atomes (O par H₂O, H par H₃O⁺) puis charges par e⁻ (côté Ox).

2. Couples métalliques Mⁿ⁺/M

- Expérience clé : Cu + 2 Ag⁺ → Cu²⁺ + 2 Ag (arbre d'argent), Zn + Cu²⁺ → Zn²⁺ + Cu.
- Le métal solide est le réducteur ; l'ion est l'oxydant.

3. Couple H₃O⁺/H₂

- Demi-équation : 2 H₃O⁺ + 2 e⁻ ⇌ H₂ + 2 H₂O.

- Métaux au-dessus de H_2 (Zn, Fe, Al, Mg...) : réagissent avec acides dilués $\rightarrow H_2$ (aboiement).
- Métaux en-dessous (Cu, Ag, Au, Pt) : pas de réaction avec acides dilués.

4. Classification électrochimique

- Classement par pouvoir oxydant décroissant (haut $\rightarrow$ bas).
- H_3O^+ / H_2 = repère central (sépare nobles / non nobles).
- Construction par expériences croisées (qui oxyde qui?).

5. Règle du γ (Prévision)

- γ part de Ox du couple DU HAUT vers Red du couple DU BAS.
- Réaction : $Ox_{\text{haut}} + Red_{\text{bas}} \longrightarrow Red_{\text{haut}} + Ox_{\text{bas}}$.
- Produits stables (ne réagissent pas entre eux).

6. Méthode « Équation bilan » Couples $\rightarrow$ Classification $\rightarrow$ Gamma $\rightarrow$ Demi-équations $\rightarrow$ Égaliser e^- $\rightarrow$ Additionner $\rightarrow$ Vérifier.

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais définir un couple oxydant/réducteur et l'écrire sous la forme Ox/Red.
- ☐ Je sais écrire et équilibrer la demi-équation $Ox + n e^- \rightleftharpoons Red$ d'un couple donné (milieu acide : H_3O^+ , H_2O).
- ☐ Je connais par cœur les couples Cu^{2+}/Cu , Ag^+/Ag , Zn^{2+}/Zn , Fe^{2+}/Fe , Fe^{3+}/Fe^{2+} , H_3O^+/H_2 .
- ☐ Je sais décrire l'expérience de la lame de cuivre dans une solution de Ag^+ (dépôt d'Ag, bleuissement) et écrire l'équation bilan.
- ☐ Je sais décrire l'action de l'acide chlorhydrique dilué sur Zn, Fe, Cu, Ag et identifier H_2 par l'aboiement.
- ☐ Je sais que seuls les métaux placés au-dessus de H_2 dans la classification sont attaqués par H_3O^+ .
- ☐ Je sais construire une classification électrochimique qualitative à partir de résultats expérimentaux (tableau de réactivités).
- ☐ Je sais placer le couple H_3O^+ / H_2 entre les métaux nobles (en dessous) et non nobles (au-dessus).
- ☐ Je sais appliquer la règle du γ (haut $\rightarrow$ bas : $Ox_{\text{haut}} + Red_{\text{bas}}$) pour prévoir une réaction.
- ☐ Je sais combiner deux demi-équations (égalité des électrons) pour obtenir l'équation bilan.




- ☐ Je sais citer des applications : corrosion/protection (galvanisation, anode sacrificielle), récupération des métaux, piles, métallurgie.
- ☐ Je vérifie systématiquement la conservation des éléments et des charges dans mes équations finales.

EXERCICE 15 Entraînement — Prévoir et écrire les bilans

- On plonge une lame de zinc dans une solution de nitrate de fer(II) $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$. Prédire ce qui se passe. Écrire les demi-équations et l'équation bilan.
- On ajoute de la poudre de fer dans une solution de nitrate d'argent AgNO_3 . Prédire. Écrire le bilan.
- On met du cuivre en contact avec une solution de Zn^{2+} . Réaction ? Justifier par la classification.
- Écrire la demi-équation du couple $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ en milieu acide. Équilibrer.
- Défi : On a trois couples : X^{2+} / X , Y^{2+} / Y , Z^{2+} / Z . Expériences : X réduit Y^{2+} ; Z réduit X^{2+} ; Y ne réduit pas Z^{2+} . Classer les trois couples du plus fort oxydant au plus faible. Où placer $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2$ si X réagit avec l'acide mais Y ne réagit pas ?




CORRIGÉ Exercice 1

- Cuivre : Couples $\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}$ et $\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}$. Classification : $\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}$ au-dessus de $\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}$. Gamma : Fe^{2+} (Ox haut) + Zn (Red bas) $\rightarrow \text{Fe} + \text{Zn}^{2+}$.



Observation : Dépôt de fer gris sur le zinc, solution qui se décolore (si Fe^{2+} coloré) ou incolore.

- Argent : Couples Ag^+ / Ag et $\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}$. Ag^+ / Ag bien au-dessus. Gamma : $\text{Ag}^+ + \text{Fe} \rightarrow \text{Ag} + \text{Fe}^{2+}$.



Observation : Dépôt d'argent (gris/noir) sur le fer, solution qui verdit (Fe^{2+}).

3. Cuivre / Zinc : Couples Cu^{2+}/Cu et Zn^{2+}/Zn . Cu^{2+}/Cu au-dessus. Réactifs : Cu (Red haut) et Zn^{2+} (Ox bas). Pas le sens du gamma. → Pas de réaction.

4. $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$: $\text{MnO}_4^- + 8 \text{H}_3\text{O}^+ + 5 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 12 \text{H}_2\text{O}$.

5. Défi :

- X réduit $\text{Y}^{2+} \rightarrow \text{Y}^{2+}/\text{Y}$ au-dessus de X^{2+}/X .
- Z réduit $\text{X}^{2+} \rightarrow \text{X}^{2+}/\text{X}$ au-dessus de Z^{2+}/Z .
- Y ne réduit pas $\text{Z}^{2+} \rightarrow$ cohérent (si Y au-dessus de Z, Y est moins bon réducteur que Z).
- Ordre : $\text{Y}^{2+}/\text{Y} > \text{X}^{2+}/\text{X} > \text{Z}^{2+}/\text{Z}$.
- X réagit avec acide $\rightarrow \text{X}$ au-dessus de $\text{H}_2 \rightarrow \text{X}^{2+}/\text{X}$ au-dessus de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$.
- Y ne réagit pas $\rightarrow \text{Y}$ en-dessous de $\text{H}_2 \rightarrow \text{Y}^{2+}/\text{Y}$ en-dessous de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$.
- Contradiction? Non. X au-dessus de H_2 , Y en-dessous. Mais on a dit Y^{2+}/Y au-dessus de X^{2+}/X . Donc $\text{Y}^{2+}/\text{Y} > \text{X}^{2+}/\text{X} > \text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2 > \text{Z}^{2+}/\text{Z}$.
- Attente : Y est un métal noble (ex : Cu), X est un métal non noble (ex : Fe), Z est un métal très non noble (ex : Zn).



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+