

CHIMIE • 1ÈRE E

MODULE 1 : CHIMIE ORGANIQUE

LEÇON 03

LES COMPOSÉS OXYGÉNÉS :
ALCOOLS, ALDÉHYDES,
CÉTONES

DURÉE CONSEILLÉE : 7 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente les principales familles de composés organiques oxygénés : alcools, aldéhydes et cétones. Elle développe leur nomenclature, leurs classes, leurs propriétés physiques et les tests caractéristiques permettant de les identifier au laboratoire.

- À la fin de cette leçon, je sais identifier le groupe fonctionnel d'un alcool, d'un aldéhyde, d'une cétone et d'un éther-oxyde dans une formule développée.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire la formule générale et la formule brute d'un alcool, d'un aldéhyde et d'une cétone saturés.
- À la fin de cette leçon, je sais nommer un alcool, un éther-oxyde, un aldéhyde et une cétone selon les règles de nomenclature officielle.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les trois classes d'alcools (primaire, secondaire, tertiaire) à partir de leur formule développée.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer les propriétés physiques des alcools (ébullition, solubilité) par la présence de liaisons hydrogène.
- À la fin de cette leçon, je sais citer des exemples de polyalcools (glycol, glycérol) et leurs usages.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|--|
| 1. Généralités sur les composés oxygénés | cétones |
| 2. Les alcools : formules, nomenclature et classes | 6. Synthèse et applications au quotidien |
| 3. Propriétés physiques des alcools et polyalcools | 7. Travaux pratiques |
| 4. Aldéhydes et cétones : formules et nomenclature | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 5. Tests d'identification des aldéhydes et | 9. Exercices |
| | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais identifier le groupe fonctionnel d'un alcool, d'un aldéhyde, d'une cétone et d'un éther-oxyde dans une formule développée.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire la formule générale et la formule brute d'un alcool, d'un aldéhyde et d'une cétone saturés.
- À la fin de cette leçon, je sais nommer un alcool, un éther-oxyde, un aldéhyde et une cétone selon les règles de nomenclature officielle.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les trois classes d'alcools (primaire, secondaire, tertiaire) à partir de leur formule développée.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer les propriétés physiques des alcools (ébullition, solubilité) par la présence de liaisons hydrogène.
- À la fin de cette leçon, je sais citer des exemples de polyalcools (glycol, glycérol) et leurs usages.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer expérimentalement un aldéhyde d'une cétone à l'aide de la 2,4-DNPH, du réactif de Schiff, de la liqueur de Fehling et du réactif de Tollens.
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les équations-bilans des réactions de test des aldéhydes.

PRÉREQUIS

- Formules brutes, développées et semi-développées des molécules organiques (Seconde)
- Nomenclature des alcanes et règles de numérotation de la chaîne carbonée
- Notion d'isomérie (isomères de constitution)
- Écriture et équilibrage d'une équation-bilan chimique
- Notion de réaction d'oxydoréduction (oxydant, réducteur)

1 GÉNÉRALITÉS SUR LES COMPOSÉS OXYGÉNÉS

1.1 Situation d'accroche et problématique

À Douala comme à Bafoussam, l'éthanol est omniprésent : dans le vin de palme et le bili-bili qui animent les veillées, dans les flacons de désinfectant à 70 % des pharmacies, ou encore comme additif dans l'essence à la station SONARA. Pourtant, un simple déplacement d'un atome d'oxygène transforme cet alcool buvable en méthanol, responsable d'intoxications mortelles lors de la consommation d'alcools frelatés. Comment distinguer ces molécules si proches ? Comment les nommer, les classer et les identifier formellement au laboratoire ?

La réponse tient en une idée directrice de la chimie organique : ce ne sont pas seulement les atomes présents qui comptent, mais la manière dont ils sont assemblés. Un atome d'oxygène portant un hydrogène donne un alcool ; le même oxygène en double liaison avec un carbone en bout de chaîne donne un aldéhyde ; au milieu de la chaîne, une cétone ; coincé entre deux carbones par des liaisons simples, un éther-oxyde. Cette leçon donne les clés pour comprendre, nommer et identifier la grande famille des **composés oxygénés**.

Problématique : comment reconnaître, nommer et distinguer les différentes familles de composés oxygénés (alcools, aldéhydes, cétones, éthers-oxydes) à partir de la structure de leurs molécules ?

1.2 Qu'est-ce qu'un composé oxygéné ?

Jusqu'ici, tu as rencontré les hydrocarbures (alcane, alcène, alcyne, composés aromatiques) : leurs molécules ne contiennent que du carbone et de l'hydrogène. La vie quotidienne et l'industrie camerounaise utilisent pourtant d'immenses quantités de molécules organiques qui contiennent, en plus, de l'oxygène : l'éthanol du vin de palme, le glucose du jus de bissap, l'acétone du dissolvant à vernis, le formol des laboratoires de biologie. Toutes appartiennent à la grande famille des composés oxygénés.

DÉFINITION Composé oxygéné

Un **composé oxygéné** est un composé organique dont la molécule contient au moins un atome d'oxygène, en plus du carbone et de l'hydrogène.

La **famille** à laquelle il appartient est déterminée par son **groupe fonctionnel**, c'est-à-dire le groupement d'atomes particulier, incluant l'oxygène, qui confère à la molécule ses propriétés chimiques caractéristiques.

L'idée directrice est la suivante : une molécule organique se décompose conceptuellement en deux parties.

- Une partie **hydrocarbonée**, notée R (ou R' , R''), appelée **groupe alkyle** : c'est le « squelette » de la molécule, chimiquement assez peu réactif. Exemples : $R = \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-}$ (groupe éthyle), $R = \text{CH}_3\text{-}$ (groupe méthyle), $R = \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-}$ (groupe propyle).
- Un **groupe fonctionnel**, petite zone de la molécule où se concentre la réactivité chimique. C'est lui qui « signe » la famille.

ATTENTION L'atome d'oxygène ne suffit pas à tout dire

Deux molécules peuvent avoir la même formule brute et appartenir à des familles différentes. Par exemple, C_2H_6O correspond à l'éthanol $CH_3 - CH_2 - OH$ (un alcool) et à la méthoxyméthane $CH_3 - O - CH_3$ (un éther-oxyde). Seule la formule développée (ou semi-développée) permet de trancher. Retiens : en chimie organique, on raisonne toujours sur la formule développée, jamais sur la seule formule brute.

1.3 Les quatre familles de composés oxygénés du programme

Les alcools : le groupe hydroxyle $-OH$

Dans un alcool, l'atome d'oxygène est lié d'une part à un atome de carbone (tétravalent, porteur d'une chaîne carbonée), d'autre part à un atome d'hydrogène. Le groupe fonctionnel $-OH$ s'appelle le groupe **hydroxyle**. La formule générale d'un alcool saturé acyclique s'écrit :



Précision importante : dans $R - OH$, R est un groupe carboné (alkyle). Si l'on remplaçait R par un simple H , on obtiendrait $H - OH$, c'est-à-dire l'eau, qui n'est évidemment pas un alcool. Le plus simple des alcools est donc le méthanol $CH_3 - OH$ ($R = CH_3 -$).

L'exemple emblématique est l'**éthanol** $CH_3 - CH_2 - OH$, de formule brute C_2H_6O : c'est l'alcool des boissons fermentées traditionnelles (vin de palme, bili-bili), du gel hydroalcoolique et du désinfectant à 70 % vendu en pharmacie, et un solvant industriel majeur.

1.4 Aldéhydes et cétones : le groupe carbonyle $C=O$

Ici, l'atome d'oxygène n'est plus lié à un hydrogène : il forme une **double liaison** avec un atome de carbone. Le groupement $C=O$ s'appelle le groupe **carbonyle**. Mais la présence du carbonyle ne suffit pas à déterminer la famille. Tout dépend de la position du carbone carbonyle dans la chaîne carbonée.

DÉFINITION Aldéhyde et cétone

- Un **aldéhyde** est un composé oxygéné dont le groupe carbonyle est porté par un carbone en bout de chaîne : ce carbone est donc aussi lié à au moins un atome d'hydrogène. Formule générale : $R - CHO$ (souvent écrit $R - CH=O$ en développé). Le cas particulier $R = H$ donne le méthanal $H - CHO$.
- Une **cétone** est un composé oxygéné dont le groupe carbonyle est porté par un carbone à l'intérieur de la chaîne : ce carbone est lié à deux autres atomes de carbone. Formule générale : $R - CO - R'$, avec R et R' groupes alkyles (donc $R \neq H$ et $R' \neq H$).

Moyen mnémotechnique : dans un aldéhyde, le carbone du carbonyle garde « un H sous le coude » (en bout de chaîne) ; dans une cétone, il est « coincé entre deux carbones ».

Exemples de référence :

- Le **méthanal** $\text{H} - \text{CHO}$ (formule brute CH_2O), l'aldéhyde le plus simple : sa solution aqueuse à 37 % massique, le formol, sert à conserver les organes et spécimens au laboratoire.
- L'**éthanal** $\text{CH}_3 - \text{CHO}$ ($\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$), aldéhyde à deux carbones.
- La **propanone** $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_3$ (formule brute $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$), appelée couramment acétone : c'est la cétone la plus simple, utilisée comme dissolvant pour vernis à ongles et solvant industriel.

ATTENTION Pas de cétone à 2 carbones

Pour une cétone, le carbone carbonyle doit être lié à deux groupes alkyles. Il faut donc au minimum 3 atomes de carbone au total. Il n'existe pas de cétone de formule brute $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$.

1.5 Les éthers-oxydes : le pont oxygène -O-

Dans un éther-oxyde, l'atome d'oxygène est lié par des liaisons simples à **deux atomes de carbone** : il forme un « pont » entre deux groupes alkyles. La formule générale est :




L'exemple historique est l'**éthoxyéthane** $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ (formule brute $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$), le fameux « éther » utilisé autrefois comme anesthésiant en chirurgie. Les éthers-oxydes sont chimiquement assez peu réactifs ; on les utilise surtout comme solvants (ex. : éther de pétrole, THF).

ATTENTION Éther ou alcool : même formule brute, familles différentes

$\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3$ (méthoxyméthane, un éther) et $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$ (éthanol, un alcool) ont tous deux pour formule brute $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$. Ce sont des **isomères de fonction**. Pour les distinguer, cherche l'hydrogène porté par l'oxygène : s'il existe, c'est un alcool ; sinon, c'est un éther.

1.6 Identifier visuellement les quatre groupes fonctionnels

La figure ci-dessous rassemble les quatre groupes fonctionnels à reconnaître instantanément. Entraîne-toi à les repérer dans n'importe quelle formule développée : c'est le réflexe fondamental de tout le chapitre.



Les quatre groupes fonctionnels oxygénés. L'oxygène est le point de départ du diagnostic : porte-t-il un H (alcool)? Est-il en double liaison en bout de chaîne (aldéhyde) ou à l'intérieur (cétone)? Ou entre deux carbones par liaisons simples (éther)?

MÉTHODE Identifier la famille d'un composé oxygéné

Face à une formule développée ou semi-développée inconnue, procède en quatre étapes systématiques :

1. Repérer l'atome (ou les atomes) d'oxygène dans la molécule.
2. Observer son environnement immédiat :
 - L'oxygène porte-t-il un atome d'hydrogène (liaison O-H)? $\Rightarrow$ Groupe hydroxyle $\Rightarrow$ Alcool.
 - L'oxygène est-il en double liaison C=O (carbonyle)?
 - Le carbone du carbonyle porte-t-il un H (carbone terminal)? $\Rightarrow$ Aldéhyde.
 - Le carbone du carbonyle est-il lié à deux carbones (carbone interne)? $\Rightarrow$ Cétone.
 - L'oxygène est-il lié par deux liaisons simples à deux carbones (sans H, sans double liaison)? $\Rightarrow$ Pont -O- $\Rightarrow$ Éther-oxyde.

EXEMPLE Application immédiate de la méthode

Identifions la famille de trois molécules de formule brute $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ ou $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$:

- $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$: l'oxygène porte un H $\Rightarrow$ groupe hydroxyle $\Rightarrow$ alcool (propan-1-ol, $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$).
- $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{C} \begin{array}{l} \text{O} \\ || \\ \text{H} \end{array}$: double liaison C=O, le carbone du carbonyle porte un H $\Rightarrow$ aldéhyde (propanal, $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$).

- $\text{CH}_3 - \text{C} \begin{array}{l} \nearrow \text{O} \\ \searrow \text{CH}_3 \end{array}$: double liaison C=O, le carbone du carbonyle est entre deux carbones
 $\Rightarrow$ cétone (propanone, $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$).

Remarque cruciale : le propanal et la propanone ont la même formule brute $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$: ce sont des isomères de fonction. Cela justifie l'existence de tests chimiques spécifiques pour les distinguer (section 5).

1.7 Tableau récapitulatif des quatre familles

Famille	Formule générale	Groupe fonctionnel	Exemple courant (contexte camerounais)
Alcool	$R - \text{OH}$	Hydroxyle $-\text{OH}$	Éthanol $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$ (vin de palme, bili-bili, désinfectant 70 %)
Aldéhyde	$R - \text{CHO}$	Carbonyle C=O en bout de chaîne	Méthanal $\text{H} - \text{CHO}$ (formol, conservation spécimens)
Cétone	$R - \text{CO} - R'$	Carbonyle C=O à l'intérieur de la chaîne	Propanone $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_3$ (acétone, dissolvant vernis)
Éther-oxyde	$R - \text{O} - R'$	Pont oxygène $-\text{O}-$	Éthoxyéthane $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{O} - \text{C}_2\text{H}_5$ (ancien anesthésique)

1.8 Le groupe fonctionnel commande les propriétés chimiques

Pourquoi accorde-t-on tant d'importance au groupe fonctionnel ? Parce que c'est lui qui détermine le comportement chimique de la molécule : toutes les molécules d'une même famille réagissent de manière analogue face à un même réactif.


PROPRIÉTÉ Famille et réactivité

Tous les composés portant le même groupe fonctionnel possèdent des propriétés chimiques semblables : ils subissent les mêmes types de réactions et donnent les mêmes tests d'identification. Ainsi :

- tous les alcools réagissent avec le sodium métallique en dégageant du dihydrogène ;
- tous les aldéhydes réduisent la liqueur de Fehling et le réactif de Tollens (ce sont des réducteurs) ;

- les cétones, elles, ne subissent pas ces réactions d'oxydation ménagée : c'est ce qui permet de les distinguer des aldéhydes.

Un premier exemple de réaction caractéristique : l'action du sodium sur un alcool. Le sodium métallique Na arrache l'hydrogène du groupe hydroxyle ; il se forme un alcoolate (sel de sodium de l'alcool) et un dégagement de dihydrogène :



Cette réaction, vive et exothermique, est caractéristique du groupe -OH : elle se produit avec tous les alcools (et aussi avec l'eau, de façon encore plus violente, d'où l'interdiction formelle de jeter du sodium dans un évier!). Elle illustre parfaitement le principe : **même groupe fonctionnel, même réactivité**.

ATTENTION Le groupe -OH d'un alcool n'est pas l'ion hydroxyde HO^-

Erreur très fréquente au Probatoire ! Le groupe hydroxyle -OH d'un alcool est lié par covalence à un atome de carbone : il ne se libère pas en ions HO^- dans l'eau. Conséquences majeures :

- une solution d'éthanol dans l'eau est neutre : son pH vaut environ 7, elle ne rougit pas le papier tournesol ;
- l'alcool n'est pas une base, contrairement à la soude NaOH qui, elle, libère bien des ions hydroxyde HO^- en solution.

Retiens la formulation exacte : « le groupe hydroxyle est un groupe fonctionnel neutre, l'ion hydroxyde est un ion basique ». L'alcool peut certes céder l'hydrogène de son -OH à un métal très réducteur comme le sodium (réaction vue ci-dessus), mais jamais spontanément dans l'eau.

LE SAVAIS-TU ? Le formol, gardien des collections scientifiques... et danger public

Le liquide dans lequel baignent les organes et les spécimens des laboratoires de biologie — grenouilles, serpents, fœtus — est le formol : une solution aqueuse à environ 37 % en masse de méthanal $\text{H}-\text{CHO}$, l'aldéhyde le plus simple. Le méthanal est un excellent agent de conservation car il « fige » les protéines en créant des ponts covalents entre elles (on dit qu'il les dénature), ce qui empêche toute décomposition microbienne. C'est aussi ce qui le rend toxique, irritant pour les voies respiratoires et cancérigène avéré (CIRC groupe 1) : il faut manipuler le formol sous la hotte, avec des gants et des lunettes. Au Cameroun, des contrôles sanitaires saisissent régulièrement du poisson ou de la viande frauduleusement traités au formol par des commerçants peu scrupuleux pour masquer un début de décomposition : une pratique dangereuse, strictement interdite et punie par la loi.

EXERCICE RÉSOLU 1 Identification de familles à partir de formules semi-développées

Énoncé. On donne les formules semi-développées de quatre composés organiques :



1. Pour chaque composé, repérer l'atome d'oxygène et décrire son environnement de liaison.
2. En déduire la famille de chaque composé et donner son nom usuel ou systématique.
3. Les composés B et C ont-ils la même formule brute ? Commenter le lien avec l'isomé-rie.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Composé A : l'oxygène est lié à un carbone (liaison simple) et porte un hydrogène (liaison O-H) : groupe -OH (hydroxyle).
Composé B : l'oxygène est en double liaison avec un carbone terminal (bout de chaîne), ce carbone porte aussi un H : groupe -CHO (carbonyle aldéhydique).
Composé C : l'oxygène est en double liaison avec un carbone situé entre deux groupes méthyles (carbone secondaire) : groupe -CO- (carbonyle cétonique).
Composé D : l'oxygène est lié par deux liaisons simples à deux carbones (un éthyle, un méthyle), sans hydrogène, sans double liaison : pont -O-.
2. A est un alcool : propan-1-ol (ou propanol-1).
B est un aldéhyde : propanal.
C est une cétone : propanone (acétone).
D est un éther-oxyde : méthoxyéthane.
3. Comptons les atomes pour B : 3 C, 6 H (5 sur la chaîne + 1 sur CHO), 1 O $\Rightarrow \text{C}_3\text{H}_6\text{O}$.
Pour C : 3 C, 6 H (3+3 sur les deux CH_3), 1 O $\Rightarrow \text{C}_3\text{H}_6\text{O}$.
B et C ont donc la même formule brute $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ tout en appartenant à deux familles différentes (aldéhyde vs cétone) : ce sont des isomères de fonction. Cela confirme qu'on ne peut pas déterminer la famille d'un composé oxygéné à partir de sa seule formule brute : il faut sa formule développée ou un test chimique d'identification.

À RETENIR L'essentiel de la section 1


- Un **composé oxygéné** contient au moins un atome d'oxygène ; sa famille est fixée par son **groupe fonctionnel**.
- Quatre familles au programme : alcool $R\text{-OH}$ (hydroxyle), aldéhyde $R\text{-CHO}$ (carbonyle terminal), cétone $R\text{-CO-R'}$ (carbonyle interne), éther-oxyde $R\text{-O-R'}$ (pont oxygène).

- Méthode de diagnostic : repérer l'oxygène → observer liaisons (H? double liaison? position?).
- Le groupe fonctionnel commande la réactivité : même groupe ⇒ mêmes réactions, mêmes tests.
- Le -OH alcoolique est covalent, neutre, non basique (différent de l'ion HO⁻).

2 LES ALCOOLS : FORMULES, NOMENCLATURE ET CLASSES

2.1 Formule générale et formule brute des alcools saturés acycliques

Un alcool saturé acyclique (sans cycle, sans double liaison C=C) dérive d'un alcane par substitution d'un atome d'hydrogène par un groupe hydroxyle -OH. Sa formule brute suit la loi générale :



EXEMPLE Vérification sur les premiers alcools

Alcool	Formule semi-développée	n	Formule brute $C_n H_{2n+2} O$
Méthanol	CH ₃ - OH	1	CH ₄ O
Éthanol	CH ₃ - CH ₂ - OH	2	C ₂ H ₆ O
Propan-1-ol	CH ₃ - CH ₂ - CH ₂ - OH	3	C ₃ H ₈ O
Butan-1-ol	CH ₃ - CH ₂ - CH ₂ - CH ₂ - OH	4	C ₄ H ₁₀ O

Attention : cette formule $C_n H_{2n+2} O$ est aussi celle des éthers-oxydes saturés acycliques (isomérisie de fonction). Elle ne caractérise pas à elle seule la fonction alcool.

2.2 Nomenclature systématique (IUPAC) des alcools

La nomenclature suit des règles précises, identiques à celles des alcanes avec une priorité pour le groupe -OH.

MÉTHODE Nommer un alcool saturé acyclique (IUPAC)

1. Choisir la chaîne principale : la plus longue chaîne carbonée portant le groupe -OH. Elle détermine le radical de base (méth-, éth-, prop-, but-, pent-, hex-, hept-, oct-, non-, déc-).
2. Numéroté la chaîne : le numérotage part de l'extrémité la plus proche du groupe -OH (règle du plus bas locant pour la fonction prioritaire).
3. Indiquer la position du -OH : par un chiffre (locant) placé avant le suffixe -ol (ex. : propan-2-ol). Si un seul -OH et pas d'ambiguïté, le locant peut être omis pour le propan-1-ol (souvent dit propan-1-ol ou 1-propanol, mais IUPAC recommande le locant).
4. Nommer et numéroté les substituants : groupes alkyles (méthyle, éthyle...), halogènes, etc., par ordre alphabétique, avec leurs locants.
5. Assembler : locants-substituants-radical-locant-ol.

EXEMPLE Exemples de nomenclature

1. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$: chaîne 3 C (propane), OH sur C1 $\Rightarrow$ propan-1-ol.
2. $\begin{array}{c} \text{OH} \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_3 \end{array}$: chaîne 3 C, OH sur C2 $\Rightarrow$ propan-2-ol (ancien : isopropanol).
3. $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{OH} \end{array}$: chaîne 4 C (butane), OH sur C1, méthyle sur C3 $\Rightarrow$ 3-méthylbutan-1-ol.
4. $\text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$: chaîne 2 C, deux OH $\Rightarrow$ éthane-1,2-diol (glycol). Le suffixe devient -diol, -triol, etc., et on conserve le 'e' de l'alcane (éthane, propane).

ATTENTION Pièges fréquents en nomenclature

- Oublier le locant de l'OH : écrire « butanol » au lieu de « butan-1-ol » ou « butan-2-ol » est une erreur (sauf pour le méthanol et l'éthanol où l'OH est nécessairement en 1).
- Mauvaise numérotation : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_3$ se numérote depuis la droite (OH sur C2) $\Rightarrow$ butan-2-ol, pas butan-3-ol.
- Chaîne principale mal choisie : pour $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{OH}$, la chaîne la plus longue portant l'OH a 4 C (butane), pas 3 C (propane). C'est le 3-méthylbutan-1-ol.
- Ordre alphabétique : « 3-éthyl-2-méthyl... » (é avant m), pas l'inverse.


2.3 Les trois classes d'alcools : primaire, secondaire, tertiaire

La classification dépend du nombre d'atomes de **carbone** liés au carbone porteur du groupe -OH (carbone α ou carbone carbinolique). C'est une notion cruciale pour prévoir la réactivité (oxydation, déshydratation, substitution).


DÉFINITION Classes d'alcools

Soit C_α le carbone portant le groupe -OH.


- Alcool primaire (1°) : C_α est lié à un seul atome de carbone (et deux H). Groupe -CH₂OH.
- Alcool secondaire (2°) : C_α est lié à deux atomes de carbone (et un H). Groupe -CH(OH)-.
- Alcool tertiaire (3°) : C_α est lié à trois atomes de carbone (pas de H). Groupe -C(OH)(R)(R')-.



Primaire (1°)
R-CH₂-OH
 C_α lié à 1 C



Secondaire (2°)
R-OH-R'
 C_α lié à 2 C



Tertiaire (3°)
R-C(OH)-R'
 C_α lié à 3 C

Représentation de Cram des trois classes d'alcools. Le carbone α (porteur de l'OH) est en gras. Seule la nature des groupes R change.

EXEMPLE Classification d'alcools isomères C₄H₁₀O

Les 4 alcools isomères de formule brute C₄H₁₀O :

1. CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-OH : Butan-1-ol → Primaire ($C_\alpha = \text{CH}_2$).
2. $\begin{array}{c} \text{OH} \\ | \\ \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_3 \end{array}$: Butan-2-ol → Secondaire ($C_\alpha = \text{CH}$).
3. $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{OH} \end{array}$: 2-Méthylpropan-1-ol → Primaire ($C_\alpha = \text{CH}_2$).
4. $\begin{array}{c} \text{OH} \\ | \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$: 2-Méthylpropan-2-ol → Tertiaire ($C_\alpha = \text{C quaternaire}$).

MÉTHODE Déterminer la classe d'un alcool à partir de sa formule

1. Identifier le carbone porteur du -OH (carbone α).
2. Compter le nombre d'atomes de carbone directement liés à ce carbone α (ne pas compter l'H ni l'O).
3. 1 carbone voisin $\Rightarrow$ Primaire ; 2 $\Rightarrow$ Secondaire ; 3 $\Rightarrow$ Tertiaire.

2.4 Les polyalcools (diols, triols) : glycol et glycérol

Lorsque la molécule porte plusieurs groupes hydroxyles, on parle de **polyalcools** (ou polyols). Les deux exemples majeurs au programme sont :

DÉFINITION Glycol et Glycérol

- Éthane-1,2-diol (nom usuel : **glycol**) : $\text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$. Diol vicinal (deux OH sur deux carbones adjacents). Liquide visqueux, doux, toxique (intoxication mortelle par ingestion, métabolisé en acide oxalique). Utilisé comme antigel dans les radiateurs de voitures (baisse le point de solidification de l'eau).
- Propane-1,2,3-triol (nom usuel : **glycérol** ou glycérine) : $\text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_2 - \text{OH}$. Triol. Liquide très visqueux, hygroscopique (absorbe l'humidité de l'air), doux, non toxique. Produit lors de la saponification (fabrication du savon à partir d'huile de palme chez les savonneries artisanales ou industrielles comme Savonnerie du Cameroun). Utilisé en pharmacie, cosmétique (hydratant), alimentaire (E422).

PROPRIÉTÉ Propriétés physiques des polyalcools

La multiplicité des groupes -OH renforce considérablement les liaisons hydrogène inter-moléculaires par rapport aux mono-alcools de masse molaire voisine :

- Températures d'ébullition très élevées (glycol : 197°C ; glycérol : 290°C avec décomposition).
- Miscibilité totale avec l'eau (nombreux sites donneurs/accepteurs de liaisons H).
- Viscosité forte (glycérol) due à l'enchevêtrement du réseau de liaisons hydrogène.

À RETENIR L'essentiel de la section 2

- Alcool saturé acyclique : formule brute $C_nH_{2n+2}O$ (isomères des éthers).
- Nomenclature IUPAC : chaîne la plus longue portant l'OH, numérotation donnant le plus bas locant à l'OH, suffixe -ol (ou -diol, -triol).
- Trois classes selon le nombre de carbones liés au C_α : Primaire ($-CH_2OH$), Secondaire ($-CHOH-$), Tertiaire ($-C(OH)R_2$).
- Polyalcools : Glycol (éthane-1,2-diol, antigel, toxique) et Glycérol (propane-1,2,3-triol, savonnerie, cosmétique, non toxique).

3 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES ALCOOLS ET POLYALCOOLS


3.1 Influence du groupe hydroxyle : liaisons hydrogène

Le groupe -OH est **polaire** (différence d'électronégativité $O=3,5$, $H=2,1$). L'atome d'oxygène porte une charge partielle négative (δ^-), l'hydrogène une charge partielle positive (δ^+). Cela permet la formation de **liaisons hydrogène** intermoléculaires : l'H δ^+ d'une molécule est attiré par l'O δ^- d'une molécule voisine.

PROPRIÉTÉ Conséquences macroscopiques des liaisons hydrogène

Comparés aux alcanes de masse molaire voisine (qui n'ont que des forces de Van der Waals faibles) :

- Températures d'ébullition (T_{eb}) et de fusion (T_f) beaucoup plus élevées.
- Solubilité dans l'eau favorisée pour les chaînes courtes (l'alcool peut s'insérer dans le réseau H de l'eau).



Évolution des températures d'ébullition. Les alcools (courbe orange) ont des T_{eb} bien supérieures aux alcanes (bleu) et aux éthers (vert) de même masse molaire, preuve de la force des liaisons hydrogène. Données approximatives : Méthane -161, Éthane -89, Propane -42, Butane 0, Pentane 36; Méthanol 65, Éthanol 78, Propan-1-ol 97, Butan-1-ol 118, Pentan-1-ol 138; Méthoxyméthane -24, Éthoxyéthane 35, Méthoxypropane 76.

3.2 Solubilité dans l'eau : le combat chaîne carbonée vs groupe OH

La solubilité résulte de l'équilibre entre :

- La partie **hydrophile** (groupe -OH) qui « aime » l'eau (liaisons H donneur/accepteur).
- La partie **hydrophobe** (chaîne carbonée R) qui « fuit » l'eau (effet hydrophobe, rupture du réseau H de l'eau).

PROPRIÉTÉ Règle empirique de solubilité des alcools dans l'eau à 20 °C

- $n \leq 3$ (Méthanol, Éthanol, Propan-1-ol, Propan-2-ol) : Miscibles en toutes proportions.
- $n = 4$ (Butan-1-ol) : Faiblement soluble ($\approx 7,5$ g/100mL). Deux phases au-delà.
- $n = 5$ (Pentan-1-ol) : Très peu soluble ($\approx 2,2$ g/100mL).
- $n \geq 6$: Pratiquement insolubles (couche séparée).

ATTENTION Isomérisie et solubilité

Pour une même formule brute, les alcools ramifiés sont plus solubles que les alcools linéaires (la chaîne ramifiée est plus compacte, moins hydrophobe). Exemple : le 2-méthylpropan-2-ol (tert-butanol, $n = 4$ ramifié) est miscible à l'eau, alors que le butan-1-ol (linéaire) ne l'est pas.

3.3 Propriétés physiques des polyalcools : glycol et glycérol

Le tableau ci-dessous compare les propriétés physiques avec des alcools mono-fonctionnés de masse molaire proche.

Composé	Formule brute	Masse molaire (g/mol)	T_{eb} (°C)	Solubilité eau
Propan-1-ol	C_3H_8O	60	97	Miscible
Glycol (Éthane-1,2-diol)	$C_2H_6O_2$	62	197	Miscible
Butan-1-ol	$C_4H_{10}O$	74	118	7,5 g/100mL
Glycérol (Propane-1,2,3-triol)	$C_3H_8O_3$	92	290 (dec.)	Miscible

LESAVAIS-TU ? Le glycol, tueur silencieux des chiens... et des radiateurs

Le glycol (éthane-1,2-diol) a un goût ****sucré**** qui attire les animaux (chiens, chats) s'il fuit d'un radiateur ou d'un bidon mal fermé. Son ingestion provoque une insuffisance rénale aiguë mortelle par formation de cristaux d'oxalate de calcium dans les tubules rénaux (métabolisation en acide glycolique puis oxalique). Au Cameroun, où les véhicules anciens sont nombreux et les fuites de radiateur fréquentes, c'est un risque réel. L'antidote est l'éthanol (perfusion IV) qui sature l'enzyme (alcool déshydrogénase) et empêche la transformation toxique. Le glycérol, lui, est inoffensif et utilisé dans les sirops pour la toux (ex. : sirop de bissap glyciné) pour son effet émollient et sucrant.


À RETENIR L'essentiel de la section 3

- Le groupe -OH crée des liaisons hydrogène intermoléculaires fortes.
- T_{eb} et T_f des alcools $\gg$ alcanes/éthers de même masse molaire.
- Solubilité dans l'eau : miscibles pour $n \leq 3$, décroît rapidement pour $n \geq 4$ (partie hydrophobe dominante).
- Polyalcools (glycol, glycérol) : T_{eb} très hautes, miscibilité totale, forte viscosité (multiplicité des sites H).

4 ALDÉHYDES ET CÉTONES : FORMULES ET NOMENCLATURE

4.1 Formules générales et brutes

Les aldéhydes et cétones saturés acycliques (un seul carbonyle, pas de C=C) sont des isomères de fonction. Leur formule brute commune est :



EXEMPLE Vérification

- Méthanal $H - CHO : n = 1 \Rightarrow CH_2O$.
- Éthanal $CH_3 - CHO : n = 2 \Rightarrow C_2H_4O$.
- Propanal $CH_3 - CH_2 - CHO : n = 3 \Rightarrow C_3H_6O$.
- Propanone $CH_3 - CO - CH_3 : n = 3 \Rightarrow C_3H_6O$ (isomère du propanal).
- Butan-2-one $CH_3 - CO - CH_2 - CH_3 : n = 4 \Rightarrow C_4H_8O$.

4.2 Nomenclature systématique (IUPAC) des aldéhydes

Le groupe $-CHO$ est ****toujours en bout de chaîne**** (carbone n°1 par définition). Le suffixe est **-al**.

MÉTHODE Nommer un aldéhyde saturé acyclique

1. Choisir la chaîne la plus longue ****contenant le carbone du carbonyle**** (celui-ci est C1).
2. Le radical est celui de l'alcane correspondant (méth-, éth-, prop-, but-...).
3. Le suffixe est -al (remplace le -e final de l'alcane : méthane → méthanal).
4. Numéroter les substituants sur la chaîne à partir du carbonyle (C1).
5. Assembler : locants-substituants-radical-al.

EXEMPLE Exemples d'aldéhydes

1. $H - CHO$: Méthanal (formol).

2. $\text{CH}_3 - \text{CHO}$: Éthanal.
3. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CHO}$: Propanal.
4. $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CHO}$: chaîne 3 C (propanal), méthyle sur C2 $\Rightarrow$ 2-Méthylpropanal.
5. $\text{OHC} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CHO}$: 2 groupes $-\text{CHO} \Rightarrow$ Butane-1,4-dial (suffix -dial).

4.3 Nomenclature systématique (IUPAC) des cétones

Le carbonyle est ****à l'intérieur de la chaîne****. Le suffixe est **-one**.

MÉTHODE Nommer une cétone saturée acyclique

1. Choisir la chaîne la plus longue ****contenant le carbone du carbonyle****.
2. Numéroter la chaîne de façon à donner le ****plus bas locant possible au carbonyle**** (règle du plus bas locant pour la fonction).
3. Le radical est celui de l'alcane correspondant.
4. Indiquer la position du carbonyle par son locant placé avant le suffixe -one (ex. : butan-2-one).
5. Nommer et numéroter les substituants.
6. Assembler : locants-substituants-radical-locant-one.

EXEMPLE Exemples de cétones

1. $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_3$: chaîne 3 C, CO sur C2 $\Rightarrow$ Propanone (acétone). Locant 2 obligatoire (seule place possible).
2. $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: chaîne 4 C, CO sur C2 $\Rightarrow$ Butan-2-one (méthyléthylcétone).
3. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: chaîne 5 C, CO sur C3 $\Rightarrow$ Pentan-3-one (diéthylcétone).
4. $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}(\text{CH}_3)_2$: chaîne 4 C (butane), CO sur C2, méthyle sur C3 $\Rightarrow$ 3-Méthylbutan-2-one.

ATTENTION Pièges nomenclature aldéhydes/cétones

- Aldéhyde : le carbonyle est ****toujours en C1****. On n'écrit ****jamais**** le locant « 1 » de-

vant -al (ex : propanal, pas propan-1-al).

- Cétone : le locant du carbonyle est ****obligatoire**** (sauf ambiguïté impossible comme propanone). Ex : butan-2-one, pas butanone.
- Priorité fonctionnelle : Si une molécule porte à la fois un -OH (alcool) et un -CHO (aldéhyde), l'aldéhyde est prioritaire $\Rightarrow$ suffixe -al, l'alcool devient préfixe hydroxy-. Ex : $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CHO}$ = 2-hydroxyéthanal (glycolaldéhyde).

4.4 Isomérisie dans la famille des aldéhydes et cétones

Trois types d'isomérisie sont possibles pour la formule $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}$:

1. **Isomérisie de chaîne** : squelette carboné différent. Ex : Butanal (linéaire) vs 2-Méthylpropanal (ramifié).
2. **Isomérisie de position (cétones seulement)** : position du carbonyle sur la chaîne. Ex : Butan-2-one vs Butan-3-one (symétrique, identique à butan-2-one) ; Pentan-2-one vs Pentan-3-one.
3. **Isomérisie de fonction** : Aldéhyde vs Cétone (même n). Ex : Propanal vs Propanone ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$) ; Butanal vs Butan-2-one ($\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$).

EXERCICE RÉSOLU 2

Nomenclature et isomérisie pour $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$

Énoncé. Écrire les formules semi-développées et donner les noms IUPAC de tous les aldéhydes et cétones saturés acycliques de formule brute $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$. Les classer par type d'isomérisie.

SOLUTION

Solution. Aldéhydes (carbonyle en C1) :

1. $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CHO}$: Butanal (chaîne linéaire).

2. $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CHO} \end{array}$: 2-Méthylpropanal (chaîne ramifiée).

$\rightarrow$ Isomérisie de ****chaîne**** entre 1 et 2.

Cétones (carbonyle interne) :

3. $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$: Butan-2-one (ou méthyléthylcétone).

4. $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{CH}_3$: Identique à 3 (symétrie), pas d'isomère butan-3-one distinct.

Pas d'isomérisie de position pour $n = 4$ (seule position 2 possible).

Isomérisie de fonction : Butanal (1) et 2-Méthylpropanal (2) sont isomères de fonction de Butan-2-one (3).

À RETENIR L'essentiel de la section 4

- Aldéhydes et cétones saturés acycliques : formule brute commune $C_nH_{2n}O$.
- Aldéhyde : suffixe -al, carbonyle en C1 (locant jamais écrit). Ex : Éthanal, Propanal.
- Cétone : suffixe -one, carbonyle interne (locant obligatoire). Ex : Propanone, Butan-2-one.
- Isoméries : chaîne, position (cétones), fonction (aldéhyde/cétone).

5 TESTS D'IDENTIFICATION DES ALDÉHYDES ET CÉTONES

5.1 Problématique : distinguer aldéhydes et cétones

Les aldéhydes et les cétones partagent le groupe carbonyle $C=O$. Ils donnent ****tous les deux**** le test de la 2,4-DNPH (précipité jaune/orange). Pour les distinguer, il faut exploiter la différence fondamentale : l'aldéhyde a un ****H sur le carbone carbonyle**** ($R - CHO$), ce qui le rend ****oxydable**** (réducteur), alors que la cétone n'a pas cet H ($R - CO - R'$) et résiste à l'oxydation ménagée.


5.2 Test commun : la 2,4-DNPH (réactif de Brady)

EXPÉRIENCE Test à la 2,4-dinitrophénylhydrazine (2,4-DNPH)

Dispositif : Tube à essai, quelques gouttes de composé à tester, 2 mL de solution de 2,4-DNPH dans l'éthanol acide (réactif de Brady). Protocole : Mélanger, chauffer légèrement si nécessaire, laisser refroidir. Observation :

- Précipité cristallisé jaune-orangé à rouge (hydrazone) $\Rightarrow$ ****Présence d'un groupe carbonyle**** (aldéhyde OU cétone).
- Pas de précipité $\Rightarrow$ Pas de carbonyle (ou stéricité trop forte).

Équation-bilan (générale) :



(R ou H pour aldéhyde ; R, R' pour cétone).

ATTENTION 2,4-DNPH ne distingue PAS aldéhyde de cétone

Ce test est ****positif pour les deux familles****. Il sert à ***détecter*** la fonction carbonyle, pas à la ***classer***. Pour distinguer, il faut les tests d'oxydation (Fehling, Tollens, Schiff).

5.3 Test au réactif de Schiff (détection des aldéhydes)

Le réactif de Schiff est une solution de fuchsine décolorée par le SO_2 (incolore). Les aldéhydes restaurent la couleur rose/magenta de la fuchsine par addition sur le carbonyle. Les cétones ne le font pas (ou très lentement/faiblement pour les cétones α -hydroxylées, hors programme).

EXPÉRIENCE Test au réactif de Schiff

Dispositif : Tube à essai, 1 mL de réactif de Schiff + quelques gouttes de composé. Observation :

- Coloration rose vif / magenta (apparition rapide, <1 min) $\Rightarrow$ Aldéhyde.
- Reste incolore (ou trouble jaunâtre lent) $\Rightarrow$ Cétone (négatif).

Interprétation : L'aldéhyde réagit avec le groupement sulfite de la fuchsine décolorée pour reformer le système conjugué coloré.

5.4 Test à la liqueur de Fehling (oxydation par Cu^{2+})


La liqueur de Fehling contient des ions Cu^{2+} (bleu) complexés par l'ion tartrate en milieu basique (soude). L'aldéhyde réduit Cu^{2+} en Cu^+ (précipité rouge brique Cu_2O). La cétone ne réagit pas.

EXPÉRIENCE Test à la liqueur de Fehling

Dispositif : Tube à essai, 1 mL Fehling A (CuSO_4) + 1 mL Fehling B (tartrate + NaOH) $\rightarrow$ solution bleue homogène. Ajouter quelques gouttes de composé. Chauffer au bain-marie 60°C pendant quelques minutes. Observation :

- Précipité rouge brique (Cu_2O , oxyde de cuivre(I)) $\Rightarrow$ Aldéhyde.
- Solution reste bleue (pas de précipité) $\Rightarrow$ Cétone.

Équation-bilan (milieu basique) :



Note : L'aldéhyde est oxydé en ion carboxylate ($\text{R} - \text{COO}^-$), le cuivre(II) est réduit en cuivre(I) insoluble.

ATTENTION Fehling : conditions strictes

- Milieu ****basique**** indispensable (tartrate empêche la précipitation de $\text{Cu}(\text{OH})_2$ bleu pâle).
- ****Chauder**** (cinétique lente à froid).
- Ne pas confondre le précipité bleu pâle de $\text{Cu}(\text{OH})_2$ (si pas assez de tartrate ou trop de soude) avec le précipité rouge brique Cu_2O caractéristique.

5.5 Test au réactif de Tollens (oxydation par Ag^+) : le miroir d'argent


Le réactif de Tollens contient l'ion diamminargent(I) $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ (solution d' $\text{AgNO}_3 + \text{NH}_3$ jusqu'à redissolution du précipité AgOH). L'aldéhyde réduit Ag^+ en Ag métallique (miroir ou précipité noir). La cétone ne réagit pas.

EXPÉRIENCE Test au réactif de Tollens

Dispositif : Tube à essai ****propre**** (rincé à l'acide nitrique dilué puis eau, sinon miroir parasite), 2 mL réactif de Tollens frais + quelques gouttes de composé. Chauffer ****douce-ment**** au bain-marie (35 °C max, pas de flamme directe). Observation :

- Miroir d'argent (paroi interne argentée) ou ****précipité noir**** (argent colloïdal) $\Rightarrow$ Aldéhyde.
- Solution reste incolore $\Rightarrow$ Cétone.

Équation-bilan (milieu basique/ammoniacal) :



Note : L'argent métallique se dépose sur le verre (miroir) si le tube est très propre, sinon en poudre noire.

ATTENTION Sécurité Tollens : danger d'explosion !

Le réactif de Tollens ****doit être préparé frais**** et ****détruit immédiatement après usage**** en le diluant et en ajoutant de l'acide nitrique dilué ou de l'eau de Javel. S'il est stocké, il forme du fulminate d'argent $\text{Ag} - \text{C} \equiv \text{N}$ (ou azoture d'argent), ****hautement explosif**** au sec ou au choc. Interdiction formelle de garder un tube de Tollens usagé.

5.6 Tableau récapitulatif des tests de distinction

Test	Aldéhyde ($R - CHO$)	Cétone ($R - CO - R'$)
2,4-DNPH (Brady)	Précipité jaune-orangé (+)	Précipité jaune-orangé (+)
Réactif de Schiff	Rose magenta (+)	Incolore (-)
Liquueur de Fehling	Précipité rouge brique Cu_2O (+)	Bleu, pas de ppt (-)
Réactif de Tollens	Miroir d'argent Ag (+)	Incolore (-)

MÉTHODE Stratégie d'identification complète d'un carbonylé inconnu

1. Faire le test **2,4-DNPH**. Si négatif → pas de carbonyle (autre famille). Si positif → aldéhyde **OU** cétone.
2. Faire un test d'**oxydation** (Fehling **OU** Tollens **OU** Schiff).
 - Positif (rouge Fehling, miroir Tollens, rose Schiff) → Aldéhyde.
 - Négatif → Cétone.

EXERCICE RÉSOLU 3 Identification d'un carbonylé inconnu X

Énoncé. On réalise trois tests sur un composé organique liquide X de formule brute C_3H_6O :

- Test 2,4-DNPH : précipité jaune-orangé.
- Test de Fehling (chauffé) : solution reste bleue.
- Test de Tollens : solution reste incolore.

Déterminer la famille de X et proposer son nom et sa formule semi-développée.

SOLUTION

Solution.

1. 2,4-DNPH positif $\Rightarrow$ X possède un groupe carbonyle $\Rightarrow$ Aldéhyde **ou** Cétone.
2. Fehling négatif (pas de Cu_2O rouge) $\Rightarrow$ X n'est **pas** oxydé par Cu^{2+} basique $\Rightarrow$ Pas d'aldéhyde.
3. Tollens négatif (pas de miroir) $\Rightarrow$ Confirme l'absence d'aldéhyde.
4. Conclusion : X est une cétone.
5. Formule brute C_3H_6O ($n = 3$). Seule cétone possible : Propanone (acétone).
6. Formule semi-développée : $CH_3 - CO - CH_3$.

À RETENIR L'essentiel de la section 5

- 2,4-DNPH : détecte **tout** carbonyle (aldéhyde + cétone). Précipité jaune-orangé.
- Schiff / Fehling / Tollens : tests d'**oxydation** (réduction du réactif par l'aldéhyde).
 - Aldéhyde : Positif (Rose / Rouge brique Cu_2O / Miroir Ag).
 - Cétone : Négatif (Incolore / Bleu / Incolore).
- Équations-bilans Fehling et Tollens à savoir écrire (oxydation aldéhyde $\rightarrow$ carboxylate).
- Sécurité : Tollens frais, détruit après usage (risque explosion).

6 SYNTHÈSE ET APPLICATIONS AU QUOTIDIEN

6.1 Tableau de synthèse global des familles oxygénées

Critère	Alcool	Aldéhyde	Cétone	Éther-oxyde
Groupe fonctionnel	-OH (Hydroxyle)	-CHO (Carbonyle terminal)	-CO- (Carbonyle interne)	-O- (Pont)
Formule générale	$R - \text{OH}$	$R - \text{CHO}$	$R - \text{CO} - R'$	$R - \text{O} - R'$
Formule brute (sat. acycl.)	$\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$	$\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}$	$\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}$	$\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$
Nomenclature (suffixe)	-ol (diol, triol)	-al (dial)	-one	alkoxy-alcane
Classes / Isomérisation	Primaire, Secondaire, Tertiaire	Isomérisation chaîne, fonction	Isomérisation chaîne, position, fonction	Isomérisation chaîne, fonction
Test caractéristique	Na(s) : H_2 gazeux (Alcoolates)	Fehling/Tollens/Schiff (+) Cu_2O rouge, Miroir Ag, Rose	Fehling/Tollens/Schiff (-) 2,4-DNPH : (+)	Schiff réactif (Solvant inerte)
2,4-DNPH	(-)	(+) Jaune/Orange	(+) Jaune/Orange	(-)
Propriétés physiques	Liaisons H fortes. T_{eb} haute. Sol. eau : $n \leq 3$ miscibles.	Polaires. T_{eb} modérées. Sol. eau : petits miscibles.	Polaires. T_{eb} modérées. Sol. eau : petits miscibles.	Faiblement polaires. Pas de liaison H donneur. T_{eb} basses. Insolubles eau.
Exemple camerounais	Éthanol (Vin de palme, Bili-bili, Désinfectant, Carburant SO-NARA)	Méthanal (Formol, conservation labo, interdit alimentaire)	Propanone (Acétone, dissolvant, nettoyage industriel)	Éthoxyéthane (Ancien anesthésique, solvant labo)

6.2 Applications concrètes au Cameroun

LESAVAIS-TU ? L'éthanol, de la tradition à l'industrie

- Vin de palme / Bili-bili / Ndoké : Fermentation traditionnelle (levures) du sucre de sève de palmier (rafa, palmier à huile) ou de maïs/millet. Teneur en éthanol variable (3–10% vol). Enjeu sanitaire : méthanol (toxique) parfois présent si fermentation mal maîtrisée ou addition frauduleuse.
- Désinfectant 70 % : Concentration optimale pour dénaturer les protéines bactériennes (l'eau aide la pénétration). Produit localement par les laboratoires pharmaceutiques (ex. Cinpharm).
- Carburant (Supercarburant) : La SONARA (Société Nationale de Raffinage) incorpore de l'éthanol (bioéthanol importé ou local futur) dans l'essence (E10 : 10% éthanol) pour réduire les émissions de CO et l'importation de pétrole.
- Solvant universel : Extraction de principes actifs (pharmacopée traditionnelle : écorces de quinquina, feuilles d'artemisia), parfumerie, encres.

LESAVAIS-TU ? Aldéhydes et cétones dans l'économie locale

- Méthanal (Formol) : Au-delà des laboratoires (conservation spécimens SVT), utilisé dans la fabrication de résines (colles pour bois/contreplaqué – industrie du bois au Sud), désinfectant d'élevages (fumigation). Surveillance sanitaire stricte : fraudes sur poisson/viande (aspect frais artificiel).
- Propanone (Acétone) : Solvant industriel majeur (peintures, vernis, colles, nettoyage pièces mécaniques). Production locale limitée, surtout importée.
- Aldéhydes aromatiques : Benzaldéhyde (amande amère), vanilline (vanille), cinnamal-déhyde (cannelle) : arômes alimentaires, parfumerie. Le Cameroun produit de la vanille (région du Sud-Ouest) : extraction naturelle vs synthèse.

LESAVAIS-TU ? Glycérol : le co-produit précieux de la savonnerie

La réaction de **saponification** de l'huile de palme (triglycérides) par la soude NaOH produit du savon (carboxylates de sodium) ET du glycérol (propane-1,2,3-triol).



Au Cameroun, les savonneries artisanelles (région de l'Ouest, du Littoral) et industrielles (Savonnerie du Cameroun, Azur) récupèrent ce glycérol. Il est purifié et revendu pour :

- Cosmétiques (crèmes hydratantes, savons surgras « surgraissés » au glycérol).

- Pharmaceutique (sirops, suppositoires, excipient).
- Alimentaire (humectant E422, confiserie).
- Explosifs (nitroglycérine) — usage industriel strict.

C'est un bel exemple d'économie circulaire : déchet → ressource.

6.3 Exercices d'entraînement (niveau Probatoire)

EXERCICE 1 Nomenclature et classes

Donner le nom IUPAC et la classe (primaire, secondaire, tertiaire) des alcools suivants :

1. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$
2. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_3$
3. $(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{OH}$
4. $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{OH}$
5. $\text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$

EXERCICE 2 Isomérisie et formules

1. Écrire les formules semi-développées et les noms des 3 aldéhydes de formule brute $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$.
2. Écrire les formules semi-développées et les noms des 3 cétones de formule brute $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$.
3. Parmi ces 6 composés, identifier les paires d'isomères de fonction.

EXERCICE 3 Tests d'identification

On dispose de trois tubes étiquetés A, B, C contenant chacun un liquide incolore : un aldéhyde, une cétone, un alcool. On réalise les tests suivants :

- Tube A : 2,4-DNPH → précipité jaune. Fehling → rouge brique.
- Tube B : 2,4-DNPH → précipité jaune. Fehling → reste bleu. Tollens → incolore.
- Tube C : 2,4-DNPH → pas de précipité. Sodium → dégagement gazeux.

Identifier le contenu de chaque tube (famille + exemple possible pour $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ ou $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$).

EXERCICE 4 Calcul et équation-bilan

On fait réagir 2,3 g d'éthanol avec un excès de sodium métallique.

1. Calculer la quantité de matière d'éthanol introduit ($M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46 \text{ g mol}^{-1}$).
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction.
3. Calculer le volume de dihydrogène dégagé aux CNTP ($V_m = 24 \text{ L mol}^{-1}$).

CORRIGÉ Exercice 1 : Nomenclature et classes

1. Butan-1-ol (Primaire : $-\text{CH}_2\text{OH}$)
2. Butan-2-ol (Secondaire : $-\text{CHOH}-$)
3. 2-Méthylpropan-2-ol (Tertiaire : $-\text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3)_2$)
4. 2-Méthylpropan-1-ol (Primaire : $-\text{CH}_2\text{OH}$ sur chaîne ramifiée)
5. Butane-1,4-diol (Diol primaire, deux fonctions primaires)

CORRIGÉ Exercice 2 : Isomérisation $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}$

Aldéhydes ($\text{C1}=\text{CHO}$) : 1. Pentanal $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CHO}$ (linéaire). 2. 2-Méthylbutanal $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CHO}$. 3. 3-Méthylbutanal $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CHO}$. 4. 2,2-Diméthylpropanal $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{CHO}$ (Pivaldéhyde). → 4 aldéhydes (isomérisation de chaîne).

Cétones (CO interne) : 1. Pentan-2-one $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$. 2. Pentan-3-one $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ (symétrique). 3. 3-Méthylbutan-2-one $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$. → 3 cétones (isomérisation de chaîne + position).

Isomères de fonction : Chaque aldéhyde est isomère de fonction de chaque cétone (12 paires au total).

CORRIGÉ Exercice 3 : Tests d'identification

- Tube A : 2,4-DNPH (+) + Fehling (+) ⇒ Aldéhyde. Exemple $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$: Propanal $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$.
- Tube B : 2,4-DNPH (+) + Fehling (-) + Tollens (-) ⇒ Cétone. Exemple $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$: Propanone CH_3COCH_3 .
- Tube C : 2,4-DNPH (-) + Na (+) ⇒ Alcool. Exemple $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$: Propan-1-ol

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ (ou Propan-2-ol).

CORRIGÉ Exercice 4 : Calcul réaction Na/Éthanol

- $n(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = \frac{m}{M} = \frac{2,3}{46} = 0,050 \text{ mol.}$
- $2 \text{ C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2 \text{ Na} \longrightarrow 2 \text{ C}_2\text{H}_5\text{ONa} + \text{H}_2.$
- D'après l'équation : $2 \text{ mol éthanol} \rightarrow 1 \text{ mol H}_2$. $n(\text{H}_2) = \frac{n(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH})}{2} = \frac{0,050}{2} = 0,025 \text{ mol.}$
 $V(\text{H}_2) = n \times V_m = 0,025 \times 24 = 0,60 \text{ L} = 600 \text{ mL.}$

À RETENIR Synthèse finale de la leçon 03 – Composés oxygénés

- 4 familles : Alcool (-OH), Aldéhyde (-CHO), Cétone (-CO-), Éther-oxyde (-O-).
- Diagnostic visuel : Oxygène + environnement (H? C=O terminal/interne? Pont?).
- Nomenclature IUPAC : Suffixe prioritaire (-ol, -al, -one), numérotation plus bas locant pour la fonction.
- Alcools : 3 classes (1°, 2°, 3°) selon substitution du C_α . Polyalcools (glycol, glycérol).
- Propriétés physiques : Liaisons H $\Rightarrow T_{eb}$ hautes, solubilité eau pour chaînes courtes ($n \leq 3$).
- Tests carbonyle : 2,4-DNPH (+) pour les deux. Distinction Aldéhyde/Cétone : Fehling, Tollens, Schiff positifs uniquement pour aldéhydes (réducteurs).
- Équations-bilans : Fehling ($\text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Cu}_2\text{O}$), Tollens ($\text{Ag}^+ \longrightarrow \text{Ag}$), Na/Alcool (H_2).
- Contexte Cameroun : Éthanol (boissons, carburant, désinfectant), Formol (labo, fraude interdite), Acétone (solvant), Glycérol (savonnerie huile de palme).

7 LES ALCOOLS : FORMULES, NOMENCLATURE ET CLASSES

Dans la section précédente, nous avons découvert que les **composés oxygénés** sont des molécules organiques qui contiennent au moins un atome d'oxygène, et nous avons appris à repérer trois groupes fonctionnels : le groupe **hydroxyle** -OH des alcools, le groupe **carbonyle** C=O des aldéhydes et des cétones. Nous allons maintenant nous concentrer sur la première grande famille : les **alcools**. C'est une famille que tu connais déjà sans le savoir : l'éthanol est présent dans le vin de palme et le bili-bili, le glycérol entre dans la fabrication des savons artisanaux, et

le méthanol est malheureusement célèbre pour les drames des alcools frelatés. Apprenons à les écrire, à les nommer et à les classer.

7.1 Formule générale d'un alcool

DÉFINITION Alcool et formule générale

Un **alcool** est un composé organique oxygéné dont la molécule possède un **groupe hydroxyle** -OH porté par un atome de carbone tétragonal (carboné saturé, c'est-à-dire lié à quatre atomes par des liaisons simples).

Un alcool saturé (dont la chaîne carbonée ne contient que des liaisons simples C-C) répond à la formule générale :



où $n \geq 1$ est le nombre d'atomes de carbone.

D'où vient cette formule? Un alcane saturé a pour formule brute $C_n H_{2n+2}$. Pour obtenir un alcool, on remplace un atome d'hydrogène -H par un groupe hydroxyle -OH : on enlève un H, on ajoute un O et un H, le bilan est donc $C_n H_{2n+2} O$. Par exemple, pour $n = 2$: $C_2 H_6 O$, c'est l'éthanol $CH_3 - CH_2 - OH$.

ATTENTION Ne pas confondre alcool et phénol

Le groupe -OH doit être porté par un carbone saturé. Si le groupe -OH est directement fixé sur un cycle benzénique (carbone trigonal, hybridation sp^2), le composé est un **phénol**, qui n'est pas un alcool et possède des propriétés très différentes (acidité marquée). De même, si le -OH est porté par un carbone d'une double liaison C=C (énol), le composé est généralement instable. Au programme de Première : alcool = -OH sur carbone tétragonal.

7.2 Nomenclature des alcools

Nommer correctement une molécule, c'est lui donner une identité unique que tous les chimistes du monde comprennent. La nomenclature officielle (IUPAC) suit des règles simples et logiques.

MÉTHODE Nommer un alcool en 3 étapes

1. Identifier la chaîne principale : c'est la chaîne carbonée la plus longue qui contient le **carbone fonctionnel** (le carbone lié au -OH). Elle donne le nom de l'alcane correspondant.
2. Numéroter la chaîne dans le sens qui donne au groupe -OH l'indice de position le plus

petit possible. Les ramifications reçoivent ensuite leurs indices.

3. Construire le nom : on cite d'abord les ramifications par ordre alphabétique avec leurs indices, puis le nom de l'alcane dont on supprime le « e » final, suivi de l'indice du -OH et du suffixe **-ol** : préfixes + alcane + indice + « ol ».

EXEMPLE Appliquons la méthode

- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$: chaîne de 2 carbones → éthane ; le -OH est forcément en position 1 (inutile de le préciser pour 2 carbones) : éthanol.
- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$: chaîne de 3 carbones, -OH en position 1 : propan-1-ol.
- $\begin{array}{c} \text{OH} \\ | \\ \text{H}_3\text{C} - \text{CH} - \text{CH}_3 \end{array}$: chaîne de 3 carbones, -OH sur le carbone central : propan-2-ol.
- $\begin{array}{c} \text{OH} \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_3 \end{array}$: chaîne de 4 carbones, -OH en position 2 : butan-2-ol.
- $\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{OH} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$: chaîne la plus longue contenant le -OH : 3 carbones (propane), un méthyle en position 2, -OH en position 1 : 2-méthylpropan-1-ol.

ATTENTION Erreur fréquente : la numérotation

Une erreur classique au Probatoire consiste à écrire « propan-3-ol » pour $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$. C'est faux : on numérote toujours la chaîne de façon à donner au groupe -OH l'indice le plus faible. Ici, en partant de la droite, le -OH est en position 1 : le nom correct est propan-1-ol. Retiens : le groupe fonctionnel est prioritaire, c'est lui qui commande le sens de numérotation.


7.3 Les trois classes d'alcools

Deux alcools peuvent avoir la même formule brute et pourtant des comportements chimiques très différents (nous le verrons avec l'oxydation ménagée). Ce qui les distingue, c'est l'environnement du carbone fonctionnel. D'où la notion de **classe**.


DÉFINITION Classe d'un alcool

La **classe** d'un alcool est le nombre de groupes alkyles (ou d'atomes de carbone) directement liés au **carbone fonctionnel**, c'est-à-dire le carbone qui porte le groupe -OH.

- **Alcool primaire (I)** : le carbone fonctionnel est lié à 1 seul atome de carbone (et donc à 2 hydrogènes) : $R-CH_2-OH$.
- **Alcool secondaire (II)** : le carbone fonctionnel est lié à 2 atomes de carbone (et à 1 hydrogène) : $R_1-CH(OH)-R_2$.
- **Alcool tertiaire (III)** : le carbone fonctionnel est lié à 3 atomes de carbone (et à aucun hydrogène) : $R_1R_2R_3C-OH$.



Butan-1-ol (primaire)



Butan-2-ol (secondaire)




2-Méthylpropan-2-ol (tertiaire)

Les trois classes d'alcools de formule brute $C_4H_{10}O$: le carbone fonctionnel (en rouge) est lié à 1, 2 ou 3 atomes de carbone.

MÉTHODE Déterminer la classe d'un alcool à partir de sa formule développée

1. Repérer le groupe $-OH$ et donc le carbone fonctionnel.
2. Compter le nombre d'atomes de carbone directement liés à ce carbone fonctionnel (les hydrogènes ne comptent pas).
3. Conclure : 1 carbone → primaire ; 2 carbones → secondaire ; 3 carbones → tertiaire.



Arbre de décision : déterminer la classe d'un alcool en une seule question.

EXERCICE RÉSOLU 4 Classe du 2-méthylpropan-1-ol

On donne l'alcool de formule semi-développée $(\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{CH}_2 - \text{OH}$. Nommer cet alcool et préciser sa classe.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 — Chaîne principale. La chaîne la plus longue contenant le carbone lié au $-\text{OH}$ comporte 3 atomes de carbone : c'est un dérivé du propane. Il y a une ramification méthyle $-\text{CH}_3$ sur le carbone n°2.

Étape 2 — Numérotation. On numérote en partant de l'extrémité portant le $-\text{OH}$: le groupe hydroxyle est en position 1, le méthyle en position 2.

Étape 3 — Nom. 2-méthylpropan-1-ol.

Classe. Le carbone fonctionnel est le carbone du groupe $-\text{CH}_2-\text{OH}$. Il est lié à un seul atome de carbone (le carbone n°2) et à deux hydrogènes. C'est donc un alcool primaire.

Vérification : la formule brute est $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$, conforme à $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$ avec $n = 4$.

ATTENTION Piège : ne pas compter les hydrogènes

La classe se détermine en comptant les carbones voisins du carbone fonctionnel, jamais les hydrogènes. Ainsi $\text{CH}_3 - \text{OH}$ (méthanol) : son carbone fonctionnel n'est lié à aucun carbone ; par convention, on le range parmi les alcools primaires (il se comporte comme eux). Autre piège : dans $(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{OH}$, le carbone central n'a aucun hydrogène : c'est un alcool tertiaire, et cette absence d'hydrogène sur le carbone fonctionnel aura des conséquences majeures en oxydation (section suivante).

7.4 Isomérisation chez les alcools ; les éthers-oxydes

Des **isomères** sont des composés qui ont la même formule brute mais des formules développées différentes, donc des propriétés différentes. Chez les alcools, on distingue trois types d'isomérisation.

DÉFINITION Les trois types d'isomérisation

- **Isomérisation de chaîne** : le squelette carboné diffère (chaîne linéaire ou ramifiée).
Exemple : butan-1-ol $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$ et 2-méthylpropan-1-ol $(\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{CH}_2 - \text{OH}$.
- **Isomérisation de position** : la chaîne est identique mais la position du groupe $-\text{OH}$ diffère.
Exemple : butan-1-ol et butan-2-ol $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_3$.
- **Isomérisation de fonction** : le groupe fonctionnel diffère. Un alcool $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$ est isomère de

fonction des **éthers-oxydes** $R - O - R'$. Exemple : l'éthanol $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$ et le méthoxyméthane $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_3$ ont tous deux la formule brute $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$.

Un **éther-oxyde** est un composé oxygéné dans lequel l'atome d'oxygène est inséré entre deux groupes alkyles : $R - O - R'$. Pour le nommer, on considère le plus petit groupe alkyle associé à l'oxygène comme un préfixe **alcoxy-** (méthoxy, éthoxy...) accolé au nom de l'alcane correspondant au plus grand groupe : ainsi $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ se nomme **méthoxyéthane**.

EXEMPLE Exemple chiffré : les 7 isomères de $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$

La formule brute $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ ($n = 4$) correspond à 4 alcools et 3 éthers-oxydes, soit 7 isomères au total :

Formule semi-développée	Nom	Classe / fonction
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$	Butan-1-ol	Alcool primaire
$(\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{CH}_2 - \text{OH}$	2-Méthylpropan-1-ol	Alcool primaire
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_3$	Butan-2-ol	Alcool secondaire
$(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{OH}$	2-Méthylpropan-2-ol	Alcool tertiaire
$\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	Méthoxypropane	Éther-oxyde
$\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}(\text{CH}_3)_2$	2-Méthoxypropane	Éther-oxyde
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	Éthoxyéthane	Éther-oxyde

On compte donc 2 alcools primaires, 1 alcool secondaire, 1 alcool tertiaire et 3 éthers-oxydes.

MÉTHODE Dénombrer les isomères alcools d'une formule brute

1. Écrire tous les squelettes carbonés possibles (isomérisie de chaîne) : pour 4 C, la chaîne linéaire butane et la chaîne ramifiée 2-méthylpropane.
2. Sur chaque squelette, placer le -OH sur chaque carbone non équivalent (isomérisie de position).
3. Nommer chaque alcool obtenu et vérifier qu'aucun n'est compté deux fois.
4. Compléter éventuellement avec les éthers-oxydes $R - O - R'$ (isomérisie de fonction).

LESAVAIS-TU ? Le méthanol, un alcool mortel

Le **méthanol** $\text{CH}_3 - \text{OH}$, alcool primaire à un seul carbone, est extrêmement toxique : l'organisme le transforme en méthanal puis en acide méthanoïque, qui détruisent le nerf optique. Quelques millilitres suffisent à provoquer la cécité, et une trentaine de millilitres entraînent la mort. C'est pourquoi les alcools frelatés — boissons artisanales adultérées ou mal distillées — provoquent régulièrement des drames, y compris au Cameroun. L'éthanol des boissons et le méthanol ne diffèrent que par un seul carbone, mais leurs effets sont sans commune mesure : en chimie, la structure fait toute la différence !

EXERCICE 5 À toi de jouer

On considère les composés suivants : (a) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$; (b) $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_3$; (c) $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$; (d) $(\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{OH}$.

1. Nommer chaque composé.
2. Préciser la classe de chaque alcool.
3. Indiquer deux couples d'isomères et préciser le type d'isomérisation.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Noms : (a) propan-1-ol ; (b) propan-2-ol ; (c) méthoxyéthane ; (d) propan-2-ol (identique à (b)).
2. Classes : (a) le carbone fonctionnel $-\text{CH}_2-\text{OH}$ est lié à 1 carbone : alcool primaire. (b) et (d) : le carbone fonctionnel $-\text{CH}(\text{OH})-$ est lié à 2 carbones : alcool secondaire. (c) n'est pas un alcool mais un éther-oxyde.
3. Isomères : (a) et (b) ont tous deux la formule brute $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ avec le $-\text{OH}$ en positions différentes : isomérisation de position. (a) et (c) ont la même formule brute $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ mais des fonctions différentes (alcool / éther-oxyde) : isomérisation de fonction.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un alcool saturé répond à la formule générale $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}$, soit $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$.
- Nomenclature : chaîne la plus longue contenant le $\text{C}-\text{OH}$, numérotation donnant au $-\text{OH}$ l'indice le plus petit, nom = préfixes + alcane + indice + « ol ».
- La **classe** d'un alcool est le nombre de carbones liés au carbone fonctionnel : 1 → primaire, 2 → secondaire, 3 → tertiaire.
- Les alcools présentent des isomérisations de chaîne, de position et de fonction (avec les

éthers-oxydes $R - O - R'$, nommés alcoxy + alcane).

- $C_4H_{10}O$: 4 alcools (2 primaires, 1 secondaire, 1 tertiaire) et 3 éthers-oxydes.

Maintenant que tu sais écrire, nommer et classer les alcools, une question naturelle se pose : pourquoi l'éthanol se mélange-t-il à l'eau alors que l'huile de palme ne s'y mélange pas ? Pourquoi les points d'ébullition des alcools sont-ils si élevés comparés à ceux des alcanes ? C'est ce que nous explorerons dans la section suivante, consacrée aux propriétés physiques des alcools et aux polyalcools comme le glycol et le glycérol.


8 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES ALCOOLS ET POLYALCOOLS

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître, nommer et classer les alcools grâce à leur formule développée. Mais une question naturelle se pose : pourquoi l'éthanol est-il liquide à température ambiante alors que le propane, de masse molaire presque identique, est un gaz ? Pourquoi le vin de palme se mélange-t-il si bien à l'eau, alors que l'huile de palme, elle, flotte ? Toutes ces observations s'expliquent par la **structure moléculaire** des alcools, et plus précisément par une petite liaison aux grands effets : la **liaison hydrogène**. C'est l'objet de cette section.

8.1 Polarité de la liaison O-H et liaison hydrogène

8.2 Une liaison O-H fortement polarisée

Dans une molécule d'alcool, le groupe caractéristique est le groupe **hydroxyle** -OH. Or l'atome d'oxygène est beaucoup plus **électronégatif** que l'atome d'hydrogène : il attire vers lui les électrons de la liaison covalente O-H. Il en résulte une **liaison polarisée** : l'oxygène porte une charge partielle négative δ^- et l'hydrogène une charge partielle positive δ^+ .




La molécule d'alcool est donc une molécule **polaire** : elle possède un pôle négatif (l'oxygène) et un pôle positif (l'hydrogène du groupe hydroxyle).

8.3 La liaison hydrogène : un pont entre molécules

Intuitivement, imagine deux molécules d'éthanol voisines : le pôle positif de l'une (le H du -OH) est attiré par le pôle négatif de l'autre (l'oxygène, qui possède des doublets non liants). Cette attraction électrostatique crée un véritable pont entre les molécules.

DÉFINITION Liaison hydrogène

Une **liaison hydrogène** est une attraction électrostatique qui s'établit entre l'atome d'hydrogène d'un groupe -OH (porteur d'une charge partielle δ^+) et l'atome d'oxygène, riche en électrons, d'une molécule voisine. On la représente par des pointillés : O-H ... O. Elle est environ dix fois plus faible qu'une liaison covalente, mais bien plus forte que les simples attractions entre molécules non polaires (forces de Van der Waals).



Liaison hydrogène (pointillés roses) entre deux molécules d'éthanol : le H^{δ+} de l'une est attiré par l'O^{δ-} de l'autre.

ATTENTION Ne pas confondre

La liaison hydrogène n'est pas une liaison covalente : aucun électron n'est mis en commun. C'est une attraction entre molécules (force intermoléculaire). Autre piège : elle n'existe de façon notable que lorsque l'hydrogène est lié à un atome très électronégatif (O, N ou F). Les alcanes, qui ne possèdent que des liaisons C-H faiblement polarisées, ne forment pas de liaisons hydrogène.

8.4 Conséquences sur les températures de fusion et d'ébullition

8.5 Des alcools beaucoup moins volatils que les alcanes

Pour faire bouillir un liquide, il faut fournir assez d'énergie pour séparer les molécules les unes des autres. Or, dans un alcool, les molécules sont retenues par les liaisons hydrogène : il faut donc davantage d'énergie, donc une température plus élevée.

PROPRIÉTÉ Températures d'ébullition élevées

À masse molaire comparable, un alcool bout à une température nettement plus élevée

qu'un alcane, à cause des liaisons hydrogène qui associent ses molécules. Les alcools courants (méthanol, éthanol, propanols, butanols) sont liquides à température ambiante (leurs températures de fusion sont inférieures à 0 °C pour la plupart : celle de l'éthanol vaut -114 °C).

EXEMPLE Éthanol contre propane : le match des masses voisines


Comparons deux molécules de masses molaires très proches :

- éthanol C_2H_5OH : $M = 46 \text{ g mol}^{-1}$, $\theta_{eb} = 78 \text{ °C}$;
- propane C_3H_8 : $M = 44 \text{ g mol}^{-1}$, $\theta_{eb} = -42 \text{ °C}$.

Écart : 120 °C ! Le propane est un gaz (celui des bouteilles de gaz domestiques), l'éthanol est un liquide. Toute la différence vient des liaisons hydrogène, présentes dans l'éthanol, absentes dans le propane.

8.6 Influence de la longueur de la chaîne carbonée

Lorsque le nombre d'atomes de carbone augmente dans la série des alcan-1-ols, la masse molaire augmente et les attractions entre les chaînes carbonées (forces de Van der Waals) s'ajoutent aux liaisons hydrogène : la température d'ébullition **augmente régulièrement**.



Températures d'ébullition des alcan-1-ols et des alcanes en fonction du nombre de carbones. La courbe des alcools est toujours bien au-dessus : c'est la signature des liaisons hydrogène.

8.7 Influence de la classe et de la ramification

À formule brute égale (isomères), tous les alcools ne bouillent pas à la même température. Plus

la molécule est ramifiée, plus elle est « compacte » : les contacts entre molécules sont moins étendus, les attractions de Van der Waals sont plus faibles, et l'ébullition est abaissée.

EXEMPLE Trois isomères en $C_4H_{10}O$

Alcool	Classe	θ_{eb}
Butan-1-ol	primaire	118 °C
Butan-2-ol	secondaire	100 °C
2-méthylpropan-2-ol	tertiaire	82 °C

Conclusion générale : à formule brute égale, $\theta_{eb}(\text{primaire}) > \theta_{eb}(\text{secondaire}) > \theta_{eb}(\text{tertiaire})$. La ramification **abaisse** la température d'ébullition.

8.8 Solubilité des alcools dans l'eau

8.9 Le duel hydrophile / hydrophobe

L'eau est le champion des liaisons hydrogène : c'est un solvant **polaire**. Une molécule d'alcool possède deux parties de caractère opposé :

- le groupe -OH, **hydrophile** (qui « aime l'eau ») : il forme des liaisons hydrogène avec les molécules d'eau et favorise la dissolution ;
- la chaîne carbonée, **hydrophobe** (qui « fuit l'eau »), comme l'huile : elle s'oppose à la dissolution.

La solubilité résulte de ce duel : tout dépend de la taille relative des deux parties.

MÉTHODE Prévoir la solubilité d'un alcool dans l'eau

1. Repérer la partie hydrophile (le ou les groupes -OH) et la partie hydrophobe (la chaîne carbonée).
2. Comparer leurs « poids » respectifs : compter le nombre d'atomes de carbone par groupe -OH.
3. Conclure :
 - si la chaîne compte au plus 3 carbones par groupe -OH, l'alcool est miscible à l'eau en toutes proportions ;
 - pour 4 carbones (butanols), la solubilité est limitée (partiellement miscible, environ 73 g L⁻¹ pour le butan-1-ol) ;
 - au-delà de 4 carbones, la partie hydrophobe domine et la solubilité devient faible (inférieure à 30 g L⁻¹ pour le pentan-1-ol).

PROPRIÉTÉ Évolution de la solubilité

Les alcools à courte chaîne (**méthanol**, **éthanol**, **propan-1-ol**, **propan-2-ol**) sont miscibles à l'eau en toutes proportions. La solubilité diminue quand la chaîne carbonée s'allonge : le butan-1-ol est encore partiellement soluble (environ 73 g L^{-1} à 20°C), mais à partir du pentan-1-ol (22 g L^{-1}) la solubilité devient faible, et les alcools supérieurs (hexanol, heptanol...) sont pratiquement insolubles.

ATTENTION Erreur fréquente

Ne dis jamais « tous les alcools sont solubles dans l'eau ». C'est faux ! Seuls les alcools à courte chaîne (1 à 3 carbones) sont miscibles en toutes proportions. Le butan-1-ol (4 carbones) a une solubilité limitée. À partir du **pentanol** (5 carbones), la partie hydrophobe l'emporte : l'alcool forme une phase séparée, comme l'huile de palme sur l'eau. Au Probatoire, précise toujours : « miscible car la chaîne carbonée est courte ($\leq 3 \text{ C}$) ».

EXERCICE RÉSOLU 5 Solubilité et ébullition : deux prévisions

Énoncé. On considère le méthanol CH_3OH et l'octan-1-ol $\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_6 - \text{CH}_2\text{OH}$. (1) Lequel est miscible à l'eau ? Justifier. (2) Lequel a la température d'ébullition la plus élevée ? Justifier.

SOLUTION

Solution. (1) Le méthanol possède un groupe $-\text{OH}$ hydrophile et une chaîne d'un seul carbone : la partie hydrophile domine, il forme des liaisons hydrogène avec l'eau et y est miscible en toutes proportions. L'octan-1-ol possède une longue chaîne hydrophobe de 8 carbones qui masque l'effet du $-\text{OH}$: il est pratiquement insoluble dans l'eau (solubilité $\approx 0,3 \text{ g L}^{-1}$). (2) L'octan-1-ol a la masse molaire la plus grande ($M = 130 \text{ g mol}^{-1}$ contre 32 g mol^{-1}) : les forces de Van der Waals entre ses longues chaînes s'ajoutent aux liaisons hydrogène. Sa température d'ébullition (195°C) est donc bien plus élevée que celle du méthanol (65°C).

8.10 Les polyalcools : glycol et glycérol

Certains composés possèdent plusieurs groupes hydroxyle : ce sont les **polyalcools** (ou polyols). Chaque groupe $-\text{OH}$ supplémentaire multiplie les liaisons hydrogène : ces composés sont très solubles dans l'eau, visqueux, et bouillent à des températures élevées.

DÉFINITION Deux polyalcools de référence

- L'**éthane-1,2-diol**, appelé glycol : $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$, de formule brute $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$. C'est un diol (deux groupes $-\text{OH}$), liquide, miscible à l'eau, $\theta_{\text{eb}} = 197^\circ\text{C}$.
- Le **propane-1,2,3-triol**, appelé glycérol (ou glycérine) : $\text{HO}-\text{CH}_2-\overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}}}-\text{CH}_2-\text{OH}$, de formule brute $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$. C'est un triol, liquide visqueux et sirupeux, miscible à l'eau, $\theta_{\text{eb}} = 290^\circ\text{C}$ (avec décomposition).

EXEMPLE Des propriétés remarquables

Grâce à leurs nombreux groupes $-\text{OH}$, le glycol et le glycérol sont hygroscopiques (ils retiennent l'eau de l'air) et très solubles dans l'eau. Le glycol sert d'**antigel** dans les radiateurs automobiles (il abaisse le point de congélation et relève le point d'ébullition de l'eau) ; le glycérol, non toxique et adoucissant, entre dans la composition des savons, des crèmes cosmétiques et de nombreux médicaments (sirops, suppositoires).

LESAVAIS-TU ? Glycol, glycérol et vie quotidienne au Cameroun

Le glycol versé dans le radiateur d'une voiture abaisse la température de congélation de l'eau (et élève sa température d'ébullition) : le moteur est protégé du gel comme de la surchauffe, utile même sous nos latitudes pour éviter la surchauffe dans les embouteillages de Douala ou Yaoundé. Le glycérol, lui, est un sous-produit de la saponification : lorsque les savonneries artisanales de Douala font réagir l'huile de palme avec la soude, elles obtiennent du savon et du glycérol, que l'on retrouve dans les savons « glycinés » doux pour la peau. La chimie des polyalcools est ainsi présente jusque dans les marchés camerounais !

À RETENIR L'essentiel de la section

- La liaison $\text{O}-\text{H}$ est polarisée ($\text{O}^{\delta-}$, $\text{H}^{\delta+}$) : les molécules d'alcool s'associent par des **liaisons hydrogène** (forces intermoléculaires fortes).
- Les alcools bouillent à des températures bien plus élevées que les alcanes de masse voisine (éthanol 78°C contre propane -42°C) et sont liquides à température ambiante.
- L'ébullition augmente avec la longueur de la chaîne ; à formule brute égale : primaire > secondaire > tertiaire (la ramification abaisse l'ébullition).
- La solubilité dans l'eau diminue quand la chaîne s'allonge : miscibles en toutes propor-

tions jusqu'à 3 carbones (propanols), solubilité limitée pour 4 carbones (butanols), très faible au-delà (pentanols et supérieurs).

- Les polyalcools (glycol $C_2H_6O_2$, glycérol $C_3H_8O_3$) cumulent les groupes $-OH$: très solubles, visqueux, aux applications nombreuses (antigel, savons, cosmétiques, pharmacie).

EXERCICE 6 Pour t'entraîner

On donne trois alcools : A = propan-1-ol, B = 2-méthylpropan-2-ol, C = hexan-1-ol. (1) Classer A, B, C par température d'ébullition croissante en justifiant. (2) Lequel est miscible à l'eau en toutes proportions ? (3) Expliquer pourquoi le glycérol est beaucoup plus soluble dans l'eau que l'hexan-1-ol, alors que sa chaîne carbonée compte 3 atomes de carbone.

CORRIGÉ Exercice

(1) B ($82^\circ C$, tertiaire ramifié, 4 C) < A ($97^\circ C$, primaire, 3 C, chaîne linéaire mais plus courte que C) < C ($157^\circ C$, primaire, 6 C, chaîne la plus longue). La ramification de B abaisse fortement son ébullition ; la longue chaîne de C élève la sienne par forces de Van der Waals. (2) Le propan-1-ol A : chaîne courte (3 C), la partie hydrophile domine, il est miscible en toutes proportions. (3) Le glycérol possède trois groupes $-OH$ pour seulement 3 carbones (ratio 1 OH / 1 C) : il forme de très nombreuses liaisons hydrogène avec l'eau, ce qui le rend miscible, tandis que l'hexan-1-ol n'a qu'un seul $-OH$ pour 6 carbones hydrophobes (ratio 1 OH / 6 C), la partie hydrophobe l'emporte.

9 ALDÉHYDES ET CÉTONES : FORMULES ET NOMENCLATURE

Dans la section précédente, nous avons vu que les alcools possèdent le groupe hydroxyle $-OH$ et que ce groupe explique leurs propriétés physiques remarquables (liaisons hydrogène, solubilité dans l'eau, températures d'ébullition élevées). Mais le monde des composés oxygénés ne s'arrête pas là. Lorsque tu laisses une bouteille de vin de palme ouverte quelques jours, elle « tourne » : l'odeur devient piquante, le goût devient âcre. Ce qui s'est passé, c'est que l'éthanol a été transformé en un nouveau composé oxygéné : l'**éthanal**, puis en acide éthanoïque (le vinaigre). Ce nouveau composé appartient à une famille que nous allons maintenant étudier : les **aldéhydes**, et leurs cousines, les **cétones**.

9.1 Le groupe carbonyle : le cœur des aldéhydes et des cétones

Une intuition d'abord. Dans un alcool, l'atome d'oxygène est relié au carbone par une liaison simple (C-O-H). Dans les aldéhydes et les cétones, l'oxygène est relié au carbone par une liaison double C=O. Ce groupe C=O s'appelle le **groupe carbonyle**. C'est lui qui commande toute la chimie de ces deux familles.

DÉFINITION Aldéhydes et cétones

Un **aldéhyde** est un composé organique qui possède le groupe carbonyle C=O en extrémité de chaîne carbonée. Son groupe caractéristique s'écrit **-CHO** : le carbone du carbonyle est lié à un atome d'hydrogène et à un seul groupe alkyle R (ou à un hydrogène pour le méthanal). Formule générale : R-CHO.

Une **cétone** est un composé organique qui possède le groupe carbonyle C=O à l'intérieur de la chaîne carbonée. Le carbone du carbonyle est lié à deux groupes alkyles R et R'. Formule générale : R-CO-R'.

À RETENIR Formule brute générale

Les aldéhydes et les cétones saturés non cycliques (une seule liaison double C=O, toutes les liaisons C-C simples, chaîne ouverte) ont pour formule brute générale :



Remarque bien que c'est la même formule générale pour les deux familles : c'est l'origine de l'isomérie de fonction que nous verrons plus loin. Une cétone possède au minimum 3 atomes de carbone, car le carbonyle doit être entouré de deux groupes alkyles.

Comment distinguer visuellement les deux familles ? Pose-toi une seule question : le carbone du C=O porte-t-il un hydrogène ?

- S'il porte un H (groupe -CHO en bout de chaîne) $\Rightarrow$ c'est un **aldéhyde** ;
- s'il porte **deux carbones** (groupe -CO- au milieu de la chaîne) $\Rightarrow$ c'est une **cétone**.

ATTENTION Le groupe -CHO ne s'écrit jamais -COH

Écrire R-COH est une erreur classique : cela laisserait croire que l'oxygène est lié au carbone par une liaison simple et porte l'hydrogène, comme dans un alcool ! Dans un aldéhyde, l'hydrogène est lié au carbone, et l'oxygène est lié au carbone par une double liaison : R-CHO signifie R-CH=O. Retiens : CHO = C doublement lié à O, H sur le C.

9.2 Nomenclature des aldéhydes : le suffixe « -al »

L'idée directrice. La nomenclature des aldéhydes suit celle des alcools, avec deux simplifications heureuses : le groupe -CHO est toujours en bout de chaîne, donc le carbone du carbonyle est toujours le carbone n°1. Il n'y a donc **jamais d'indice de position** à écrire.

MÉTHODE Nommer un aldéhyde

1. Repérer le groupe -CHO : son carbone est obligatoirement le carbone n°1.
2. Identifier la chaîne la plus longue contenant ce carbone ; elle donne la racine (méthan-, éthan-, propan-, butan-...).
3. Remplacer le « e » final de l'alcane par le suffixe **-al** : éthane → éthanal.
4. Indiquer les ramifications éventuelles avec leur indice de position (le CHO étant en position 1).

EXEMPLE Les quatre premiers aldéhydes

Formule brute	Formule semi-développée	Nom
CH ₂ O	HCHO (ou H-CHO)	méthanal (formaldéhyde)
C ₂ H ₄ O	CH ₃ - CHO	éthanal (acétaldéhyde)
C ₃ H ₆ O	CH ₃ - CH ₂ - CHO	propanal
C ₄ H ₈ O	CH ₃ - CH ₂ - CH ₂ - CHO	butanal

Vérifie la formule générale : pour l'éthanal, $n = 2$, donc $C_2H_{2 \times 2}O = C_2H_4O$. C'est bien cela.

ATTENTION Ne jamais écrire « éthan-1-al »

Erreur extrêmement fréquente au Probatoire ! Certains élèves, par habitude des alcools (éthan-1-ol, propan-2-ol), écrivent « éthan-1-al » ou « butan-1-al ». C'est faux : comme le groupe -CHO est forcément en extrémité de chaîne, le carbone du carbonyle est toujours le carbone n°1, sans ambiguïté possible. L'indice de position est donc inutile et interdit. On écrit éthanal, butanal, tout simplement. En revanche, pour un aldéhyde ramifié comme $(CH_3)_2CH - CHO$, on écrit bien 2-méthylpropanal : les indices servent alors à localiser les ramifications, pas le CHO.

9.3 Nomenclature des cétones : le suffixe « -one »

L'idée directrice. Pour une cétone, le carbonyle peut se trouver à différentes positions à l'in-

térieur de la chaîne. Il faut donc préciser sa position par un indice, en choisissant le sens de numérotation qui donne au carbonyle l'indice le plus petit possible.

MÉTHODE Nommer une cétone

1. Identifier la chaîne carbonée la plus longue contenant le groupe $C=O$; elle donne la racine.
2. Numérotter la chaîne de façon à donner au carbone du carbonyle l'indice le plus petit possible.
3. Remplacer le « e » final de l'alcane par le suffixe **-one**, précédé de l'indice de position : pentan-2-one.
4. Citer ensuite les ramifications éventuelles par ordre alphabétique.

EXEMPLE Les premières cétones

Formule brute	Formule semi-développée	Nom
C_3H_6O	$CH_3 - CO - CH_3$	propanone (acétone)
C_4H_8O	$CH_3 - CO - CH_2 - CH_3$	butanone
$C_5H_{10}O$	$CH_3 - CO - CH_2 - CH_2 - CH_3$	pentan-2-one
$C_5H_{10}O$	$CH_3 - CH_2 - CO - CH_2 - CH_3$	pentan-3-one

Deux remarques essentielles sur ces exemples.

- La propanone n'a pas besoin d'indice : sur une chaîne de 3 carbones, le carbonyle ne peut être qu'en position 2 (les positions 1 et 3 donneraient un aldéhyde). De même, « butanone » suffit car butan-2-one et « butan-3-one » désignent la même molécule (il suffit de numérotter dans l'autre sens). Par convention, on omet l'indice lorsqu'il n'y a qu'une seule position possible.
- À partir de 5 carbones, l'indice devient indispensable : pentan-2-one et pentan-3-one sont deux molécules différentes (ce sont des isomères de position).

ATTENTION Pentan-2-one, jamais pentan-4-one

Prenons la molécule $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CO - CH_3$. Si tu numérotés la chaîne à partir de la gauche, le carbonyle porte l'indice 4 ; à partir de la droite, il porte l'indice 2. La règle est sans appel : on choisit toujours l'indice le plus petit. Le nom correct est donc **pentan-2-one**. Écrire « pentan-4-one » est une erreur de nomenclature sanctionnée à l'examen, même si la molécule décrite est la bonne.


9.4 Isomérisation de fonction entre aldéhydes et cétones

Rappelle-toi : les aldéhydes et les cétones saturés non cycliques partagent la même formule générale $C_nH_{2n}O$. Il existe donc, pour une même formule brute, des aldéhydes et des cétones : ce sont des **isomères de fonction**, c'est-à-dire des composés de même formule brute mais de groupes fonctionnels différents.


EXEMPLE Le couple propanal / propanone : C_3H_6O

La formule brute C_3H_6O correspond à deux composés :

- le propanal $CH_3 - CH_2 - CHO$: carbonyle en extrémité (aldéhyde) ;
- la propanone $CH_3 - CO - CH_3$: carbonyle à l'intérieur (cétone).



Propanal (aldéhyde)



Propanone (cétone)

Isomérisation de fonction : le propanal et la propanone ont la même formule brute C_3H_6O , mais le groupe carbonyle $C=O$ est en extrémité de chaîne dans l'aldéhyde (le carbone du carbonyle porte un H) et à l'intérieur de la chaîne dans la cétone (le carbone du carbonyle porte deux groupes méthyle).

EXERCICE RÉSOLU 6 Dénombrer les isomères de formule brute C_4H_8O

Énoncé. Donner les formules semi-développées et les noms de tous les aldéhydes et cétones de formule brute C_4H_8O .


SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : vérifier la formule générale. Pour $n = 4$: $C_4H_{2 \times 4}O = C_4H_8O$. La formule correspond bien à des aldéhydes et cétones saturés non cycliques.

Étape 2 : chercher les aldéhydes (groupe $-CHO$ en bout de chaîne, le carbone du CHO est le n°1).

- Chaîne linéaire de 4 carbones : $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CHO \rightarrow$ butanal ;
- Chaîne ramifiée de 3 carbones + 1 méthyle : $(CH_3)_2CH - CHO$, c'est-à-dire



Il n'y a pas d'autre possibilité : avec 4 carbones au total, la chaîne principale contenant le CHO compte 4 ou 3 carbones.

Étape 3 : chercher les cétones (groupe $-\text{CO}-$ à l'intérieur de la chaîne).

- $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \rightarrow$ butanone.

C'est la seule : une chaîne de 4 carbones n'offre qu'une position interne (la position 2, équivalente à la position 3 par symétrie de numérotation), et une chaîne ramifiée de 3 carbones ne peut pas porter de carbonyle interne entouré de deux alkyles.

Conclusion. $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ correspond à 2 aldéhydes (butanal et 2-méthylpropanal) et 1 cétone (butanone), soit 3 isomères au total. Le butanal et la butanone sont isomères de fonction ; le butanal et le 2-méthylpropanal sont isomères de chaîne.

MÉTHODE

Stratégie générale pour dénombrer les isomères $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}$

1. Aldéhydes : fixer $-\text{CHO}$ en position 1, puis faire varier le squelette des $n - 1$ carbones restants (isomérisation de chaîne).
2. Cétones : placer le groupe $-\text{CO}-$ à chaque position interne possible de chaque squelette (isomérisation de position), en éliminant les doublons par symétrie.
3. Vérifier que chaque formule développée compte bien n carbones, $2n$ hydrogènes et 1 oxygène.

9.5 Du quotidien au laboratoire : pourquoi ces molécules comptent

LESAVAIS-TU ?

L'acétone et l'éthanal, deux stars du quotidien

La propanone, connue sous le nom courant d'**acétone**, est la cétone la plus simple et l'un des solvants organiques les plus utilisés au monde : c'est elle qui dissout le vernis à ongles dans les dissolvants que l'on trouve dans tous les marchés de Yaoundé et de Douala. Elle sert aussi à nettoyer la verrerie de laboratoire car elle évapore très vite.

L'éthanal, lui, est le premier produit de l'oxydation de l'éthanol. C'est lui qui donne son odeur piquante caractéristique au vin de palme ou au vin qui « tourne » avant de devenir vinaigre : l'éthanol est d'abord oxydé en éthanal, puis l'éthanal est oxydé à son tour en acide éthanoïque. Chez l'être humain, c'est aussi l'éthanal, formé dans le foie lors de la dégradation de l'alcool, qui est en grande partie responsable des effets désagréables de l'excès de boisson. Le méthanal (formaldéhyde), enfin, est utilisé en solution aqueuse (le formol) pour conserver les pièces anatomiques et les spécimens de biologie.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Aldéhydes et cétones possèdent le groupe carbonyle $C=O$; formule générale commune $C_n H_{2n} O$ (composés saturés non cycliques).
- Aldéhyde $R-CHO$: carbonyle en extrémité de chaîne, le carbone du CHO porte un H. Suffixe -al, jamais d'indice de position (le CHO est toujours le carbone n°1) : méthanal, éthanal, propanal, butanal.
- Cétone $R-CO-R'$: carbonyle à l'intérieur de la chaîne. Suffixe -one avec l'indice le plus petit possible : propanone, butanone, pentan-2-one, pentan-3-one.
- Aldéhydes et cétones de même formule brute sont des isomères de fonction (ex. propanal et propanone, C_3H_6O).

Maintenant que tu sais reconnaître et nommer ces deux familles, une question se pose naturellement : comment, au laboratoire, distinguer concrètement un aldéhyde d'une cétone versés dans deux tubes non étiquetés ? C'est précisément l'objet de la section suivante, consacrée aux tests d'identification : la 2,4-DNPH, le réactif de Schiff, la liqueur de Fehling et le réactif de Tollens.

10 TESTS D'IDENTIFICATION DES ALDÉHYDES ET CÉTONES

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître et à nommer les aldéhydes et les cétones à partir de leurs formules. Mais dans un laboratoire réel — par exemple au contrôle qualité de la SONARA ou dans une brasserie — on reçoit parfois un flacon sans étiquette. Comment savoir si le liquide contient un aldéhyde, une cétone, ou aucun des deux ? La réponse passe par des **tests d'identification** : des réactions chimiques simples, rapides, qui produisent un changement visible (coloration, précipité, dépôt métallique) caractéristique d'une fonction. C'est l'objet de cette section, capitale pour le Probatoire.

10.1 Le test à la 2,4-DNPH : caractériser le groupe carbonyle

Intuition. Aldéhydes et cétones possèdent tous les deux un groupe **carbonyle** $C=O$. Il existe donc un réactif qui « reconnaît » ce groupe, sans distinguer les deux familles : c'est la 2,4-DNPH.

DÉFINITION La 2,4-dinitrophénylhydrazine (2,4-DNPH)

La **2,4-DNPH** (ou 2,4-dinitrophénylhydrazine) est un réactif qui donne, avec tout composé porteur d'un groupe carbonyle $C=O$ (aldéhyde ou cétone), un **précipité jaune-orangé** de 2,4-dinitrophénylhydrazone. Elle caractérise le groupe carbonyle mais ne distingue pas un aldéhyde d'une cétone.

Protocole. On introduit quelques gouttes du composé à tester dans un tube à essai, puis on ajoute quelques gouttes de solution de 2,4-DNPH. L'apparition d'un précipité jaune-orangé (souvent instantané, parfois après léger chauffage) prouve la présence d'un groupe carbonyle. Si rien ne se passe, le composé n'est ni un aldéhyde ni une cétone (c'est peut-être un alcool, un acide carboxylique, un ester...).

ATTENTION Ce que la DNPH ne dit pas

Un précipité jaune-orangé avec la 2,4-DNPH signifie seulement : « il y a un groupe carbonyle ». Il est impossible de conclure « c'est un aldéhyde » ou « c'est une cétone » sur la base de ce seul test. Il faut un deuxième test (Schiff, Fehling ou Tollens) pour trancher.

10.2 Le réactif de Schiff : un test spécifique des aldéhydes

Intuition. Pour distinguer aldéhydes et cétones, il faut exploiter une différence de réactivité. Le réactif de Schiff est le premier test qui le permet.

PROPRIÉTÉ Test au réactif de Schiff

Le **réactif de Schiff** (fuchsine décolorée par l'acide sulfureux SO_2) est incolore. En présence d'un aldéhyde, il se colore en **rose-violet** (magenta). Avec une cétone, le réactif reste incolore : le test est négatif.

Protocole. Quelques gouttes du composé à tester + quelques gouttes de réactif de Schiff, à température ambiante (à froid). Coloration rose-violette $\Rightarrow$ aldéhyde ; pas de coloration $\Rightarrow$ cétone (ou absence de carbonyle, déjà écartée par la DNPH).

ATTENTION Sensibilité du réactif de Schiff

Le réactif de Schiff est très sensible : il peut rosir légèrement au contact de l'air (oxydation lente) ou avec certains composés non carbonylés (acides forts, SO_2 résiduel). Un test positif doit être une coloration franche et rapide (quelques secondes). Une coloration lente et diffuse après plusieurs minutes n'est pas significative.


10.3 La liqueur de Fehling : l'oxydation ménagée des aldéhydes

Intuition. Les aldéhydes sont des espèces **réductrices** : ils peuvent être oxydés facilement en acides carboxyliques (ou en ions carboxylates en milieu basique). Les cétones, elles, ne subissent pas cette oxydation ménagée. La liqueur de Fehling met en évidence cette différence de comportement rédox.

PROPRIÉTÉ Test à la liqueur de Fehling

La **liqueur de Fehling** est une solution bleue contenant des ions cuivre(II) Cu^{2+} complexés par l'ion tartrate (sel de Rochelle) en milieu basique (soude). Chauffée en présence d'un aldéhyde, elle donne un **précipité rouge brique** d'oxyde de cuivre(I) Cu_2O . Avec une cétone, la solution reste bleue : test négatif.

Interprétation rédox. L'aldéhyde R-CHO est oxydé en ion carboxylate R-COO^- (couple $\text{R-COO}^-/\text{R-CHO}$), tandis que les ions Cu^{2+} sont réduits en Cu_2O (le cuivre passe du degré d'oxydation +II à +I). L'équation-bilan en milieu basique s'écrit :

**MÉTHODE** Démonstration de l'équilibrage (rappel méthodologique)

1. Demi-équation d'oxydation (aldéhyde $\rightarrow$ carboxylate) : $\text{R-CHO} + 3 \text{OH}^- \longrightarrow \text{R-COO}^- + 2 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{e}^-$
2. Demi-équation de réduction ($\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}_2\text{O}$) : $2 \text{Cu}^{2+} + 2 \text{OH}^- + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$
3. Somme : on additionne membre à membre et on simplifie l'eau et les OH^- .

Conditions : chauffage au bain-marie (environ 60°C à 80°C), milieu basique. Le précipité rouge brique de Cu_2O est la signature du test positif.


ATTENTION Test négatif $\neq$ « sans action » mal formulée

Dire que la liqueur de Fehling est « sans action » sur une cétone signifie que le test est négatif : la solution reste bleue, aucun précipité n'apparaît, rien d'observable ne se produit. Au Probatoire, rédige toujours l'observation concrète (« la solution reste bleue, pas de précipité rouge brique ») plutôt qu'une formule vague.

10.4 Le réactif de Tollens : le miroir d'argent**PROPRIÉTÉ** Test au réactif de Tollens

Le **réactif de Tollens** (nitrate d'argent ammoniacal) contient des ions diammineargent(I) $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$. En présence d'un aldéhyde, à tiède, il se forme un **dépôt d'argent métallique** Ag qui tapisse la paroi du tube : c'est le fameux **miroir d'argent**. Avec une cétone, le test est négatif : pas de dépôt.

Interprétation rédox. Là encore, l'aldéhyde est oxydé en ion carboxylate, et l'ion Ag^+ (complexé) est réduit en argent métallique Ag :



MÉTHODE Démonstration de l'équilibrage (rappel méthodologique)

1. Oxydation : $\text{R-CHO} + 3\text{OH}^- \longrightarrow \text{R-COO}^- + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^-$
2. Réduction : $2[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{Ag} + 4\text{NH}_3$
3. Somme : on ajoute 3OH^- à gauche pour neutraliser l'acidité latente et former l'eau (équilibre O/H en milieu basique).

Conditions : chauffage doux au bain-marie, milieu ammoniacal basique. Le miroir gris-brillant sur la paroi du tube est irratable.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi « miroir » d'argent ?


Avant l'industrialisation moderne, le test de Tollens était réellement utilisé pour argenter les miroirs : on versait sur une plaque de verre un mélange de réactif de Tollens et d'un aldéhyde (comme le glucose, qui possède une fonction aldéhyde), et une fine couche d'argent métallique se déposait uniformément, rendant le verre réfléchissant. C'est de cette application artisanale que vient le nom « miroir d'argent ». Le même principe sert encore à argenter les boules de Noël et certains thermos !

10.5 Tableau récapitulatif et stratégie d'identification

À RETENIR Résultats des quatre tests

Test	Aldéhyde	Cétone
2,4-DNPH	Précipité jaune-orangé	Précipité jaune-orangé
Réactif de Schiff	Coloration rose-violette	Reste incolore (négatif)
Liqueur de Fehling (à chaud)	Précipité rouge brique Cu_2O	Solution bleue inchangée (négatif)
Réactif de Tollens	Miroir d'argent Ag	Pas de dépôt (négatif)

Conclusion clé : les aldéhydes sont des **réducteurs** (ils réduisent Cu^{2+} et Ag^+) ; les cétones ne le sont pas.




Aspect des quatre tubes à essai lors de tests positifs sur un aldéhyde : précipité jaune-orangé (DNPH), coloration rose-violette (Schiff), précipité rouge brique de Cu_2O sous solution bleue (Fehling), dépôt d'argent sur les parois (Tollens).

MÉTHODE**Identifier un composé inconnu : la stratégie en deux étapes**

1. Test à la 2,4-DNPH. Précipité jaune-orangé $\Rightarrow$ le composé contient un groupe carbonyle (aldéhyde ou cétone). Pas de précipité $\Rightarrow$ ni aldéhyde ni cétone : inutile d'aller plus loin.
2. Test au réactif de Schiff (ou Fehling, ou Tollens). Test positif $\Rightarrow$ c'est un aldéhyde. Test négatif $\Rightarrow$ c'est une cétone.
3. Conclure en citant les deux observations, puis, si la formule brute est connue, proposer la formule semi-développée et le nom du composé.

Piège : un seul test positif à la DNPH ne suffit jamais à conclure entre aldéhyde et cétone.



Organigramme d'identification d'un composé carbonyle inconnu : la DNPH détecte le groupe carbonyle, puis le réactif de Schiff (ou Fehling, ou Tollens) distingue l'aldéhyde de la cétone.

EXERCICE RÉSOLU 7 Identification d'un composé de formule brute C_3H_6O

Un composé organique A a pour formule brute C_3H_6O . Il donne un précipité jaune-orangé avec la 2,4-DNPH. Chauffé avec la liqueur de Fehling, il provoque l'apparition d'un précipité rouge brique. Identifier A, écrire sa formule semi-développée et l'équation-bilan du test de Fehling.


SOLUTION

Étape 1 — Exploiter le test à la DNPH. Le précipité jaune-orangé prouve la présence d'un groupe carbonyle : A est un aldéhyde ou une cétone. Avec C_3H_6O , les deux candidats sont le **propanal** $CH_3 - CH_2 - CHO$ et la **propanone** $CH_3 - CO - CH_3$.

Étape 2 — Exploiter le test de Fehling. Le précipité rouge brique de Cu_2O est un test positif : A est un réducteur, donc un aldéhyde. La propanone (cétone) aurait laissé la solution bleue inchangée.

Conclusion : A est le **propanal** : $CH_3 - CH_2 - \overset{\overset{O}{\parallel}}{C} - H$.

Équation-bilan du test (milieu basique, chauffage) :




L'aldéhyde est oxydé en ion propanoate ; les ions Cu^{2+} sont réduits en oxyde de cuivre(I) rouge brique.

EXERCICE 7 À toi de jouer

Un liquide B de formule brute C_4H_8O donne un précipité jaune-orangé avec la 2,4-DNPH, mais ne rosit pas le réactif de Schiff et ne réagit pas avec la liqueur de Fehling. Donner la nature de B, sa formule semi-développée et son nom.

CORRIGÉ Exercice 1

Le test à la DNPH est positif : B contient un groupe carbonyle. Les tests de Schiff et de Fehling sont négatifs : B n'est pas un aldéhyde, c'est donc une cétone. La seule cétone acyclique saturée de formule brute C_4H_8O est la **butan-2-one** (anciennement butanone) :

**À RETENIR L'essentiel de la section**

- La **2,4-DNPH** caractérise le groupe carbonyle : précipité jaune-orangé avec les aldéhydes et les cétones.
- Le **réactif de Schiff** (rose-violet), la **liqueur de Fehling** (précipité rouge brique Cu_2O à chaud) et le **réactif de Tollens** (miroir d'argent) sont positifs avec les aldéhydes uniquement.
- Les aldéhydes sont des **réducteurs** (oxydables en carboxylates) ; les cétones ne le sont pas.
- Stratégie : DNPH d'abord, puis Schiff, Fehling ou Tollens pour trancher.

11 SYNTHÈSE ET APPLICATIONS AU QUOTIDIEN

Dans la section précédente, tu as appris à distinguer expérimentalement les aldéhydes des cétones grâce à la 2,4-DNPH, au réactif de Schiff, à la liqueur de Fehling et au réactif de Tollens. Ces tests ne sont pas de simples recettes de laboratoire : ils sont au cœur d'une démarche plus vaste qui consiste à **identifier** un composé organique inconnu, démarche très appréciée au Probatoire. Mais une question demeure : d'où viennent ces aldéhydes et ces cétones ? La réponse est élégante : ils naissent de l'**oxydation ménagée** des alcools. Cette dernière section boucle la boucle : elle relie les trois familles oxygénées entre elles, dresse un bilan complet de la leçon, puis montre comment ces molécules irriguent la vie quotidienne camerounaise, de la pharmacie au savon artisanal, en passant par les carburants.

11.1 Bilan général : les familles oxygénées en un coup d'œil

Avant d'aller plus loin, prenons de la hauteur. Trois familles de composés oxygénés ont été étudiées dans cette leçon : les **alcools**, les **aldéhydes** et les **cétones**. Chacune possède un groupe fonctionnel caractéristique, une formule générale, un suffixe de nomenclature et des tests d'identification propres. Le tableau suivant condense l'essentiel de la leçon : apprends-le par cœur, il résume à lui seul la moitié des questions de Probatoire sur ce chapitre.

Critère	Alcool	Aldéhyde	Cétone
Groupe fonctionnel	hydroxyle -OH	carbonyle -CHO (en bout de chaîne)	carbonyle C=O (à l'intérieur)
Formule générale	$C_n H_{2n+1} OH$ (ou $C_n H_{2n+2} O$)	$C_n H_{2n} O$	$C_n H_{2n} O$
Suffixe / préfixe	-ol	-al	-one
Exemple	éthanol $CH_3 - CH_2 - OH$	éthanal $CH_3 - CHO$	propanone $CH_3 - CO - CH_3$
Test 2,4-DNPH	négatif	positif (précipité jaune-orangé)	positif (précipité jaune-orangé)
Réactif de Schiff	négatif	positif (coloration rose-violette)	négatif
Liqueur de Fehling	négatif	positif (précipité rouge brique)	négatif
Réactif de Tollens	négatif	positif (miroir d'argent)	négatif

À RETENIR La stratégie d'identification en deux temps


La 2,4-DNPH détecte la famille des composés carbonylés (aldéhydes et cétones confondus). Les réactifs de Schiff, de Fehling et de Tollens tranchent ensuite entre aldéhyde et cétone : seul l'aldéhyde, qui possède un hydrogène porté par le carbone du carbonyle, est un réducteur capable de les faire réagir.

11.2 Complément Probatoire : de l'alcool au composé carbonylé, la chaîne d'oxydation

Voici l'intuition. Un alcool possède un atome d'hydrogène « fragile » : celui du groupe -OH, mais aussi celui (ou ceux) porté(s) par le carbone fonctionnel. Un **oxydant ménagé** (dichromate de potassium $K_2Cr_2O_7$ en milieu acide, ou permanganate de potassium $KMnO_4$ dilué) peut arracher ces hydrogènes sans casser la chaîne carbonée. Le résultat dépend alors crucialement de la **classe** de l'alcool, c'est-à-dire du nombre de groupes alkyle portés par le carbone fonctionnel.


PROPRIÉTÉ Oxydation ménagée des alcools — complément Probatoire

- Un alcool primaire $R - CH_2 - OH$ s'oxyde d'abord en aldéhyde $R - CHO$; si l'oxydant est en excès ou si l'aldéhyde n'est pas éliminé du milieu au fur et à mesure, l'oxydation se poursuit jusqu'à l'acide carboxylique $R - COOH$.
- Un alcool secondaire $R_1 - CH(OH) - R_2$ s'oxyde en cétone $R_1 - CO - R_2$, et l'oxydation s'arrête là.
- Un alcool tertiaire ne subit pas d'oxydation ménagée : son carbone fonctionnel ne porte aucun atome d'hydrogène à arracher. (En conditions brutales, la chaîne carbonée se rompt : ce n'est plus une oxydation ménagée.)




Chaîne d'oxydation ménagée d'un alcool primaire : alcool $\rightarrow$ aldéhyde $\rightarrow$ acide carboxylique. Pour un alcool secondaire, la chaîne s'arrête à la cétone ; pour un alcool tertiaire, elle ne démarre pas.


Écrivons les équations-bilans avec l'oxydant le plus classique, l'ion dichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ en milieu acide (couple $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$). Pour l'alcool primaire, par exemple l'éthanol :



L'aldéhyde formé peut être oxydé à son tour :



Pour un alcool secondaire, par exemple le propan-2-ol :



Observation expérimentale caractéristique : la solution passe de l'**orange** (couleur de l'ion dichromate) au **vert** (couleur de l'ion chrome Cr^{3+}). Ce virage de couleur est d'ailleurs le principe de l'éthylotest chimique autrefois utilisé par les forces de l'ordre : l'éthanol expiré par un conducteur ayant bu décolore le dichromate.

ATTENTION Ne confonds pas oxydation ménagée et combustion

L'oxydation ménagée conserve le squelette carboné : elle transforme seulement le groupe fonctionnel. La combustion, elle, détruit totalement la molécule en CO_2 et H_2O . Dire « l'alcool tertiaire ne s'oxyde pas » est un abus de langage : il ne subit pas d'oxydation ménagée, mais il brûle parfaitement !

ATTENTION Le piège classique du test DNPH

Erreur fréquente au Probatoire : un élève réalise le test à la 2,4-DNPH, observe un précipité jaune-orangé et conclut « le composé est un aldéhyde ». C'est faux : la DNPH réagit avec les aldéhydes et les cétones. Le test DNPH positif prouve seulement la présence d'un groupe carbonyle. Pour conclure, il faut un second test : Schiff, Fehling ou Tollens. Positif → aldéhyde ; négatif → cétone.

11.3 Applications au quotidien : des molécules qui changent la vie

11.4 L'éthanol, l'alcool aux mille visages

L'**éthanol** $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$ est sans conteste le composé oxygéné le plus présent dans la vie quotidienne.


- **Désinfection et hygiène.** L'alcool à 70 % (v/v) (70 mL d'éthanol pour 100 mL de solution) est un antiseptique de référence dans les hôpitaux et les pharmacies de Yaoundé ou de Douala : il détruit les membranes des bactéries et de nombreux virus. Les solutions hydro-alcooliques en contiennent de 60 % à 80 % en volume.
- **Boissons.** Obtenue par fermentation alcoolique des sucres (action des levures sur le glucose : $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \longrightarrow 2 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2 \text{CO}_2$), il est présent dans le vin de palme, le bili-bili (mil fermenté) ou la bière industrielle. La distillation du vin de palme donne l'odontol ou l'afofo, eau-de-vie très concentrée en éthanol.
- **Biocarburant.** Mélangé à l'essence (carburant E10 : 10 % d'éthanol), il réduit la consommation de pétrole et les émissions polluantes.

LESAVAIS-TU ? De la canne à sucre au réservoir : la filière SOSUCAM

La SOSUCAM (Société Sucrière du Cameroun), installée à Nkoteng et Mbandjock, produit du sucre à partir de la canne. La mélasse, résidu sucré de la cristallisation, peut être fermentée puis distillée pour produire de l'éthanol. Dans plusieurs pays (Brésil en tête), cet éthanol « vert » est mélangé à l'essence comme **biocarburant** : il est dit renouvelable car le CO_2 dégagé lors de sa combustion a été préalablement absorbé par la canne pendant sa croissance. Le bilan carbone est donc presque neutre, contrairement à celui de l'essence fossile.

11.5 Le glycérol et la savonnerie artisanale

Le **glycérol** (propane-1,2,3-triol, $\text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_2 - \text{OH}$) est un polyalcool sirupeux, soluble dans l'eau, hygroscopique. Il intervient dans la fabrication du savon : la **saponification** est la réaction entre un corps gras (ester de glycérol et d'acides gras, issu par exemple de l'huile de palme) et la soude à chaud. Elle produit du savon et libère du glycérol :



Dans les savonneries artisanales qui utilisent l'huile de palme rouge, le glycérol formé reste souvent dans le savon et lui confère ses propriétés adoucissantes. Industriellement, il est récupéré et revendu aux industries pharmaceutique (sirops, suppositoires) et cosmétique (crèmes hydratantes), car il retient l'eau.

11.6 La propanone (acétone), la cétone industrielle

La **propanone** $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_3$, appelée couramment acétone, est la cétone la plus simple. C'est un excellent **solvant** organique : elle dissout les vernis à ongles (d'où son usage comme dissolvant), les colles, les résines et de nombreuses peintures. L'industrie l'emploie dans la fabrication de plastiques et de médicaments. Au laboratoire, elle sert à rincer et sécher rapidement la verrerie, car elle est très volatile ($\theta_{\text{eb}} = 56^\circ\text{C}$).

11.7 Le méthanal (formaldéhyde) et le formol

Le **méthanal** HCHO est le plus simple des aldéhydes. Sa solution aqueuse à environ 37 % en masse, appelée **formol**, est un puissant désinfectant et un agent de conservation : dans les laboratoires d'anatomie et les facultés de médecine, elle permet de conserver les pièces anatomiques et les spécimens biologiques en durcissant les protéines. Le formol sert aussi à la fabrication de colles et de résines (mélaminé des tables de laboratoire).

ATTENTION Sécurité : le méthanol, un poison mortel

Le méthanol $\text{CH}_3 - \text{OH}$, alcool à un seul carbone, est toxique : son oxydation dans l'organisme produit du méthanal puis de l'acide méthanoïque, qui attaquent le nerf optique. L'ingestion de quelques millilitres provoque la cécité ; une trentaine de millilitres peut être mortelle. Les alcools frelatés (boissons artisanales mal distillées, ou coupées avec de l'alcool industriel dénaturé contenant du méthanol) provoquent régulièrement des intoxications graves. Ne jamais consommer d'alcool de provenance douteuse, et ne jamais confondre alcool à brûler et alcool alimentaire.

ATTENTION Inflammabilité : alcools et acétone

L'éthanol, le méthanol et la propanone sont des liquides très inflammables dont les vapeurs forment avec l'air des mélanges explosifs. Au laboratoire : jamais de flamme nue à proximité, chauffage au bain-marie plutôt qu'au bec Bunsen, bouchons refermés immédiatement, stockage loin des sources de chaleur. C'est pourquoi l'alcool à brûler se

manipule avec la plus grande prudence dans les cuisines.

11.8 Méthodologie : identifier un composé oxygéné au Probatoire

MÉTHODE Démarche d'identification d'un composé oxygéné

Face à un exercice du type « un composé A de formule brute $C_xH_yO...$ », procède toujours ainsi :

1. Exploite la formule brute. Calcule le nombre d'insaturations. Si la formule est $C_nH_{2n}O$, il y a une insaturation : le composé est un carbonyle (aldéhyde ou cétone) à chaîne saturée, ou un alcool/éther insaturé — l'énoncé précise généralement le contexte. Si elle est $C_nH_{2n+2}O$, c'est un alcool ou un éther-oxyde saturé.
2. Test à la 2,4-DNPH. Positif → composé carbonyle (aldéhyde ou cétone). Négatif → ni aldéhyde ni cétone.
3. Test de Schiff, Fehling ou Tollens. Positif → aldéhyde ; négatif → cétone.
4. Exploite les données complémentaires (oxydation d'un alcool, nombre d'isomères, nom de l'alcool de départ) pour déterminer la formule semi-développée exacte et nommer le composé.
5. Conclut proprement : formule semi-développée + nom systématique.

EXERCICE RÉSOLU 8 Identification d'un composé carbonyle (type Probatoire)

L'oxydation ménagée d'un alcool A de formule brute $C_4H_{10}O$ donne un composé B. Le composé B donne un précipité jaune-orangé avec la 2,4-DNPH et un précipité rouge brique avec la liqueur de Fehling.

1. Que peut-on déduire des tests réalisés sur B ?
2. Donner la classe de l'alcool A.
3. Sachant que la chaîne carbonée de A est ramifiée, donner les formules semi-développées et les noms de A et de B.
4. Écrire l'équation-bilan de la réaction de B avec la liqueur de Fehling.

SOLUTION

1. Interprétation des tests. Le test positif à la 2,4-DNPH prouve que B possède un groupe carbonyle : B est un aldéhyde ou une cétone. Le test positif à la liqueur de Fehling (précipité rouge brique d'oxyde de cuivre(I) Cu_2O) prouve que B est un réducteur : c'est donc

un aldéhyde.


2. Classe de A. Seul un alcool primaire donne un aldéhyde par oxydation ménagée. A est donc un alcool primaire.

3. Formules et noms. La formule $C_4H_{10}O$ correspond à $C_nH_{2n+2}O$ avec $n = 4$: alcool saturé. A étant primaire et à chaîne ramifiée, sa formule semi-développée est

$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{OH} \end{array}$: c'est le 2-méthylpropan-1-ol. (L'autre alcool primaire de formule $C_4H_{10}O$, le butan-1-ol, a une chaîne linéaire : il est exclu.) L'oxydation conserve le sque-

lette carboné, donc B est $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CHO} \end{array}$: le 2-méthylpropanal.

4. Équation-bilan avec la liqueur de Fehling. En milieu basique, l'ion cuivre(II) Cu^{2+} (complexé, responsable de la couleur bleue) est réduit en oxyde de cuivre(I) Cu_2O rouge brique, tandis que l'aldéhyde est oxydé en ion carboxylate :



On note $R = \text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) -$ pour alléger : $R - \text{CHO} + 2 \text{Cu}^{2+} + 5 \text{OH}^- \longrightarrow R - \text{COO}^- + \text{Cu}_2\text{O} + 3 \text{H}_2\text{O}$. Le virage du bleu au rouge brique est la signature expérimentale de l'aldéhyde.


EXERCICE 8 À toi de jouer

Un composé organique C a pour formule brute C_3H_6O . Il donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH, mais ne réagit ni avec le réactif de Schiff ni avec la liqueur de Fehling. Par ailleurs, C est obtenu par oxydation ménagée d'un alcool D.


1. Déterminer la fonction chimique de C, sa formule semi-développée et son nom.
2. Donner la formule semi-développée, le nom et la classe de D.
3. Écrire l'équation-bilan de l'oxydation de D par l'ion dichromate en milieu acide.

CORRIGÉ Exercice : identification de C et D


1. La formule C_3H_6O est du type $C_nH_{2n}O$: une insaturation. DNPH positive → carbonyle ; Schiff et Fehling négatifs → ce n'est pas un aldéhyde. C est donc une cétone :



2. Une cétone provient de l'oxydation ménagée d'un alcool secondaire : D est



3. Équation-bilan :



La solution passe de l'orange au vert.

À RETENIR

L'essentiel de la section

- La 2,4-DNPH détecte les carbonyles (aldéhydes et cétones) ; Schiff, Fehling et Tollens distinguent l'aldéhyde (positif) de la cétone (négatif).
- Oxydation ménagée : alcool primaire → aldéhyde → acide carboxylique ; alcool secondaire → cétone ; alcool tertiaire → pas d'oxydation ménagée.
- Éthanol : antiseptique, boissons fermentées, biocarburant ; glycérol : coproduit de la saponification ; acétone : solvant industriel ; formol : conservateur.
- Le méthanol est un poison (cécité, mort) ; alcools et acétone sont très inflammables.
- Méthode d'identification : formule brute → DNPH → Schiff/Fehling/Tollens → conclusion nommée.

Tu disposes désormais d'une vision complète des composés oxygénés : leurs structures, leurs noms, leurs propriétés et leurs tests. La leçon suivante te fera découvrir la famille qui prolonge naturellement la chaîne d'oxydation que tu viens d'étudier : les **acides carboxyliques** et leurs dérivés, les **esters**, à l'origine des arômes de fruits et des savons.

12 TRAVAUX PRATIQUES

12.1 Objectifs du TP

Ce travail pratique te place dans la peau d'un **chimiste analyste** : trois flacons ont perdu leur étiquette dans le laboratoire du lycée, et tu dois retrouver la nature de leur contenu en utilisant uniquement des tests chimiques. C'est exactement la démarche suivie chaque jour dans les laboratoires de contrôle de qualité, par exemple pour vérifier qu'un produit vendu comme « alcool » ne contient pas de solvant dangereux.

À l'issue de ce TP, tu seras capable de :

- réaliser dans les règles de sécurité les trois tests caractéristiques des composés carbonylés : test à la **2,4-DNPH**, test au **réactif de Schiff** et test à la **liqueur de Fehling** ;
- interpréter les observations (précipité jaune-orangé, coloration rose-violette, précipité rouge brique) pour distinguer un **aldéhyde** d'une **cétone** et d'un **alcool** ;
- identifier deux échantillons inconnus à partir d'un tableau d'observations ;
- écrire l'équation-bilan de la réaction d'oxydation ménagée d'un aldéhyde par la liqueur de Fehling.


À RETENIR

Rappels indispensables avant de commencer

- La 2,4-DNPH réagit avec tous les composés carbonylés (aldéhydes et cétones) : précipité jaune-orangé.
- Le réactif de Schiff et la liqueur de Fehling ne réagissent qu'avec les aldéhydes (coloration rose-violette ; précipité rouge brique à chaud).
- Les alcools ne réagissent avec aucun de ces trois réactifs.

12.2 Matériel et produits

Matériel	Produits
9 tubes à essai propres et secs	Échantillon A : éthanal (ou formol dilué à 5 %)
3 pipettes compte-gouttes	Échantillon B : propanone (acétone commerciale)
Portoir à tubes	Échantillon C : éthanol
Bécher de 250 mL (bain-marie)	Solution de 2,4-DNPH (quelques mL)
Bec Bunsen ou réchaud à gaz	Réactif de Schiff (quelques mL)
Thermomètre (facultatif)	Liqueur de Fehling fraîchement préparée
Pissette d'eau distillée	Eau distillée



Formules semi-développées des trois échantillons : l'éthanal et la propanone portent un groupe carbonyle (test DNPH +), l'éthanol porte un groupe hydroxyle (tests carbonylés -).

LESAVAIS-TU ? Et si un réactif manque au laboratoire ?

Dans de nombreux lycées camerounais, les réactifs sont coûteux. Quelques alternatives :

- La liqueur de Fehling peut être préparée au laboratoire en mélangeant, au moment de l'emploi, une solution de sulfate de cuivre(II) (CuSO_4) et une solution de potasse (KOH) additionnée de sel de Seignette (tartrate double de sodium et de potassium, disponible en pharmacie) : le mélange doit être bleu et limpide.
- L'éthanal peut être remplacé par du formol (solution commerciale de méthanal) dilué, ou par du glucose en poudre (le glucose possède une fonction aldéhyde et donne un test de Fehling positif).
- L'acétone vendue en quincaillerie ou en pharmacie comme dissolvant convient parfaitement.
- À défaut de bain-marie, une casserole contenant de l'eau chauffée sur un réchaud à gaz ou à bois fait l'affaire.

12.3 Sécurité


ATTENTION Consignes de sécurité — à lire avant toute manipulation

- Pictogramme « inflammable » (flamme) : l'éthanol, l'acétone et l'éthanal sont très inflammables. Aucune flamme nue à proximité des flacons ; le chauffage se fait uniquement au **bain-marie**, jamais le tube directement dans la flamme.
- Pictogramme « toxique / nocif » (tête de mort ou point d'exclamation) : la 2,4-DNPH est toxique et tache durablement la peau en jaune ; le formol est nocif par inhalation. Porte des gants si disponibles, des lunettes de protection et une blouse ; travaille près d'une fenêtre ouverte.
- Pictogramme « corrosif » : la liqueur de Fehling contient une base concentrée (KOH). En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau froide pendant plusieurs

minutes et prévenir le professeur.

- Ne jamais pipeter avec la bouche ; utiliser exclusivement les pipettes compte-gouttes.
- Ne jamais goûter ni sentir directement les produits : pour percevoir une odeur, agiter doucement l'air au-dessus du tube vers le nez avec la main.
- Les déchets contenant du cuivre et de la DNPH ne se jettent pas à l'évier : les verser dans le bidon de récupération prévu par le professeur.

12.4 Schéma du dispositif



Dispositif de chauffage au bain-marie pour le test à la liqueur de Fehling : le tube contenant le mélange réactionnel est plongé dans l'eau chaude, jamais chauffé directement à la flamme.

12.5 Protocole

MÉTHODE Déroulement des trois tests

Préparation. Numéroté neuf tubes à essai : A1, A2, A3 pour l'échantillon A ; B1, B2, B3 pour B ; C1, C2, C3 pour C. Introduire dans chaque tube environ 1 mL (soit 20 gouttes) de l'échantillon correspondant, avec une pipette propre dédiée à chaque flacon.

1. Test à la 2,4-DNPH (tubes A1, B1, C1) : ajouter 5 gouttes de solution de 2,4-DNPH dans chaque tube. Agiter doucement. Observer l'apparition éventuelle d'un précipité jaune-orangé. Noter l'observation immédiatement.
2. Test au réactif de Schiff (tubes A2, B2, C2) : ajouter environ 1 mL de réactif de Schiff dans chaque tube. Agiter et attendre 2 à 3 minutes à froid. Observer l'apparition éventuelle d'une coloration rose-violette.
3. Test à la liqueur de Fehling (tubes A3, B3, C3) : ajouter environ 2 mL de liqueur de Fehling (solution bleue) dans chaque tube. Plonger les trois tubes dans le bain-marie

maintenu entre 60 °C et 70 °C pendant 3 à 5 minutes. Observer l'apparition éventuelle d'un précipité rouge brique et le changement de teinte de la solution.

4. Consignation : reporter toutes les observations dans le tableau de résultats, en précisant la couleur, la nature (précipité ou coloration) et la rapidité d'apparition.
5. Conclusion : déduire de l'ensemble des tests la nature (aldéhyde, cétone ou alcool) de chacun des échantillons A, B et C.

12.6 Observations et résultats attendus

Voici le tableau de résultats type, tel qu'il doit apparaître dans ton compte rendu :

Test	Échantillon A	Échantillon B	Échantillon C
2,4-DNPH	Précipité jaune-orangé abondant, rapide	Précipité jaune-orangé	Aucun changement
Réactif de Schiff	Coloration rose-violette en 2 min	Aucune coloration	Aucune coloration
Liqueur de Fehling (à chaud)	Précipité rouge brique, solution verdit	Solution bleue inchangée	Solution bleue inchangée
Conclusion	Aldéhyde (éthanal)	Cétone (propanone)	Alcool (éthanol)

ATTENTION Pièges d'observation

- Un léger trouble avec la DNPH sur l'échantillon C peut provenir d'une pipette mal rincée : toujours utiliser une pipette par flacon.
- Le réactif de Schiff rosit lentement à l'air : ne conclure qu'après comparaison avec un tube témoin contenant uniquement le réactif.
- Un chauffage trop prolongé du test de Fehling peut faire brunir la solution même sans aldéhyde : respecter les 3 à 5 minutes.

12.7 Exploitation


EXERCICE RÉSOLU 9 Questions d'exploitation

1. Pourquoi le test à la 2,4-DNPH, à lui seul, ne permet-il pas de distinguer A de B ?

2. Quels tests permettent de trancher entre A et B ? Justifier.
3. L'échantillon C ne réagit avec aucun des trois réactifs. Que peut-on en conclure ?
4. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre l'éthanal (A) et la liqueur de Fehling, sachant que l'ion Cu^{2+} (complexé, bleu) est réduit en oxyde de cuivre(I) Cu_2O (rouge brique) et que l'aldéhyde est oxydé en ion carboxylate CH_3COO^- en milieu basique.
5. On réalise les trois tests sur un quatrième flacon D : DNPH positive, Schiff négatif, Fehling négatif. Quelle est la famille de D ? Proposer un exemple de composé.

SOLUTION

1. La 2,4-DNPH réagit avec le groupe carbonyle $\text{C}=\text{O}$ présent dans les aldéhydes et dans les cétones. A et B possèdent tous deux ce groupe : le précipité jaune-orangé apparaît donc dans les deux cas. Ce test prouve seulement que A et B sont des **composés carbonylés**.
2. Ce sont le réactif de Schiff et la liqueur de Fehling : ce sont des oxydants ménagés qui n'oxydent que les aldéhydes. A donne une coloration rose-violette avec Schiff et un précipité rouge brique avec Fehling : A est un aldéhyde. B ne réagit ni à Schiff ni à Fehling : B est une cétone.
3. C n'est ni un aldéhyde ni une cétone : il ne possède pas de groupe carbonyle. Sa réponse négative aux trois tests est compatible avec un alcool (ici l'éthanol), ce qui est confirmé par son odeur caractéristique et son inflammabilité.
4. L'équation-bilan s'écrit :



L'éthanal est oxydé en ion éthanoate ; les ions cuivre(II), responsables de la couleur bleue, sont réduits en oxyde de cuivre(I) rouge brique qui précipite.

5. D est une cétone : elle possède un groupe carbonyle (DNPH positive) mais n'est pas oxydable par les oxydants ménagés. Exemple : la propanone CH_3COCH_3 ou la butanone $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_3$.

12.8 Conclusion

Ce TP illustre la stratégie générale d'**identification** des composés organiques : on combine plusieurs tests complémentaires, car aucun test isolé ne suffit. La 2,4-DNPH détecte la famille des composés carbonylés ; le réactif de Schiff et la liqueur de Fehling distinguent ensuite, au sein de cette famille, les aldéhydes (oxydables) des cétones (non oxydables par les oxydants ménagés). L'absence de réponse aux trois tests oriente vers un alcool. Cette démarche par élimination, rigoureuse et économique en réactifs, est celle utilisée dans les laboratoires de contrôle : elle montre que la chimie est une science expérimentale où l'observation soignée, consignée dans un tableau, conduit à une conclusion argumentée. Retiens la phrase-clé : « DNPH pour le carbonyle, Schiff et Fehling pour l'aldéhyde ».

13 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

13.1 Fiche méthode 1 : Nommer un alcool


MÉTHODE Nommer un alcool en nomenclature systématique

1. Repérer le groupe caractéristique hydroxyle – OH dans la formule développée ou semi-développée.
2. Identifier la chaîne principale : c'est la chaîne carbonée la plus longue contenant le carbone fonctionnel (celui qui porte le – OH).
3. Numérotter la chaîne de sorte que le carbone fonctionnel ait l'indice de position le plus petit possible.
4. Construire le nom : nom de l'alcane correspondant, dont on remplace le e final par le suffixe **-ol**, précédé de l'indice de position : alcane → alcan-indice-ol.
5. Citer les ramifications (alkyles) en préfixe, avec leurs indices, par ordre alphabétique.
6. Vérifier : le nom ne commence jamais par « 1-ol » si la chaîne n'a qu'un seul carbone fonctionnel en bout de chaîne... sauf si c'est nécessaire pour lever une ambiguïté (ex. propan-1-ol / propan-2-ol).

Réflexe : si le – OH est sur un carbone en bout de chaîne, l'indice est 1 ; s'il est au milieu, compare les deux sens de numérotation.

EXERCICE RÉSOLU 10 Nommer des alcools

Nommer les alcools suivants :



SOLUTION

a) La chaîne la plus longue contenant le – OH compte 4 carbones : butane. Le – OH est sur le carbone 1 (bout de chaîne). Pas de ramification.

Nom : butan-1-ol.

b) Chaîne principale : 4 carbones (butane). Numérotation : depuis la gauche, le – OH est en position 2 ; depuis la droite, en position 3. On retient l'indice le plus petit : 2.

Nom : butan-2-ol.

c) La chaîne la plus longue contenant le – OH compte 4 carbones (attention : le CH_3 en

ramification ne fait pas partie de la chaîne principale car on doit inclure le carbone fonctionnel). Numérotation à partir du carbone portant le - OH : - OH en position 1, méthyle en position 3.

Nom : 3-méthylbutan-1-ol.

Conclusion : a) butan-1-ol ; b) butan-2-ol ; c) 3-méthylbutan-1-ol.

13.2 Fiche méthode 2 : Distinguer les trois classes d'alcools

MÉTHODE Déterminer la classe d'un alcool

1. Repérer le carbone fonctionnel : c'est le carbone qui porte le groupe - OH.
2. Compter les atomes de carbone directement liés à ce carbone fonctionnel (les groupes alkyles R).
3. Conclure selon le tableau :

Nombre de C liés	Classe	Structure
1 (ou 0 pour le méthanol)	Alcool primaire (I)	$R - CH_2 - OH$
2	Alcool secondaire (II)	$R - CH(OH) - R'$
3	Alcool tertiaire (III)	$R - C(OH)(R') - R''$



4. Piège à éviter : ne compte que les carbones voisins, jamais les hydrogènes.


Réflexe : un alcool primaire a toujours le motif $-CH_2 - OH$; un alcool secondaire le motif $-CH(OH)-$; un alcool tertiaire le motif $-C(OH)R_3$.

EXERCICE RÉSOLU 11 Classes des isomères de formule brute $C_4H_{10}O$

On donne les quatre alcools isomères de formule brute $C_4H_{10}O$:

- A : $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH$





Donner le nom et la classe de chacun.

SOLUTION

On repère dans chaque cas le carbone fonctionnel et on compte ses voisins carbonés.

A : carbone fonctionnel CH_2 lié à un seul carbone. Nom : butan-1-ol, alcool primaire.

B : carbone fonctionnel CH lié à deux carbones (CH_3 et CH_2CH_3). Nom : butan-2-ol, alcool secondaire.

C : carbone fonctionnel CH_2 lié à un seul carbone. Nom : 2-méthylpropan-1-ol, alcool primaire.

D : carbone fonctionnel C lié à trois carbones (trois CH_3). Nom : 2-méthylpropan-2-ol, alcool tertiaire.

Conclusion : A et C sont primaires, B est secondaire, D est tertiaire. Ces quatre composés sont des isomères de constitution (même formule brute $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$, structures différentes).

13.3 Fiche méthode 3 : Expliquer les propriétés physiques des alcools

MÉTHODE**Relier structure moléculaire et propriétés physiques**

1. Repérer le groupe hydroxyle $-\text{OH}$: il est polaire et permet la formation de **liaisons hydrogène** entre molécules d'alcool.
2. Températures de fusion et d'ébullition : les liaisons hydrogène renforcent la cohésion entre molécules $\Rightarrow$ les alcools ont des températures d'ébullition nettement plus élevées que les alcanes de masse molaire voisine. Plus la chaîne carbonée est longue, plus la température d'ébullition augmente.
3. Solubilité dans l'eau : le groupe $-\text{OH}$ (partie hydrophile) forme des liaisons hydrogène avec l'eau ; la chaîne carbonée (partie hydrophobe) s'y oppose. Les alcools à chaîne courte ($n \leq 4$) sont miscibles ou très solubles ; la solubilité diminue quand la chaîne s'allonge.
4. Poly alcools : plus il y a de groupes $-\text{OH}$ (glycol : 2 ; glycérol : 3), plus les liaisons hydrogène sont nombreuses $\Rightarrow$ températures d'ébullition et solubilité dans l'eau encore plus élevées, liquides visqueux.

Réflexe : toujours citer la liaison hydrogène dans la justification, c'est le mot-clé attendu par le correcteur.

EXERCICE RÉSOLU 12 Comparaison de températures d'ébullition et de solubilités

On donne les températures d'ébullition : propane $\theta_{eb} = -42^\circ\text{C}$; éthanol $\theta_{eb} = 78^\circ\text{C}$; glycérol (propane-1,2,3-triol) $\theta_{eb} = 290^\circ\text{C}$.

1. Expliquer pourquoi l'éthanol bout à une température bien plus élevée que le propane, alors que leurs masses molaires sont voisines ($M(\text{C}_3\text{H}_8) = 44 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46 \text{ g mol}^{-1}$).
2. Expliquer pourquoi le glycérol est miscible à l'eau en toutes proportions alors que l'hexan-1-ol y est très peu soluble.

SOLUTION

1. Les molécules de propane sont apolaires : seules de faibles interactions de Van der Waals les unissent, faciles à rompre. L'éthanol possède un groupe hydroxyle $-\text{OH}$ polaire : ses molécules s'associent par liaisons hydrogène ($\text{O}-\text{H}\dots\text{O}$). Rompre ces liaisons exige beaucoup plus d'énergie, d'où une température d'ébullition très supérieure (78°C contre -42°C) malgré des masses molaires quasi identiques.

2. Le glycérol $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{OH}$ possède trois groupes hydroxyle pour seulement trois carbones : sa partie hydrophile domine largement. Il forme de nombreuses liaisons hydrogène avec l'eau, d'où une miscibilité totale. L'hexan-1-ol ne possède qu'un seul groupe $-\text{OH}$ pour une longue chaîne de six carbones, hydrophobe : la partie carbonée l'emporte, la solubilité dans l'eau devient très faible.

Conclusion : les liaisons hydrogène expliquent à la fois les températures d'ébullition élevées et la solubilité dans l'eau ; le rapport (nombre de $-\text{OH}$) / (longueur de la chaîne carbonée) est le critère décisif.

13.4 Fiche méthode 4 : Nommer un aldéhyde et une cétone**MÉTHODE** Nomenclature des aldéhydes et des cétones

Pour un aldéhyde $R-\text{CHO}$:

1. Le groupe carbonyle $\text{C}=\text{O}$ est toujours en extrémité de chaîne : le carbone fonctionnel est le carbone n°1.
2. Chaîne principale la plus longue contenant le $-\text{CHO}$; nom de l'alcane + suffixe **-al** : alcanal (pas d'indice, il est sous-entendu 1).
3. Citer les ramifications en préfixe.

Pour une cétone $R-\text{CO}-R'$:

1. Le groupe carbonyle est à l'intérieur de la chaîne.
2. Chaîne principale la plus longue contenant le $\text{C}=\text{O}$; numéroter pour donner au carbonyle l'indice le plus petit.

3. Nom de l'alcane + suffixe **-one** précédé de l'indice : alcan-indice-one.

Réflexe : aldéhyde = - CHO en bout (suffixe -al) ; cétone = - CO - au milieu (suffixe -one + indice obligatoire).

EXERCICE RÉSOLU 13 Nommer des aldéhydes et des cétones

Nommer les composés suivants et préciser leur famille :

- a) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CHO}$ b) $\text{CH}_3\text{-CO-CH}_2\text{-CH}_3$ c) $\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{-CH-CHO} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ d) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CO-CH}_2\text{-CH}_3$

SOLUTION

- a) Groupe - CHO en extrémité : aldéhyde. Chaîne de 3 carbones $\Rightarrow$ propanal.
 b) Groupe C = O à l'intérieur de la chaîne : cétone. Chaîne de 4 carbones ; numérotation donnant l'indice le plus petit au carbonyle : position 2 $\Rightarrow$ butan-2-one (ou butanone).
 c) Groupe - CHO en extrémité : aldéhyde. Chaîne principale de 3 carbones contenant le - CHO, méthyle en position 2 $\Rightarrow$ 2-méthylpropanal.
 d) Cétone. Chaîne de 5 carbones, carbonyle en position 3 (identique dans les deux sens) $\Rightarrow$ pentan-3-one.
 Conclusion : a) propanal (aldéhyde) ; b) butan-2-one (cétone) ; c) 2-méthylpropanal (aldéhyde) ; d) pentan-3-one (cétone).

13.5 Fiche méthode 5 : Distinguer aldéhydes et cétones par les tests

MÉTHODE Choisir et interpréter les tests d'identification

- Test commun — 2,4-DNPH : aldéhydes et cétones donnent un précipité jaune-orangé. Ce test prouve la présence du groupe carbonyle C = O mais ne distingue pas les deux familles.
- Tests discriminants (oxydation ménagée, positifs uniquement pour les aldéhydes) :

Réactif	Aldéhyde	Cétone
2,4-DNPH	Précipité jaune-orangé	Précipité jaune-orangé
Réactif de Schiff	Coloration rose-violette	Incolore (négatif)
Liqueur de Fehling (à chaud)	Précipité rouge brique Cu_2O	Reste bleue (négatif)
Réactif de Tollens	Miroir d'argent	Négatif

3. Stratégie : 2,4-DNPH d'abord (carbonyle ?), puis Schiff ou Fehling (aldéhyde ou cétone ?).

4. Justification : l'aldéhyde est un réducteur (il s'oxyde en acide carboxylique) ; la cétone ne subit pas l'oxydation ménagée.

Réflexe : « test positif » = changement visible observé ; toujours préciser la couleur attendue.

EXERCICE RÉSOLU 14 Identification de deux composés carbonylés

Deux flacons sans étiquette A et B contiennent l'un le propanal, l'autre la propanone. On réalise les tests suivants :

- Avec la 2,4-DNPH, A et B donnent tous deux un précipité jaune-orangé.
- Avec la liqueur de Fehling chauffée, A donne un précipité rouge brique ; B ne réagit pas.
- Avec le réactif de Schiff, A donne une coloration rose-violette ; B reste incolore.

Identifier A et B en justifiant chaque étape.

SOLUTION

Étape 1 — 2,4-DNPH : les deux composés donnent un précipité jaune-orangé $\Rightarrow$ A et B possèdent tous deux un groupe carbonyle $C=O$. Ce test ne permet pas encore de les distinguer : c'est cohérent, le propanal et la propanone sont tous deux des composés carbonylés.

Étape 2 — Liqueur de Fehling : le précipité rouge brique de Cu_2O obtenu avec A montre que A est un réducteur : c'est un aldéhyde. B ne réduit pas la liqueur de Fehling : c'est une cétone.

Étape 3 — Réactif de Schiff : la coloration rose-violette avec A confirme que A est un aldéhyde ; le test négatif avec B confirme la cétone.

Conclusion : A est le propanal $CH_3 - CH_2 - CHO$ et B est la propanone $CH_3 - CO - CH_3$. Les tests de Fehling et de Schiff, concordants, lèvent toute ambiguïté laissée par la 2,4-DNPH.

13.6 Fiche méthode 6 : Écrire les équations-bilans des réactions de test

MÉTHODE Rédiger l'équation d'un test d'oxydation ménagée

1. Écrire le couple oxydant/réducteur mis en jeu : l'aldéhyde $R - CHO$ s'oxyde en acide carboxylique $R - COOH$ (ou ion carboxylate $R - COO^-$ en milieu basique).

2. Identifier l'oxydant du test : ion Cu^{2+} complexé (Fehling, réduit en Cu_2O rouge brique) ou ion Ag^+ complexé (Tollens, réduit en Ag métallique).
3. Écrire les demi-équations en précisant le milieu (Fehling et Tollens s'utilisent en milieu basique) :
 - Oxydation : $\text{R-CHO} + 3 \text{OH}^- \longrightarrow \text{R-COO}^- + 2 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{e}^-$
 - Fehling : $2 \text{Cu}^{2+} + 2 \text{OH}^- + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$
 - Tollens : $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$
4. Combiner en égalisant les électrons échangés, puis simplifier les espèces communes.
5. Vérifier la conservation des atomes et des charges.

Réflexe : le bilan global d'un test de Fehling fait apparaître le précipité Cu_2O ; celui de Tollens fait apparaître Ag solide (le miroir).

EXERCICE RÉSOLU 15**Équation du test de la liqueur de Fehling sur l'éthanal**

L'éthanal $\text{CH}_3 - \text{CHO}$ donne un test positif à la liqueur de Fehling chauffée : on observe un précipité rouge brique d'oxyde de cuivre(I) Cu_2O . En milieu basique, l'éthanal est oxydé en ion éthanoate $\text{CH}_3 - \text{COO}^-$.

1. Écrire les deux demi-équations électroniques.
2. En déduire l'équation-bilan de la réaction.

On donne les couples : $\text{CH}_3 - \text{COO}^- / \text{CH}_3 - \text{CHO}$ et $\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}_2\text{O}$.


SOLUTION

1. Demi-équations (milieu basique, on équilibre avec OH^- et H_2O) :


Oxydation de l'aldéhyde :




Réduction des ions cuivre(II) :



2. Équation-bilan : les deux demi-équations échangent chacune 2 électrons ; on les additionne membre à membre :



En simplifiant (5 OH^- à gauche, 3 H_2O à droite) :



Vérification : charges à gauche $2 \times (+2) + 5 \times (-1) = -1$; à droite -1 . Atomes : C : 2/2; H : 9/9; O : 6/6; Cu : 2/2. L'équation est équilibrée.

Conclusion : le précipité rouge brique de Cu_2O observé est la signature de la réduction des ions Cu^{2+} par l'éthanal, oxydé en ion éthanoate.

ATTENTION**Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire**

1. Oublier l'indice de position dans le nom d'une cétone (écrire « butanone » est toléré, mais « pentanone » sans indice est fautif : pentan-2-one ou pentan-3-one ?). Pour un alcool, l'indice est obligatoire dès qu'il y a ambiguïté : propan-1-ol $\neq$ propan-2-ol.
2. Mal compter les voisins du carbone fonctionnel : la classe d'un alcool se détermine en comptant les carbones liés au carbone porteur du $-\text{OH}$, pas les hydrogènes ni la longueur totale de la chaîne.
3. Croire que la 2,4-DNPH distingue aldéhyde et cétone : elle donne un précipité jaune-orangé avec les deux. Seuls Schiff, Fehling et Tollens sont discriminants (positifs pour l'aldéhyde seul).
4. Écrire des couleurs vagues : « le test est positif » ne suffit pas. Il faut préciser : précipité rouge brique (Fehling), coloration rose-violette (Schiff), miroir d'argent (Tollens), précipité jaune-orangé (DNPH).
5. Déséquilibrer les équations de test : oublier les OH^- du milieu basique, ou ne pas vérifier la conservation des charges. Pense aussi à simplifier les H_2O et OH^- présents des deux côtés avant de conclure.

14 EXERCICES

15 LEÇON 03 : LES COMPOSÉS OXYGÉNÉS : ALCOOLS, ALDÉHYDES, CÉTONES

15.1 1. Généralités sur les composés oxygénés

Les **composés oxygénés** sont des composés organiques dont la molécule contient au moins un atome d'oxygène lié à la chaîne carbonée. Ils sont omniprésents dans la vie quotidienne au Cameroun : l'**éthanol** dans le vin de palme, le bili-bili ou les boissons brassées ; l'**éthanal** dans les arômes de fruits mûrs ; l'**acide acétique** dans le vinaigre de palme ; le **glycérol** dans les savons artisanaux.

DÉFINITION Composé oxygéné

Un composé oxygéné est un dérivé d'hydrocarbure obtenu par substitution d'un ou plusieurs atomes d'hydrogène par un ou plusieurs groupes fonctionnels contenant de l'oxygène.

Les familles étudiées dans cette leçon se distinguent par leur **groupe fonctionnel** (GF) :

- **Alcools** : groupe **hydroxyle** -OH lié à un carbone sp^3 (saturé).
- **Aldéhydes** : groupe **carbonyle** C=O porté par un carbone terminal (lié à au moins un H).
- **Cétones** : groupe **carbonyle** C=O porté par un carbone interne (lié à deux atomes de carbone).

À RETENIR Groupes fonctionnels et formules générales

Famille	Groupe fonctionnel	Formule générale (saturé, acyclique)	Exemple courant
Alcool	-OH (hydroxyle)	$C_n H_{2n+2} O \quad (n \geq 1)$	Éthanol CH_3CH_2OH (vin de palme)
Aldéhyde	-CHO (formyle)	$C_n H_{2n} O \quad (n \geq 1)$	Éthanal CH_3CHO (arôme banane)
Cétone	-CO- (oxo)	$C_n H_{2n} O \quad (n \geq 3)$	Propanone CH_3COCH_3 (solvant)

15.2 2. Les alcools : formules, nomenclature et classes

Formules. La formule brute générale des alcools saturés acycliques est $C_n H_{2n+2} O$ ($n \in \mathbb{N}^*$). La formule semi-développée montre le groupe -OH sur la chaîne.

Nomenclature (IUPAC).

MÉTHODE Nommer un alcool


1. Identifier la chaîne principale : la plus longue chaîne carbonée portant le groupe -OH.
2. Numéroté la chaîne en donnant le plus petit locant au carbone portant le -OH (le carbone fonctionnel).
3. Nommer les substituants (alkyles, halogènes...) avec leurs locants.
4. Écrire le nom : locant-ol (ex. butan-2-ol) ou locant-ol-... si substitué. Le suffixe est -ol.

Classes d'alcools (Isomérisie de fonction et de chaîne). La classe dépend du nombre d'atomes de carbone directement liés au carbone fonctionnel (celui qui porte le -OH).

PROPRIÉTÉ Classification des alcools

- Alcool primaire (1°) : Le carbone fonctionnel est lié à un seul atome de carbone (et deux H). $R - CH_2 - OH$

- Alcool secondaire (2°) : Le carbone fonctionnel est lié à deux atomes de carbone (et un H). $R - CH(OH) - R'$
- Alcool tertiaire (3°) : Le carbone fonctionnel est lié à trois atomes de carbone (pas de H). $R - C(OH)(R') - R''$

EXEMPLE Exemples des trois classes (formule brute $C_4H_{10}O$)

Éthers-oxydes. Ils possèdent le groupe **éther** $R - O - R'$ (oxygène lié à deux carbones). Nomenclature : alcoxyalcane (ex. méthoxypropane pour $CH_3 - O - CH_2CH_2CH_3$) ou éther X-lique et Y-lique.


15.3 3. Propriétés physiques des alcools et polyalcools

Liaisons hydrogène. Le groupe $-OH$ est très polarisé (δ^- sur O, δ^+ sur H). Les molécules d'alcool s'associent par **liaisons hydrogène** intermoléculaires ($O-H \cdots O$).

PROPRIÉTÉ Conséquences macroscopiques

- Températures d'ébullition (θ_{eb}) élevées par rapport aux alcanes de masse molaire comparable (ex. éthanol 78 °C vs propane -42 °C).
- Solubilité dans l'eau : Miscibilité totale pour les alcools à chaîne courte ($n \leq 3$) car ils forment des liaisons H avec l'eau. La solubilité diminue quand la chaîne carbonée hydrophobe s'allonge ($n \geq 4$).
- Effet de ramification : À formule brute égale, un alcool ramifié a une θ_{eb} plus basse (surface de contact réduite, forces de Van der Waals plus faibles) et une meilleure solubilité (encombrement stérique moindre pour l'hydratation).

EXPÉRIENCE Comparaison θ_{eb} : éthanol, butan-1-ol, 2-méthylpropan-2-ol, propane



Températures d'ébullition : le propane (gaz) n'a pas de liaison H ; l'éthanol (petite chaîne) bout plus bas que le butan-1-ol (chaîne longue) ; le tert-butanol (ramifié) bout plus bas que le butan-1-ol (linéaire).

Polyalcools. Molécules portant plusieurs groupes -OH.

- **Glycol (éthane-1,2-diol)** $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$: antigel, synthèse polymères.
- **Glycérol (propane-1,2,3-triol)** $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{OH}$: **visqueux**, hygroscopique, miscible à l'eau. Produit lors de la **saponification** des huiles (huile de palme + soude → savon + glycérol) dans les savonneries artisanales.

LESAVAIS-TU ? Le glycérol au Cameroun

Dans les savonneries artisanales (ex. savon de Marseille local, savon noir), l'hydrolyse basique de l'huile de palme (triglycérides) libère du glycérol. Ce dernier adoucit la peau et est récupéré dans l'industrie cosmétique. Le glycol, lui, est toxique par ingestion (danger pour les freins automobiles).

15.4 4. Aldéhydes et cétones : formules et nomenclature

Le groupe **carbonyle** $\text{C}=\text{O}$ est plan, polarisé (δ^+ sur C, δ^- sur O), site de réactivité majeur (addition nucléophile).

DÉFINITION Aldéhyde et Cétone

- **Aldéhyde** : $\text{R}-\text{CHO}$ (R = H ou alkyl). Le carbone carbonyle est terminal. Suffixe -al. Nomenclature : chaîne la plus longue contenant le CHO, numérotée depuis le carbonyle (locant 1 omis).
- **Cétone** : $\text{R}-\text{CO}-\text{R}'$ (R, R' = alkyl). Le carbone carbonyle est interne. Suffixe -one. No-

menclature : chaîne la plus longue contenant le C = O, numérotée pour donner le plus petit locant au carbonyle.

EXEMPLE Nomenclature

- CH_3CHO : Éthanal (ancien : acétaldéhyde).
- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$: Propanal.
- CH_3COCH_3 : Propan-2-one (ancien : acétone).
- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_2\text{CH}_3$: Pentan-3-one.

Isomérisie. Aldéhydes et cétones sont **isomères de fonction** (même formule brute $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}$, groupes fonctionnels différents). Exemple : Propanal ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$) et Propanone ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$).

15.5 5. Tests d'identification des aldéhydes et cétones

Ces tests exploitent la **réductibilité** du groupe carbonyle des aldéhydes (présence d'un H sur le C=O) vs l'absence de réductibilité facile pour les cétones.

EXPÉRIENCE Test à la 2,4-DNPH (2,4-dinitrophénylhydrazine)

Dispositif : Quelques gouttes de composé carbonyle + solution de 2,4-DNPH dans l'éthanol acide. Observation : Précipité cristallisé jaune-orangé (2,4-dinitrophénylhydrazone) pour aldéhydes ET cétones. Équation : $\text{R}_2\text{C}=\text{O} + \text{H}_2\text{N}-\text{NH}-\text{C}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)_2 \longrightarrow \text{R}_2\text{C}=\text{N}-\text{NH}-\text{C}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)_2 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ Utilité : Test de caractérisation (point de fusion du dérivé) mais PAS de distinction aldéhyde/cétone.




EXPÉRIENCE Test de Schiff (fuchsine décolorée par SO_2)

Dispositif : Réactif incolore + composé carbonyle (à froid). Observation : Coloration rose-violet (magenta) immédiate pour les aldéhydes. Négatif (reste incolore) pour les cétones. Mécanisme : Addition du SO_2 sur le carbonyle, puis restauration du chromophore fuchsine par l'aldéhyde. Attention : Réversible à chaud ou par excès d'acide fort.

EXPÉRIENCE Test de Fehling (cuivre(II) complexé par tartrate, milieu basique)

Dispositif : Mélange Fehling A (CuSO_4) + Fehling B (tartrate + NaOH) + aldéhyde $\rightarrow$ chauff-

fage. Observation : Précipité rouge brique d'oxyde de cuivre(I) Cu_2O pour les aldéhydes. Négatif (solution bleue inchangée) pour les cétones. Demi-équations :



EXPÉRIENCE Test de Tollens (argent(I) complexé par ammoniacque, $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$)

Dispositif : Solution de Tollens fraîche + aldéhyde $\rightarrow$ chauffage doux (bain-marie). Observation : Miroir d'argent (dépôt d'Ag métallique brillant) ou précipité noir pour les aldéhydes. Négatif pour les cétones. Bilan : $\text{R-CHO} + 2 [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ + 3 \text{OH}^- \longrightarrow \text{R-COO}^- + 2 \text{Ag} \downarrow + 4 \text{NH}_3 + 2 \text{H}_2\text{O}$

À RETENIR Tableau récapitulatif des tests d'identification

Réactif	Aldéhyde	Cétone
2,4-DNPH	+ Précipité jaune-orangé	+ Précipité jaune-orangé
Schiff	+ Rose-violet	- Incolore
Fehling	+ Précipité rouge brique (Cu_2O)	- Bleu inchangé
Tollens	+ Miroir d'argent (Ag)	- Inchangé

15.6 6. Synthèse et applications au quotidien

Préparation des aldéhydes et cétones : Oxydation des alcools.

MÉTHODE Oxydation ménagée (arrêt à l'aldéhyde/cétone)

- Mélanger l'alcool et l'oxydant ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}^+$ ou KMnO_4/H^+) dans un ballon à reflux.
- Alcool primaire $\xrightarrow{\text{distillation immédiate}}$ Aldéhyde (évite la sur-oxydation en acide).

3. Alcool secondaire $\xrightarrow{\text{reflux}}$ Cétone.
4. Alcool tertiaire : Pas de réaction (pas de H sur le C fonctionnel).

ATTENTION Sur-oxydation

Si l'aldéhyde n'est pas distillé au fur et à mesure, il s'oxyde en acide carboxylique : $\text{R-CHO} \xrightarrow{\text{Ox}} \text{R-COOH}$. C'est pour cela que le vin tourné (éthanol $\rightarrow$ acide acétique) devient du vinaigre.

Distillation et bili-bili. La fabrication traditionnelle du bili-bili (bière de mil/maïs) ou du vin de palme suivi de distillation artisanale (arak, odontol) repose sur la différence de $\theta_{\text{éb}}$: éthanol (78 °C) vs eau (100 °C). **Attention** : Les premières fractions (têtes) contiennent du **méthanol** (65 °C), **très toxique** (cécité, décès).

LESAVAIS-TU ? CIMENCAM et SONARA

À la SONARA (Limbe), le craquage et le reformage produisent des composés oxygénés (éthanol, éthers-oxydes comme MTBE/ETBE) ajoutés aux essences comme oxygénants (améliorent l'indice d'octane, réduisent CO/NO_x). CIMENCAM utilise des alcools (glycol) dans les adjuvants de ciment.

15.7 Je vérifie mes connaissances**EXERCICE 9** QCM : les groupes fonctionnels

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre correspondante et la phrase complète.

1. Le groupe fonctionnel des alcools est :
 - (a) -CHO
 - (b) -OH
 - (c) -CO-
 - (d) -COOH
2. Un alcool est dit secondaire lorsque le carbone fonctionnel est lié à :
 - (a) un seul atome de carbone
 - (b) deux atomes de carbone

- (c) trois atomes de carbone
 - (d) aucun atome de carbone
3. La formule brute générale d'un alcool saturé non cyclique est :
- (a) $C_n H_{2n} O$
 - (b) $C_n H_{2n+2} O$
 - (c) $C_n H_{2n-2} O$
 - (d) $C_n H_{2n+1} OH$ avec $n = 0$ possible
4. Le réactif qui donne un précipité jaune-orangé avec les aldéhydes et les cétones est :
- (a) la liqueur de Fehling
 - (b) le réactif de Schiff
 - (c) la 2,4-DNPH
 - (d) le réactif de Tollens
5. Le miroir d'argent est un test caractéristique :
- (a) des cétones
 - (b) des alcools
 - (c) des aldéhydes
 - (d) des éthers-oxydes

EXERCICE 10 Vrai ou faux, en justifiant

Réponds par VRAI ou FAUX, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Le propan-2-ol est un alcool primaire.
2. Les aldéhydes et les cétones possèdent tous deux le groupe carbonyle $C=O$.
3. La liqueur de Fehling permet de distinguer un aldéhyde d'une cétone.
4. Le glycérol (propane-1,2,3-triol) est un polyalcool possédant trois groupes hydroxyle.
5. La 2,4-DNPH permet de distinguer le propanal de la propanone.
6. L'éthanol est miscible à l'eau en toutes proportions grâce aux liaisons hydrogène.

EXERCICE 11 Texte à trous

Recopie et complète le texte suivant avec les mots ou expressions de la liste : carbonyle ; hydroxyle ; primaire ; tertiaire ; rouge brique ; Schiff ; oxydation ménagée ; hydrogène. Les composés oxygénés renferment l'élément oxygène dans leur molécule. Les alcools possèdent le groupe-OH, tandis que les aldéhydes et les cétones possèdent le groupeC=O. Dans un alcool, le carbone fonctionnel n'est lié qu'à un seul atome de carbone ; dans un alcool, il est lié à trois atomes de carbone. La solubilité des petits alcools dans l'eau s'explique par l'existence de liaisonsentre leurs molécules et celles de l'eau. Lors du test à la liqueur de Fehling, un aldéhyde donne un précipitéd'oxyde de cuivre(I) Cu_2O . Le réactif de, incolore, devient rose-violet en présence d'un aldéhyde. Les aldéhydes s'obtiennent pardes alcools primaires.





EXERCICE 12 Définitions



Définis en une phrase claire et précise chacun des termes suivants :

1. composé oxygéné ;
2. alcool secondaire ;
3. aldéhyde ;
4. test d'identification ;
5. polyalcool.

15.8 Je m'entraîne**EXERCICE 13** Nomenclature dans les deux sens

Partie A. Donne le nom de chacun des composés suivants :






Partie B. Écris la formule semi-développée de chacun des composés suivants :

1. le 3-méthylbutan-2-ol ;
2. le méthanal ;
3. la pentan-3-one ;
4. l'éther méthylique et propylique (méthoxypropane).

EXERCICE 14 Classes des alcools

On considère les quatre alcools suivants :



1. Indique, pour chaque alcool, sa classe (primaire, secondaire ou tertiaire) en justifiant.
2. Nomme chacun de ces alcools.
3. Quels sont, parmi ces composés, les isomères de constitution ? Précise leur formule brute.

EXERCICE 15 Températures d'ébullition

On donne les températures d'ébullition (sous pression normale) de quatre composés, dans le désordre : 78 °C, 118 °C, -42 °C, 83 °C.

1. Attribue à chacun des composés suivants sa température d'ébullition : propane C_3H_8 , éthanol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, butan-1-ol $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$, 2-méthylpropan-2-ol $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$.
2. Justifie tes choix en faisant intervenir les liaisons hydrogène, la longueur de la chaîne carbonée et la ramification.
3. Lequel de ces composés est le plus soluble dans l'eau ? Justifie.

EXERCICE 16 Tableau des tests

Recopie et complète le tableau suivant en indiquant, pour chaque test, s'il est positif (+) ou négatif (-), et l'observation correspondante en cas de test positif.

Réactif	Propanal	Butanone	Éthanol
2,4-DNPH			
Réactif de Schiff			
Liquueur de Fehling			
Réactif de Tollens			

Deux flacons non étiquetés contiennent deux liquides inconnus X et Y. Le liquide X donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH mais ne réagit ni avec la liqueur de Fehling ni avec le réactif de Tollens. Le liquide Y donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH et un dépôt d'argent avec le réactif de Tollens. Détermine la famille chimique de X et celle de Y.

15.9 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 17** Le composé $C_4H_{10}O$: isomères et identification

Un laboratoire de lycée à Douala possède un flacon étiqueté simplement « $C_4H_{10}O$ ».

Données : masses molaires atomiques : $M(C) = 12 \text{ g mol}^{-1}$; $M(H) = 1 \text{ g mol}^{-1}$; $M(O) = 16 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Calcule la masse molaire moléculaire du composé.
2. Écris les formules semi-développées de tous les isomères de formule brute $C_4H_{10}O$ appartenant à la famille des alcools. Nomme-les et précise la classe de chacun.
3. Écris les formules semi-développées de tous les isomères éthers-oxydes de formule $C_4H_{10}O$ et nomme-les.
4. Une oxydation ménagée du contenu du flacon par une solution acidifiée de dichromate de potassium fournit un composé B qui donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH et un précipité rouge brique avec la liqueur de Fehling.
 - (a) Quelle est la famille du composé B ? Justifie.
 - (b) En déduire la classe de l'alcool contenu dans le flacon, puis identifier les alcools possibles.
 - (c) Écris la formule semi-développée et le nom de B sachant que sa chaîne carbonée est linéaire.
5. Le réactif de Schiff, rosé par B, redevient-il incolore si l'on ajoute un excès d'acide sulfurique concentré ? Que peut-on en conclure sur la nature de B ?

EXERCICE 18 Identification d'un composé C_3H_6O et tests de Fehling

Au cours d'une séance de travaux pratiques au Lycée de Nkongsamba, un professeur remet aux élèves un échantillon d'un composé organique B de formule brute C_3H_6O . Les élèves réalisent trois tests :

- test 1 : B donne avec la 2,4-DNPH un précipité jaune-orangé ;
- test 2 : B chauffé avec la liqueur de Fehling donne un précipité rouge brique ;
- test 3 : B avec le réactif de Tollens donne un miroir d'argent.

Données : $M(C) = 12 \text{ g mol}^{-1}$; $M(H) = 1 \text{ g mol}^{-1}$; $M(O) = 16 \text{ g mol}^{-1}$; $M(Cu) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Écris les formules semi-développées de tous les composés de formule brute C_3H_6O possédant un groupe carbonyle. Nomme-les.
2. Interprète le résultat du test 1. Que peut-on en déduire ?
3. Interprète les tests 2 et 3. Identifie alors sans ambiguïté le composé B : donne sa formule semi-développée et son nom.
4. Écris l'équation-bilan de la réaction de B avec la liqueur de Fehling, sachant que l'ion cuivre(II) complexé Cu^{2+} est réduit en oxyde de cuivre(I) Cu_2O et que B est oxydé en ion carboxylate $C_2H_5COO^-$ en milieu basique.
5. Sachant que l'on a utilisé $n = 0,010 \text{ mol}$ de B, calcule la quantité de matière puis la masse du précipité de Cu_2O obtenu, la réaction étant totale.
6. Propose une expérience simple permettant de préparer B à partir de l'alcool correspondant. Précise le nom et la classe de cet alcool.

EXERCICE 19 Alcool frelaté : le danger du méthanol

Suite à plusieurs cas d'intoxication liés à la consommation d'alcool artisanal frelaté dans une localité de la région de l'Ouest, un laboratoire d'analyses reçoit un échantillon de boisson suspectée de contenir du méthanol CH_3OH mélangé à l'éthanol C_2H_5OH .

Données : températures d'ébullition : méthanol $\theta_{eb} = 65^\circ C$; éthanol $\theta_{eb} = 78^\circ C$. Masses molaires : $M(CH_3OH) = 32 \text{ g mol}^{-1}$; $M(C_2H_5OH) = 46 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Écris les formules semi-développées du méthanol et de l'éthanol. À quelle classe d'alcool appartiennent-ils ?
2. On réalise l'oxydation ménagée de chacun de ces deux alcools par une solution acidifiée de permanganate de potassium.
 - (a) Nomme les produits d'oxydation obtenus respectivement à partir du méthanol et de l'éthanol (produits de la première étape d'oxydation).
 - (b) Explique pourquoi le méthanol et l'éthanol, tous deux alcools primaires, donnent les mêmes résultats aux tests d'oxydation (2,4-DNPH, Schiff, Fehling) : ces tests

permettent-ils de distinguer les deux alcools ?

3. Les produits d'oxydation obtenus sont le méthanal et l'éthanal. Propose une démarche expérimentale, fondée sur une propriété physique ou sur une réaction ultérieure d'oxydation, permettant de distinguer ces deux produits d'oxydation.
4. En exploitant les températures d'ébullition données, nomme la technique de séparation qui permettrait de mettre en évidence la présence de méthanol dans la boisson. Décris brièvement le principe de cette technique et précise quel liquide s'évapore en premier.
5. Le méthanol est toxique : son oxydation dans l'organisme produit des composés qui attaquent le nerf optique. Rédige un court message de sensibilisation (5 lignes maximum) à l'attention des consommateurs, expliquant le danger des alcools frelatés.

16 CORRIGÉS DES EXERCICES**CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les groupes fonctionnels**

1. b) Le groupe fonctionnel des alcools est le groupe **hydroxyle** $-OH$, porté par un carbone **tétragonal** (hybridation sp^3).
2. b) Un alcool est **secondaire** lorsque le carbone fonctionnel (celui qui porte le $-OH$) est lié à deux atomes de carbone (et à un seul atome d'hydrogène). Sa formule générale est $R - CH(OH) - R'$.
3. b) La formule brute générale d'un alcool saturé non cyclique est $C_nH_{2n+2}O$ avec $n \geq 1$ (l'alcool le plus simple est le méthanol CH_4O , donc $n = 0$ est impossible).
4. c) La **2,4-DNPH** donne un précipité jaune-orangé avec tous les composés carbonyles : aldéhydes et cétones. C'est un test de la **famille carbonyle**, pas un test de distinction.
5. c) Le **miroir d'argent** (réactif de Tollens) est caractéristique des aldéhydes, seuls réducteurs parmi les composés étudiés dans cette leçon.

Point de vigilance : ne pas confondre « test de caractérisation du carbonyle » (2,4-DNPH) et « tests de distinction aldéhyde/cétone » (Schiff, Fehling, Tollens).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. FAUX. Dans le propan-2-ol $CH_3 - \overset{OH}{\underset{|}{CH}} - CH_3$, le carbone fonctionnel est lié à deux atomes de carbone : c'est un alcool secondaire.
2. VRAI. Les aldéhydes ($R - CHO$) et les cétones ($R - CO - R'$) possèdent tous deux le groupe **carbonyle** $C=O$; ils diffèrent par la position de ce groupe (terminal pour l'aldéhyde, interne pour la cétone).
3. VRAI. Un aldéhyde, **réducteur**, réduit les ions Cu^{2+} de la liqueur de Fehling en précipité rouge brique d'oxyde de cuivre(I) Cu_2O ; une cétone ne réagit pas (la solution reste bleue).
4. VRAI. Le glycérol $HO - CH_2 - CH(OH) - CH_2 - OH$ porte trois groupes hydroxyle : c'est un **trialcool**, donc un **polyalcool**.
5. FAUX. Le propanal (aldéhyde) et la propanone (cétone) donnent tous deux un précipité jaune-orangé avec la 2,4-DNPH : ce test ne les distingue pas. Il faut utiliser Schiff, Fehling ou Tollens.

6. VRAI. L'éthanol forme des **liaisons hydrogène** avec les molécules d'eau grâce à son groupe -OH ; sa chaîne carbonée étant courte ($n = 2$), il est **miscible** à l'eau en toutes proportions.

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

Les **composés oxygénés** renferment l'élément oxygène dans leur molécule. Les alcools possèdent le groupe **hydroxyle** -OH, tandis que les aldéhydes et les cétones possèdent le groupe **carbonyle** C=O. Dans un alcool **primaire**, le carbone fonctionnel n'est lié qu'à un seul atome de carbone ; dans un alcool **tertiaire**, il est lié à trois atomes de carbone. La **solubilité** des petits alcools dans l'eau s'explique par l'existence de liaisons **hydrogène** entre leurs molécules et celles de l'eau. Lors du test à la liqueur de Fehling, un aldéhyde donne un précipité rouge brique d'oxyde de cuivre(I) Cu_2O . Le réactif de **Schiff**, incolore, devient rose-violet en présence d'un aldéhyde. Les aldéhydes s'obtiennent par **oxydation ménagée** des alcools primaires.

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions






1. **Composé oxygéné** : composé organique dont la molécule contient au moins un atome d'oxygène lié à la chaîne carbonée (dérivé d'hydrocarbure portant un groupe fonctionnel oxygéné).
2. **Alcool secondaire** : alcool dont le carbone fonctionnel (porteur du groupe -OH) est lié à deux atomes de carbone et à un atome d'hydrogène : $R - \text{CH}(\text{OH}) - R'$.
3. **Aldéhyde** : composé oxygéné possédant un groupe carbonyle C=O porté par un carbone terminal de la chaîne, lié à au moins un atome d'hydrogène : $R - \text{CHO}$.
4. **Test d'identification** : expérience simple dont le résultat observable (coloration, précipité, dépôt) permet de reconnaître de manière caractéristique une famille ou une espèce chimique.
5. **Polyalcool** : molécule organique possédant plusieurs groupes hydroxyle -OH portés par des atomes de carbone différents (ex. glycol, glycérol).

CORRIGÉ Exercice 5 — Nomenclature dans les deux sens





Partie A.

1. $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH}_3$: chaîne de 4 C, -OH en position 2 $\Rightarrow$ butan-2-ol (alcool secon-

daire).



Partie B.



Point de vigilance : pour une cétone, numéroter la chaîne de façon à donner le plus petit locant au carbonyle ; pour un aldéhyde, le carbone du -CHO porte toujours le numéro 1 (locant omis).

CORRIGÉ

Exercice 6 — Classes des alcools

1. Classes.

- A : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$: le C fonctionnel est lié à un atome de carbone $\Rightarrow$ alcool **primaire**.
- B : $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: le C fonctionnel est lié à deux atomes de carbone $\Rightarrow$

alcool **secondaire**.

- C : $\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_3)(\text{OH}) - \text{CH}_3$: le C fonctionnel est lié à trois atomes de carbone $\Rightarrow$ alcool **tertiaire**.
- D : $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{OH}$: le C fonctionnel (celui du $\text{CH}_2 - \text{OH}$) est lié à un atome de carbone $\Rightarrow$ alcool **primaire**.

2. Noms. A : butan-1-ol ; B : butan-2-ol ; C : 2-méthylpropan-2-ol ; D : 2-méthylpropan-1-ol.

3. Isomérisie. Les quatre composés ont la même formule brute $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$: ce sont des **isomères de constitution** (isomérisie de position pour A et B ; isomérisie de chaîne pour A, B et C, D).

CORRIGÉ Exercice 7 — Températures d'ébullition et solubilité

1. Attribution.

Composé	Justification	$\theta_{\text{éb}}$
Propane C_3H_8	pas de liaison H (alcane)	-42°C
Éthanol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	liaison H, chaîne courte ($n = 2$)	78°C
2-méthylpropan-2-ol $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$	liaison H, chaîne de 4 C ramifiée	83°C
Butan-1-ol $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$	liaison H, chaîne de 4 C linéaire	118°C

2. Justification. Le propane ne forme pas de liaisons hydrogène : ses molécules ne sont retenues que par de faibles forces de Van der Waals, d'où une $\theta_{\text{éb}}$ très basse. Les alcools s'associent par liaisons hydrogène, ce qui élève fortement $\theta_{\text{éb}}$. À fonction identique, plus la chaîne carbonée est longue, plus $\theta_{\text{éb}}$ est élevée (butan-1-ol > éthanol). À formule brute égale ($\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$), l'isomère ramifié (2-méthylpropan-2-ol) présente une surface de contact moindre entre molécules : ses forces intermoléculaires sont plus faibles et il bout plus bas ($83^\circ\text{C} < 118^\circ\text{C}$).

3. Solubilité. L'éthanol est le plus soluble dans l'eau (miscible en toutes proportions) : sa chaîne hydrophobe est la plus courte et son groupe $-\text{OH}$ forme des liaisons hydrogène avec l'eau.

CORRIGÉ Exercice 8 — Tableau des tests d'identification

Réactif	Propanal (aldéhyde)	Butanone (cétone)	Éthanol (alcool)
2,4-DNPH	+ précipité jaune-orangé	+ précipité jaune-orangé	-
Schiff	+ rose-violet	-	-
Fehling	+ précipité rouge brique Cu_2O	-	-
Tollens	+ miroir d'argent	-	-

Identification de X et Y.

- X : DNPH positive $\Rightarrow$ composé **carbonylé** ; Fehling et Tollens négatifs $\Rightarrow$ ce n'est pas un aldéhyde. Donc X est une cétone.
- Y : DNPH positive $\Rightarrow$ composé carbonylé ; Tollens positif (miroir d'argent) $\Rightarrow$ **réducteur**. Donc Y est un aldéhyde.

Point de vigilance : l'éthanol ne réagit avec aucun de ces quatre réactifs : les tests de cette leçon caractérisent le groupe carbonyle, pas le groupe hydroxyle.

CORRIGÉ Exercice 9 — Le composé $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$: isomères et identification

Barème indicatif (sur 10) : 1. (1 pt) ; 2. (3 pts) ; 3. (1,5 pt) ; 4. (3 pts) ; 5. (1,5 pt).

1. Masse molaire.

$$M(\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}) = 4 \times 12 + 10 \times 1 + 16 = 48 + 10 + 16 = \boxed{74 \text{ g mol}^{-1}}$$

2. Isomères alcools de $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$.

Formule semi-développée	Nom	Classe
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$	butan-1-ol	primaire
$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_3$	butan-2-ol	secondaire
$\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{OH}$	2-méthylpropan-1-ol	primaire
$\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_3)(\text{OH}) - \text{CH}_3$	2-méthylpropan-2-ol	tertiaire

3. Isomères éthers-oxydes.

- $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: méthoxypropane ;
- $\text{CH}_3 - \text{O} - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_3$: 2-méthoxypropane ;
- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: éthoxyéthane.

4. Identification.

1. B donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH : B est un composé carbonylé. De plus, B donne un précipité rouge brique avec la liqueur de Fehling : B est réducteur. Conclusion : B est un aldéhyde.

2. Seul un alcool primaire conduit par oxydation ménagée à un aldéhyde (un alcool secondaire donnerait une cétone, négative au test de Fehling; un alcool tertiaire ne s'oxyde pas). L'alcool du flacon est donc le butan-1-ol ou le 2-méthylpropan-1-ol.

3. B a une chaîne carbonée linéaire : B est le butanal : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \overset{\text{O}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}} = \text{O}$. L'alcool du flacon est donc le butan-1-ol.

5. Réactif de Schiff. Oui : la coloration rose du réactif de Schiff est réversible; un excès d'acide sulfurique concentré (ou un chauffage) la fait disparaître. Cela confirme que B est bien un aldéhyde (seuls les aldéhydes donnent ce test réversible).

Points de vigilance : ne pas oublier l'isomère 2-méthylpropan-1-ol (primaire malgré la ramification); rappeler que la 2,4-DNPH seule ne suffit pas à conclure.

CORRIGÉ Exercice 10 — Identification d'un composé $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ et tests de Fehling


Barème indicatif (sur 10) : 1. (1,5 pt); 2. (1 pt); 3. (1,5 pt); 4. (2 pts); 5. (2,5 pts); 6. (1,5 pt).

1. Composés carbonylés de formule $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$.



- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CHO}$: propanal (aldéhyde);
- $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_3$: propanone (cétone).

2. Test 1. Le précipité jaune-orangé avec la 2,4-DNPH prouve que B possède un groupe carbonyle : B est un aldéhyde ou une cétone. Ce test seul ne permet pas de trancher.


3. Tests 2 et 3. Le précipité rouge brique avec Fehling et le miroir d'argent avec Tollens montrent que B est réducteur : B est un aldéhyde. Conclusion : B est le propanal,



4. Équation-bilan avec la liqueur de Fehling.



Bilan :



5. Quantité et masse de Cu_2O . Tableau d'avancement (réaction totale, B limitant) :

État	Avancement	$n(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO})$	$n(\text{Cu}_2\text{O})$
Initial	$x = 0$	0,010 mol	0
Final	x_{max}	0	x_{max}

D'après la stœchiométrie : $n(\text{Cu}_2\text{O}) = n(\text{B}) = x_{\text{max}} = 0,010 \text{ mol}$.

$$M(\text{Cu}_2\text{O}) = 2 \times 63,5 + 16 = 143 \text{ g mol}^{-1}$$

$$m(\text{Cu}_2\text{O}) = n \times M = 0,010 \times 143 = \boxed{1,43 \text{ g}}$$

6. Préparation de B. On réalise l'oxydation ménagée du propan-1-ol $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ (alcool primaire) par une solution acidifiée de dichromate de potassium ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}^+$), en distillant le propanal au fur et à mesure de sa formation pour éviter sa sur-oxydation en acide propanoïque.

Points de vigilance : vérifier l'équilibrage des demi-équations en milieu basique (avec OH^-) ; dans le calcul, ne pas oublier le facteur 2 sur le cuivre dans $M(\text{Cu}_2\text{O})$.

CORRIGÉ Exercice 11 — Alcool frelaté : le danger du méthanol

Barème indicatif (sur 10) : 1. (1,5 pt) ; 2. (3 pts) ; 3. (1,5 pt) ; 4. (2 pts) ; 5. (2 pts).

1. Formules et classes. Méthanol : $\text{CH}_3 - \text{OH}$; éthanol : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$. Dans les deux cas, le carbone fonctionnel n'est lié qu'à un seul atome de carbone (zéro pour le méthanol, considéré par convention comme primaire) : ce sont des alcools primaires.

2. Oxydation ménagée.

1. Méthanol $\rightarrow$ méthanal HCHO (formaldéhyde) ; éthanol $\rightarrow$ éthanal CH_3CHO (acétaldéhyde).
2. Les deux alcools étant primaires, ils donnent tous deux des aldéhydes : les produits obtenus réagissent positivement à la 2,4-DNPH (précipité jaune), au réactif de Schiff (rose-violet) et à la liqueur de Fehling (précipité rouge brique). Ces tests caractérisent la famille (aldéhyde) mais pas la longueur de la chaîne : ils ne permettent pas de distinguer le méthanol de l'éthanol.

3. Distinction du méthanal et de l'éthanal. Deux démarches possibles :

- Propriété physique : mesurer la température d'ébullition : le méthanal est gazeux à température ambiante ($\theta_{\text{éb}} \approx -21^\circ\text{C}$) alors que l'éthanal bout vers 21°C ;
- Oxydation ultérieure : oxyder chaque aldéhyde en acide carboxylique : le méthanal donne l'acide méthanoïque HCOOH , qui possède encore un caractère réducteur (il réduit le réactif de Tollens), contrairement à l'acide éthanoïque CH_3COOH issu de l'éthanal.

4. Technique de séparation. On utilise la distillation fractionnée, qui sépare les liquides miscibles selon leurs températures d'ébullition. En chauffant le mélange, le liquide le plus volatil s'évapore en premier : c'est le méthanol ($65^\circ\text{C} < 78^\circ\text{C}$). En recueillant la première fraction distillée et en mesurant la température en tête de colonne (palier vers 65°C), on met en évidence la présence de méthanol.


5. Message de sensibilisation.

« Attention aux alcools artisanaux frelatés ! Ils peuvent contenir du méthanol, un poison invisible : quelques gouttes suffisent à rendre aveugle, une petite quantité peut tuer. Ni la couleur, ni le goût, ni l'odeur ne permettent de le détecter. Ne consommez jamais d'alcool de source inconnue et signalez les cas

suspects aux autorités sanitaires. Votre vie et votre vue n'ont pas de prix. »

Points de vigilance : le méthanol, bien que primaire, ne possède qu'un seul carbone ; les tests d'oxydation identifient une fonction, jamais une molécule précise : il faut toujours croiser avec une propriété physique ou une analyse complémentaire.

17 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les cinq idées-force à retenir sur les composés oxygénés.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

[L'essentiel de la leçon] Définitions clés

- **Composé oxygéné** : composé organique dont la molécule contient au moins un atome d'oxygène.
- **Alcool** : groupe **hydroxyle** $-OH$ porté par un carbone tétraédrique (hybridé sp^3) ; formule générale $R-OH$, brute $C_nH_{2n+2}O$.
- **Aldéhyde** : groupe **carbonyle** $C=O$ en extrémité de chaîne : $R-CHO$, brute $C_nH_{2n}O$.
- **Cétone** : groupe carbonyle à l'intérieur de la chaîne : $R-CO-R'$, brute $C_nH_{2n}O$.

- Aldéhydes et cétones de même formule brute sont des **isomères de fonction**.

Classes d'alcools (selon le nombre de groupes alkyle liés au carbone fonctionnel)

Classe	Carbone fonctionnel lié à...	Exemple
Primaire (I)	1 groupe alkyle (ou 0)	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{OH}$ éthanol
Secondaire (II)	2 groupes alkyles	$\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_3$ propan-2-ol
Tertiaire (III)	3 groupes alkyles	$(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{OH}$ 2-méthylpropan-2-ol

Nomenclature express

- Alcool : chaîne la plus longue contenant $-\text{OH}$, indice le plus petit, suffixe $-\text{ol}$: $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH} = \text{propan-1-ol}$.
- Aldéhyde : suffixe $-\text{al}$, le carbone du $-\text{CHO}$ est toujours C1 : $\text{CH}_3 - \text{CHO} = \text{éthanal}$.
- Cétone : suffixe $-\text{one}$ avec indice de position : $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{CH}_3 = \text{propanone}$.

Propriétés physiques

- Les liaisons hydrogène entre molécules d'alcool $\Rightarrow \theta_{\text{éb}}$ des alcools supérieure à celle des alcanes de masse voisine.
- Solubilité dans l'eau : grande pour $n \leq 4$ carbones, puis décroît quand la chaîne carbonée s'allonge.
- **Polyalcools** : glycol $\text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$ (antigel), glycérol $\text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_2 - \text{OH}$ (savonnerie, pharmacie).

Tests d'identification (à connaître par cœur)

Réactif	Aldéhyde	Cétone	Observation positive
2,4-DNPH	+	+	précipité jaune-orangé
Réactif de Schiff	+	-	coloration rose-violette
Liquideur de Fehling	+	-	précipité rouge brique Cu_2O
Réactif de Tollens	+	-	miroir d'argent

Équations-types des tests



Méthode express pour identifier un composé oxygéné

1. DNPH négative $\Rightarrow$ ce n'est ni un aldéhyde ni une cétone (penser à un alcool).
2. DNPH positive puis Schiff (ou Fehling) positive $\Rightarrow$ **aldéhyde**.
3. DNPH positive mais Schiff et Fehling négatives $\Rightarrow$ **cétone**.

À RETENIR**Checklist avant le Probatoire**

- ☐ Je sais reconnaître les groupes hydroxyle -OH et carbonyle C=O dans une formule développée.
- ☐ Je connais les formules brutes générales : $C_nH_{2n+2}O$ (alcool), $C_nH_{2n}O$ (aldéhyde et cétone).
- ☐ Je sais nommer un alcool (suffixe -ol), un aldéhyde (-al), une cétone (-one) avec les bons indices.
- ☐ Je distingue sans hésiter alcool primaire, secondaire et tertiaire à partir de la formule développée.
- ☐ Je sais expliquer l'ébullition élevée et la solubilité des alcools par les liaisons hydrogène.
- ☐ Je connais les formules du glycol et du glycérol et une application de chacun.
- ☐ Je sais que la 2,4-DNPH caractérise le groupe carbonyle (aldéhydes et cétones).
- ☐ Je sais que Schiff, Fehling et Tollens distinguent les aldéhydes (positifs) des cétones (négatifs).
- ☐ Je sais décrire les observations : précipité jaune (DNPH), rose (Schiff), rouge brique (Fehling), miroir d'argent (Tollens).
- ☐ Je sais écrire et équilibrer les équations-bilans des tests de Fehling et de Tollens.
- ☐ Je sais construire un raisonnement d'identification à partir des résultats de plusieurs tests.
- ☐ Je cite des exemples du quotidien camerounais : éthanol des boissons fermentées, glycérol des savonneries artisanales.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**