

MATHÉMATIQUES • TLE E

ORGANISATION ET GESTION DES DONNÉES

LEÇON 11

PROBABILITÉS, VARIABLES ALÉATOIRES ET LOI BINOMIALE

DURÉE CONSEILLÉE : 8 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit le langage et les outils du calcul des probabilités : événements, équiprobabilité, formule de la réunion, puis les variables aléatoires (loi, espérance, variance) et enfin le schéma de Bernoulli et la loi binomiale. Elle fournit les méthodes essentielles pour modéliser et résoudre les problèmes de hasard rencontrés au Bac et dans la vie courante.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire une expérience aléatoire par son univers et traduire une situation par des événements
- À la fin de cette leçon, je sais calculer une probabilité dans un cas d'équiprobabilité par dénombrement
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ et $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- À la fin de cette leçon, je sais construire un arbre de probabilités pour modéliser une expérience à plusieurs épreuves
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire et la présenter dans un tableau
- À la fin de cette leçon, je sais calculer l'espérance, la variance et l'écart-type d'une variable aléatoire et interpréter l'espérance

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Vocabulaire des probabilités et équi-probabilité
2. Opérations sur les événements et arbres de probabilités
3. Variables aléatoires et loi de probabilité
4. Espérance, variance et écart-type
5. Épreuve de Bernoulli et schéma de Bernoulli
6. Loi binomiale et applications
7. Probabilités conditionnelles et probabilités totales
8. Activité d'intégration
9. Méthodes et exercices résolus
10. Exercices
11. Corrigés des exercices
12. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire une expérience aléatoire par son univers et traduire une situation par des événements
- À la fin de cette leçon, je sais calculer une probabilité dans un cas d'équiprobabilité par dénombrement
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ et $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- À la fin de cette leçon, je sais construire un arbre de probabilités pour modéliser une expérience à plusieurs épreuves
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire et la présenter dans un tableau
- À la fin de cette leçon, je sais calculer l'espérance, la variance et l'écart-type d'une variable aléatoire et interpréter l'espérance
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître un schéma de Bernoulli et justifier l'utilisation de la loi binomiale
- À la fin de cette leçon, je sais calculer $P(X = k)$, $E(X)$ et $V(X)$ pour une loi binomiale $B(n; p)$
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre un problème concret (jeu, contrôle qualité, sondage) en mobilisant ces outils

PRÉREQUIS

- Dénombrement : arrangements, combinaisons, coefficient binomial $C(n,k)$ (leçon sur l'analyse combinatoire)
- Calculs sur les fractions et les puissances
- Notion d'ensemble : réunion, intersection, complémentaire
- Lecture et construction de tableaux et de diagrammes en barres
- Pourcentages et proportionnalité

1 VOCABULAIRE DES PROBABILITÉS ET ÉQUIPROBABILITÉ

Situation d'accroche. À Yaoundé, un opérateur de téléphonie mobile lance une grande tombola promotionnelle : chaque client qui recharge au moins 1000 FCFA reçoit un code unique et a, annonce la publicité, « une chance sur 100 » de gagner un smartphone. Un élève de Terminale, client fidèle, se pose deux questions très concrètes : s'il recharge 5 fois dans le mois, quelle est sa probabilité de gagner au moins une fois ? Et de son côté, l'opérateur, qui attend 100000 participants, doit budgéter les lots : combien de smartphones doit-il prévoir en moyenne ?

Ces deux questions semblent simples, mais aucune ne peut être résolue avec les seuls outils du collège. La première exige de savoir combiner des probabilités (et fera appel, dans les sections suivantes, à la loi binomiale) ; la seconde repose sur la notion d'espérance. Toute cette leçon est construite pour y répondre rigoureusement. Mais avant de calculer, il faut apprendre à parler le langage du hasard : c'est l'objet de cette première section.

Problématique. Comment modéliser mathématiquement une situation dépendant du hasard, et comment calculer la probabilité d'un événement lorsque toutes les issues ont la même chance de se réaliser ?

1.1 Expérience aléatoire et univers

Certaines expériences sont déterministes : si tu laisses tomber une pierre, elle tombe, toujours. D'autres ne le sont pas : quand on lance un dé bien équilibré, on connaît la liste des résultats possibles, mais on ne peut pas prévoir lequel va sortir. C'est cette seconde catégorie qui nous intéresse.

DÉFINITION Expérience aléatoire

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont le résultat dépend du hasard : on connaît l'ensemble des résultats possibles, mais on ne peut pas prévoir avec certitude celui qui sera obtenu.

EXEMPLE Expériences aléatoires de la vie courante

- Lancer un dé à six faces et noter le numéro obtenu.
- Tirer une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes.
- Tirer au sort un lot dans une tombola de quartier à Douala.
- Interroger un élève au hasard dans une classe de Terminale C et noter son sexe.

Chaque résultat possible d'une expérience aléatoire s'appelle une **issue** (ou éventualité). L'ensemble de toutes les issues joue un rôle central : c'est lui qui porte tous les calculs.

DÉFINITION Univers

L'**univers** d'une expérience aléatoire, noté Ω (lire « oméga »), est l'ensemble de toutes les issues possibles de cette expérience.

EXEMPLE Trois univers à connaître par cœur

- Lancer d'un dé : $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$, donc $\text{Card}(\Omega) = 6$.
- Lancer d'une pièce : $\Omega = \{\text{Pile}; \text{Face}\}$.
- Tirage d'une carte dans un jeu de 32 : $\Omega = \{32 \text{ cartes}\}$, $\text{Card}(\Omega) = 32$.

ATTENTION Bien choisir son univers

Le choix de l'univers dépend de ce qu'on observe. Si on lance deux dés et qu'on s'intéresse aux deux faces obtenues, l'univers est l'ensemble des 36 couples $(i; j)$ avec $i, j \in \{1, \dots, 6\}$, et non pas l'ensemble des sommes $\{2, 3, \dots, 11\}$. Nous verrons pourquoi ce choix est décisif : les 36 couples sont équiprobables, les 11 sommes ne le sont pas.

1.2 Événements : le vocabulaire fondamental

Un événement, c'est une question que l'on pose sur le résultat de l'expérience : « le numéro obtenu est-il pair? », « la carte tirée est-elle un cœur? ». Mathématiquement, une telle question se traduit par un sous-ensemble de Ω .

DÉFINITION Événement, événement élémentaire

Soit Ω l'univers d'une expérience aléatoire.

- Un **événement** est une partie (un sous-ensemble) de Ω .
- Un **événement élémentaire** est un événement réduit à une seule issue, c'est-à-dire un singleton $\{\omega\}$ avec $\omega \in \Omega$.
- L'événement Ω tout entier est appelé **événement certain** : il se réalise toujours.
- L'ensemble vide $\emptyset$ est appelé **événement impossible** : il ne se réalise jamais.

EXEMPLE Avec le lancer d'un dé

Soit $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

- $A = \text{« obtenir un nombre pair »} = \{2; 4; 6\}$ est un événement (non élémentaire).
- $B = \text{« obtenir 5 »} = \{5\}$ est un événement élémentaire.
- « Obtenir un nombre entre 1 et 6 » est l'événement certain Ω .
- « Obtenir 7 » est l'événement impossible $\emptyset$.

Les événements se combinent grâce aux opérations ensemblistes, que tu as étudiées en Seconde. La correspondance entre le langage courant et le langage des ensembles est essentielle :

Langage courant	Écriture ensembliste
« A ou B se réalise » (au moins l'un des deux)	$A \cup B$ (réunion)
« A et B se réalisent tous les deux »	$A \cap B$ (intersection)
« A ne se réalise pas »	$\bar{A}$ (événement contraire)

DÉFINITION Événement contraire, événements incompatibles

Soit A un événement d'un univers Ω .

- L'**événement contraire** de A , noté $\bar{A}$, est l'ensemble des issues de Ω qui n'appartiennent pas à A : $\bar{A} = \Omega \setminus A$.
- Deux événements A et B sont dits **incompatibles** (ou disjoints) s'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps, c'est-à-dire si $A \cap B = \emptyset$.

ATTENTION Contraire $\neq$ incompatible

Ne confonds pas ces deux notions ! A et $\bar{A}$ sont toujours incompatibles, mais deux événements incompatibles ne sont pas forcément contraires l'un de l'autre. Avec le dé, $A = \{1\}$ et $B = \{2\}$ sont incompatibles, pourtant $\bar{A} = \{2; 3; 4; 5; 6\} \neq B$.

La figure suivante résume visuellement toutes ces notions.




Diagramme de Venn : l'univers Ω , deux événements A et B , leur intersection $A \cap B$ (zone violette) et l'événement contraire $\bar{A}$ (tout ce qui est hors du disque A).

1.3 Probabilité d'un événement

Revenons à la tombola de Yaoundé. Dire qu'un client a « une chance sur 100 » de gagner, c'est associer à l'événement « gagner » le nombre $\frac{1}{100} = 0,01$. Cette idée — mesurer la vraisemblance d'un événement par un nombre — est le cœur de la leçon.

DÉFINITION Probabilité d'un événement

Soit $\Omega = \{\omega_1; \omega_2; \dots; \omega_n\}$ un univers fini. Définir une **probabilité** sur Ω , c'est associer à chaque issue ω_i un nombre $p_i \in [0; 1]$, appelé probabilité de l'événement élémentaire $\{\omega_i\}$, tel que

$$p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1.$$

La probabilité d'un événement A , notée $P(A)$, est alors la somme des probabilités des issues qui composent A .

PROPRIÉTÉ Conséquences immédiates

Pour tout événement A d'un univers fini Ω :

- $0 \leq P(A) \leq 1$;
- $P(\Omega) = 1$ (l'événement certain a une probabilité de 1) ;
- $P(\emptyset) = 0$ (l'événement impossible a une probabilité de 0).

EXPÉRIENCE Pourquoi la somme vaut-elle 1 ?

Lance un dé 600 fois et note la fréquence de chaque face. Tu constateras que chaque fréquence se rapproche de $\frac{1}{6}$, et que la somme des six fréquences vaut exactement 1 à chaque série de lancers, puisque chaque lancer produit une et une seule face. La probabilité est le modèle théorique de ces fréquences : la contrainte $p_1 + \dots + p_n = 1$ traduit simplement le fait qu'à chaque expérience, une issue se réalise obligatoirement.

1.4 Le cas de l'équiprobabilité

La situation la plus simple — et la plus fréquente au Baccalauréat — est celle où toutes les issues ont la même chance d'apparaître : dé non truqué, pièce équilibrée, tirage au sort honnête.

DÉFINITION Équiprobabilité

On dit qu'il y a **équiprobabilité** lorsque toutes les issues de Ω ont la même probabilité. Si $\text{Card}(\Omega) = n$, chaque événement élémentaire a alors pour probabilité $\frac{1}{n}$.

PROPRIÉTÉ Formule des cas favorables

En situation d'équiprobabilité, pour tout événement A :

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration (formatrice)

Notons $n = \text{Card}(\Omega)$. Par équiprobabilité, chaque issue a pour probabilité $\frac{1}{n}$. Par définition, $P(A)$ est la somme des probabilités des issues de A . Or A contient $\text{Card}(A)$ issues, chacune de probabilité $\frac{1}{n}$. Donc

$$P(A) = \underbrace{\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n}}_{\text{Card}(A) \text{ termes}} = \frac{\text{Card}(A)}{n} = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}. \quad \blacksquare$$

PROPRIÉTÉ Probabilité de l'événement contraire

Pour tout événement A : $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

EXPÉRIENCE Démonstration exigible

En situation d'équiprobabilité avec $\text{Card}(\Omega) = n$: comme A et $\bar{A}$ forment une partition de Ω , on a $\text{Card}(A) + \text{Card}(\bar{A}) = n$, donc $\text{Card}(\bar{A}) = n - \text{Card}(A)$. Alors

$$P(\bar{A}) = \frac{n - \text{Card}(A)}{n} = 1 - \frac{\text{Card}(A)}{n} = 1 - P(A). \quad \blacksquare$$

Cette propriété reste vraie même hors équiprobabilité : elle découle de $P(A) + P(\bar{A}) = P(\Omega) = 1$.

MÉTHODE Calculer une probabilité par équiprobabilité

1. Vérifier l'équiprobabilité : l'énoncé doit préciser « dé équilibré », « tirage au hasard », « pièce non truquée », etc. Sans cette hypothèse, la formule des cas favorables est interdite.
2. Dénombrer l'univers : calculer $\text{Card}(\Omega)$, éventuellement avec les outils de dénombrement (arrangements, combinaisons).
3. Dénombrer l'événement : calculer $\text{Card}(A)$ avec le même soin.
4. Conclure : $P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$, en simplifiant la fraction et en rédigeant une phrase de conclusion.

ATTENTION Le piège classique : les sommes de deux dés

On lance deux dés équilibrés et on s'intéresse à la somme des faces. Les sommes possibles sont 2, 3, ..., 12 : onze valeurs. Erreur fréquente : écrire $P(\text{somme} = 7) = \frac{1}{11}$. C'est faux, car les onze sommes ne sont pas équiprobables ! Il n'y a qu'une façon d'obtenir 2 (le couple (1 ; 1)), mais six façons d'obtenir 7. Les issues équiprobables sont les 36 couples $(i ; j)$, pas les sommes. Le tableau ci-dessous montre que $P(\text{somme} = 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

Dé 1 \ Dé 2	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Les 36 issues équiprobables du lancer de deux dés, représentées par la somme obtenue.

Les six cases dorées correspondent à la somme 7 : $P(\text{somme} = 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$, et non $\frac{1}{11}$.

1.5 Dénombrement et probabilités : exemples résolus

Dès que les ensembles sont grands, on ne compte plus « à la main » : on utilise les combinaisons (tirages simultanés, sans ordre) et les arrangements (tirages ordonnés). Rappel : le nombre de façons de choisir k objets parmi n sans tenir compte de l'ordre est $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

EXERCICE RÉSOLU 1 Tirage d'une carte dans un jeu de 32

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes (8 cartes dans chacune des 4 couleurs : cœur, carreau, trèfle, pique ; il y a 4 rois). On considère les événements C : « tirer un cœur » et R : « tirer un roi ». Calculer $P(C)$, $P(R)$, $P(C \cap R)$ et $P(\bar{C})$.

SOLUTION

Solution détaillée. Le tirage est fait au hasard : il y a équiprobabilité, et $\text{Card}(\Omega) = 32$.

- Il y a 8 cœurs : $P(C) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$.
- Il y a 4 rois : $P(R) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$.
- Un seul roi de cœur : $P(C \cap R) = \frac{1}{32}$.
- Événement contraire : $P(\bar{C}) = 1 - P(C) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. (Vérification directe : 24 cartes ne sont pas des cœurs, et $\frac{24}{32} = \frac{3}{4}$.)

La probabilité de tirer « un cœur ou un roi » sera calculée dans la section 2 avec la formule de la réunion : $P(C \cup R) = P(C) + P(R) - P(C \cap R) = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} - \frac{1}{32} = \frac{11}{32}$.

EXERCICE RÉSOLU 2 Tombola du lycée

Pour la fête du lycée de Ngaoundéré, on vend 200 billets de tombola numérotés de 1 à 200. On tire au sort un billet gagnant. Calculer la probabilité que le numéro gagnant soit : (a) un multiple de 10 ; (b) un numéro à deux chiffres.

SOLUTION

Solution détaillée. Tirage au sort : équiprobabilité, $\text{Card}(\Omega) = 200$.

(a) Les multiples de 10 entre 1 et 200 sont 10, 20, ..., 200 : il y en a 20. Donc $P(A) = \frac{20}{200} = \frac{1}{10}$.

(b) Les numéros à deux chiffres vont de 10 à 99 : il y en a $99 - 10 + 1 = 90$. Donc $P(B) = \frac{90}{200} = \frac{9}{20}$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Délégation de classe et combinaisons

Une classe de Terminale D compte 12 filles et 8 garçons. On choisit au hasard une délégation de 3 élèves pour représenter la classe. Quelle est la probabilité que la délégation soit composée exactement de 2 filles et 1 garçon ?

SOLUTION

Solution détaillée. Le choix est simultané et sans ordre : on utilise les combinaisons, avec équiprobabilité de tous les groupes de 3 élèves.

- Nombre de délégations possibles : $\text{Card}(\Omega) = \binom{20}{3} = \frac{20 \times 19 \times 18}{3 \times 2 \times 1} = 1140$.
- Cas favorables : choisir 2 filles parmi 12 et 1 garçon parmi 8 :

$$\text{Card}(A) = \binom{12}{2} \times \binom{8}{1} = 66 \times 8 = 528.$$

- Conclusion : $P(A) = \frac{528}{1140} = \frac{44}{95} \approx 0,46$.

ATTENTION Rédaction : les trois réflexes du candidat

- Toujours annoncer l'équiprobabilité (« le dé est équilibré, donc les issues sont équiprobables ») avant d'utiliser la formule des cas favorables.

- Toujours préciser l'univers et son cardinal dans la rédaction.
- Une probabilité est un nombre de $[0 ; 1]$: si tu trouves $P(A) = 1,4$ ou $P(A) = -0,2$, il y a forcément une erreur de calcul ou de dénombrement.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi l'organisateur gagne toujours

Les jeux de hasard — Loto, paris sportifs, tombolas promotionnelles — reposent sur l'équiprobabilité : chaque billet, chaque grille a la même chance de gagner. Pourtant, à long terme, c'est toujours l'organisateur qui s'enrichit. Le secret ? Les gains distribués sont calculés pour être, en moyenne, inférieurs aux mises encaissées. Cette « moyenne » est précisément l'espérance de la variable aléatoire « gain », que nous étudierons dans la section 4. Pour la tombola de notre accroche : si chacun des 100 000 clients a une chance sur 100 de gagner, l'opérateur doit prévoir en moyenne $100\,000 \times \frac{1}{100} = 1\,000$ smartphones — un coût prévisible, largement couvert par les recharges. Les mathématiques ne prédisent pas qui gagnera, mais elles prédisent combien gagneront : c'est toute la puissance des probabilités.

EXERCICE 1 Pour s'entraîner

On lance deux dés équilibrés à six faces et on note la somme des faces obtenues.

1. Calculer la probabilité d'obtenir une somme égale à 9.
2. Calculer la probabilité d'obtenir une somme strictement supérieure à 9.
3. Calculer la probabilité d'obtenir une somme inférieure ou égale à 9. Que remarque-t-on ?

CORRIGÉ Exercice : sommes de deux dés

Les 36 couples $(i ; j)$ sont équiprobables, $\text{Card}(\Omega) = 36$.

1. Somme égale à 9 : couples $(3 ; 6), (4 ; 5), (5 ; 4), (6 ; 3)$, soit 4 cas favorables : $P = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$.
2. Somme strictement supérieure à 9, c'est-à-dire 10, 11 ou 12 : 3 cas pour 10, 2 cas pour 11, 1 cas pour 12, soit 6 cas : $P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.
3. L'événement « somme ≤ 9 » est le contraire de « somme > 9 » : $P = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$. On remarque que le passage au contraire évite de compter 30 cas un par un : c'est souvent la méthode la plus rapide.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une **expérience aléatoire** a des issues imprévisibles mais connues ; leur ensemble est l'**univers** Ω .
- Un **événement** est une partie de Ω ; $\bar{A}$ est son contraire ; A et B sont incompatibles si $A \cap B = \emptyset$.
- Une probabilité associe à chaque événement un nombre de $[0 ; 1]$, avec $P(\Omega) = 1$ et $P(\emptyset) = 0$.
- En **équiprobabilité** : $P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$ — à condition d'avoir vérifié que les issues sont équiprobables.
- Toujours utile : $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

2 OPÉRATIONS SUR LES ÉVÉNEMENTS ET ARBRES DE PROBABILITÉS

Dans la section précédente, nous avons appris à décrire une expérience aléatoire (univers, événements, événement contraire) et à calculer une probabilité en situation d'**équiprobabilité** grâce au quotient $\frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$. Mais dans la vie courante, on s'intéresse rarement à un seul événement isolé : un commerçant de Mokolo veut connaître la probabilité qu'un client achète du riz ou de l'huile ; un élève veut la probabilité d'obtenir au moins une mention sur deux épreuves ; un technicien d'Orange veut la probabilité que deux relais tombent en panne en même temps. Pour répondre à ces questions, il faut savoir combiner les événements. C'est l'objet de cette section : réunion, intersection, événements incompatibles, stratégie du contraire, puis l'outil roi du chapitre : l'**arbre de probabilités**.

2.1 Réunion et intersection d'événements

DÉFINITION Réunion et intersection

Soient A et B deux événements d'un univers Ω .

- La **réunion** $A \cup B$ (lire « A ou B ») est l'événement réalisé lorsque A est réalisé, ou B est réalisé, ou les deux. Le « ou » des mathématiques est inclusif.
- L'**intersection** $A \cap B$ (lire « A et B ») est l'événement réalisé lorsque A et B sont réalisés simultanément.
- A et B sont dits **incompatibles** (ou disjoints) lorsqu'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps, c'est-à-dire $A \cap B = \emptyset$.

EXEMPLE Lecture concrète

On lance un dé équilibré à six faces : $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Soient $A = \ll \text{obtenir un nombre pair} \gg = \{2; 4; 6\}$ et $B = \ll \text{obtenir un multiple de 3} \gg = \{3; 6\}$. Alors :

$$A \cup B = \{2; 3; 4; 6\} \quad \text{et} \quad A \cap B = \{6\}.$$

A et B ne sont pas incompatibles, car le résultat 6 réalise les deux à la fois. En revanche, A et $C = \ll \text{obtenir 5} \gg$ sont incompatibles : $A \cap C = \emptyset$.

ATTENTION Le « ou » n'est pas le « ou exclusif » du langage courant

Au restaurant, « fromage ou dessert » signifie souvent « l'un ou l'autre, mais pas les deux ». En probabilités, $A \cup B$ inclut toujours la possibilité que A et B se réalisent ensemble. C'est précisément cette subtilité qui explique la formule du paragraphe suivant.

2.2 Probabilité de la réunion de deux événements

Imaginons que l'on compte les éléments de $A \cup B$ en additionnant naïvement le nombre d'éléments de A et celui de B : les éléments qui appartiennent aux deux ensembles (ceux de $A \cap B$) sont alors comptés **deux fois**. Pour corriger, il faut retirer une fois ce double comptage. Cette idée de dénombrement donne immédiatement le théorème fondamental.

PROPRIÉTÉ Théorème — probabilité de la réunion

Pour tous événements A et B d'un univers Ω :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

En particulier, si A et B sont incompatibles ($A \cap B = \emptyset$) :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

La démonstration en situation d'équiprobabilité est exigible au Baccalauréat.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

On se place en situation d'équiprobabilité sur un univers fini Ω contenant n issues. On note $\text{Card}(E)$ le nombre d'éléments d'un événement E .

1. Compter $A \cup B$. Quand on additionne $\text{Card}(A) + \text{Card}(B)$, chaque élément de $A \cap B$ est compté deux fois (une fois dans A , une fois dans B). Pour obtenir le bon total, on retire

une fois $\text{Card}(A \cap B)$:

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B).$$

2. Diviser par n . Par équiprobabilité, $P(E) = \frac{\text{Card}(E)}{n}$. En divisant l'égalité précédente par n :

$$\frac{\text{Card}(A \cup B)}{n} = \frac{\text{Card}(A)}{n} + \frac{\text{Card}(B)}{n} - \frac{\text{Card}(A \cap B)}{n}.$$

3. Conclure. On reconnaît dans chaque terme une probabilité :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

4. Cas incompatible. Si $A \cap B = \emptyset$, alors $P(A \cap B) = 0$ et la formule devient $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.




Diagramme de Venn : en additionnant $P(A)$ et $P(B)$, la zone $A \cap B$ est comptée deux fois ; il faut donc soustraire $P(A \cap B)$ une fois.

EXEMPLE Application directe

Dans une classe de Terminale C de 50 élèves, 28 élèves pratiquent le football, 20 pratiquent la course, et 10 pratiquent les deux. On choisit un élève au hasard. Soient F « l'élève joue au football » et C « l'élève fait de la course ».

$$P(F \cup C) = P(F) + P(C) - P(F \cap C) = \frac{28}{50} + \frac{20}{50} - \frac{10}{50} = \frac{38}{50} = 0,76.$$

La probabilité que l'élève pratique au moins l'un des deux sports est 0,76.

ATTENTION Erreur fréquente : le double comptage

Ne jamais écrire $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ sans avoir vérifié que A et B sont incompatibles ! Dans

l'exemple précédent, additionner directement donnerait $\frac{28}{50} + \frac{20}{50} = \frac{48}{50} = 0,96$, ce qui est faux : les 10 élèves pratiquant les deux sports auraient été comptés deux fois. Au Bac, justifie toujours : « les événements sont incompatibles, donc... » ou applique la formule complète.

2.3 La stratégie du contraire : le réflexe « au moins un »

L'événement contraire $\bar{A}$ vérifie $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$, donc $P(A) = 1 - P(\bar{A})$. Cette égalité, toute simple, devient une stratégie redoutable dès que l'énoncé contient les mots « **au moins un** ». En effet, « obtenir au moins un succès » se réalise de plusieurs façons (exactement 1, exactement 2, ...), alors que son contraire « obtenir **aucun** succès » ne se réalise que d'une seule façon, souvent très facile à calculer.

MÉTHODE Traiter un événement « au moins un »

1. Repérer l'expression « au moins un » (ou « au moins une ») dans la question.
2. Nommer A l'événement cherché et identifier son contraire : $\bar{A}$ = « aucun » (ou « aucune »).
3. Calculer $P(\bar{A})$, généralement plus simple (un seul cas à traiter, souvent un produit de probabilités).
4. Conclure : $P(A) = 1 - P(\bar{A})$.

EXEMPLE Intuition rapide

On lance deux fois une pièce équilibrée. Probabilité d'obtenir au moins un Pile ? Le contraire est « aucun Pile », c'est-à-dire Face puis Face, de probabilité $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. Donc $P(\text{au moins un Pile}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. Vérification par dénombrement : sur les 4 issues $\{PP, PF, FP, FF\}$, trois contiennent au moins un Pile.

2.4 Arbres de probabilités : construire et exploiter

Beaucoup d'expériences se déroulent **en plusieurs étapes** : tirer deux boules successivement, répéter un lancer, subir deux tests médicaux. L'**arbre pondéré** est l'outil qui permet d'organiser ces situations sans rien oublier.

DÉFINITION Arbre pondéré

Un arbre pondéré représente les étapes successives d'une expérience : chaque nœud se

ramifie en branches correspondant aux issues possibles de l'étape, et chaque branche porte la probabilité de cette issue sachant le chemin déjà parcouru.

PROPRIÉTÉ Règles de calcul sur un arbre — admises

- Règle des produits : la probabilité d'un chemin (une succession d'issues) est le produit des probabilités rencontrées le long de ce chemin.
- Règle de la somme : la probabilité d'un événement réalisé par plusieurs chemins est la somme des probabilités de ces chemins.
- Contrôle : la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut toujours 1.

MÉTHODE Construire et exploiter un arbre pondéré

1. Identifier les étapes de l'expérience et, à chaque étape, les issues possibles.
2. Calculer la probabilité de chaque branche, en tenant compte de ce qui s'est passé avant (crucial en cas de tirage sans remise : la composition de l'urne change).
3. Vérifier qu'à chaque nœud, la somme des probabilités vaut 1.
4. Pour un événement donné : repérer les chemins favorables, calculer la probabilité de chacun (produits), puis les additionner.
5. Si la question contient « au moins un », envisager le passage au contraire.

2.5 Exemple complet : deux tirages sans remise

EXERCICE RÉSOLU 4 Urne : 3 boules rouges, 2 noires — deux tirages sans remise

Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules noires, indiscernables au toucher. On tire une première boule, on ne la remet pas, puis on tire une deuxième boule.

1. Construire l'arbre pondéré de l'expérience.
2. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges.
3. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule rouge.

SOLUTION

1. Arbre pondéré. Au premier tirage, $P(R_1) = \frac{3}{5}$ et $P(N_1) = \frac{2}{5}$. Au deuxième tirage, la composition de l'urne dépend du premier résultat (tirage sans remise) :

- si la première boule est rouge, il reste 2 rouges et 2 noires : $P(R_2) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ et $P(N_2) = \frac{1}{2}$;
- si la première boule est noire, il reste 3 rouges et 1 noire : $P(R_2) = \frac{3}{4}$ et $P(N_2) = \frac{1}{4}$.

L'arbre complet est représenté sur la figure ci-dessous.

2. Deux boules rouges. Un seul chemin convient : R_1 puis R_2 . Par la règle des produits :

$$P(R_1 \cap R_2) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10} = 0,3.$$


3. Au moins une rouge. Trois chemins sont favorables (RR , RN , NR) : le calcul direct est possible mais long. Appliquons la stratégie du contraire : le contraire de « au moins une rouge » est « aucune rouge », c'est-à-dire deux noires (chemin N_1N_2) :

$$P(\bar{A}) = P(N_1 \cap N_2) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}.$$

Donc :

$$P(A) = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10} = 0,9.$$

Vérification par la règle de la somme : $P(RR) + P(RN) + P(NR) = \frac{3}{10} + \frac{3}{10} + \frac{3}{10} = \frac{9}{10}$. Les deux méthodes concordent.



Arbre pondéré des deux tirages sans remise. Les probabilités du deuxième niveau dépendent du premier tirage : c'est la signature du « sans remise ». La somme des quatre chemins vaut $\frac{3}{10} + \frac{3}{10} + \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = 1$.

ATTENTION Sans remise : les probabilités changent d'un niveau à l'autre

L'erreur classique consiste à recopier $\frac{3}{5}$ et $\frac{2}{5}$ au deuxième niveau de l'arbre. Après un tirage sans remise, l'urne ne contient plus que 4 boules, et sa composition dépend de la boule déjà tirée. Prends le réflexe de réécrire, à chaque nœud, le contenu de l'urne avant de calculer les probabilités des branches. À l'inverse, si le tirage est avec remise, l'urne est reconstituée à l'identique : les probabilités se recopient alors telles quelles d'un niveau à l'autre.

LESAVAIS-TU ? Les arbres, outils de décision

Les arbres de probabilités ne servent pas qu'au Bac : en médecine, ils modélisent les tests de dépistage (test positif ou négatif sachant que le patient est malade ou sain) ; dans les télécommunications, des entreprises comme MTN ou Orange les utilisent pour estimer la fiabilité d'un réseau où plusieurs équipements se succèdent. Le mathématicien anglais Thomas Bayes (XVIII^e siècle) a bâti sur ces idées une théorie — les probabilités « à l'envers » — qui est aujourd'hui au cœur de l'intelligence artificielle.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Une urne contient 4 boules vertes et 1 boule blanche. On effectue deux tirages successifs sans remise.

1. Construire l'arbre pondéré de l'expérience.
2. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules vertes.
3. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule blanche.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Premier tirage : $P(V_1) = \frac{4}{5}$, $P(B_1) = \frac{1}{5}$. Si V_1 est réalisé, il reste 3 vertes et 1 blanche : branches $\frac{3}{4}$ et $\frac{1}{4}$. Si B_1 est réalisé, il ne reste que 4 vertes : $P(V_2) = 1$ et $P(B_2) = 0$.

2. $P(V_1 \cap V_2) = \frac{4}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$.

3. Contraire de « au moins une blanche » : « aucune blanche », c'est-à-dire deux vertes.

Donc :

$$P(\text{au moins une blanche}) = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}.$$

Vérification par les chemins : $P(V_1 \cap B_2) + P(B_1 \cap V_2) = \frac{4}{5} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \times 1 = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- $A \cup B$: « A ou B ou les deux » ; $A \cap B$: « A et B simultanément ».
- Pour tous événements : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; si A et B sont incompatibles, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- « Au moins un » $\Rightarrow$ passer au contraire « aucun » : $P(A) = 1 - P(\bar{A})$.
- Sur un arbre : produits le long d'un chemin, somme des chemins favorables ; à chaque nœud, la somme des probabilités des branches vaut 1.
- Sans remise : les probabilités du niveau suivant dépendent du résultat précédent ; avec remise : elles se recopient à l'identique.

3 VARIABLES ALÉATOIRES ET LOI DE PROBABILITÉ

Dans la section précédente, nous avons appris à décrire les événements d'une expérience aléatoire et à calculer leurs probabilités à l'aide d'arbres pondérés. Mais dans la vie courante, on s'intéresse rarement à un événement en soi : on s'intéresse à un nombre qui dépend du hasard. Le transporteur de la ligne Douala-Yaoundé veut connaître le nombre de passagers par voyage ; l'opérateur téléphonique compte le nombre d'appels reçus par heure ; le joueur de loterie veut savoir combien il gagne ou perd. Dans chaque cas, le hasard produit une valeur numérique : c'est exactement l'idée de **variable aléatoire**. Cette section va nous apprendre à décrire complètement un tel phénomène grâce à sa **loi de probabilité** et à sa **fonction de répartition**.

3.1 Notion de variable aléatoire

Intuition. Lançons deux dés et intéressons-nous à la somme des faces obtenues. Le résultat du lancer est un couple (1 ; 4), (3 ; 6), etc. : ce n'est pas un nombre unique. Mais à chaque couple, on peut associer un nombre : la somme des deux faces. Ainsi, au couple (1 ; 4) on associe 5, au couple (3 ; 6) on associe 9. On a construit une fonction qui, à chaque issue de l'expérience, associe un nombre réel. Cette fonction s'appelle une variable aléatoire.

DÉFINITION Variable aléatoire

Soit Ω l'univers (fini) d'une expérience aléatoire muni d'une probabilité P . On appelle **variable aléatoire** sur Ω toute fonction X définie sur Ω et à valeurs dans $\mathbb{R}$:

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \omega \longmapsto X(\omega).$$

L'ensemble des valeurs prises par X est noté $X(\Omega) = \{x_1 ; x_2 ; \dots ; x_n\}$.

ATTENTION Ce que « variable aléatoire » ne veut pas dire

Une variable aléatoire n'est ni une variable au sens algébrique (comme le x d'une équation), ni un nombre : c'est une fonction. Le mot « aléatoire » vient du fait que la valeur $X(\omega)$ dépend de l'issue ω , laquelle relève du hasard. Avant l'expérience, on ne sait pas quelle valeur X prendra ; après l'expérience, la valeur est parfaitement déterminée.

Pour chaque valeur x_i prise par X , on peut considérer l'événement « X prend la valeur x_i », que l'on note $(X = x_i)$. C'est un événement au sens des sections précédentes :

$$(X = x_i) = \{\omega \in \Omega ; X(\omega) = x_i\}.$$

On peut donc calculer sa probabilité $P(X = x_i)$. De même, $(X \leq x)$ désigne l'événement « X prend une valeur inférieure ou égale à x », et $(X > x_i)$ est l'événement contraire de $(X \leq x_i)$.

EXEMPLE Somme de deux dés

On lance deux dés équilibrés (un rouge, un bleu). L'univers est l'ensemble des 36 couples $(i; j)$ avec $i, j \in \{1; 2; \dots; 6\}$, toutes les issues étant équiprobables de probabilité $\frac{1}{36}$. On définit la variable aléatoire S = somme des deux faces. Alors $S(\Omega) = \{2; 3; \dots; 12\}$. Par exemple, l'événement $(S = 5)$ est réalisé par les couples $(1; 4)$, $(2; 3)$, $(3; 2)$, $(4; 1)$, donc $P(S = 5) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$.

3.2 Loi de probabilité d'une variable aléatoire

Intuition. Connaître une variable aléatoire, c'est savoir répondre à deux questions : quelles valeurs peut-elle prendre ? et avec quelles probabilités ? La réponse complète à ces deux questions s'appelle la loi de probabilité de X .

DÉFINITION Loi de probabilité

Soit X une variable aléatoire prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$. On appelle **loi de probabilité** de X la donnée de tous les couples $(x_i; p_i)$ où $p_i = P(X = x_i)$. On la présente sous forme de tableau :

Valeurs x_i	x_1	x_2	...	x_n
$p_i = P(X = x_i)$	p_1	p_2	...	p_n

PROPRIÉTÉ Condition fondamentale

Les nombres p_i d'une loi de probabilité vérifient :

$$\text{pour tout } i, \quad 0 \leq p_i \leq 1 \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^n p_i = p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1.$$

Justification. Les événements $(X = x_1), (X = x_2), \dots, (X = x_n)$ sont deux à deux incompatibles (une issue ω ne peut donner qu'une seule valeur de X) et leur réunion est l'univers Ω tout entier (toute issue donne une valeur de X). Ils forment donc une partition de Ω , et par conséquent la somme de leurs probabilités vaut $P(\Omega) = 1$. ■

Cette propriété est un outil de vérification précieux : après avoir calculé une loi, on doit toujours contrôler que la somme des p_i vaut 1. Elle sert aussi à retrouver une probabilité manquante : si l'on connaît toutes les p_i sauf une, la dernière s'obtient par différence avec 1.

MÉTHODE Déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire

1. Lister les valeurs prises par X : pour chaque issue possible, calculer $X(\omega)$, puis écrire l'ensemble $X(\Omega) = \{x_1; \dots; x_n\}$ sans en oublier (penser en particulier à la valeur 0 et aux valeurs négatives pour un gain algébrique).
2. Calculer chaque probabilité $p_i = P(X = x_i)$, en dénombrant les issues favorables (équiprobabilité) ou en utilisant un arbre pondéré.
3. Présenter le tableau de la loi : valeurs x_i rangées dans l'ordre croissant en première ligne, probabilités p_i en seconde ligne.
4. Vérifier que $\sum p_i = 1$. Si ce n'est pas le cas, il y a une erreur : valeur oubliée ou calcul faux.

EXERCICE RÉSOLU 5 Loi de la somme de deux dés

On lance deux dés équilibrés et on note S la somme des faces obtenues. Déterminer la loi de probabilité de S .

SOLUTION

Étape 1 : valeurs de S . La plus petite somme est $1 + 1 = 2$, la plus grande est $6 + 6 = 12$, et toutes les valeurs intermédiaires sont atteintes : $S(\Omega) = \{2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12\}$.

Étape 2 : calcul des probabilités. Il y a 36 couples équiprobables. On dénombre les couples donnant chaque somme : par exemple ($S = 4$) est réalisé par $(1; 3), (2; 2), (3; 1)$, soit 3 issues, donc $P(S = 4) = \frac{3}{36}$. En procédant de même pour chaque valeur :

Étape 3 : tableau de la loi.

s_i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$P(S = s_i)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Étape 4 : vérification.

$$\frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1}{36} = \frac{36}{36} = 1.$$

La loi est correcte. On remarque la symétrie de la loi autour de la valeur 7, la plus probable.

3.3 Représentation graphique : le diagramme en barres

Une loi de probabilité se visualise par un **diagramme en barres** : sur l'axe des abscisses, on place les valeurs s_i ; au-dessus de chacune, on trace une barre dont la hauteur est la probabilité p_i . Ce diagramme donne d'un coup d'œil les valeurs les plus probables et la forme générale de la loi (symétrie, étalement).




Diagramme en barres de la loi de la somme S de deux dés :
la loi est symétrique autour de 7, valeur la plus probable.

3.4 Exemple de la vie courante : loi d'un gain algébrique

Les variables aléatoires sont l'outil naturel pour analyser les jeux d'argent, très présents dans la vie quotidienne (tombola de quartier, jeux de paris). L'exemple suivant est un modèle à retenir : il sera repris dans la section suivante pour le calcul de l'espérance.

EXEMPLE Un jeu de dé à 100 FCFA

À la fête de la jeunesse, un forain propose le jeu suivant : le joueur mise 100 FCFA, puis lance un dé équilibré.

- Si le dé donne 6, le forain rend 500 FCFA au joueur ;
- si le dé donne 1, le forain rend 200 FCFA ;
- dans les autres cas (2, 3, 4 ou 5), le forain ne rend rien.

On note X le **gain algébrique** du joueur, c'est-à-dire ce qu'il reçoit moins sa mise de 100 FCFA. Déterminons la loi de X .

Valeurs de X . Si le dé donne 6 : $X = 500 - 100 = 400$. Si le dé donne 1 : $X = 200 - 100 = 100$. Sinon : $X = 0 - 100 = -100$. Donc $X(\Omega) = \{-100; 100; 400\}$.

Probabilités. Le dé étant équilibré : $P(X = 400) = \frac{1}{6}$, $P(X = 100) = \frac{1}{6}$, et $P(X = -100) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

Tableau de la loi (valeurs rangées dans l'ordre croissant) :

x_i	-100	100	400
$P(X = x_i)$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Vérification : $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4+1+1}{6} = 1$. La loi est bien définie. On observe que le joueur perd sa mise dans deux tiers des cas : nous verrons à la section suivante, grâce à l'espérance, si ce jeu est équitable.

ATTENTION Les deux erreurs classiques

- Oublier une valeur possible de X . C'est l'erreur la plus fréquente : on oublie souvent la valeur 0 (par exemple « nombre de succès » quand il n'y a aucun succès) ou une valeur négative (la perte dans un gain algébrique). Avant de calculer, demande-toi toujours : quelle est la plus petite valeur possible ? la plus grande ? toutes les valeurs intermédiaires sont-elles atteintes ?
- Ne pas vérifier que $\sum p_i = 1$. Cette vérification, qui prend dix secondes, détecte la quasi-totalité des erreurs. Au Baccalauréat, écris explicitement la somme et sa valeur 1 : c'est un réflexe qui rassure le correcteur et qui te protège.

3.5 Fonction de répartition

Intuition. La loi de probabilité répond à la question « quelle est la probabilité que X prenne exactement la valeur x_i ? ». Mais dans la pratique, on pose souvent une autre question : « quelle est la probabilité que X ne dépasse pas une certaine valeur ? ». Un fournisseur d'accès veut connaître la probabilité que le nombre de pannes mensuelles soit au plus égal à 3 ; un assureur, la probabilité que le nombre de sinistres soit au plus égal à un seuil. C'est la fonction de répartition qui répond à ces questions, en accumulant les probabilités.

DÉFINITION Fonction de répartition

Soit X une variable aléatoire. On appelle **fonction de répartition** de X la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$F(x) = P(X \leq x).$$

Concrètement, si X prend les valeurs $x_1 < x_2 < \dots < x_n$, alors $F(x)$ est la somme des probabilités des valeurs inférieures ou égales à x :

- si $x < x_1$: aucune valeur de X n'est inférieure ou égale à x , donc $F(x) = 0$;
- si $x_1 \leq x < x_2$: $F(x) = p_1$;
- si $x_2 \leq x < x_3$: $F(x) = p_1 + p_2$;
- ...
- si $x \geq x_n$: toutes les valeurs sont inférieures ou égales à x , donc $F(x) = 1$.

PROPRIÉTÉ Propriétés de la fonction de répartition

La fonction de répartition F d'une variable aléatoire X (prenant un nombre fini de valeurs) est :

1. une fonction **croissante** sur $\mathbb{R}$;
2. une fonction **en escalier** : constante sur chaque intervalle $[x_i ; x_{i+1}[$, avec un « saut » en chaque valeur x_i ;
3. telle que $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ (elle vaut 0 avant la plus petite valeur de X et 1 à partir de la plus grande).

Justification de la croissance. Si $a \leq b$, alors l'événement $(X \leq a)$ est inclus dans l'événement $(X \leq b)$: toute issue réalisant le premier réalise le second. Or, si $A \subset B$, alors $P(A) \leq P(B)$. Donc $F(a) = P(X \leq a) \leq P(X \leq b) = F(b)$. ■

PROPRIÉTÉ Lien entre fonction de répartition et loi de probabilité

Si les valeurs de X sont rangées dans l'ordre strictement croissant $x_1 < x_2 < \dots < x_n$, alors le saut de F en x_i est exactement la probabilité de x_i :

$$P(X = x_i) = F(x_i) - F(x_{i-1}) \quad (\text{avec } F(x_0) = 0).$$

Plus généralement, pour tous réels $a < b$: $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.

Justification. L'événement $(X \leq x_i)$ est la réunion des deux événements incompatibles $(X \leq x_{i-1})$ et $(X = x_i)$, puisqu'il n'y a aucune valeur de X strictement entre x_{i-1} et x_i . Donc $F(x_i) = F(x_{i-1}) + P(X = x_i)$, d'où le résultat. ■

Ce lien est précieux dans les deux sens : on construit F en additionnant les p_i , et on retrouve la loi en calculant les sauts de F .

EXERCICE RÉSOLU 6 Fonction de répartition du jeu de dé


On reprend le jeu de la fête de la jeunesse : X prend les valeurs $-100, 100, 400$ avec les probabilités $\frac{2}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}$. Déterminer la fonction de répartition F de X , puis calculer $P(X \leq 250)$.

SOLUTION

On accumule les probabilités dans l'ordre croissant des valeurs :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -100 \\ \frac{2}{3} & \text{si } -100 \leq x < 100 \\ \frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6} & \text{si } 100 \leq x < 400 \\ \frac{5}{6} + \frac{1}{6} = 1 & \text{si } x \geq 400 \end{cases}$$

Pour $P(X \leq 250)$: comme $100 \leq 250 < 400$, on lit directement $F(250) = \frac{5}{6}$. Autrement dit, la probabilité que le joueur gagne au plus 250 FCFA vaut $\frac{5}{6}$. On vérifie le lien avec la loi : $P(X = 400) = F(400) - F(100) = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$, ce qui redonne bien la probabilité du tableau.



Fonction de répartition du gain X : fonction en escalier, croissante, nulle avant -100 , égale à 1 à partir de 400. Les sauts ont pour hauteurs $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$ et $\frac{1}{6}$, c'est-à-dire exactement les probabilités $P(X = x_i)$.

MÉTHODE Construire et utiliser une fonction de répartition

1. Ranger les valeurs de X dans l'ordre croissant : $x_1 < x_2 < \dots < x_n$.

2. Calculer les probabilités cumulées : $F(x_1) = p_1$, $F(x_2) = p_1 + p_2$, ..., $F(x_n) = 1$.
3. Écrire F par morceaux : 0 avant x_1 , puis chaque cumul sur l'intervalle $[x_i ; x_{i+1}[$, et 1 à partir de x_n .
4. Pour calculer $P(a < X \leq b)$, utiliser $F(b) - F(a)$; pour retrouver $P(X = x_i)$, calculer le saut $F(x_i) - F(x_{i-1})$.

ATTENTION Inégalités strictes ou larges : sois vigilant

Par définition, $F(x) = P(X \leq x)$ avec une inégalité large : la valeur x est incluse. Ainsi $F(100) = \frac{5}{6}$ dans l'exemple du jeu (la valeur 100 est comptée), alors que pour tout x strictement inférieur à 100, $F(x) = \frac{2}{3}$. Sur le graphique, c'est le point fermé en haut du saut qui indique la valeur de F en x_i . De même, $P(X < x_i) = F(x_{i-1})$ et non $F(x_i)$: ne confonds pas $(X < x_i)$ et $(X \leq x_i)$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une **variable aléatoire** X est une fonction de Ω dans $\mathbb{R}$; $(X = x_i)$ est un événement dont on calcule la probabilité.
- La **loi de probabilité** de X est le tableau des couples $(x_i ; P(X = x_i))$; on a toujours $\sum p_i = 1$: cette vérification est obligatoire.
- La loi se représente par un **diagramme en barres**.
- La **fonction de répartition** $F(x) = P(X \leq x)$ est croissante, en escalier, nulle avant la plus petite valeur et égale à 1 à partir de la plus grande.
- On passe de F à la loi par les sauts : $P(X = x_i) = F(x_i) - F(x_{i-1})$.

LESAVAIS-TU ? Des probabilités aux assurances

La fonction de répartition est l'outil de base des actuaires, ces mathématiciens qui calculent les primes d'assurance. Pour fixer le prix d'une assurance automobile à Douala, l'assureur étudie la variable aléatoire $X =$ « montant annuel des indemnités d'un client » et utilise $F(x) = P(X \leq x)$ pour estimer, par exemple, la probabilité que les indemnités dépassent les primes encaissées. La théorie que tu découvres ici, formalisée par le mathématicien soviétique Andreï Kolmogorov en 1933, fait ainsi tourner l'assurance, la banque et les télécommunications — y compris celles des réseaux MTN et Orange au Cameroun, où les lois de probabilités servent à dimensionner le nombre d'antennes relais.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes, indiscernables au toucher. On tire simultanément 2 boules et on note X le nombre de boules rouges obtenues.

1. Déterminer la loi de probabilité de X (on vérifiera que la somme des probabilités vaut 1).
2. Représenter cette loi par un diagramme en barres.
3. Déterminer la fonction de répartition F de X et en déduire $P(X \leq 1)$.

CORRIGÉ Exercice

1. Il y a $\binom{5}{2} = 10$ tirages équiprobables. X prend les valeurs 0, 1, 2 (on ne peut tirer que 0, 1 ou 2 boules rouges).

$$P(X = 0) = \frac{\binom{2}{2}}{\binom{5}{2}} = \frac{1}{10}, \quad P(X = 1) = \frac{\binom{3}{1}\binom{2}{1}}{\binom{5}{2}} = \frac{6}{10}, \quad P(X = 2) = \frac{\binom{3}{2}}{\binom{5}{2}} = \frac{3}{10}.$$

Vérification : $\frac{1}{10} + \frac{6}{10} + \frac{3}{10} = 1$.

2. Diagramme en barres : barres de hauteurs 0,1 ; 0,6 ; 0,3 au-dessus des valeurs 0, 1, 2.
3. $F(x) = 0$ si $x < 0$; $F(x) = \frac{1}{10}$ si $0 \leq x < 1$; $F(x) = \frac{7}{10}$ si $1 \leq x < 2$; $F(x) = 1$ si $x \geq 2$. Comme $1 \leq 1 < 2$, on a $P(X \leq 1) = F(1) = \frac{7}{10}$.

Nous savons désormais décrire complètement une variable aléatoire par sa loi et sa fonction de répartition. Mais ces tableaux sont parfois longs à manipuler : ne pourrait-on résumer une loi par quelques nombres significatifs, comme une « valeur moyenne » ou une mesure de sa dispersion ? C'est précisément l'objet de la section suivante : l'espérance, la variance et l'écart-type.

4 ESPÉRANCE, VARIANCE ET ÉCART-TYPE

Dans la section précédente, nous avons appris à décrire complètement une variable aléatoire par sa **loi de probabilité** : un tableau donnant, pour chaque valeur x_i , la probabilité $p_i = P(X = x_i)$. Cette description est exhaustive, mais elle est parfois trop riche : face à un jeu de hasard, un commerçant ou un assureur souhaite souvent résumer la situation par un ou deux nombres. Combien puis-je espérer gagner en moyenne ? Les gains sont-ils stables ou très dispersés ? Ce sont précisément les questions auxquelles répondent l'**espérance** et la **variance** (ou son équivalent, l'**écart-type**), que nous étudions dans cette section.

4.1 Espérance mathématique

Une intuition pour commencer.

Imaginons une tombola organisée par une coopérative scolaire à Yaoundé. Chaque billet coûte 500 FCFA et permet de gagner, selon le tirage, 0, 1 000 ou 5 000 FCFA. Si tu joues une seule fois, ton gain est imprévisible. Mais si tu joues un très grand nombre de fois, ton gain moyen par partie va se stabiliser autour d'une valeur précise : c'est cette valeur que l'on appelle **espérance mathématique**. Elle se calcule en faisant la moyenne des gains possibles, pondérée par leurs probabilités.

DÉFINITION Espérance d'une variable aléatoire

Soit X une variable aléatoire prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ avec les probabilités $p_1, p_2, \dots, p_n$ (où $p_i = P(X = x_i)$). L'**espérance mathématique** de X est le nombre réel noté $E(X)$ défini par :

$$E(X) = \sum_{i=1}^n p_i x_i = p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n.$$

À RETENIR Interprétation concrète de l'espérance

L'espérance $E(X)$ s'interprète comme la valeur moyenne de X sur un grand nombre de répétitions de l'expérience. C'est l'idée intuitive de la loi des grands nombres : si l'on répète l'expérience N fois et que l'on note les valeurs obtenues, la moyenne arithmétique de ces valeurs se rapproche de $E(X)$ lorsque N devient très grand. L'espérance n'est donc pas une valeur que X prend nécessairement : c'est une moyenne théorique à long terme.

ATTENTION L'espérance n'est pas une valeur possible

L'espérance peut très bien ne figurer pas parmi les valeurs x_i . Par exemple, le nombre moyen d'enfants par ménage peut valoir 3,4, alors qu'aucun ménage n'a 3,4 enfants ! Ne dis jamais « X vaut en moyenne exactement $E(X)$ à chaque partie », mais « sur un grand nombre de parties, le gain moyen par partie se rapproche de $E(X)$ ».

Jeu équitable, favorable, défavorable.

Lorsque X représente le gain algébrique d'un jeu (gain net, c'est-à-dire en tenant compte de la mise), l'espérance permet de classer le jeu :

DÉFINITION Jeu équitable, favorable, défavorable

Soit X le gain algébrique d'un jeu de hasard.

- Si $E(X) = 0$, le jeu est dit **équitable** : sur un grand nombre de parties, ni le joueur ni l'organisateur ne gagnent en moyenne.
- Si $E(X) > 0$, le jeu est **favorable** au joueur.
- Si $E(X) < 0$, le jeu est **défavorable** au joueur (c'est le cas de tous les jeux d'argent organisés commercialement : l'organisateur se réserve une marge).

EXEMPLE La tombola de la coopérative

Une tombola propose 200 billets à 500 FCFA chacun. Les lots sont : un lot de 20 000 FCFA, deux lots de 5 000 FCFA, dix lots de 1 000 FCFA. On note X le gain algébrique (lot reçu moins la mise) d'un joueur achetant un billet. La loi de X est :

x_i	19 500	4 500	500	-500
p_i	$\frac{1}{200}$	$\frac{2}{200}$	$\frac{10}{200}$	$\frac{187}{200}$

Calculons l'espérance :

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \frac{1}{200} \times 19\,500 + \frac{2}{200} \times 4\,500 + \frac{10}{200} \times 500 + \frac{187}{200} \times (-500) \\
 &= \frac{19\,500 + 9\,000 + 5\,000 - 93\,500}{200} = \frac{-60\,000}{200} = -300.
 \end{aligned}$$

Ainsi $E(X) = -300$ FCFA : le jeu est défavorable au joueur. En moyenne, chaque joueur « perd » 300 FCFA par billet, ce qui correspond à la marge de la coopérative (c'est le but d'une tombola : financer les activités!).

4.2 Linéarité de l'espérance

Très souvent, le gain réel s'obtient à partir d'une variable X par une transformation affine : par exemple, si la mise est de b francs et que le lot est proportionnel à X , le gain net est $Y = aX + b$. La propriété suivante, admise, évite de recalculer toute la loi.

PROPRIÉTÉ Linéarité de l'espérance (admise)

Soit X une variable aléatoire et a, b deux nombres réels. Alors :

$$E(aX + b) = a E(X) + b.$$

En particulier, $E(X + b) = E(X) + b$ et $E(aX) = a E(X)$.

EXEMPLE Vérification sur un exemple

Soit X de loi : $P(X = 1) = 0,5$, $P(X = 2) = 0,3$, $P(X = 3) = 0,2$. Alors $E(X) = 0,5 \times 1 + 0,3 \times 2 + 0,2 \times 3 = 1,7$. Posons $Y = 2X + 3$. La loi de Y porte sur les valeurs 5, 7, 9 avec les mêmes probabilités, donc :

$$E(Y) = 0,5 \times 5 + 0,3 \times 7 + 0,2 \times 9 = 2,5 + 2,1 + 1,8 = 6,4.$$

Et l'on vérifie : $2E(X) + 3 = 2 \times 1,7 + 3 = 6,4$. La formule fonctionne.

4.3 Variance et écart-type : mesurer la dispersion

Pourquoi l'espérance ne suffit pas.

Considérons deux jeux. Jeu A : tu gagnes 990 FCFA ou 1 010 FCFA avec probabilité $\frac{1}{2}$ chacun. Jeu B : tu gagnes 0 FCFA ou 2 000 FCFA avec probabilité $\frac{1}{2}$ chacun. Les deux jeux ont la même espérance $E = 1 000$ FCFA. Pourtant, ils ne se ressemblent pas : le jeu A est très stable, le jeu B est très risqué. Il nous faut un outil pour mesurer cet écart par rapport à la moyenne : c'est la **variance**.

DÉFINITION Variance et écart-type

Soit X une variable aléatoire d'espérance $m = E(X)$, prenant les valeurs $x_1, \dots, x_n$ avec les probabilités $p_1, \dots, p_n$. La **variance** de X est :

$$V(X) = \sum_{i=1}^n p_i (x_i - m)^2.$$

L'**écart-type** de X est : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

À RETENIR Sens de la variance et de l'écart-type

La variance est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Plus les valeurs de X sont dispersées autour de $E(X)$, plus $V(X)$ et $\sigma(X)$ sont grands. On a toujours $V(X) \geq 0$, et $V(X) = 0$ si et seulement si X est constante. L'écart-type a l'avantage de s'exprimer dans la même unité que X (des FCFA si X est en FCFA), ce qui le rend plus parlant que la variance.

La définition de la variance est rarement la méthode de calcul la plus rapide. Le théorème suivant, exigible au Baccalauréat, fournit une formule beaucoup plus pratique.

PROPRIÉTÉ Théorème de König-Huygens

Pour toute variable aléatoire X :

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2,$$

c'est-à-dire
$$V(X) = \sum_{i=1}^n p_i x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n p_i x_i \right)^2.$$

EXPÉRIENCE**Démonstration guidée du théorème de König-Huygens**

Posons $m = E(X)$ et développons la définition de la variance.

1. Développons le carré. Pour chaque indice i : $(x_i - m)^2 = x_i^2 - 2m x_i + m^2$.
2. Injectons dans la somme.

$$V(X) = \sum_{i=1}^n p_i (x_i - m)^2 = \sum_{i=1}^n p_i x_i^2 - 2m \sum_{i=1}^n p_i x_i + m^2 \sum_{i=1}^n p_i.$$

3. Reconnaissons les sommes. Par définition, $\sum p_i x_i^2 = E(X^2)$ et $\sum p_i x_i = m$. De plus, la somme des probabilités vaut 1 : $\sum p_i = 1$.
4. Concluons.

$$V(X) = E(X^2) - 2m \times m + m^2 \times 1 = E(X^2) - 2m^2 + m^2 = E(X^2) - m^2.$$

D'où $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$. $\square$

ATTENTION**Les deux erreurs classiques**

- Ne confonds pas $E(X^2)$ et $[E(X)]^2$! Le premier est la moyenne des carrés ($\sum p_i x_i^2$), le second est le carré de la moyenne. Ils sont presque toujours différents, et leur différence est précisément la variance, qui est positive ou nulle. Si tu trouves une variance négative, tu as fait une erreur de calcul.
- L'écart-type est la racine carrée de la variance, pas la variance elle-même. Quand l'énoncé demande $\sigma(X)$, n'oublie pas la dernière étape : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

MÉTHODE**Calculer $E(X)$, $V(X)$, $\sigma(X)$ avec un tableau**

1. Construis un tableau à quatre lignes : x_i ; p_i ; $p_i x_i$; $p_i x_i^2$.

2. Vérifie que $\sum p_i = 1$ (contrôle rapide de la loi).
3. Additionne la troisième ligne : $E(X) = \sum p_i x_i$.
4. Additionne la quatrième ligne : $E(X^2) = \sum p_i x_i^2$.
5. Applique König-Huygens : $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.
6. Termine par $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$, en arrondissant proprement.

EXERCICE RÉSOLU 7**Espérance et écart-type du gain d'une tombola**

Énoncé. Une association de quartier à Douala organise une tombola de 100 billets vendus 1 000 FCFA chacun. Les lots sont : un vélo d'une valeur de 40 000 FCFA, quatre sacs de riz de 5 000 FCFA chacun. On note X le gain algébrique (lot moins la mise) d'un acheteur d'un billet. Déterminer la loi de X , calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$. Le jeu est-il équitable ?

SOLUTION

Solution. Les valeurs possibles de X sont : $40\,000 - 1\,000 = 39\,000$; $5\,000 - 1\,000 = 4\,000$; et $-1\,000$ (billet perdant, 95 cas sur 100).

x_i	39 000	4 000	-1 000	Totaux
p_i	0,01	0,04	0,95	1
$p_i x_i$	390	160	-950	$E(X) = -400$
$p_i x_i^2$	15 210 000	640 000	950 000	$E(X^2) = 16\,800\,000$

Espérance : $E(X) = 390 + 160 - 950 = -400$ FCFA. Le jeu est défavorable au joueur : il n'est pas équitable (pour être équitable, il faudrait $E(X) = 0$). Chaque billet rapporte en moyenne 400 FCFA à l'association, soit 40 000 FCFA au total, ce qui correspond exactement à la recette (100 000 FCFA) moins la valeur des lots (60 000 FCFA).



Variance (König-Huygens) :

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 16\,800\,000 - (-400)^2 = 16\,800\,000 - 160\,000 = 16\,640\,000.$$

Écart-type : $\sigma(X) = \sqrt{16\,640\,000} \approx 4\,079$ FCFA. L'écart-type est très grand devant l'espérance : le gain est extrêmement dispersé (la plupart perdent 1 000 FCFA, un seul gagne beaucoup), ce qui est typique d'une tombola.

Deux lois de même espérance, de variances différentes.

La figure ci-dessous compare les jeux A et B évoqués plus haut : même espérance 1 000 FCFA, mais des dispersions très différentes. Pour le jeu A, $V(A) = 100$ et $\sigma(A) = 10$ FCFA ; pour le jeu B, $V(B) = 1\,000\,000$ et $\sigma(B) = 1\,000$ FCFA.



Deux lois de même espérance $E = 1\,000$ FCFA mais de variances très différentes : le jeu A est concentré autour de la moyenne, le jeu B est très dispersé. L'échelle horizontale est respectée dans chaque graphique.

PROPRIÉTÉ Effet d'une transformation affine sur la variance (admise)

Soit X une variable aléatoire et a, b deux réels. Alors :

$$V(aX + b) = a^2 V(X) \quad \text{et} \quad \sigma(aX + b) = |a| \sigma(X).$$

Ajouter une constante b translate toutes les valeurs sans changer la dispersion ; multiplier par a dilate les écarts, d'où le facteur a^2 sur la variance.

EXEMPLE Application directe

Si $V(X) = 4$, alors $V(3X + 5) = 3^2 \times 4 = 36$ et $\sigma(3X + 5) = 3 \times 2 = 6$. Remarque que la constante 5 n'intervient pas.

LESAVAIS-TU ? L'espérance, outil des assureurs

Les compagnies d'assurance fixent leurs primes grâce à l'espérance mathématique des sinistres. Si un assureur estime qu'un conducteur a une probabilité 0,02 d'avoir un accident coûtant en moyenne 2 000 000 FCFA dans l'année, le coût moyen du risque est $E = 0,02 \times 2\,000\,000 = 40\,000$ FCFA. La prime annuelle sera donc supérieure à 40 000 FCFA (on ajoute les frais de gestion et une marge) : l'assurance est, comme le casino, un « jeu » à espérance négative pour le client... mais qui le protège d'une perte catastrophique. C'est le même raisonnement qui permet à la LONACAM ou aux loteries de garantir leurs lots tout

en dégageant des recettes.

EXERCICE 4 Application : Jeu de cartes

Un opérateur de jeux propose le tirage suivant : on tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Tirer un as rapporte 1 000 FCFA, tirer un roi rapporte 500 FCFA, toute autre carte ne rapporte rien. La mise est de 200 FCFA. On note X le gain algébrique du joueur.

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. Calculer $E(X)$. Le jeu est-il équitable, favorable ou défavorable ?
3. Calculer $V(X)$ puis $\sigma(X)$ (arrondir au franc près).
4. Quelle mise rendrait le jeu équitable ?

CORRIGÉ Exercice : Jeu de cartes

1. Il y a 4 as et 4 rois dans 32 cartes. Les valeurs de X sont 800 (as), 300 (roi), -200 (autre) :

$$P(X = 800) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}; P(X = 300) = \frac{1}{8}; P(X = -200) = \frac{24}{32} = \frac{3}{4}.$$
2. $E(X) = \frac{1}{8} \times 800 + \frac{1}{8} \times 300 + \frac{3}{4} \times (-200) = 100 + 37,5 - 150 = -12,5$ FCFA. Le jeu est défavorable au joueur.
3. $E(X^2) = \frac{1}{8} \times 800^2 + \frac{1}{8} \times 300^2 + \frac{3}{4} \times (-200)^2 = 80\,000 + 11\,250 + 30\,000 = 121\,250$. D'où
 $V(X) = 121\,250 - (-12,5)^2 = 121\,250 - 156,25 = 121\,093,75$, et $\sigma(X) = \sqrt{121\,093,75} \approx 348$ FCFA.
4. Notons m la mise. Le gain algébrique devient $X' = X + (200 - m)$, donc $E(X') = E(X) + 200 - m = 187,5 - m$. Le jeu est équitable si $E(X') = 0$, c'est-à-dire $m = 187,5$ FCFA.

À RETENIR L'essentiel de la section

- $E(X) = \sum p_i x_i$: gain moyen sur un grand nombre de parties. Jeu équitable si $E(X) = 0$.
- Linéarité : $E(aX + b) = aE(X) + b$.
- Variance : $V(X) = \sum p_i (x_i - E(X))^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$ (König-Huygens, formule de calcul à privilégier).
- Écart-type : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$; il mesure la dispersion dans l'unité de X .
- $V(aX + b) = a^2 V(X)$: la translation ne change pas la dispersion.

5 ÉPREUVE DE BERNOULLI ET SCHÉMA DE BERNOULLI

Dans la section précédente, tu as appris à associer à une expérience aléatoire une **variable aléatoire** X , puis à résumer son comportement par deux nombres : l'**espérance** $E(X)$, qui donne la valeur moyenne attendue, et la **variance** $V(X)$ (ou l'écart-type $\sigma(X)$), qui mesure la dispersion autour de cette moyenne. Nous allons maintenant mettre ces outils au service d'une situation extrêmement fréquente, tant dans la vie courante qu'au Baccalauréat : répéter plusieurs fois la même expérience qui n'a que deux issues possibles. Réussite ou échec à un examen blanc, pièce conforme ou défectueuse à la sortie d'une usine de Brasseries du Cameroun, réponse juste ou fausse à une question de QCM : partout, le même modèle mathématique se cache. Ce modèle porte le nom du mathématicien suisse Jacques Bernoulli.

5.1 Épreuve de Bernoulli et variable de Bernoulli

Intuition. Imagine que tu lances une pièce de monnaie en te demandant simplement : « Pile ou Face ? ». Ou qu'un technicien de CAMTEL teste une ligne téléphonique : « fonctionnelle ou défectueuse ? ». Dans les deux cas, l'expérience n'a que deux issues, et l'une d'elles nous intéresse particulièrement : on l'appelle le **succès**. Toute la richesse du modèle tient dans un seul nombre : la probabilité p du succès.

DÉFINITION Épreuve de Bernoulli

On appelle **épreuve de Bernoulli** toute expérience aléatoire qui ne comporte que deux issues :

- le **succès**, noté S , de probabilité p ;
- l'**échec**, noté $\bar{S}$ (ou E), de probabilité $q = 1 - p$.

Le nombre p (avec $0 \leq p \leq 1$) est appelé le **paramètre** de l'épreuve de Bernoulli.

ATTENTION Deux issues, pas forcément « naturelles »

Une expérience peut avoir plusieurs issues et être ramenée à une épreuve de Bernoulli en regroupant les issues. Par exemple, on lance un dé à six faces et on s'intéresse uniquement à l'événement « obtenir un 6 » : alors $S = \{\text{obtenir un 6}\}$ avec $p = \frac{1}{6}$, et $\bar{S} = \{\text{obtenir 1, 2, 3, 4 ou 5}\}$ avec $q = \frac{5}{6}$. C'est toi qui choisis ce que tu appelles « succès », selon la question posée.

La variable de Bernoulli. À une épreuve de Bernoulli, on associe naturellement une variable aléatoire qui « code » le résultat : 1 si succès, 0 si échec.

DÉFINITION Variable de Bernoulli

La **variable de Bernoulli** X de paramètre p est la variable aléatoire définie par :

$$X = \begin{cases} 1 & \text{en cas de succès} \\ 0 & \text{en cas d'échec} \end{cases} \quad \text{avec } P(X = 1) = p \text{ et } P(X = 0) = 1 - p.$$

On dit que X suit la **loi de Bernoulli** de paramètre p , notée $B(1; p)$.

PROPRIÉTÉ Espérance et variance d'une variable de Bernoulli

Si X suit la loi de Bernoulli de paramètre p , alors :

$$E(X) = p \quad \text{et} \quad V(X) = p(1 - p).$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée (exigible)

On calcule directement à partir des définitions de l'espérance et de la variance.

1. Espérance. La loi de X ne comporte que deux valeurs :

$$E(X) = 1 \times P(X = 1) + 0 \times P(X = 0) = 1 \times p + 0 \times (1 - p) = p.$$

2. Calcul de $E(X^2)$. Comme X ne prend que les valeurs 0 et 1, on a $X^2 = X$ (car $0^2 = 0$ et $1^2 = 1$). Donc :

$$E(X^2) = 1^2 \times p + 0^2 \times (1 - p) = p.$$

3. Variance. On utilise la formule de König-Huygens $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$:

$$V(X) = p - p^2 = p(1 - p).$$

La démonstration est terminée. Retiens la démarche : elle est courte et peut être demandée telle quelle au Baccalauréat.

EXEMPLE Lancer d'un dé

On lance un dé équilibré et on note X la variable qui vaut 1 si on obtient un 6, 0 sinon. Alors X suit la loi de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{6}$, et :

$$E(X) = \frac{1}{6} \approx 0,17 \quad ; \quad V(X) = \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{36} \approx 0,14.$$

5.2 Schéma de Bernoulli : répéter des épreuves identiques et indépendantes

Intuition. Une seule épreuve, c'est peu d'information. Mais si un opérateur de téléphonie teste 20 lignes, si un élève répond à 10 questions d'un QCM, si un contrôleur qualité prélève 50 sachets de lait en poudre à la sortie d'une chaîne de production, alors on répète la même épreuve de Bernoulli, et la question devient : « combien de succès va-t-on obtenir au total ? ». Pour que le modèle soit valable, deux conditions sont indispensables : les épreuves doivent être **identiques** (même probabilité p à chaque fois) et **indépendantes** (le résultat d'une épreuve ne modifie pas les probabilités des suivantes).

DÉFINITION Schéma de Bernoulli

On appelle **schéma de Bernoulli** la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, où n est un entier naturel non nul. À chaque épreuve, la probabilité du succès est la même, égale à p .


MÉTHODE Justifier qu'une situation est un schéma de Bernoulli

Pour pouvoir utiliser ce modèle (et, dans la section suivante, la loi binomiale), tu dois rédiger une justification en trois points :

1. Deux issues. Chaque épreuve élémentaire n'a que deux issues : succès S de probabilité p , échec de probabilité $1 - p$. Précise clairement ce que tu appelles succès.
2. Même probabilité. Les épreuves sont identiques : la probabilité p du succès est la même à chaque répétition.
3. Indépendance. Les épreuves sont indépendantes : le résultat de l'une n'influence pas les autres. C'est souvent ici que se joue la validité du modèle (tirages avec remise, grande population, etc.).

Conclusion type à rédiger : « On répète n fois, de façon identique et indépendante, une épreuve de Bernoulli de paramètre p : il s'agit donc d'un schéma de Bernoulli de paramètres n et p . »

Modélisation par un arbre. Un schéma de Bernoulli se représente par un arbre à n niveaux : à chaque niveau, deux branches (S de poids p , $\bar{S}$ de poids $q = 1 - p$). Grâce à l'indépendance, la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités rencontrées le long de ce chemin. Un chemin qui contient exactement k succès et $n - k$ échecs a donc pour probabilité $p^k(1-p)^{n-k}$, quel que soit l'ordre des succès. Il reste à compter combien de chemins contiennent exactement k succès : c'est le nombre de façons de choisir les positions des k succès parmi les n épreuves, c'est-à-dire le coefficient binomial $\binom{n}{k}$.



Arbre d'un schéma de Bernoulli à $n = 3$ épreuves. Les trois chemins épais et orangés contiennent exactement $k = 2$ succès : il y en a $\binom{3}{2} = 3$, chacun de probabilité p^2q .

À RETENIR Compter les chemins

Dans un schéma de Bernoulli à n épreuves, le nombre de chemins de l'arbre contenant exactement k succès est :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Chacun de ces chemins a pour probabilité $p^k(1-p)^{n-k}$. Cette observation est la clé de la loi binomiale, que nous étudierons dans la section suivante.

EXEMPLE Vérification sur l'arbre à 3 épreuves

Pour $n = 3$, les chemins à 2 succès sont $(S, S, \bar{S})$, $(S, \bar{S}, S)$ et $(\bar{S}, S, S)$: on retrouve bien $\binom{3}{2} = 3$ chemins, chacun de probabilité $p \times p \times q = p^2q$. La probabilité d'obtenir exactement 2 succès est donc $3p^2q$. Par exemple, avec $p = 0,5$ (pièce équilibrée), elle vaut $3 \times 0,25 \times 0,5 = 0,375$.

5.3 Reconnaître (ou rejeter) un schéma de Bernoulli

Exemples où le modèle s'applique.

- **Tirages avec remise.** On tire une boule dans une urne, on note le résultat, on la remet, et on recommence. L'urne est dans le même état à chaque tirage : épreuves identiques et indépendantes.
- **Contrôle qualité en grande série.** Une usine produit des milliers de pièces par jour ; on en prélève n au hasard. Même si le prélèvement se fait techniquement sans remise, le prélèvement de quelques pièces ne modifie pratiquement pas la proportion de défectueuses : on assimile à des tirages avec remise (voir la discussion ci-dessous).
- **Réponses au hasard à un QCM.** Un candidat répond au hasard et indépendamment à chaque question : chaque question est une épreuve de Bernoulli dont le paramètre dépend du nombre d'options proposées.

EXERCICE RÉSOLU 8**Un élève répond au hasard à un QCM**

Un élève répond complètement au hasard à un QCM de 10 questions. Chaque question propose 2 options, dont une seule est correcte. Justifier que le nombre X de bonnes réponses relève d'un schéma de Bernoulli, et préciser ses paramètres. Quelle est la probabilité qu'il obtienne exactement 5 bonnes réponses ?

SOLUTION

Solution.

1. Deux issues. Pour chaque question, deux issues : succès S « la réponse est correcte » de probabilité $p = \frac{1}{2}$ (une option correcte parmi 2, choix au hasard), ou échec de probabilité $1 - p = \frac{1}{2}$.
2. Épreuves identiques. Chaque question a la même structure (2 options, réponse au hasard) : $p = \frac{1}{2}$ à chaque épreuve.
3. Indépendance. L'élève répond au hasard à chaque question sans tenir compte des réponses précédentes : les épreuves sont indépendantes.

On répète donc $n = 10$ fois, de façon identique et indépendante, une épreuve de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{2}$: c'est un schéma de Bernoulli de paramètres $n = 10$ et $p = \frac{1}{2}$.

Pour obtenir exactement 5 bonnes réponses, il faut choisir les 5 questions réussies parmi 10 : il y a $\binom{10}{5} = 252$ chemins, chacun de probabilité $\left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \left(\frac{1}{2}\right)^{10}$. Donc :

$$P(X = 5) = \binom{10}{5} \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \frac{252}{1024} \approx 0,246.$$

L'élève a environ 24,6 % de chances d'obtenir exactement la moyenne en répondant au hasard.

Contre-exemple : les tirages sans remise. Une urne contient 4 boules rouges et 6 boules noires. On tire une première boule : la probabilité qu'elle soit rouge est $\frac{4}{10} = 0,4$. Si on ne la remet

pas et qu'elle était rouge, la probabilité de tirer une rouge au deuxième tirage devient $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$; si elle était noire, elle devient $\frac{4}{9}$. La probabilité du succès dépend du résultat précédent : les épreuves ne sont ni identiques ni indépendantes. Ce n'est **pas** un schéma de Bernoulli.

ATTENTION Erreur fréquente : appliquer la loi binomiale à des tirages sans remise

C'est l'un des pièges classiques du Baccalauréat. Avant d'écrire « X suit une loi binomiale », vérifie impérativement l'indépendance des épreuves. Des tirages sans remise dans une petite population ne constituent pas un schéma de Bernoulli : dans ce cas, il faut revenir aux probabilités conditionnelles et à l'arbre pondéré, ou au dénombrement direct. Appliquer la formule binomiale sans justification fait perdre des points, même si le calcul numérique est correct.

Discussion nuancée : quand peut-on assimiler à des tirages avec remise ? Supposons maintenant qu'un contrôleur prélève 10 sachets dans un stock de 10 000 sachets dont 5 % sont défectueux, sans remise. Après le premier tirage d'un sachet défectueux, la proportion passe de $\frac{500}{10\,000} = 0,05$ à $\frac{499}{9\,999} \approx 0,0499$: la variation est négligeable. Lorsque la taille de la population est très grande devant le nombre de tirages, les épreuves sont quasi indépendantes et on assimile les tirages sans remise à des tirages avec remise : le schéma de Bernoulli (et donc la loi binomiale) devient une excellente approximation. C'est exactement ce qui justifie le contrôle qualité en grande série évoqué plus haut, et c'est une formulation souvent attendue dans les sujets du Bac : « la population étant très grande, on assimile ce prélèvement à un tirage avec remise ».

LE SAVAIS-TU ? Jacques Bernoulli et la loi des grands nombres

Jacques Bernoulli (1654–1705), membre d'une illustre famille de mathématiciens suisses, a consacré vingt ans à son ouvrage *Ars Conjectandi*, publié après sa mort en 1713. Il y démontre la première version de la loi des grands nombres : quand on répète un schéma de Bernoulli un très grand nombre de fois, la fréquence observée du succès se rapproche de la probabilité p . C'est le fondement théorique des sondages : interroger 1 000 électeurs choisis au hasard permet d'estimer une intention de vote à l'échelle de tout le Cameroun, avec une marge d'erreur que les mathématiques savent quantifier.

EXERCICE 5 À toi de jouer

Une entreprise de Douala produit des câbles électriques. On estime que 2 % des câbles présentent un défaut. On prélève au hasard 20 câbles dans la production journalière, très importante.

1. Justifier que le nombre X de câbles défectueux dans le prélèvement relève d'un schéma de Bernoulli dont on précisera les paramètres.

- Combien de chemins de l'arbre (théorique) conduisent à exactement 2 câbles défectueux ?
- Écrire, sans la calculer, la probabilité d'obtenir exactement 2 câbles défectueux.

CORRIGÉ Exercice : câbles électriques

- Chaque câble prélevé donne lieu à une épreuve à deux issues : succès S « le câble est défectueux » de probabilité $p = 0,02$, ou échec de probabilité $0,98$. La production étant très importante, on assimile le prélèvement à 20 tirages avec remise : les épreuves sont identiques et indépendantes. C'est donc un schéma de Bernoulli de paramètres $n = 20$ et $p = 0,02$.
- Le nombre de chemins contenant exactement 2 succès est $\binom{20}{2} = \frac{20 \times 19}{2} = 190$.
- Chaque chemin à 2 succès a pour probabilité $(0,02)^2 \times (0,98)^{18}$, donc :

$$P(X = 2) = \binom{20}{2} (0,02)^2 (0,98)^{18} = 190 \times (0,02)^2 \times (0,98)^{18}.$$

Tu sais désormais reconnaître, justifier et représenter un schéma de Bernoulli. Dans la section suivante, nous exploiterons le comptage des chemins par les coefficients $\binom{n}{k}$ pour définir la **loi binomiale** et en donner les formules d'espérance et de variance, qui te permettront de résoudre efficacement les problèmes du Baccalauréat.

6 LOI BINOMIALE ET APPLICATIONS

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître un **schéma de Bernoulli** : la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, chacune ayant une probabilité p de succès. Nous avons compté les chemins d'un arbre pour calculer, par exemple, la probabilité d'obtenir exactement deux succès en trois épreuves. Mais que faire si l'on répète l'épreuve 10, 50 ou 1000 fois ? Dessiner l'arbre devient impossible. C'est précisément là qu'intervient la **loi binomiale** : elle fournit une formule directe qui remplace l'arbre. Cette loi est l'un des outils les plus utilisés de la vie courante : contrôle qualité dans une usine des Brasseries du Cameroun, sondage d'opinion avant une élection, efficacité d'un vaccin dans un centre de santé de Yaoundé. Cette section te donne la maîtrise complète de cet outil, très fréquent au Baccalauréat.

6.1 Définition de la loi binomiale

Reprenons la situation générale. On répète n fois, de façon identique et indépendante, une épreuve de Bernoulli de probabilité de succès p . À l'issue des n épreuves, on s'intéresse au

nombre total de succès obtenus. Ce nombre est aléatoire : il peut valoir 0 (aucun succès), 1, 2, ..., jusqu'à n (que des succès). C'est donc une variable aléatoire, et sa loi porte un nom.

DÉFINITION Loi binomiale

Soit n un entier naturel non nul et p un réel de $[0; 1]$. On considère un schéma de Bernoulli de n épreuves, de probabilité de succès p . La variable aléatoire X qui compte le **nombre de succès** obtenus au cours des n épreuves suit la **loi binomiale** de paramètres n et p . On note :

$$X \hookrightarrow B(n; p).$$

Les valeurs prises par X sont les entiers $0, 1, 2, \dots, n$.

EXEMPLE Reconnaître une loi binomiale

Un opérateur téléphonique constate qu'un appel passé en heure de pointe aboutit avec une probabilité 0,8, indépendamment des autres appels. Un client passe 10 appels. La variable X qui compte le nombre d'appels aboutis suit la loi $B(10; 0,8)$: $n = 10$ répétitions identiques et indépendantes, succès « l'appel aboutit » de probabilité $p = 0,8$.

ATTENTION Vérifier les conditions avant d'écrire $B(n; p)$

On ne peut invoquer la loi binomiale que si les trois conditions sont réunies : (1) même épreuve répétée n fois ; (2) deux issues seulement (succès/échec) ; (3) indépendance des épreuves. En particulier, un tirage sans remise dans une petite population n'est pas un schéma de Bernoulli. En revanche, un tirage avec remise, ou un prélèvement dans une très grande population (que l'on assimile alors à un tirage avec remise), convient. Au Baccalauréat, cette justification doit être rédigée explicitement : elle vaut des points.

6.2 Formule de la loi binomiale

PROPRIÉTÉ Formule de la loi binomiale

Si $X \hookrightarrow B(n; p)$, alors pour tout entier k tel que $0 \leq k \leq n$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k},$$

où $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ est le nombre de façons de choisir k positions parmi n .

Cette formule n'est pas tombée du ciel : elle se comprend entièrement grâce à l'arbre de probabilités. Suivons le raisonnement, dont la justification est exigible au Baccalauréat.

EXPÉRIENCE Pourquoi la formule est-elle vraie ?

Plaçons-nous dans un schéma de Bernoulli à n épreuves, avec p la probabilité de succès et $q = 1 - p$ celle d'échec.

1. Probabilité d'un chemin. Réaliser l'événement « $X = k$ », c'est suivre un chemin de l'arbre comportant exactement k succès et $n - k$ échecs. Par indépendance des épreuves, la probabilité d'un tel chemin est le produit des probabilités rencontrées le long des branches : k facteurs p et $n - k$ facteurs q , soit $p^k q^{n-k}$. Tous les chemins à k succès ont donc la même probabilité.
2. Combien de tels chemins ? Un chemin à k succès est entièrement déterminé par le choix des positions des k succès parmi les n épreuves. Il y a exactement $\binom{n}{k}$ tels choix, donc $\binom{n}{k}$ chemins.
3. Conclusion. L'événement « $X = k$ » est la réunion de $\binom{n}{k}$ événements (chemins) deux à deux incompatibles, chacun de probabilité $p^k q^{n-k}$. D'où :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

EXEMPLE Application directe

Reprenons les appels téléphoniques : $X \hookrightarrow B(10 ; 0,8)$. La probabilité qu'exactly 7 appels sur 10 aboutissent est :

$$P(X = 7) = \binom{10}{7} (0,8)^7 (0,2)^3 = 120 \times 0,2097 \times 0,008 \approx 0,201.$$

Il y a environ 20 % de chances qu'exactly 7 appels sur 10 aboutissent.

ATTENTION Les deux erreurs classiques au Bac

- Oublier le coefficient $\binom{n}{k}$. Écrire $P(X = k) = p^k (1 - p)^{n-k}$ ne donne que la probabilité d'un seul chemin (par exemple « les k premières épreuves sont des succès »). C'est l'erreur la plus fréquente : le coefficient binomial compte tous les chemins favorables.
- Intervertir les exposants. L'exposant de p est k (le nombre de succès), celui de $1 - p$ est $n - k$ (le nombre d'échecs). Vérifie toujours que la somme des exposants vaut n .

Puisque X est une variable aléatoire, la somme des probabilités de toutes ses valeurs doit valoir

1. Vérifions-le : c'est une magnifique application de la formule du binôme de Newton, vue dans le chapitre sur le dénombrement.

EXPÉRIENCE Vérification que $\sum_{k=0}^n P(X = k) = 1$

Rappelons la formule du binôme de Newton : pour tous réels a et b ,

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Appliquons-la avec $a = p$ et $b = 1 - p$:

$$\sum_{k=0}^n P(X = k) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = (p + (1-p))^n = 1^n = 1.$$

La loi binomiale est donc bien une loi de probabilité. Retiens le lien profond : le nom « binomiale » vient précisément du binôme de Newton, et les coefficients $\binom{n}{k}$ sont ceux du triangle de Pascal.

6.3 Espérance et variance de la loi binomiale

PROPRIÉTÉ Espérance et variance — résultats admis

Si $X \hookrightarrow B(n; p)$, alors :

$$E(X) = np \quad \text{et} \quad V(X) = np(1-p), \quad \text{donc} \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}.$$

Ces formules sont admises au programme de Terminale ; leur démonstration n'est pas exigible.

L'intuition derrière $E(X) = np$ est limpide : si chaque épreuve réussit en moyenne une proportion p du temps, alors sur n épreuves on attend en moyenne $n \times p$ succès. Sur 10 appels qui aboutissent 8 fois sur 10, on « attend » $10 \times 0,8 = 8$ appels aboutis : c'est exactement le bon sens.

EXEMPLE Vérification numérique sur un petit cas

Prenons $X \hookrightarrow B(2; 0,5)$ (deux lancers d'une pièce équilibrée, X = nombre de « Pile »). La loi de X , calculée avec la formule, est :

k	0	1	2
$P(X = k)$	0,25	0,5	0,25

Calculons l'espérance « à la main » : $E(X) = 0 \times 0,25 + 1 \times 0,5 + 2 \times 0,25 = 1$. La formule donne

$np = 2 \times 0,5 = 1$: accord parfait. Pour la variance : $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = (0 \times 0,25 + 1 \times 0,5 + 4 \times 0,25) - 1^2 = 1,5 - 1 = 0,5$, et la formule donne $np(1-p) = 2 \times 0,5 \times 0,5 = 0,5$. Les formules admises sont bien cohérentes avec les définitions.

6.4 Calculs types avec la loi binomiale

Au Baccalauréat, trois types de questions reviennent sans cesse. Voici la stratégie pour chacun.

MÉTHODE Les trois calculs types

Soit $X \hookrightarrow B(n; p)$.

1. Probabilité d'une valeur exacte : appliquer directement la formule $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.
2. Probabilité cumulée $P(X \leq k)$: additionner les probabilités $P(X = 0) + P(X = 1) + \dots + P(X = k)$. Il n'y a pas de raccourci : on calcule chaque terme puis on somme. De même, $P(X \geq k) = P(X = k) + \dots + P(X = n)$, ou encore $1 - P(X \leq k-1)$ si cela demande moins de calculs.
3. Probabilité « au moins un succès » : passer par l'événement contraire. L'événement « $X \geq 1$ » a pour contraire « $X = 0$ » (aucun succès, c'est-à-dire n échecs), d'où :

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1-p)^n.$$

Cette astuce transforme une somme de n termes en un seul calcul : utilise-la systématiquement dès que tu lis « au moins un ».

EXERCICE RÉSOLU 9 Contrôle qualité dans une usine

Une machine d'une usine de conditionnement à Douala produit 2 % de pièces défectueuses. On prélève au hasard un lot de 50 pièces dans la production (la production est suffisamment importante pour assimiler le prélèvement à un tirage avec remise). On note X le nombre de pièces défectueuses dans le lot.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.
2. Calculer la probabilité que le lot contienne au plus une pièce défectueuse (arrondir à 10^{-3}).
3. Quel est le nombre moyen de pièces défectueuses attendu par lot ?

SOLUTION

1. Chaque pièce prélevée est une épreuve de Bernoulli : succès « la pièce est défectueuse

» de probabilité $p = 0,02$. On répète $n = 50$ épreuves, identiques et indépendantes (prélèvement assimilé à un tirage avec remise). Donc $X \hookrightarrow B(50; 0,02)$.

2. « Au plus une pièce défectueuse » signifie $X \leq 1$, c'est-à-dire $X = 0$ ou $X = 1$:

$$P(X = 0) = \binom{50}{0} (0,02)^0 (0,98)^{50} = (0,98)^{50} \approx 0,3642,$$

$$P(X = 1) = \binom{50}{1} (0,02)^1 (0,98)^{49} = 50 \times 0,02 \times (0,98)^{49} \approx 0,3716.$$

Donc $P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) \approx 0,3642 + 0,3716 \approx 0,736$. Il y a environ 73,6 % de chances qu'un lot de 50 pièces contienne au plus une pièce défectueuse.

3. Le nombre moyen attendu est l'espérance : $E(X) = np = 50 \times 0,02 = 1$. En moyenne, on attend une pièce défectueuse par lot de 50 pièces.

6.5 Représentation graphique et forme de la loi

Représentons la loi binomiale par un diagramme en barres : en abscisse les valeurs k , en ordonnée les probabilités $P(X = k)$. Voici la loi $B(10; 0,3)$.





Diagramme en barres de la loi $B(10; 0,3)$. Le maximum est atteint en $k = 3 = E(X)$: les valeurs les plus probables se concentrent autour de l'espérance.

On observe que la barre la plus haute correspond à $k = 3$, précisément l'espérance $np = 10 \times 0,3 = 3$. Ce n'est pas un hasard : la loi binomiale se concentre toujours autour de son espérance. Observons maintenant l'effet du paramètre p en comparant deux lois à $n = 20$ fixé.



Comparaison des lois $B(20; 0,5)$ et $B(20; 0,1)$. Pour $p = 0,5$, la loi est symétrique en forme de cloche centrée sur $np = 10$; pour $p = 0,1$, elle est décalée vers la gauche, centrée sur $np = 2$.

À RETENIR Lecture graphique de la loi binomiale

- Le diagramme en barres de $B(n; p)$ est centré autour de l'espérance np .
- Pour $p = 0,5$, le diagramme est symétrique et présente une forme en cloche.
- Pour p proche de 0 (respectivement de 1), le diagramme est décalé vers les petites (respectivement grandes) valeurs de k : il est asymétrique.
- Quand n grandit, la forme en cloche devient de plus en plus régulière : c'est l'embryon de la fameuse courbe en cloche (loi normale) que tu rencontreras dans les études supérieures.

6.6 Applications de la loi binomiale

La loi binomiale intervient dès qu'on répète une même observation à deux issues. Voici les grands domaines d'application, avec des situations que tu peux rencontrer au Baccalauréat comme dans la vie.

Contrôle qualité. C'est l'exemple traité plus haut : un fabricant teste un échantillon de produits et décide d'accepter ou de rejeter un lot selon le nombre de pièces défectueuses. La règle de décision (« rejeter le lot si $X \geq 2$ ») repose entièrement sur des calculs binomiaux.

Sondages. Avant une élection, un institut interroge $n = 1000$ personnes. Si la proportion réelle d'électeurs favorables à un candidat est p , le nombre X de réponses favorables suit approximativement $B(1000; p)$. On attend $E(X) = 1000p$ réponses favorables, avec un écart-type $\sqrt{1000p(1-p)}$ qui mesure la marge d'erreur du sondage.

Jeux de hasard. Un joueur mise n fois de suite à un jeu où sa probabilité de gain est p . Son nombre

de gains suit $B(n; p)$. La probabilité de gagner au moins une fois est $1 - (1 - p)^n$: c'est elle qui explique pourquoi « jouer souvent augmente les chances de gagner au moins une fois », tout en rappelant que l'espérance de gain reste généralement défavorable.

Médecine. Un traitement guérit une maladie avec une probabilité $p = 0,9$. Administré à $n = 20$ patients (guérisons supposées indépendantes), le nombre de guérisons suit $B(20; 0,9)$. On attend $E(X) = 18$ guérisons, et la probabilité que tous les patients guérissent est $P(X = 20) = 0,9^{20} \approx 0,12$: seulement 12 %, alors que chaque patient a 90 % de chances de guérir ! Ce genre de calcul aide les médecins et les épidémiologistes à évaluer l'efficacité réelle d'un traitement ou d'une campagne de vaccination.

LESAVAIS-TU ? La loi binomiale, pilier des sondages modernes

C'est Jacques Bernoulli (1654–1705) qui, dans son ouvrage *Ars Conjectandi*, a posé les fondations mathématiques de ces situations répétées — d'où le nom « épreuve de Bernoulli ». Trois siècles plus tard, la même formule $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ est utilisée chaque jour : par les instituts de sondage pour annoncer « ce candidat est crédité de 52 % des intentions de vote, à plus ou moins 3 points près », par les opérateurs comme MTN ou Orange Cameroun pour dimensionner leurs réseaux (combien d'abonnés appelleront simultanément ?), et par les laboratoires pharmaceutiques pour décider si un nouveau médicament est réellement efficace. Maîtriser la loi binomiale, c'est comprendre la logique cachée derrière tous ces chiffres.

EXERCICE 6 Pour t'entraîner

Un vaccin est efficace dans 95 % des cas. On vaccine 30 personnes d'un quartier de Ba-foussam (efficacités supposées indépendantes). On note X le nombre de personnes pour lesquelles le vaccin est efficace.

1. Quelle loi suit X ? Préciser les paramètres.
2. Calculer la probabilité que le vaccin soit efficace pour exactement 28 personnes (arrondir à 10^{-3}).
3. Calculer la probabilité que le vaccin soit inefficace pour au moins une personne.
4. Combien de personnes peut-on espérer voir protégées ?

CORRIGÉ Exercice

1. On répète $n = 30$ épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, de probabilité de succès $p = 0,95$ (« le vaccin est efficace »). Donc $X \hookrightarrow B(30; 0,95)$.
2. $P(X = 28) = \binom{30}{28} (0,95)^{28} (0,05)^2 = 435 \times (0,95)^{28} \times 0,0025$. Or $(0,95)^{28} \approx 0,2377$, donc $P(X = 28) \approx 435 \times 0,2377 \times 0,0025 \approx 0,259$.
3. « Inefficace pour au moins une personne » est le contraire de « efficace pour les 30 per-

sonnes » :

$$P(X \leq 29) = 1 - P(X = 30) = 1 - (0,95)^{30} \approx 1 - 0,2146 \approx 0,785.$$

Il y a donc environ 78,5 % de chances qu'au moins une personne ne soit pas protégée, malgré une efficacité individuelle de 95 %.

4. $E(X) = np = 30 \times 0,95 = 28,5$: on peut espérer qu'environ 28 à 29 personnes soient protégées.

À RETENIR L'essentiel de la section

- X compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli à n épreuves de paramètre p : $X \hookrightarrow B(n; p)$.
- Formule fondamentale : $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$, pour $k = 0, 1, \dots, n$. Le coefficient $\binom{n}{k}$ compte les chemins de l'arbre à k succès.
- Espérance et variance (admisses) : $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$, d'où $\sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}$.
- Réflexe « au moins un » : $P(X \geq 1) = 1 - (1 - p)^n$.
- Le diagramme en barres est centré sur np , en forme de cloche symétrique quand $p = 0,5$.

7 PROBABILITÉS CONDITIONNELLES ET PROBABILITÉS TOTALES

Dans la leçon commune, tu as appris à calculer des probabilités par équiprobabilité, à utiliser les arbres et à reconnaître un schéma de Bernoulli. Mais dans la vie réelle, l'information arrive souvent progressivement : un test de dépistage est positif, un client a déjà attendu dix minutes, la première carte tirée est un as. Comment cette information modifie-t-elle la probabilité d'un événement ? C'est toute la question des **probabilités conditionnelles**.

7.1 Probabilité conditionnelle : définition et intuition

EXPÉRIENCE Une intuition pour commencer

Dans une classe de Terminale D de 40 élèves, 18 sont des filles et 12 élèves portent des lunettes, dont 5 filles. On choisit un élève au hasard. La probabilité qu'il porte des lunettes est $\frac{12}{40} = 0,3$. Mais si l'on sait que l'élève choisi est une fille, l'univers se réduit aux 18 filles : la probabilité devient $\frac{5}{18} \approx 0,28$. L'information « c'est une fille » a changé la probabilité. On note $P_F(L) = \frac{5}{18}$: probabilité de L sachant F .

DÉFINITION Probabilité conditionnelle

Soit A et B deux événements d'un univers Ω , avec $P(A) \neq 0$. On appelle **probabilité de B sachant A** le nombre

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

On le note aussi $P(B | A)$. Il se lit : « probabilité que B se réalise, sachant que A est réalisé ».

ATTENTION Ne pas confondre $P_A(B)$ et $P_B(A)$

En général $P_A(B) \neq P_B(A)$. Dans l'exemple de la classe : $P_F(L) = \frac{5}{18}$ (lunettes sachant fille), mais $P_L(F) = \frac{5}{12}$ (fille sachant lunettes). Vérifie toujours quel événement est la condition : c'est celui qui est déjà réalisé, celui qui réduit l'univers.

PROPRIÉTÉ Probabilités composées

Pour tous événements A et B avec $P(A) \neq 0$:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B).$$


C'est une simple réécriture de la définition, mais c'est la règle qui justifie la multiplication des probabilités le long des branches d'un arbre. Elle se généralise à n événements :

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \times P_{A_1}(A_2) \times \dots \times P_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n).$$

7.2 L'arbre pondéré : l'outil de calcul

MÉTHODE Construire et exploiter un arbre pondéré

1. Identifier l'ordre chronologique ou logique des événements : la première ramification porte sur la condition, la seconde sur l'événement conditionné.
2. Inscrire sur chaque branche la probabilité correspondante (probabilité conditionnelle à partir du deuxième niveau).
3. Règle 1 : la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités de ses branches.
4. Règle 2 : la probabilité d'un événement réalisé par plusieurs chemins est la somme des probabilités de ces chemins.
5. Vérifier que la somme des probabilités issues d'un même nœud vaut 1.



Arbre pondéré à deux niveaux : chaque chemin donne une intersection (probabilité indiquée en bout de branche), par exemple $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.

7.3 Système complet et formule des probabilités totales

DÉFINITION Système complet d'événements

Des événements $A_1, A_2, \dots, A_n$ forment un **système complet** (ou une partition de Ω) s'ils sont deux à deux incompatibles ($A_i \cap A_j = \emptyset$ pour $i \neq j$) et si leur réunion est Ω ($\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$). Le cas le plus utilisé est le couple $(A, \bar{A})$.

PROPRIÉTÉ Formule des probabilités totales

Si $(A_1, \dots, A_n)$ est un système complet avec $P(A_i) \neq 0$ pour tout i , alors pour tout événement B :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \times P_{A_i}(B).$$

Dans le cas particulier $(A, \bar{A})$:

$$P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B).$$

Sur l'arbre, c'est exactement la règle 2 : on additionne les probabilités de tous les chemins menant à B .

PROPRIÉTÉ Formule de Bayes (ou formule des causes)

Dans les mêmes conditions, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $P(B) \neq 0$:

$$P_B(A_k) = \frac{P(A_k) \times P_{A_k}(B)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) \times P_{A_i}(B)}.$$

Elle permet de « remonter l'arbre » : connaître la probabilité d'une cause A_k sachant l'effet B observé.

EXERCICE RÉSOLU 10 Test de dépistage d'une maladie

Dans une région, 2 % de la population est atteinte d'une maladie M . Un test de dépistage est positif chez 95 % des malades et chez 3 % des non-malades. On note T : « le test est positif ». Calculer la probabilité qu'une personne choisie au hasard ait un test positif. Si le test est positif, quelle est la probabilité que la personne soit réellement malade ?

SOLUTION

Le couple $(M, \bar{M})$ forme un système complet. Les données sont : $P(M) = 0,02$, $P_M(T) = 0,95$, $P_{\bar{M}}(T) = 0,03$. D'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(T) &= P(M) \times P_M(T) + P(\bar{M}) \times P_{\bar{M}}(T) \\ &= 0,02 \times 0,95 + 0,98 \times 0,03 \\ &= 0,019 + 0,0294 = 0,0484. \end{aligned}$$

La probabilité d'un test positif est donc 0,0484, soit environ 4,84 %. Pour la seconde question, on utilise la formule de Bayes :

$$P_T(M) = \frac{P(M \cap T)}{P(T)} = \frac{P(M) \times P_M(T)}{P(T)} = \frac{0,019}{0,0484} \approx 0,3926.$$

Remarque : malgré un test performant, la probabilité d'être malade sachant un test positif n'est que d'environ 39 % ! C'est le paradoxe bien connu des maladies rares (faible prévalence).

EXEMPLE Fiabilité d'une ligne de transmission

Un message envoyé par un centre CAMTEL transite par deux relais. Le premier relais fonctionne avec probabilité 0,9 ; s'il fonctionne, le message est transmis correctement avec probabilité 0,98 ; s'il tombe en panne, le message est perdu. La probabilité de transmission correcte est

$$P(T) = 0,9 \times 0,98 + 0,1 \times 0 = 0,882.$$

LE SAVAIS-TU ? Le paradoxe du dépistage et le filtrage anti-spam

Le contre-exemple du test médical (maladie rare $\Rightarrow$ beaucoup de faux positifs) est le même mécanisme que les filtres anti-spam d'Orange Cameroun ou MTN. Si 1 % des mails sont des spams et que le filtre a 99 % de détection mais 5 % de faux positifs, un mail classé « spam » n'a que ≈ 17 % de chances d'être un vrai spam. C'est pourquoi les dossiers « indésirables » contiennent souvent des mails légitimes : le filtre privilégie la sécurité (ne pas rater un spam) au détriment de la précision.

ATTENTION Pièges fréquents

- La formule des probabilités totales exige un système complet : vérifie que les événements de la partition sont incompatibles et recouvrent tout Ω .
- Sur un arbre, n'additionne jamais les probabilités le long d'un même chemin : on mul-

multiplie le long d'un chemin, on additionne entre chemins distincts.

- $P_A(B)$ n'est définie que si $P(A) \neq 0$: mentionne cette condition dans ta rédaction au Bac.
- Pour Bayes, ne confonds pas $P_A(B)$ (donnée directe, souvent fiabilité d'un test) et $P_B(A)$ (cherchée, probabilité a posteriori).

EXERCICE 7 Contrôle qualité à la SABC

Une usine remplit des bouteilles avec deux machines : M_1 produit 60 % des bouteilles dont 1 % sont défectueuses ; M_2 produit le reste dont 2 % sont défectueuses. On prélève une bouteille au hasard.

1. Construire l'arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité qu'elle soit défectueuse.
3. Sachant qu'elle est défectueuse, quelle est la probabilité qu'elle provienne de M_1 ?

CORRIGÉ Exercice : contrôle qualité

1. Premier niveau (machine) : $P(M_1) = 0,6$, $P(M_2) = 0,4$. Second niveau (défaut D) : $P_{M_1}(D) = 0,01$, $P_{M_1}(\bar{D}) = 0,99$; $P_{M_2}(D) = 0,02$, $P_{M_2}(\bar{D}) = 0,98$. Les feuilles de l'arbre portent $P(M_1 \cap D) = 0,006$, $P(M_1 \cap \bar{D}) = 0,594$, $P(M_2 \cap D) = 0,008$, $P(M_2 \cap \bar{D}) = 0,392$.
2. Probabilités totales : $P(D) = 0,6 \times 0,01 + 0,4 \times 0,02 = 0,006 + 0,008 = 0,014$.
3. Formule de Bayes : $P_D(M_1) = \frac{P(M_1 \cap D)}{P(D)} = \frac{0,006}{0,014} = \frac{3}{7} \approx 0,4286$.

À RETENIR L'essentiel du complément

- $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ pour $P(A) \neq 0$; donc $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.
- Sur un arbre pondéré : produit le long d'un chemin, somme entre les chemins.
- Formule des probabilités totales : $P(B) = \sum P(A_i)P_{A_i}(B)$, (A_i) système complet.
- Formule de Bayes : $P_B(A_k) = \frac{P(A_k)P_{A_k}(B)}{\sum P(A_i)P_{A_i}(B)}$ (remonter l'arbre).

8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

9 LEÇON M11 : PROBABILITÉS, VARIABLES ALÉATOIRES ET LOI BINOMIALE

9.1 Activité d'intégration : La tombola du quartier Deïdo

9.2 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- modéliser une situation concrète de la vie courante (une tombola de quartier) à l'aide d'une **variable aléatoire** et de sa **loi de probabilité** ;
- calculer une **espérance mathématique** et l'interpréter pour juger si un jeu est équitable, favorable ou défavorable ;
- reconnaître et justifier un **schéma de Bernoulli**, puis utiliser la **loi binomiale** pour calculer une probabilité et un nombre moyen de succès ;
- discuter de manière critique une hypothèse de modélisation (tirages avec ou sans remise) ;
- rédiger une conclusion argumentée permettant de prendre une décision : conseiller ou déconseiller l'achat de billets de tombola.

9.3 Situation

La tombola du quartier Deïdo, à Douala.

Pour financer la réfection du terrain de football du quartier, l'association des jeunes de Deïdo organise une grande tombola lors de la fête de fin d'année. Voici les conditions du jeu, affichées sur la banderole devant le foyer culturel :

- 500 billets numérotés de 1 à 500 sont mis en vente, au prix de 500 FCFA l'unité ;
- le tirage aura lieu en public, dans un sac opaque contenant les 500 numéros ; chaque numéro a la même chance d'être tiré ;
- **10 billets gagnants** donnent droit à un lot d'une valeur de 5000 FCFA chacun (sacs de riz, bons d'achat chez le commerçant du coin) ;
- **1 billet gagnant** donne droit au gros lot : 50000 FCFA en espèces ;
- les 11 numéros gagnants sont tirés successivement et sont tous distincts : un même billet ne peut pas gagner deux lots.

Mama Ngo Bell, qui tient une boutique de provisions face au marché, hésite : son neveu, élève en Terminale C au lycée de Deïdo, lui propose d'acheter 20 billets « pour augmenter ses chances ». Elle se pose trois questions :

1. Si j'achète un seul billet, combien puis-je espérer gagner en moyenne ? Le jeu est-il équitable ?
2. L'association est-elle sûre de gagner de l'argent, et combien ?
3. Si j'achète 20 billets, quelle est la probabilité que je gagne au moins un lot ? Combien de lots puis-je espérer remporter en moyenne ?

Par groupes de quatre, vous allez aider Mama Ngo Bell à prendre sa décision, en mobilisant tous les outils de la leçon : équiprobabilité, loi d'une variable aléatoire, espérance, schéma de Bernoulli et loi binomiale.

9.4 Consignes

Partie A — Le point de vue de l'acheteur d'un billet.

1. On choisit au hasard un billet parmi les 500. Justifier que l'on est en situation d'**équiprobabilité**.
2. On note X la variable aléatoire égale au gain algébrique de l'acheteur d'un billet, c'est-à-dire la valeur du lot reçu moins le prix du billet. Déterminer les valeurs prises par X .
3. Déterminer la loi de probabilité de X (on présentera les résultats dans un tableau). Vérifier que la somme des probabilités vaut 1.
4. Calculer l'espérance $E(X)$. Interpréter le résultat : que perd (ou gagne) en moyenne un joueur qui achèterait un billet à un très grand nombre de tombolas identiques ? Le jeu est-il équitable ?

Partie B — Le point de vue de l'association.

5. Calculer la recette totale de la vente des billets et le coût total des lots distribués. En déduire le bénéfice de l'association. Ce bénéfice est-il certain ou aléatoire ? Justifier.
6. Retrouver le lien entre le bénéfice par billet de l'association et l'espérance $E(X)$ calculée à la question 4.

Partie C — Le commerçant qui achète 20 billets.

Mama Ngo Bell achète finalement 20 billets. On s'intéresse au nombre Y de lots qu'elle remporte.

7. Expliquer pourquoi, rigoureusement, les 20 billets ne constituent pas des épreuves indépendantes (les numéros gagnants sont tirés sans remise).
8. Pour simplifier, on assimile la situation à 20 tirages avec remise, chaque billet ayant une probabilité $p = \frac{11}{500}$ d'être gagnant. Justifier alors que Y suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Pourquoi cette approximation est-elle raisonnable ici ?
9. Calculer la probabilité que Mama Ngo Bell ne gagne aucun lot, puis la probabilité qu'elle gagne au moins un lot. Arrondir à 10^{-3} .
10. Calculer $E(Y)$ et interpréter : combien de lots peut-elle espérer remporter en moyenne ?

11. Sachant qu'elle a dépensé 10000 FCFA en billets, et en utilisant l'espérance de la Partie A, calculer son gain algébrique moyen total. L'achat de 20 billets améliore-t-il son espérance de gain ?

Partie D — Conclusion argumentée.

12. Rédiger en quelques lignes un conseil à Mama Ngo Bell : faut-il acheter des billets de tombola ? Votre argumentaire devra distinguer le point de vue financier (espérance de gain) et le point de vue solidaire (financement du terrain de football).

9.5 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de la leçon

- **Équiprobabilité** : si l'univers Ω contient n issues équiprobables, alors pour tout événement A : $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$.
- **Loi d'une variable aléatoire X prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_k$** : c'est la donnée des probabilités $p_i = P(X = x_i)$, avec $p_1 + p_2 + \dots + p_k = 1$.
- **Fonction de répartition** : $F(x) = P(X \leq x)$. C'est une fonction croissante, continue à droite, avec des sauts aux valeurs prises par X .
- **Espérance** : $E(X) = \sum_{i=1}^k p_i x_i$. Le jeu est équitable si $E(X) = 0$, favorable au joueur si $E(X) > 0$, défavorable si $E(X) < 0$.
- **Variance** : $V(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - [E(X)]^2 = \sum_{i=1}^k p_i (x_i - E(X))^2$.
- **Écart-type** : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$. Il mesure la dispersion des valeurs autour de l'espérance (même unité que X).
- **Schéma de Bernoulli** : n répétitions identiques et indépendantes d'une épreuve de Bernoulli de probabilité de succès p . La variable Y qui compte les succès suit la loi binomiale $B(n, p)$.
- **Loi binomiale** : $P(Y = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, avec $E(Y) = np$ et $V(Y) = np(1-p)$.
- **Événement contraire** : $P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0)$, souvent bien plus rapide à calculer.

9.6 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 11 La tombola du quartier Deïdo — Partie A : Point de vue de l'acheteur1. Équiprobabilité. 2. Valeurs de X . 3. Loi de X . 4. Espérance et interprétation.**SOLUTION**

1. Équiprobabilité. Le numéro gagnant est tiré au hasard dans un sac opaque contenant les 500 numéros : chaque numéro a donc la même probabilité $\frac{1}{500}$ d'être tiré. On est bien en situation d'équiprobabilité, avec $\text{card}(\Omega) = 500$.

2. Valeurs de X . Trois cas se présentent pour l'acheteur d'un billet à 500 FCFA :

- il gagne le gros lot : $X = 50000 - 500 = 49500$;
- il gagne un lot de 5000 FCFA : $X = 5000 - 500 = 4500$;
- il ne gagne rien : $X = 0 - 500 = -500$.

Donc X prend les valeurs 49500, 4500 et -500.

3. Loi de probabilité de X . Par équiprobabilité :

$$P(X = 49500) = \frac{1}{500}, \quad P(X = 4500) = \frac{10}{500}, \quad P(X = -500) = \frac{489}{500}.$$

Valeur x_i	49500	4500	-500
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{500}$	$\frac{10}{500}$	$\frac{489}{500}$

Vérification : $\frac{1}{500} + \frac{10}{500} + \frac{489}{500} = \frac{500}{500} = 1$. La loi est bien définie.

4. Espérance de X .

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{1}{500} \times 49500 + \frac{10}{500} \times 4500 + \frac{489}{500} \times (-500) \\ &= \frac{49500 + 45000 - 244500}{500} = \frac{-150000}{500} = -300. \end{aligned}$$

Interprétation : en moyenne, l'acheteur d'un billet perd 300 FCFA par billet. Comme $E(X) < 0$, le jeu est défavorable au joueur : il n'est pas équitable. Cela ne signifie pas que tout joueur perd : un joueur peut gagner le gros lot ; mais sur un très grand nombre de participations, la perte moyenne se rapproche de 300 FCFA par billet (loi des grands nombres).

EXERCICE RÉSOLU 12 Partie B — Le point de vue de l'association5. Recettes, coûts et bénéfice. 6. Lien avec $E(X)$.**SOLUTION**

5. Bénéfice de l'association.

- Recette de la vente : $500 \times 500 = 250000$ FCFA.

- Coût total des lots : $10 \times 5000 + 1 \times 50000 = 50000 + 50000 = 100000$ FCFA.

$$\text{Bénéfice} = 250000 - 100000 = 150000 \text{ FCFA.}$$

Ce bénéfice est certain (et non aléatoire) : dès lors que les 500 billets sont vendus, la recette est fixe, et les 11 lots seront distribués quoiqu'il arrive, pour un coût connu d'avance. Le hasard ne joue que sur qui gagne, pas sur les montants. L'association financera donc le terrain à hauteur de 150000 FCFA.

6. Lien avec l'espérance. Le bénéfice par billet de l'association est $\frac{150000}{500} = 300$ FCFA : c'est exactement l'opposé de $E(X) = -300$. C'est logique : le gain de l'organisateur est le contraire du gain algébrique du joueur, donc $E(\text{gain association}) = -E(X) = 300$ FCFA par billet. Ce que les joueurs perdent en moyenne, l'association le gagne.

EXERCICE RÉSOLU 13 Partie C — Les 20 billets de Mama Ngo Bell

7. Non-indépendance stricte. 8. Modèle binomial approché. 9. $P(Y \geq 1)$. 10. $E(Y)$. 11. Gain moyen total.

SOLUTION

7. Non-indépendance stricte. Les 11 numéros gagnants sont tirés sans remise et sont distincts : si l'un des billets de Mama Ngo Bell est déjà gagnant, il reste moins de lots disponibles pour ses autres billets. La probabilité qu'un deuxième billet gagne dépend du résultat du premier : les épreuves ne sont donc pas rigoureusement indépendantes. Le modèle exact serait plus compliqué (loi hypergéométrique, hors programme).

8. Modèle binomial approché. On assimile la situation à 20 tirages avec remise : chaque billet est alors une épreuve de Bernoulli de succès « le billet gagne un lot », de probabilité

$$p = \frac{11}{500} = 0,022,$$

et les 20 épreuves sont identiques et indépendantes. C'est donc un **schéma de Bernoulli** : Y suit la loi binomiale $B(20; 0,022)$. L'approximation est raisonnable car 20 billets représentent une petite fraction (4 %) des 500 billets : le fait qu'un billet soit gagnant modifie très peu les chances des autres.

9. Probabilité de gagner au moins un lot. On passe par l'événement contraire :

$$P(Y = 0) = \binom{20}{0} (0,022)^0 (0,978)^{20} = (0,978)^{20} \approx 0,641.$$

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) \approx 1 - 0,641 = 0,359.$$

Mama Ngo Bell a donc environ 36 % de chances de remporter au moins un lot : c'est loin d'être sûr, malgré ses 20 billets.

10. Nombre moyen de lots.

$$E(Y) = np = 20 \times \frac{11}{500} = \frac{220}{500} = 0,44.$$

En moyenne, elle remporte 0,44 lot : autrement dit, moins d'un lot sur deux participations de ce type.

11. Gain algébrique moyen total. Chaque billet a une espérance de gain de -300 FCFA ; par additivité de l'espérance, pour 20 billets :

$$E(\text{gain total}) = 20 \times (-300) = -6000 \text{ FCFA.}$$

Sur ses 10000 FCFA investis, elle peut espérer récupérer en moyenne environ 4000 FCFA seulement. Acheter plus de billets augmente la probabilité de gagner au moins une fois, mais aggrave la perte moyenne : l'espérance de gain par franc dépensé reste la même.

EXERCICE RÉSOLU 14 Partie D — Conclusion argumentée

12) Rédiger un conseil à Mama Ngo Bell.

SOLUTION

Exemple de conclusion rédigée.

« Du strict point de vue financier, la tombola est défavorable à l'acheteur : chaque billet de 500 FCFA rapporte en moyenne 200 FCFA de lots, soit une perte moyenne de 300 FCFA par billet, et acheter 20 billets porte la perte moyenne à 6000 FCFA, pour une probabilité de gagner au moins un lot d'environ 36 % seulement. Si l'objectif de Mama Ngo Bell est de gagner de l'argent, il faut donc lui déconseiller cet achat : aucune stratégie d'achat ne peut rendre l'espérance positive. En revanche, la tombola n'est pas une arnaque : la règle du jeu est transparente, le bénéfice certain de 150000 FCFA finance le terrain de football du quartier, et l'achat de billets peut être vu comme un don partiellement remboursé en moyenne, avec une petite chance de gros lot. Notre conseil : acheter un ou deux billets par solidarité avec l'association, en sachant que l'on « donne » en moyenne 300 FCFA par billet — mais ne pas considérer la tombola comme un placement. »

ATTENTION Pièges fréquents dans ce type de problème

- Oublier le prix du billet : le gain algébrique est le lot moins 500 FCFA. Calculer l'espérance avec les lots bruts donnerait +200 FCFA et ferait croire à tort que le jeu est favorable !
- Confondre « probable » et « rentable » : avoir 36 % de chances de gagner au moins un lot ne signifie pas que l'opération est rentable ; un lot de 5000 FCFA ne rembourse que la moitié des 10000 FCFA dépensés.
- Utiliser la loi binomiale sans vérifier les conditions : il faut des épreuves identiques et indépendantes. Ici, l'indépendance n'est qu'approchée (tirages sans remise assimilés à des tirages avec remise) : le dire explicitement fait partie de la qualité de la mo-

délisation.

- Oublier de vérifier que la somme des probabilités d'une loi vaut 1.

9.7 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles de la leçon :

- L'**équiprobabilité** fournit naturellement la loi de probabilité d'une variable aléatoire dès que l'on sait dénombrer les cas favorables (1 gros lot, 10 lots, 489 billets perdants sur 500).
- L'**espérance mathématique** est l'outil de décision central : elle résume en un seul nombre le comportement moyen d'un jeu et permet de trancher objectivement la question « le jeu est-il équitable ? ». Ici, $E(X) = -300$ FCFA tranche sans appel.
- Le gain de l'organisateur est l'**opposé** du gain des joueurs : une tombola associative est conçue pour être défavorable aux joueurs, et c'est précisément ce qui garantit le bénéfice certain de l'association.
- Le **schéma de Bernoulli** et la **loi binomiale** permettent de traiter les achats multiples : probabilité de gagner au moins une fois (via l'événement contraire) et nombre moyen de succès $E(Y) = np$.
- Une modélisation exige de **discuter ses hypothèses** : l'assimilation de tirages sans remise à des tirages avec remise est une approximation, légitime ici car 20 est petit devant 500.
- Enfin, les mathématiques éclairent la décision sans la dicter : le calcul montre que la tombola est un mauvais investissement mais peut être un bon geste solidaire. Savoir distinguer ces deux points de vue, c'est exactement l'esprit de l'approche par les compétences : mobiliser des savoirs pour résoudre des situations de la vie courante et argumenter un choix.

LES AVAIS-TU ? Pour aller plus loin

Les loteries nationales et les jeux de hasard fonctionnent tous sur ce principe : l'espérance de gain du joueur est toujours strictement négative, la différence finançant l'organisateur et les lots. Au Cameroun, les jeux de paris sportifs très populaires chez les jeunes obéissent à la même logique mathématique : sur le long terme, c'est l'opérateur qui gagne. Comprendre l'espérance mathématique, c'est se donner les moyens de ne pas se laisser piéger par le mirage du « gros lot ».

10 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

11 PROBABILITÉS, VARIABLES ALÉATOIRES ET LOI BINOMIALE

11.1 Vocabulaire des probabilités et équiprobabilité

DÉFINITION Expérience aléatoire, Univers et Événements

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont le résultat ne peut être prédit avec certitude avant sa réalisation, bien que l'ensemble des résultats possibles soit connu. L'**univers** Ω est l'ensemble de tous les résultats possibles (issues élémentaires). Un **événement** est une partie de Ω (un sous-ensemble des issues). Un **événement élémentaire** est un singleton $\{\omega\}$ ne contenant qu'une seule issue. L'**événement contraire** de A (noté $\bar{A}$ ou A^c) est l'ensemble des issues de Ω qui ne sont pas dans A : $\bar{A} = \Omega \setminus A$. Deux événements A et B sont **incompatibles** (ou mutuellement exclusifs) si $A \cap B = \emptyset$: ils ne peuvent pas se réaliser simultanément.

DÉFINITION Équiprobabilité

On dit qu'il y a **équiprobabilité** lorsque toutes les issues élémentaires de Ω ont la même chance de se réaliser. C'est le cas typiquement pour : un dé parfait (6 faces), une pièce de monnaie non truquée (2 faces), un tirage au hasard dans une urne où les objets sont indiscernables au toucher, un tirage au sort équitable. Si Ω a N issues équiprobables, alors $P(\{\omega\}) = \frac{1}{N}$ pour tout $\omega \in \Omega$.

PROPRIÉTÉ Probabilité dans le cas d'équiprobabilité

Si Ω est fini et muni d'une équiprobabilité, pour tout événement $A \subset \Omega$:

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

On a toujours $0 \leq P(A) \leq 1$, $P(\emptyset) = 0$, $P(\Omega) = 1$ et $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

MÉTHODE Calculer une probabilité dans un cas d'équiprobabilité

Pour calculer la probabilité d'un événement A lorsque toutes les issues sont équiprobables :

1. Justifier l'équiprobabilité : décrire l'expérience et préciser pourquoi les issues ont toutes la même chance de se réaliser (pièce non truquée, dé équilibré, tirage au hasard dans une urne...).
2. Déterminer l'univers Ω et calculer son cardinal $\text{Card}(\Omega)$, souvent à l'aide d'un dénombrement (arrangements, combinaisons, p -listes).
3. Dénombrer les issues favorables à A , c'est-à-dire calculer $\text{Card}(A)$.
4. Conclure avec la formule :

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

5. Simplifier la fraction et, si demandé, donner une valeur décimale ou un pourcentage.

Réflexes : un tirage simultané (sans ordre) se dénombre avec les combinaisons $\binom{n}{p}$; un tirage successif sans remise avec les arrangements A_n^p ; un tirage successif avec remise avec les p -listes n^p .

EXERCICE RÉSOLU 15 Tirage simultané dans une urne

Une urne contient 5 boules rouges et 4 boules vertes, indiscernables au toucher. On tire simultanément 3 boules de l'urne.

1. Déterminer le nombre de tirages possibles.
2. Calculer la probabilité de l'événement A : « obtenir exactement 2 boules rouges ».
3. Calculer la probabilité de l'événement B : « obtenir au moins une boule verte ».

SOLUTION

1. Nombre de tirages possibles.

Le tirage est simultané : l'ordre n'intervient pas et il n'y a pas de remise. On choisit donc 3 boules parmi 9 :

$$\text{Card}(\Omega) = \binom{9}{3} = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} = 84.$$

Tous les tirages sont équiprobables car les boules sont indiscernables au toucher.

2. Probabilité de A .

Obtenir exactement 2 boules rouges signifie : choisir 2 boules parmi les 5 rouges et 1 boule

parmi les 4 vertes. D'après le principe multiplicatif :

$$\text{Card}(A) = \binom{5}{2} \times \binom{4}{1} = 10 \times 4 = 40.$$

Par équiprobabilité :

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{40}{84} = \frac{10}{21}.$$

3. Probabilité de B .

L'événement contraire $\bar{B}$ est « n'obtenir aucune boule verte », c'est-à-dire obtenir 3 boules rouges :

$$\text{Card}(\bar{B}) = \binom{5}{3} = 10 \quad \text{donc} \quad P(\bar{B}) = \frac{10}{84} = \frac{5}{42}.$$

Alors :

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \frac{5}{42} = \frac{37}{42}.$$

Conclusion : $P(A) = \frac{10}{21}$ et $P(B) = \frac{37}{42}$. Le passage par l'événement contraire a évité un dénombrement pénible en trois cas.

11.2 Opérations sur les événements et arbres de probabilités

DÉFINITION Réunion, Intersection, Contraire

Soient A et B deux événements de Ω .

- La **réunion** $A \cup B$ (se lit « A ou B ») est l'événement « A se réalise ou B se réalise (ou les deux) ».
- L'**intersection** $A \cap B$ (se lit « A et B ») est l'événement « A se réalise et B se réalise ».
- L'**événement contraire** $\bar{A}$ (ou A^c) est l'événement « A ne se réalise pas ».

PROPRIÉTÉ Formules fondamentales sur les probabilités

Pour tous événements A, B de Ω :

- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- Si A et B sont incompatibles ($A \cap B = \emptyset$), alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- Probabilité conditionnelle : si $P(B) > 0$, $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$.
- A et B sont **indépendants** si et seulement si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

MÉTHODE Utiliser la formule de la réunion et l'événement contraire

1. Traduire l'énoncé : identifier les événements A et B , et exprimer ce qui est demandé ($A \cup B$ se lit « A ou B » ; $A \cap B$ se lit « A et B » ; $\bar{A}$ se lit « non A »).
2. Événement contraire : utiliser

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$
 C'est souvent le réflexe gagnant dès qu'apparaît « au moins un ».
3. Réunion : appliquer la formule

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$
4. Cas particulier : si A et B sont **incompatibles** ($A \cap B = \emptyset$), alors $P(A \cap B) = 0$ et la formule devient $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
5. Vérifier que le résultat est compris entre 0 et 1.

EXERCICE RÉSOLU 16 Enquête dans un lycée de Yaoundé

Dans un lycée, 60 % des élèves pratiquent le football, 35 % pratiquent la musique, et 20 % pratiquent les deux. On interroge un élève au hasard. On note F : « l'élève pratique le football » et M : « l'élève pratique la musique ».

1. Calculer la probabilité que l'élève pratique le football ou la musique.
2. Calculer la probabilité qu'il ne pratique ni l'un ni l'autre.
3. Calculer la probabilité qu'il pratique le football mais pas la musique.

SOLUTION

On a $P(F) = 0,6$, $P(M) = 0,35$ et $P(F \cap M) = 0,2$.

1. D'après la formule de la réunion :

$$P(F \cup M) = P(F) + P(M) - P(F \cap M) = 0,6 + 0,35 - 0,2 = 0,75.$$

2. « Ni l'un ni l'autre » est l'événement contraire de $F \cup M$, c'est-à-dire $\overline{F \cup M}$:

$$P(\overline{F \cup M}) = 1 - P(F \cup M) = 1 - 0,75 = 0,25.$$

3. « Football mais pas musique » est l'événement $F \cap \bar{M}$. Comme $F = (F \cap M) \cup (F \cap \bar{M})$ et que ces deux événements sont incompatibles :

$$P(F) = P(F \cap M) + P(F \cap \bar{M}) \implies P(F \cap \bar{M}) = 0,6 - 0,2 = 0,4.$$

Conclusion : la probabilité de pratiquer au moins une des deux activités est 0,75 ; celle de n'en pratiquer aucune est 0,25 ; celle de pratiquer uniquement le football est 0,4.

MÉTHODE Construire et exploiter un arbre de probabilités

Un arbre de probabilités modélise une expérience à plusieurs étapes successives.

1. Identifier les étapes de l'expérience (ex : premier tirage, second tirage).
2. Dessiner les branches pour chaque issue possible à chaque étape.
3. Étiqueter chaque branche par la probabilité conditionnelle correspondante (probabilité de l'issue sachant le chemin parcouru).
4. Calculer la probabilité d'un chemin (issue composée) en multipliant les probabilités sur les branches de ce chemin (formule des probabilités composées : $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$).
5. Calculer la probabilité d'un événement en sommant les probabilités des chemins qui le réalisent.

EXERCICE RÉSOLU 17 Arbre de probabilités : contrôle qualité sans remise

Une boîte contient 10 composants dont 3 sont défectueux. On prélève 2 composants successivement sans remise. On note D_i : « le i -ème composant est défectueux ».


1. Construire l'arbre de probabilités.
2. Calculer la probabilité que les deux composants soient défectueux.
3. Calculer la probabilité qu'exactement un des deux soit défectueux.

SOLUTION

1. Arbre de probabilités.

Première étape : $P(D_1) = \frac{3}{10} = 0,3$, $P(\bar{D}_1) = \frac{7}{10} = 0,7$. Seconde étape (sans remise, les probabilités changent) :

- Si D_1 réalisé : il reste 9 composants dont 2 défectueux. $P_{D_1}(D_2) = \frac{2}{9}$, $P_{D_1}(\bar{D}_2) = \frac{7}{9}$.
- Si $\bar{D}_1$ réalisé : il reste 9 composants dont 3 défectueux. $P_{\bar{D}_1}(D_2) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$, $P_{\bar{D}_1}(\bar{D}_2) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$.



Arbre de probabilités pour un tirage sans remise de 2 composants.

2. Deux défectueux : chemin $D_1 \cap D_2$.

$$P(D_1 \cap D_2) = P(D_1) \times P_{D_1}(D_2) = 0,3 \times \frac{2}{9} = \frac{0,6}{9} = \frac{1}{15} \approx 0,0667.$$

3. Exactement un défectueux : chemins $D_1 \cap \bar{D}_2$ et $\bar{D}_1 \cap D_2$.

$$P(D_1 \cap \bar{D}_2) = 0,3 \times \frac{7}{9} = \frac{2,1}{9} = \frac{7}{30};$$

$$P(\bar{D}_1 \cap D_2) = 0,7 \times \frac{1}{3} = \frac{7}{30}.$$

$$P(\text{exactement 1}) = \frac{7}{30} + \frac{7}{30} = \frac{7}{15} \approx 0,4667.$$

Conclusion : sans remise, les tirages ne sont pas indépendants ($P(D_2)$ dépend de D_1), l'arbre est l'outil indispensable.

11.3 Variables aléatoires et loi de probabilité

DÉFINITION Variable aléatoire

Une **variable aléatoire** (v.a.) est une application $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ qui associe un nombre réel à chaque issue de l'univers. On note $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ l'ensemble des valeurs prises par X . Pour chaque valeur x_i , l'événement « $X = x_i$ » est $\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x_i\}$.

DÉFINITION Loi de probabilité d'une variable aléatoire

La **loi de probabilité** d'une v.a. X à valeurs dans $\{x_1, \dots, x_n\}$ est le tableau qui associe à chaque valeur x_i sa probabilité $p_i = P(X = x_i)$.

x_i	x_1	x_2	...	x_n
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	...	p_n

Les p_i satisfont $p_i \geq 0$ et $\sum_{i=1}^n p_i = 1$.

DÉFINITION Fonction de répartition

La **fonction de répartition** de X est la fonction $F : \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$ définie par $F(x) = P(X \leq x)$. C'est une fonction croissante, continue à droite, à paliers, telle que $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$. Pour $x \in [x_k, x_{k+1})$, $F(x) = \sum_{i=1}^k p_i$.

PROPRIÉTÉ Propriétés de la fonction de répartition

Pour tout réel $a \leq b$:

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a).$$

En particulier, pour une valeur x_i prise par X :

$$P(X = x_i) = F(x_i) - \lim_{x \rightarrow x_i^-} F(x) \quad (\text{hauteur du palier}).$$

MÉTHODE Établir la loi de probabilité d'une variable aléatoire X

1. Déterminer l'ensemble des valeurs prises par X : $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. C'est l'étape la plus importante : lister toutes les valeurs possibles.
2. Pour chaque valeur x_i , identifier l'événement $(X = x_i)$ et calculer $p_i = P(X = x_i)$, souvent par équiprobabilité ou à l'aide d'un arbre.
3. Présenter la loi dans un tableau.
4. Contrôle obligatoire : vérifier que $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.
5. Si on demande la **fonction de répartition** F , calculer les sommes cumulées : $F(x) = P(X \leq x)$, définie par paliers sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE RÉSOLU 18 Gains à une tombola de quartier

Lors d'une tombola organisée à Douala, un sac contient 10 tickets : 1 ticket rapporte 5000 F, 3 tickets rapportent 1000 F et 6 tickets ne rapportent rien. On tire un ticket au hasard et on note X le gain (en francs).

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. Déterminer la fonction de répartition de X .

SOLUTION

1. Loi de probabilité de X .

Les valeurs possibles de X sont : 0, 1000 et 5000. Les tickets étant indiscernables, il y a équiprobabilité sur les 10 tickets :

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= \frac{6}{10} = 0,6; \\ P(X = 1000) &= \frac{3}{10} = 0,3; \\ P(X = 5000) &= \frac{1}{10} = 0,1. \end{aligned}$$

D'où la loi de X :

x_i	0	1000	5000
$P(X = x_i)$	0,6	0,3	0,1

Contrôle : $0,6 + 0,3 + 0,1 = 1$. La loi est bien définie.

2. Fonction de répartition.

$F(x) = P(X \leq x)$ est définie sur $\mathbb{R}$ par paliers :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 0,6 & \text{si } 0 \leq x < 1000 \\ 0,9 & \text{si } 1000 \leq x < 5000 \\ 1 & \text{si } x \geq 5000 \end{cases}$$

Par exemple, pour $1000 \leq x < 5000$: $F(x) = P(X = 0) + P(X = 1000) = 0,6 + 0,3 = 0,9$.

Conclusion : X prend les valeurs 0, 1000, 5000 avec les probabilités 0,6 ; 0,3 ; 0,1, et sa fonction de répartition est une fonction en escalier, croissante, de 0 à 1.

11.4 Espérance, variance et écart-type**DÉFINITION** Espérance mathématique

L'**espérance** (ou moyenne) d'une variable aléatoire X de loi (x_i, p_i) est la moyenne pondérée de ses valeurs par leurs probabilités :

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n.$$

C'est la valeur moyenne que l'on attendrait en répétant l'expérience un très grand nombre de fois (Loi des grands nombres).

DÉFINITION Variance et écart-type

La **variance** mesure la dispersion des valeurs de X autour de son espérance :

$$V(X) = E([X - E(X)]^2) = \sum_{i=1}^n (x_i - E(X))^2 p_i.$$

L'**écart-type** est la racine carrée de la variance : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$. Il s'exprime dans la même unité que X .

PROPRIÉTÉ Formule de König-Huygens et linéarité

- König-Huygens (à connaître par cœur, utilisable sans démonstration au Bac) :

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 p_i \right) - [E(X)]^2.$$

- Linéarité de l'espérance : pour tous réels a, b , $E(aX + b) = aE(X) + b$.
- Variance affine : $V(aX + b) = a^2 V(X)$.

MÉTHODE Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$

Soit X une variable aléatoire de loi (x_i, p_i) .

1. Espérance : multiplier chaque valeur par sa probabilité puis additionner :

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i.$$

2. Variance : le plus rapide est la formule de König-Huygens :

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 p_i \right) - [E(X)]^2.$$

On calcule donc d'abord $E(X^2)$ en ajoutant une ligne x_i^2 au tableau.

3. Écart-type : prendre la racine carrée :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

4. Interpréter : $E(X)$ est la valeur moyenne attendue sur un grand nombre de répétitions ; $\sigma(X)$ mesure la dispersion autour de cette moyenne.

Réflexe : toujours vérifier que $V(X) \geq 0$; une variance négative signale obligatoirement une erreur de calcul.

EXERCICE RÉSOLU 19 Rentabilité d'un jeu de hasard

On reprend la tombola de l'exercice précédent : X prend les valeurs 0, 1000, 5000 avec les probabilités 0,6 ; 0,3 ; 0,1.

1. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.
2. Le ticket coûte 500 F. Le jeu est-il favorable au joueur ?

SOLUTION

1. Complétons le tableau de la loi avec les lignes utiles :

x_i	0	1000	5000	Total
p_i	0,6	0,3	0,1	1
$x_i p_i$	0	300	500	800
$x_i^2 p_i$	0	300000	2500000	2800000

Espérance :

$$E(X) = 0 \times 0,6 + 1000 \times 0,3 + 5000 \times 0,1 = 0 + 300 + 500 = 800 \text{ F.}$$

Variance (formule de König-Huygens) :

$$E(X^2) = 0^2 \times 0,6 + 1000^2 \times 0,3 + 5000^2 \times 0,1 = 300000 + 2500000 = 2800000;$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 2800000 - 800^2 = 2800000 - 640000 = 2160000.$$

Écart-type :

$$\sigma(X) = \sqrt{2160000} \approx 1469,7 \text{ F.}$$

2. Le gain moyen par partie est $E(X) = 800$ F, alors que le ticket coûte 500 F. Le gain moyen net est $800 - 500 = 300$ F > 0 : le jeu est donc favorable au joueur en moyenne. (En pratique, l'organisateur aurait intérêt à vendre le ticket plus cher!)

Conclusion : $E(X) = 800$ F, $V(X) = 2160000$ et $\sigma(X) \approx 1470$ F. La forte valeur de $\sigma(X)$ traduit une grande dispersion des gains autour de la moyenne.

11.5 Épreuve de Bernoulli et schéma de Bernoulli

DÉFINITION Épreuve de Bernoulli

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire qui ne présente que deux issues possibles :

- Succès (noté S), de probabilité p ($0 < p < 1$).
- Échec (noté $\bar{S}$ ou E), de probabilité $q = 1 - p$.

Exemples : lancer une pièce (Pile/Face), tester un composant (Conforme/Défectueux), un appel qui aboutit ou non.

DÉFINITION Schéma de Bernoulli

On répète n fois ($n \in \mathbb{N}^*$) une même épreuve de Bernoulli de paramètre p , de manière identique et indépendante. L'indépendance est garantie en pratique par un tirage avec remise, ou par un tirage dans une population très grande (assimilé à un tirage avec remise). La variable aléatoire X qui compte le nombre de succès sur les n épreuves suit la **loi binomiale** de paramètres n et p , notée $X \hookrightarrow B(n, p)$.

PROPRIÉTÉ Loi binomiale

Si $X \hookrightarrow B(n, p)$, alors pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n\}$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Espérance et variance :

$$E(X) = np, \quad V(X) = np(1 - p), \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}.$$

EXPÉRIENCE Découverte de la formule de la loi binomiale

On considère un schéma de Bernoulli à $n = 3$ épreuves de paramètre p .

1. Dessiner l'arbre des 3 épreuves (succès S prob. p , échec E prob. $q = 1 - p$).
2. Combien de chemins mènent à exactement $k = 1$ succès ? Écrire leur probabilité commune. En déduire $P(X = 1)$.
3. Faire de même pour $k = 2$ et $k = 3$.
4. Généraliser pour n épreuves : pourquoi le coefficient $\binom{n}{k}$ apparaît-il ?

1. L'arbre a $2^3 = 8$ feuilles. 2. $k = 1$ succès : 3 chemins (SEE, ESE, EES). Chacun a probabilité pq^2 . $P(X = 1) = 3pq^2 = \binom{3}{1}p^1q^2$. 3. $k = 2$: 3 chemins (SSE, SES, ESS), prob. p^2q . $P(X = 2) = 3p^2q = \binom{3}{2}p^2q^1$. 4. $k = 3$: 1 chemin (SSS), prob. p^3 . $P(X = 3) = \binom{3}{3}p^3q^0$. 4. Pour n épreuves, obtenir k succès revient à choisir les k positions des succès parmi les n épreuves : $\binom{n}{k}$ choix. Chaque chemin a probabilité p^kq^{n-k} . D'où la formule générale.

MÉTHODE Identifier une épreuve et un schéma de Bernoulli

1. Épreuve de Bernoulli : vérifier que l'expérience n'a que deux issues : succès S (probabilité p) et échec $\bar{S}$ (probabilité $q = 1 - p$).
2. Schéma de Bernoulli : vérifier que l'on répète n fois cette épreuve de façon identique et indépendante. L'indépendance est garantie en pratique par un tirage avec remise, ou par un tirage dans une population très grande (assimilé à un tirage avec remise).
3. Conclure : la variable aléatoire X qui compte le nombre de succès suit la **loi binomiale** $B(n, p)$.
4. Tracer un arbre si n est petit (2 ou 3) : chaque chemin a une probabilité obtenue en multipliant les probabilités des branches.

ATTENTION Condition d'indépendance

Un tirage sans remise dans une petite urne ne donne pas un schéma de Bernoulli : les tirages ne sont pas indépendants. Ne pas appliquer la loi binomiale dans ce cas !

EXERCICE RÉSOLU 20 Contrôle qualité chez un embouteilleur

Une usine d'embouteillage de Bafoussam produit des bouteilles dont 2 % présentent un défaut de bouchage. On prélève au hasard 3 bouteilles dans la production, avec remise. On note X le nombre de bouteilles défectueuses.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.
2. Construire l'arbre de probabilités et déterminer la loi de X .

SOLUTION

1. Chaque prélèvement est une épreuve de Bernoulli : succès S = « la bouteille est défectueuse » de probabilité $p = 0,02$, échec $\bar{S}$ de probabilité $q = 1 - 0,02 = 0,98$. On répète $n = 3$ fois cette épreuve, de manière identique et indépendante (tirage avec remise). Donc X , qui compte le nombre de succès, suit la loi binomiale :

$$X \hookrightarrow B(3; 0,02).$$

2. Arbre de probabilités :




Schéma de Bernoulli à 3 épreuves : $p = 0,02$, $q = 0,98$.

En comptant les succès sur chaque chemin et en multipliant les probabilités le long des branches :

$$P(X = 0) = (0,98)^3 = 0,941192;$$

$$P(X = 1) = 3 \times 0,02 \times (0,98)^2 = 3 \times 0,019208 = 0,057624;$$

$$P(X = 2) = 3 \times (0,02)^2 \times 0,98 = 0,001176;$$

$$P(X = 3) = (0,02)^3 = 0,000008.$$

Contrôle : $0,941192 + 0,057624 + 0,001176 + 0,000008 = 1$.

Conclusion : $X \hookrightarrow B(3; 0,02)$ et sa loi est donnée par le tableau ci-dessus ; la probabilité d'avoir au moins une bouteille défectueuse sur les 3 est $1 - P(X = 0) \approx 0,0588$.

11.6 Loi binomiale et applications

PROPRIÉTÉ Formules usuelles de la loi binomiale $B(n, p)$

Si $X \hookrightarrow B(n, p)$:

- $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, pour $k \in \{0, \dots, n\}$.
- $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1-p)^n$ (très utile pour « au moins un »).
- $P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k P(X = i)$ (somme des probabilités).
- $E(X) = np$, $V(X) = np(1-p)$, $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$.

MÉTHODE Exploiter la loi binomiale $B(n, p)$

1. Identifier n (nombre d'épreuves) et p (probabilité de succès à chaque épreuve). Vérifier l'indépendance.
2. Annoncer clairement : « X suit la loi binomiale de paramètres $n = \dots$ et $p = \dots$ ».
3. Appliquer la formule adaptée à la question :
 - « exactement k » : $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.
 - « au moins k » : $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1)$ ou somme directe si k proche de n .
 - « au plus k » : $P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k P(X = i)$.
4. Calculer avec la calculatrice (fonction `binompdf` et `binomcdf` si disponible) ou à la main si n petit.
5. Interpréter le résultat en pourcentage ou en décision.

EXERCICE RÉSOLU 21 Réseau mobile en zone rurale

Dans une localité, la probabilité qu'un appel passé sur le réseau aboutisse du premier coup est 0,8. Un technicien effectue 10 appels tests, supposés indépendants. On note X le nombre d'appels qui aboutissent.

1. Quelle est la loi de X ? Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.
2. Calculer la probabilité qu'exactly 8 appels aboutissent.
3. Calculer la probabilité qu'au moins 8 appels aboutissent (arrondir à 10^{-4}).

SOLUTION

1. Chaque appel est une épreuve de Bernoulli de succès $p = 0,8$. Les 10 appels sont indé-

pendants, donc :

$$X \hookrightarrow B(10; 0,8).$$

Espérance : $E(X) = np = 10 \times 0,8 = 8$. En moyenne, 8 appels sur 10 aboutissent.

Variance : $V(X) = np(1-p) = 10 \times 0,8 \times 0,2 = 1,6$, d'où $\sigma(X) = \sqrt{1,6} \approx 1,26$.

2. D'après la formule de la loi binomiale avec $k = 8$:

$$\begin{aligned} P(X = 8) &= \binom{10}{8} (0,8)^8 (0,2)^2 \\ &= 45 \times 0,16777216 \times 0,04 \\ &\approx 0,3020. \end{aligned}$$

3. « Au moins 8 » signifie $X = 8$, $X = 9$ ou $X = 10$:

$$\begin{aligned} P(X = 9) &= \binom{10}{9} (0,8)^9 (0,2)^1 = 10 \times 0,134217728 \times 0,2 \approx 0,2684; \\ P(X = 10) &= (0,8)^{10} \approx 0,1074. \end{aligned}$$

Donc :

$$P(X \geq 8) = P(X = 8) + P(X = 9) + P(X = 10) \approx 0,3020 + 0,2684 + 0,1074 = 0,6778.$$

Conclusion : la probabilité qu'au moins 8 des 10 appels aboutissent est d'environ 0,6778, soit environ 67,8 %. Le réseau est conforme si l'opérateur exige ce seuil avec une probabilité d'au moins 60 %.

EXERCICE RÉSOLU 22 Problème de décision : deux fournisseurs

Une entreprise de Buea achète ses câbles électriques chez deux fournisseurs. Chez le fournisseur A, 5 % des câbles sont défectueux et le câble coûte 9000 F. Chez le fournisseur B, 10 % sont défectueux et le câble coûte 8000 F. Un câble défectueux entraîne un coût de réparation de 20000 F. On note C_A et C_B le coût total (achat + réparation éventuelle) d'un câble selon le fournisseur.

1. Déterminer les lois de C_A et C_B .
2. Calculer $E(C_A)$ et $E(C_B)$, puis conseiller l'entreprise.

SOLUTION

1. Chez A : le câble coûte 9000 F s'il est bon (probabilité 0,95) et $9000 + 20000 = 29000$ F s'il est défectueux (probabilité 0,05).

c	9000	29000
$P(C_A = c)$	0,95	0,05

Chez B : le câble coûte 8000 F (probabilité 0,9) ou 28000 F (probabilité 0,1).

c	8000	28000
$P(C_B = c)$	0,9	0,1

Contrôle : $0,95 + 0,05 = 1$ et $0,9 + 0,1 = 1$.

2. Calcul des espérances :

$$E(C_A) = 9000 \times 0,95 + 29000 \times 0,05 = 8550 + 1450 = 10000 \text{ F};$$

$$E(C_B) = 8000 \times 0,9 + 28000 \times 0,1 = 7200 + 2800 = 10000 \text{ F}.$$

Les deux coûts moyens sont égaux : 10000 F. Pour départager, calculons les variances :

$$V(C_A) = 9000^2 \times 0,95 + 29000^2 \times 0,05 - 10000^2 = 76950000 + 42050000 - 100000000 = 19000000;$$

$$V(C_B) = 8000^2 \times 0,9 + 28000^2 \times 0,1 - 10000^2 = 57600000 + 78400000 - 100000000 = 36000000.$$

Donc $\sigma(C_A) \approx 4359 \text{ F}$ et $\sigma(C_B) = 6000 \text{ F}$.

Conclusion : à espérance de coût égale, le fournisseur A présente un écart-type plus faible, donc un risque moindre de mauvaise surprise. L'entreprise prudente choisira le fournisseur A.

LESAVAIS-TU ?

De Bernoulli à nos téléphones : l'histoire d'une loi universelle

La loi binomiale doit son nom à Jakob Bernoulli (1655–1705), mathématicien suisse de la célèbre famille Bernoulli. Dans son ouvrage posthume *Ars Conjectandi* (1713), il démontre le théorème de Bernoulli (loi faible des grands nombres) : la fréquence d'un événement converge vers sa probabilité. Son ami Abraham de Moivre (1667–1754) a ensuite montré que pour n grand, la loi binomiale $B(n, p)$ est bien approchée par une loi normale (théorème central limite), ce qui évitait des calculs fastidieux à l'époque. Au Cameroun aujourd'hui : cette loi modélise le taux d'erreur binaire (BER) dans les fibres optiques de CAMTEL, le taux de germination des semences améliorées à l'IRAD, la fiabilité des antennes relais MTN/Orange, ou encore le taux de réussite au Baccalauréat dans un établissement. C'est l'outil mathématique de base de la fiabilité industrielle et du contrôle qualité.

ATTENTION

Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Appliquer la loi binomiale sans vérifier l'indépendance. Un tirage sans remise dans une petite population n'est PAS un schéma de Bernoulli. Rédige toujours la justification : « les épreuves sont identiques et indépendantes (tirage avec remise), donc $X \hookrightarrow B(n, p)$ ».
2. Oublier le coefficient binomial. Écrire $P(X = k) = p^k(1-p)^{n-k}$ sans le $\binom{n}{k}$ est faux dès que $k \neq$

0 et $k \neq n$. Le coefficient compte le nombre de chemins de l'arbre menant à k succès.

3. Confondre « ou » et « et ». $P(A \cup B) \neq P(A) + P(B)$ en général : il faut retrancher $P(A \cap B)$. N'oublie ce terme que si tu as justifié que les événements sont incompatibles.
4. Ne pas vérifier la loi de probabilité. Avant de calculer $E(X)$, contrôle que la somme des p_i vaut 1 ; une variance négative ou une probabilité supérieure à 1 doit te faire reprendre tes calculs immédiatement.
5. Mal traiter le « au moins un ». Ne calcule jamais $P(X \geq 1)$ en sommant tous les cas : utilise $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - p)^n$. Et dans un dénombrement, « au moins une boule verte » se traite par l'événement contraire, pas par une somme de cas fastidieuse.

12 EXERCICES

12.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 8 QCM : vocabulaire et calculs de base

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entoure-la et justifie brièvement.

1. On lance un dé équilibré à 6 faces. La probabilité d'obtenir un nombre pair est :
a) $\frac{1}{6}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{2}{3}$
2. Si A et B sont deux événements incompatibles avec $P(A) = 0,3$ et $P(B) = 0,5$, alors $P(A \cup B)$ vaut :
a) 0,15 b) 0,8 c) 0,2 d) 1
3. Une variable aléatoire X suit la loi binomiale $B(10 ; 0,2)$. Son espérance est :
a) 0,2 b) 2 c) 1,6 d) 8
4. Soit X une variable aléatoire de variance $V(X) = 9$. Son écart-type $\sigma(X)$ vaut :
a) 81 b) 4,5 c) 3 d) 9

EXERCICE 9 Vrai ou faux justifié

Réponds par VRAI ou FAUX en justifiant chaque réponse par une propriété du cours ou un contre-exemple.

1. Pour tout événement A , on a $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
2. Si $P(A) = 0,4$ et $P(B) = 0,7$, alors $P(A \cup B) = 1,1$.
3. L'espérance d'une variable aléatoire est toujours un nombre positif.
4. Si X suit la loi binomiale $B(n ; p)$, alors $V(X) = np(1 - p)$.

EXERCICE 10 Définitions à compléter

Recopie et complète les phrases suivantes avec les mots ou expressions du cours.

1. Une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat avec certitude, mais dont on connaît l'ensemble des résultats possibles, est appelée ... ; cet ensemble de résultats est appelé ... et noté ...
2. Dans le cas de l'..., la probabilité d'un événement A est $P(A) = \frac{\dots}{\dots}$.

3. Une ... est une application qui, à chaque issue d'une expérience aléatoire, associe un nombre réel.
4. Une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire qui n'a que ... issues : le ... (probabilité p) et l'... (probabilité $1 - p$).

EXERCICE 11 Calculs directs

1. On lance deux pièces de monnaie équilibrées. Donner l'univers Ω et calculer la probabilité d'obtenir exactement une fois « Pile ».
2. Soit A et B deux événements tels que $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,4$ et $P(A \cap B) = 0,2$. Calculer $P(A \cup B)$ et $P(\bar{A})$.
3. Une variable aléatoire X prend les valeurs 0, 1, 2 avec les probabilités 0,2, 0,5 et 0,3. Calculer $E(X)$.
4. X suit la loi binomiale $B(50; 0,1)$. Donner $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

12.2 Je m'entraîne**EXERCICE 12** Loto du quartier

Une urne contient 10 boules indiscernables au toucher : 3 rouges, 5 bleues et 2 vertes. On tire une boule au hasard.

1. Calculer la probabilité de chacun des événements : R : « la boule est rouge », B : « la boule est bleue », V : « la boule est verte ».
2. Calculer la probabilité que la boule tirée ne soit pas bleue.
3. On tire maintenant deux boules successivement et avec remise. Construire l'arbre de probabilités (on ne distinguera que « rouge » et « non rouge ») et calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges.

EXERCICE 13 Gain à la tombola

À la fête de la jeunesse à Ngaoundéré, une tombola propose 100 tickets à 200 FCFA l'unité. Parmi eux, 2 tickets font gagner 5000 FCFA, 8 tickets font gagner 1000 FCFA, et les autres ne rapportent rien. On note X le gain algébrique (gain brut moins le prix du ticket) d'un joueur qui achète un ticket.

1. Déterminer la loi de probabilité de X (présenter les résultats dans un tableau).

2. Calculer l'espérance $E(X)$. Interpréter le résultat : le jeu est-il favorable au joueur ?
3. Calculer la variance $V(X)$ puis l'écart-type $\sigma(X)$ (arrondir au franc près).

EXERCICE 14 Contrôle qualité chez un opérateur

Un centre d'appel d'Orange Cameroun constate que la probabilité qu'un appel dure plus de 5 minutes est 0,4. On interroge au hasard 5 appels, supposés indépendants, et on note X le nombre d'appels durant plus de 5 minutes.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. Calculer la probabilité qu'exactement 2 appels durent plus de 5 minutes (arrondir à 10^{-3}).
3. Calculer la probabilité qu'au moins un appel dure plus de 5 minutes.
4. Donner $E(X)$ et interpréter.

EXERCICE 15 Fonction de répartition

Soit X une variable aléatoire dont la fonction de répartition F est donnée par :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 0,1 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 0,4 & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 0,8 & \text{si } 3 \leq x < 4 \\ 1 & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
3. Calculer $P(X > 2)$ et $P(1 \leq X \leq 3)$.

12.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 16 Tirage dans une urne — type Bac

Une urne contient 4 boules blanches et 6 boules noires, indiscernables au toucher. On tire successivement et sans remise 2 boules de l'urne.

Partie A : étude du tirage

1. Construire l'arbre de probabilités complet de cette expérience, en précisant les probabilités sur chaque branche.
2. Calculer la probabilité des événements suivants :
 - (a) A : « les deux boules tirées sont blanches » ;
 - (b) B : « les deux boules tirées sont de la même couleur » ;
 - (c) C : « les deux boules tirées sont de couleurs différentes ».
3. Vérifier que $P(C) = 1 - P(B)$. Expliquer pourquoi ce résultat était prévisible.

Partie B : variable aléatoire

On note X le nombre de boules blanches obtenues à l'issue du tirage.

4. Déterminer la loi de probabilité de X (présenter les résultats dans un tableau, sous forme de fractions irréductibles).
5. Calculer l'espérance $E(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$ (arrondir à 10^{-2}).
6. On propose le jeu suivant : le joueur mise 500 FCFA ; il gagne 1000 FCFA par boule blanche obtenue. On note Y le gain algébrique du joueur. Exprimer Y en fonction de X , puis calculer $E(Y)$. Le jeu est-il équitable ?

EXERCICE 17 Sachets mal scellés à Bonabéri — type Bac

Dans une usine de conditionnement d'arachides de Bonabéri (Douala), on estime que 3 % des sachets sont mal scellés. La production journalière est suffisamment importante pour qu'on puisse assimiler tout prélèvement à un tirage avec remise. On prélève au hasard 20 sachets dans la production et on note X le nombre de sachets mal scellés dans ce prélèvement. On donnera les résultats arrondis à 10^{-4} . On rappelle : $0,97^{20} \approx 0,5438$.

Partie A : loi de X

1. Justifier soigneusement que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.
2. Calculer la probabilité qu'aucun sachet du prélèvement ne soit mal scellé.
3. Calculer la probabilité qu'exactement un sachet soit mal scellé.
4. En déduire la probabilité qu'au moins deux sachets soient mal scellés.
5. Calculer le nombre moyen de sachets mal scellés dans un prélèvement de 20 sachets.

Partie B : décision commerciale

Le chef de production affirme : « Sur une journée de 10000 sachets, il y a forcément moins de 400 sachets mal scellés. »

6. Calculer l'espérance du nombre de sachets mal scellés sur une journée de 10000 sachets et commenter l'affirmation du chef de production.
7. L'usine souhaite que la probabilité qu'un prélèvement de 20 sachets ne contienne au-

cun sachet mal scellé soit supérieure à 0,9. On note p le taux de sachets défectueux. Montrer que la condition s'écrit $(1 - p)^{20} > 0,9$, puis déterminer la valeur maximale de p (arrondir à 10^{-3}). On donne : $0,9^{1/20} \approx 0,9947$.

EXERCICE 18 QCM du concours d'entrée — type Bac

Un candidat répond totalement au hasard à un QCM de 8 questions. Chaque question propose 4 réponses dont une seule est correcte, et les réponses sont indépendantes les unes des autres. On note X le nombre de bonnes réponses du candidat. Les résultats seront arrondis à 10^{-4} .

Partie A : étude probabiliste

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.
2. Calculer la probabilité que le candidat donne exactement 4 bonnes réponses.
3. Calculer la probabilité que le candidat donne au moins la moitié de bonnes réponses, c'est-à-dire $P(X \geq 4)$. On donne :

$$P(X = 4) \approx 0,0865, \quad P(X = 5) \approx 0,0231, \quad P(X = 6) \approx 0,0038, \quad P(X = 7) \approx 0,0004.$$

4. Calculer l'espérance $E(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$. Interpréter $E(X)$.

Partie B : barème et prime d'assurance

Le concours attribue +1 point par bonne réponse et -0,25 point par mauvaise réponse. On note N la note finale du candidat sur 8.

5. Exprimer N en fonction de X , puis calculer $E(N)$. Commenter.
6. Une compagnie d'assurance de Yaoundé assure ses clients contre les dégâts des eaux. Elle estime que la probabilité qu'un client déclare un sinistre dans l'année est 0,05 et que le coût moyen d'un sinistre est de 400000 FCFA. En s'inspirant de la notion d'espérance, calculer le coût moyen annuel par client pour la compagnie, puis proposer une prime annuelle minimale (arrondie au millier de francs supérieur) permettant à la compagnie d'être rentable, sachant qu'elle souhaite dégager une marge de 20 % sur le coût moyen.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter au Bac

- Confondre tirage avec remise (probabilités constantes, indépendance, loi binomiale possible) et tirage sans remise (les probabilités changent au second tirage : pas de loi binomiale).
- Écrire $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ sans vérifier que A et B sont incompatibles ; la formule générale est $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

- Oublier le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ dans $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.
- Pour « au moins un », penser à passer par l'événement contraire : $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$.
- Donner la variance à la place de l'écart-type : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

13 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : vocabulaire et calculs de base

- Réponse c). Les issues paires sont $\{2; 4; 6\}$, soit 3 issues sur 6. Par équiprobabilité :

$$P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$
- Réponse b). A et B incompatibles signifie $A \cap B = \emptyset$, donc

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0,3 + 0,5 = 0,8.$$
- Réponse b). Pour $X \sim B(n; p)$, $E(X) = np = 10 \times 0,2 = 2$.
- Réponse c). $\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{9} = 3$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux justifié

- VRAI. A et $\bar{A}$ forment une partition de Ω , donc $P(A) + P(\bar{A}) = P(\Omega) = 1$, d'où $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
- FAUX. Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1 : $P(A \cup B) = 1,1$ est impossible. La formule correcte est $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; sans connaître $P(A \cap B)$, on sait seulement que $P(A \cup B) \leq 1$.
- FAUX. Contre-exemple : X prend les valeurs -2 et 1 avec les probabilités 0,5 et 0,5; alors $E(X) = -2 \times 0,5 + 1 \times 0,5 = -0,5 < 0$. L'espérance d'un gain algébrique peut être négative (jeu défavorable).
- VRAI. C'est une propriété du cours : si $X \sim B(n; p)$, alors $V(X) = np(1 - p)$ et $\sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions à compléter

- ...est appelée **expérience aléatoire**; cet ensemble de résultats est appelé **univers** (ou univers des possibles) et noté Ω .
- Dans le cas de l'**équiprobabilité**, la probabilité d'un événement A est

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à A}}{\text{nombre total d'issues possibles}} = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}.$$
- Une **variable aléatoire** est une application qui, à chaque issue d'une expérience aléatoire, associe un nombre réel.

4. Une épreuve de Bernoulli n'a que **deux** issues : le **succès** (probabilité p) et l'**échec** (probabilité $1 - p$).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. $\Omega = \{PP; PF; FP; FF\}$: 4 issues équiprobables. Les issues contenant exactement un « Pile » sont PF et FP :

$$P = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

2. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,5 + 0,4 - 0,2 = 0,7$; $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,5 = 0,5$.

3. $E(X) = 0 \times 0,2 + 1 \times 0,5 + 2 \times 0,3 = 0 + 0,5 + 0,6 = 1,1$.

4. $E(X) = np = 50 \times 0,1 = 5$; $V(X) = np(1 - p) = 50 \times 0,1 \times 0,9 = 4,5$; $\sigma(X) = \sqrt{4,5} \approx 2,12$.


CORRIGÉ Exercice 5 — Loto du quartier

1. Par équiprobabilité (boules indiscernables au toucher) :

$$P(R) = \frac{3}{10} = 0,3; \quad P(B) = \frac{5}{10} = 0,5; \quad P(V) = \frac{2}{10} = 0,2.$$

Vérification : $0,3 + 0,5 + 0,2 = 1$.

2. $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,5 = 0,5$. On retrouve bien $P(R) + P(V) = 0,3 + 0,2 = 0,5$.
3. À chaque tirage, $P(R) = 0,3$ et $P(\bar{R}) = 0,7$: la remise rend les tirages indépendants et les probabilités identiques au second tirage.



Arbre de probabilités du tirage de deux boules avec remise.

La probabilité d'obtenir deux boules rouges est le produit le long du chemin $R-R$:

$$P(R \cap R) = 0,3 \times 0,3 = 0,09.$$

ATTENTION Point de vigilance

Sur un arbre, on multiplie les probabilités le long d'un chemin et on additionne les probabilités des chemins menant au même événement.

CORRIGÉ Exercice 6 — Gain à la tombola

1. Le gain algébrique est le gain brut diminué des 200 FCFA du ticket : X prend les valeurs $5000 - 200 = 4800$, $1000 - 200 = 800$ et $0 - 200 = -200$.

Valeur x_i	4800	800	-200
$P(X = x_i)$	$\frac{2}{100} = 0,02$	$\frac{8}{100} = 0,08$	$\frac{90}{100} = 0,9$

Vérification : $0,02 + 0,08 + 0,9 = 1$.

2. $E(X) = 4800 \times 0,02 + 800 \times 0,08 + (-200) \times 0,9 = 96 + 64 - 180 = -20$.

En moyenne, un joueur perd 20 FCFA par ticket : le jeu est défavorable au joueur (et rapporte en moyenne 20 FCFA par ticket à l'organisateur).

3. On calcule d'abord :

$$E(X^2) = 4800^2 \times 0,02 + 800^2 \times 0,08 + (-200)^2 \times 0,9 = 460800 + 51200 + 36000 = 548000.$$

Par la formule de **Koenig-Huygens** :

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 548000 - (-20)^2 = 548000 - 400 = 547600.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{547600} = 740 \text{ FCFA (valeur exacte)}.$$

L'écart-type, très grand devant l'espérance, traduit la forte dispersion des gains autour de la moyenne : la plupart des joueurs perdent 200 FCFA, quelques-uns gagnent gros.

CORRIGÉ Exercice 7 — Contrôle qualité chez un opérateur

1. Pour chaque appel, on répète une épreuve de Bernoulli : succès S « l'appel dure plus de 5 minutes », de probabilité $p = 0,4$. On répète $n = 5$ fois cette épreuve, de manière identique et indépendante (hypothèse de l'énoncé). X compte le nombre de succès : donc X suit la loi binomiale $B(5; 0,4)$.

$$2. P(X = 2) = \binom{5}{2} \times 0,4^2 \times 0,6^3 = 10 \times 0,16 \times 0,216 = 0,3456 \approx 0,346.$$

3. On passe par l'événement contraire « aucun appel ne dure plus de 5 minutes » :

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,6^5 = 1 - 0,07776 \approx 0,922.$$

4. $E(X) = np = 5 \times 0,4 = 2$. Sur un grand nombre d'échantillons de 5 appels, on observe en moyenne 2 appels durant plus de 5 minutes.

ATTENTION Point de vigilance

La justification du caractère binomial (deux issues, n répétitions identiques et indépendantes, X compte les succès) est une rédaction attendue ; ne pas l'oublier.

CORRIGÉ Exercice 8 — Fonction de répartition

1. On rappelle que $F(x) = P(X \leq x)$ et que $P(X = k) = F(k) - F(k^-)$ (saut de F en k). Les sauts ont lieu en 1, 2, 3, 4 :

$$\begin{aligned} P(X = 1) &= 0,1 - 0 = 0,1; & P(X = 2) &= 0,4 - 0,1 = 0,3; \\ P(X = 3) &= 0,8 - 0,4 = 0,4; & P(X = 4) &= 1 - 0,8 = 0,2. \end{aligned}$$

Vérification : $0,1 + 0,3 + 0,4 + 0,2 = 1$.

$$2. E(X) = 1 \times 0,1 + 2 \times 0,3 + 3 \times 0,4 + 4 \times 0,2 = 0,1 + 0,6 + 1,2 + 0,8 = 2,7.$$

$$E(X^2) = 1 \times 0,1 + 4 \times 0,3 + 9 \times 0,4 + 16 \times 0,2 = 0,1 + 1,2 + 3,6 + 3,2 = 8,1.$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 8,1 - 2,7^2 = 8,1 - 7,29 = 0,81.$$

$$3. P(X > 2) = P(X = 3) + P(X = 4) = 0,4 + 0,2 = 0,6 \text{ (ou directement } 1 - F(2) = 1 - 0,4 = 0,6).$$

$$P(1 \leq X \leq 3) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 0,1 + 0,3 + 0,4 = 0,8.$$


ATTENTION Point de vigilance

$P(X > 2) = 1 - F(2)$ car $F(2) = P(X \leq 2)$; attention à ne pas écrire $1 - F(3)$.

CORRIGÉ Exercice 9 — Tirage dans une urne — type Bac

Partie A.

1. Au premier tirage : $P(B_1) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$ et $P(N_1) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$. Le tirage étant sans remise, la composition de l'urne change au second tirage (il ne reste que 9 boules) : par exemple, si la première boule est blanche, il reste 3 blanches sur 9, d'où $P_{B_1}(B_2) = \frac{3}{9}$.



Arbre du tirage sans remise : les probabilités du second niveau dépendent du résultat du premier tirage.

2. (a) $P(A) = P(B_1 \cap B_2) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{9} = \frac{6}{45} = \frac{2}{15}$.

(b) $B = (B_1 \cap B_2) \cup (N_1 \cap N_2)$, réunion d'événements incompatibles :

$$P(B) = \frac{2}{15} + \frac{3}{5} \times \frac{5}{9} = \frac{2}{15} + \frac{1}{3} = \frac{2}{15} + \frac{5}{15} = \frac{7}{15}.$$

(c) $P(C) = P(B_1 \cap N_2) + P(N_1 \cap B_2) = \frac{4}{15} + \frac{4}{15} = \frac{8}{15}$.

3. $1 - P(B) = 1 - \frac{7}{15} = \frac{8}{15} = P(C)$. C'était prévisible : « même couleur » et « couleurs différentes » sont deux événements **contraires** l'un de l'autre, donc $C = \bar{B}$ et $P(C) = 1 - P(B)$.

Partie B.

4. X prend les valeurs 0, 1, 2 :

$$P(X = 0) = P(N_1 \cap N_2) = \frac{1}{3} = \frac{5}{15}; \quad P(X = 1) = P(C) = \frac{8}{15}; \quad P(X = 2) = P(A) = \frac{2}{15}.$$

x_i	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{5}{15}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{2}{15}$

Vérification : $\frac{5 + 8 + 2}{15} = 1$.

$$5. E(X) = 0 \times \frac{5}{15} + 1 \times \frac{8}{15} + 2 \times \frac{2}{15} = \frac{12}{15} = \frac{4}{5} = 0,8.$$

$$E(X^2) = 0 + 1 \times \frac{8}{15} + 4 \times \frac{2}{15} = \frac{16}{15},$$

$$V(X) = \frac{16}{15} - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{16}{15} - \frac{16}{25} = \frac{80 - 48}{75} = \frac{32}{75} \approx 0,4267, \quad \sigma(X) = \sqrt{\frac{32}{75}} \approx 0,65.$$

6. Le joueur gagne $1000X$ FCFA et a misé 500 FCFA : $Y = 1000X - 500$.

Par linéarité de l'espérance : $E(Y) = 1000 E(X) - 500 = 1000 \times 0,8 - 500 = 300$ FCFA.

$E(Y) = 300 \neq 0$: le jeu n'est pas équitable ; il est favorable au joueur, qui gagne en moyenne 300 FCFA par partie.

Barème indicatif (sur 5 pts) : arbre correct avec probabilités conditionnelles (1 pt) ; $P(A)$, $P(B)$, $P(C)$ (1 pt) ; événements contraires justifiés (0,5 pt) ; loi de X avec vérification (1 pt) ; $E(X)$ et $\sigma(X)$ (1 pt) ; Y en fonction de X et conclusion (0,5 pt).

ATTENTION Points de vigilance

Citer explicitement « sans remise » pour justifier les probabilités du second niveau ; un jeu est équitable si et seulement si $E(Y) = 0$; simplifier les fractions jusqu'au bout.

CORRIGÉ Exercice 10 — Sachets mal scellés à Bonabéri — type Bac

Partie A.

1. Pour chaque sachet prélevé, on réalise une épreuve de Bernoulli : succès S « le sachet est mal scellé », de probabilité $p = 0,03$. On répète $n = 20$ fois cette épreuve ; le prélèvement étant assimilé à un tirage avec remise, les répétitions sont identiques et indépendantes. X compte le nombre de succès : donc $X \sim B(20; 0,03)$.

$$2. P(X = 0) = \binom{20}{0} \times 0,03^0 \times 0,97^{20} = 0,97^{20} \approx 0,5438.$$

$$3. P(X = 1) = \binom{20}{1} \times 0,03 \times 0,97^{19} = 20 \times 0,03 \times \frac{0,97^{20}}{0,97} \approx 0,6 \times \frac{0,5438}{0,97} \approx 0,3364.$$

$$4. P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \approx 1 - 0,5438 - 0,3364 = 0,1198.$$

5. Le nombre moyen est l'espérance : $E(X) = np = 20 \times 0,03 = 0,6$ sachet mal scellé par prélèvement de 20.

Partie B.

6. Sur 10000 sachets, le nombre de sachets mal scellés suit $B(10000; 0,03)$, d'espérance $10000 \times 0,03 = 300$. L'affirmation est abusive : certes $300 < 400$, mais il s'agit

d'une moyenne ; le nombre réel est aléatoire et peut dépasser 400 certains jours. Le mot « forcément » est donc incorrect.

7. La probabilité qu'aucun des 20 sachets ne soit défectueux est $(1-p)^{20}$. La condition de l'usine s'écrit donc $(1-p)^{20} > 0,9$. La fonction $t \mapsto t^{1/20}$ étant croissante sur $[0; +\infty[$:

$$1-p > 0,9^{1/20} \approx 0,9947 \iff p < 1 - 0,9947 = 0,0053.$$

Le taux de sachets défectueux doit donc être au maximum $p \approx 0,005$, soit 0,5 %.

Barème indicatif (sur 5 pts) : justification complète de la loi binomiale (1 pt) ; $P(X = 0)$ et $P(X = 1)$ (1 pt) ; $P(X \geq 2)$ par le complément (0,5 pt) ; $E(X)$ (0,5 pt) ; critique de l'affirmation (1 pt) ; inéquation en p et résolution (1 pt).

ATTENTION Points de vigilance

L'assimilation à un tirage avec remise est la condition qui autorise l'indépendance — elle doit être citée ; pour « au moins deux », passer par $1 - P(X = 0) - P(X = 1)$; dans la question 7, justifier le sens de l'inégalité par la croissance de la fonction puissance.

CORRIGÉ Exercice 11 — QCM du concours d'entrée — type Bac

Partie A.

- Chaque question est une épreuve de Bernoulli : succès « réponse correcte » de probabilité $p = \frac{1}{4} = 0,25$ (une seule réponse juste parmi 4, choix au hasard). Les 8 réponses sont indépendantes et X compte les succès : donc $X \sim B(8; 0,25)$.
- $P(X = 4) = \binom{8}{4} \times 0,25^4 \times 0,75^4 = 70 \times 0,00390625 \times 0,31640625 \approx 0,0865$.
- Les événements $(X = k)$ sont incompatibles deux à deux :

$$P(X \geq 4) = P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) + P(X = 7) + P(X = 8).$$

Or $P(X = 8) = 0,25^8 \approx 0,0000153 \approx 0,0000$, d'où

$$P(X \geq 4) \approx 0,0865 + 0,0231 + 0,0038 + 0,0004 + 0,0000 = 0,1138.$$

En répondant au hasard, un candidat a environ 11,4 % de chances d'obtenir au moins la moitié des bonnes réponses.

- $E(X) = np = 8 \times 0,25 = 2$; $V(X) = np(1-p) = 8 \times 0,25 \times 0,75 = 1,5$; $\sigma(X) = \sqrt{1,5} \approx 1,22$.

En répondant au hasard, un candidat obtient en moyenne 2 bonnes réponses sur 8.

Partie B.

5. Le candidat a X bonnes réponses et $8 - X$ mauvaises :

$$N = X - 0,25(8 - X) = X - 2 + 0,25X = 1,25X - 2.$$

Par linéarité de l'espérance : $E(N) = 1,25 E(X) - 2 = 1,25 \times 2 - 2 = 0,5$.

Le barème à points négatifs ramène la note moyenne d'un candidat répondant au hasard à 0,5 sur 8, proche de zéro : il dissuade efficacement les réponses au hasard.

6. Le coût annuel pour la compagnie est une variable aléatoire valant 400000 FCFA avec probabilité 0,05 et 0 avec probabilité 0,95. Le coût moyen (espérance) par client est :

$$E = 0,05 \times 400000 + 0,95 \times 0 = 20000 \text{ FCFA.}$$

Pour dégager une marge de 20 % sur ce coût moyen, la prime doit valoir au moins :

$$20000 \times 1,20 = 24000 \text{ FCFA.}$$

La prime annuelle minimale est donc de 24000 FCFA (déjà un multiple de 1000). C'est exactement le principe du calcul des primes pures en assurance : prime = espérance du coût des sinistres, majorée d'un chargement.

Barème indicatif (sur 5 pts) : loi binomiale justifiée (1 pt) ; $P(X = 4)$ avec le coefficient binomial (0,5 pt) ; $P(X \geq 4)$ en sommant les valeurs (1 pt) ; $E(X)$, $\sigma(X)$ et interprétation (1 pt) ; N en fonction de X et $E(N)$ (1 pt) ; coût moyen et prime (0,5 pt).

ATTENTION Points de vigilance

Ne pas oublier $\binom{8}{4} = 70$ dans $P(X = 4)$; « au moins la moitié » signifie $X \geq 4$ (et non $X > 4$) ; la linéarité de l'espérance $E(aX + b) = aE(X) + b$ doit être nommée ; attention : $V(aX + b) = a^2 V(X)$, le b disparaît.

14 FICHE BILAN

15 PROBABILITÉS, VARIABLES ALÉATOIRES ET LOI BINOMIALE

15.1 Vocabulaire des probabilités et équiprobabilité

DÉFINITION Expérience aléatoire, univers et événements

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on ne peut pas prédire le résultat avec certitude, mais dont on connaît l'ensemble de tous les résultats possibles.

- L'ensemble de tous les résultats possibles s'appelle l'**univers** et se note Ω .
- Un **événement** est une partie de Ω (un ensemble de résultats). On note généralement les événements par des lettres majuscules $A, B, C, \dots$
- Un **événement élémentaire** est un événement qui ne contient qu'un seul résultat : $\{\omega\}$ avec $\omega \in \Omega$.
- L'**événement contraire** (ou complémentaire) de A est l'ensemble des résultats de Ω qui n'appartiennent pas à A : $\bar{A} = \Omega \setminus A = \{\omega \in \Omega \mid \omega \notin A\}$.
- L'**événement impossible** est $\emptyset$; l'**événement certain** est Ω .

EXEMPLE Exemples concrets au Cameroun

1. Lancer un dé équilibré à 6 faces : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. L'événement « obtenir un nombre pair » est $A = \{2, 4, 6\}$. Son contraire est $\bar{A} = \{1, 3, 5\}$.
2. Code de recharge MTN (14 chiffres) : On choisit un code au hasard. Ω = ensemble des 10^{14} codes possibles. A = « le code commence par 237 » (indicatif pays). $\text{Card}(A) = 10^{11}$.
3. Enquête sur la consommation d'électricité (ENEO) : On interroge un ménage au hasard à Yaoundé. $\Omega = \{\text{Abonné}, \text{Non abonné}\}$. $A = \{\text{Abonné}\}$.

DÉFINITION Équiprobabilité

On dit qu'il y a **équiprobabilité** lorsque tous les résultats élémentaires de Ω ont la même

chance de se produire. Dans ce cas, pour tout événement $A \subset \Omega$:

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

ATTENTION Condition d'application

N'utilise jamais cette formule sans avoir justifié l'équiprobabilité. Au Bac, écrire « Par équiprobabilité » ou « Les issues sont équiprobables car le dé est parfait / le tirage est uniforme » est obligatoire pour obtenir le point de méthode.

PROPRIÉTÉ Propriétés immédiates

Pour tout événement A :

- $0 \leq P(A) \leq 1$.
- $P(\Omega) = 1$; $P(\emptyset) = 0$.
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

EXERCICE RÉSOLU 23 Probabilité et code promo Orange

Énoncé : Orange Cameroun lance un jeu. Un code gagnant est un nombre à 4 chiffres (de 0000 à 9999). Un client compose un code au hasard.

1. Définir Ω et calculer son cardinal.
2. Calculer la probabilité que le code soit un palindrome (ex : 1221, 3443).
3. Calculer la probabilité que le code ne contienne aucun chiffre 0.

Solution :

1. $\Omega = \{0000, 0001, \dots, 9999\}$. $\text{Card}(\Omega) = 10^4 = 10\,000$. Équiprobabilité justifiée (choix au hasard).
2. Un palindrome à 4 chiffres a la forme $abba$. $a \in \{0, \dots, 9\}$ (10 choix), $b \in \{0, \dots, 9\}$ (10 choix). $\text{Card}(A) = 10 \times 10 = 100$. $P(A) = \frac{100}{10\,000} = 0,01$.
3. $B = \ll \text{aucun } 0 \gg$. Chaque chiffre a 9 possibilités $\{1, \dots, 9\}$. $\text{Card}(B) = 9^4 = 6561$. $P(B) = \frac{6561}{10\,000} = 0,6561$.

15.2 Opérations sur les événements et arbres de probabilités

PROPRIÉTÉ Probabilité de la réunion

Pour quels que soient deux événements A et B :


$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Si A et B sont **incompatibles** ($A \cap B = \emptyset$), alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

MÉTHODE Arbre de probabilités pondéré

Pour modéliser une expérience à plusieurs étapes :

1. Dessiner les branches pour la première étape, étiqueter chaque branche par sa probabilité.
2. Pour chaque issue, dessiner les branches de l'étape suivante avec leurs probabilités (qui peuvent dépendre de l'issue précédente, par exemple dans un tirage sans remise).
3. Règle du produit : La probabilité d'un chemin (issue finale) est le produit des probabilités sur ses branches.
4. Règle de la somme : La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des chemins qui le réalisent.
5. Vérifier que la somme des probabilités des issues finales vaut 1.



Arbre de probabilités pour l'exemple du dépistage.

15.3 Variables aléatoires et loi de probabilité

DÉFINITION Variable aléatoire discrète

Une **variable aléatoire** (v.a.) X est une fonction définie sur Ω à valeurs dans $\mathbb{R}$. Elle associe un nombre réel x à chaque issue ω . On note $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ l'ensemble des valeurs prises par X . La **loi de probabilité** de X est le tableau :

$$\begin{array}{c|cccc} X & x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \hline P & p_1 & p_2 & \dots & p_n \end{array} \quad \text{avec } p_i = P(X = x_i) > 0 \text{ et } \sum_{i=1}^n p_i = 1.$$

DÉFINITION Fonction de répartition

La **fonction de répartition** de X est la fonction $F : \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$ définie par $F(x) = P(X \leq x)$.


- F est croissante, continue à droite, avec des sauts aux x_i .
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.
- $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.
- $P(X = x_i) = F(x_i) - \lim_{x \rightarrow x_i^-} F(x)$ (hauteur du saut).

EXEMPLE Loi de probabilité et fonction de répartition

Contexte : On lance deux dés équilibrés. X = somme des résultats. Ω a 36 issues équiprobables.

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	5/36	4/36	3/36	2/36	1/36

$F(x)$ est un escalier. $F(5) = P(X \leq 5) = \frac{1+2+3+4}{36} = \frac{10}{36}$. $P(5 < X \leq 8) = F(8) - F(5) = \frac{26}{36} - \frac{10}{36} = \frac{16}{36}$.

Fonction de répartition $F(x)$ de la somme de 2 dés

Graphique de la fonction de répartition (escalier).

15.4 Espérance, variance et écart-type

DÉFINITION Espérance mathématique

L'**espérance** (ou moyenne) de X est :

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i.$$

C'est la moyenne théorique pondérée par les probabilités. Unité : même unité que X .

PROPRIÉTÉ Propriétés de l'espérance (Linéarité)

Pour toutes v.a. X, Y et réels a, b :

- $E(aX + b) = aE(X) + b$.
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ (toujours vrai, même sans indépendance).

DÉFINITION Variance et écart-type

La **variance** mesure la dispersion autour de la moyenne :

$$V(X) = E[(X - E(X))^2] = \sum_{i=1}^n p_i (x_i - E(X))^2.$$

Formule de calcul pratique (dite **formule de König-Huygens**) :

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \quad \text{avec} \quad E(X^2) = \sum x_i^2 p_i.$$

L'**écart-type** est $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$. Il a la même unité que X .

PROPRIÉTÉ Propriétés de la variance

Pour $a, b \in \mathbb{R}$:

- $V(aX + b) = a^2 V(X)$ (le b ne change pas la dispersion).
- Si X et Y sont indépendantes : $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$.

ATTENTION Pièges classiques

- Oublier de vérifier $\sum p_i = 1$ avant de calculer $E(X)$.
- Confondre $E(X^2)$ et $[E(X)]^2$. $E(X^2) = \sum x_i^2 p_i$; $[E(X)]^2 = (\sum x_i p_i)^2$.
- Écrire $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$ sans parenthèses : $E(X)^2$ est ambigu, écrire $[E(X)]^2$.
- Appliquer $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$ sans vérifier l'indépendance.

EXERCICE RÉSOLU 24 Gain à un jeu de hasard (Loterie Nationale)

Énoncé : Un ticket coûte 500 FCFA. Gains possibles : 0 FCFA (prob. 0,9), 1 000 FCFA (prob. 0,08), 50 000 FCFA (prob. 0,02). X = gain net (gain - prix ticket).

1. Donner la loi de X .
2. Calculer $E(X)$ et l'interpréter.
3. Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Solution :

1. X prend les valeurs : -500 ($p=0,9$), 500 ($p=0,08$), 49 500 ($p=0,02$). Somme proba = 1.
2. $E(X) = (-500) \times 0,9 + 500 \times 0,08 + 49500 \times 0,02 = -450 + 40 + 990 = 580$ FCFA.
Interprétation : En moyenne, le joueur gagne 580 FCFA par ticket. Le jeu est favorable au joueur (rare!).
3. $E(X^2) = 250000 \times 0,9 + 250000 \times 0,08 + 2450250000 \times 0,02 = 225000 + 20000 + 49005000 = 49250000$. $V(X) = 49250000 - 580^2 = 49250000 - 336400 = 48913600$. $\sigma(X) = \sqrt{48913600} \approx 6994$ FCFA. Grande dispersion : risque élevé.

15.5 Épreuve de Bernoulli et schéma de Bernoulli

DÉFINITION Épreuve de Bernoulli

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire n'ayant que deux issues possibles :

- Succès (souvent noté 1), de probabilité $p \in [0,1]$.
- Échec (souvent noté 0), de probabilité $1 - p$ (souvent noté q).

La v.a. X associée ($X = 1$ si succès, 0 sinon) suit une **loi de Bernoulli** de paramètre $p : Be(p)$.
 $E(X) = p$, $V(X) = p(1 - p)$.

DÉFINITION Schéma de Bernoulli

On répète n fois ($n \in \mathbb{N}^*$) une même épreuve de Bernoulli de paramètre p , de manière indépendante. C'est un **schéma de Bernoulli** de paramètres (n, p) . Conditions à vérifier (check-list) :

1. Nombre fixé n d'épreuves.
2. Deux issues par épreuve (Succès/Échec).
3. Probabilité de succès p identique à chaque épreuve.
4. Indépendance des épreuves (souvent : tirages avec remise).

ATTENTION Indépendance et « Sans remise »

Si on tire sans remise dans une population finie, ce n'est PAS un schéma de Bernoulli (les probabilités changent, pas d'indépendance). C'est une loi hypergéométrique (hors programme Terminale, mais à savoir pour ne pas confondre). Au Bac, si « sans remise » → Arbre de probabilités ou dénombrement direct.

15.6 Loi binomiale et applications

PROPRIÉTÉ Loi binomiale $B(n, p)$

Soit X le nombre de succès lors d'un schéma de Bernoulli (n, p) . X suit la **loi binomiale** de paramètres n et p , notée $X \sim B(n, p)$. Pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n\}$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Démonstration (exigible au Bac) : Un chemin avec exactement k succès a une probabilité

$p^k(1-p)^{n-k}$ (produit car indépendance). Il y a $\binom{n}{k}$ façons de placer ces k succès parmi les n épreuves (choix des positions). Les chemins sont incompatibles $\rightarrow$ on somme les probabilités.

PROPRIÉTÉ Espérance et variance de la loi binomiale

Si $X \sim B(n, p)$:

$$E(X) = np, \quad V(X) = np(1-p), \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}.$$

Justification : $X = X_1 + \dots + X_n$ où $X_i \sim Be(p)$ indépendantes. $E(X) = \sum E(X_i) = np$. $V(X) = \sum V(X_i) = np(1-p)$ (indépendance).

MÉTHODE Calculer $P(X = k)$ ou $P(X \leq k)$ avec la loi binomiale

1. Identifier n (nb d'épreuves) et p (prob. succès). Vérifier les 4 conditions du schéma.
2. Écrire $X \sim B(n, p)$.
3. Cas $P(X = k)$: Appliquer la formule $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$. Calculer $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.
4. Cas $P(X \leq k)$ ou $P(X \geq k)$: Somme des termes. Astuce : $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1-p)^n$.
5. Arrondir le résultat final (souvent à 10^{-4} ou 10^{-3}) et conclure par une phrase.

LESAVAIS-TU ? Tables de la loi binomiale et Calculatrice

Au Cameroun, les tables de la loi binomiale (valeurs de $P(X \leq k)$) sont fournies dans les sujets du Bac pour $n \leq 20$ et certaines valeurs de p . Sur calculatrice (mode STAT/DIST) : BinomialCD (cumulée) et BinomialPD (ponctuelle). Attention : Même avec la calculatrice, il faut écrire la formule et les paramètres n, p, k sur la copie pour avoir les points de méthode.

EXERCICE RÉSOLU 25 Contrôle qualité usine de bouteilles (Brasseries du Cameroun)

Énoncé : Sur une chaîne de remplissage, 4% des bouteilles sont sous-remplies. On prélève au hasard 20 bouteilles (population grande $\approx$ avec remise). X = nombre de bouteilles sous-remplies.

1. Justifier que X suit une loi binomiale. Préciser ses paramètres.
2. Calculer $P(X = 0)$ et $P(X = 1)$.

3. Calculer la probabilité qu'il y ait au moins 2 bouteilles défectueuses.
4. Donner l'espérance et l'écart-type de X .

Solution :

1. $n = 20$ épreuves (bouteilles), 2 issues (conforme/défectueuse), $p = 0,04$ constant, indépendance (prélèvement dans grande population ou avec remise). $X \sim B(20; 0,04)$.
2. $P(X = 0) = (0,96)^{20} \approx 0,4420$. $P(X = 1) = \binom{20}{1} 0,04^1 0,96^{19} = 20 \times 0,04 \times 0,96^{19} \approx 0,3683$.
3. $P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \approx 1 - 0,4420 - 0,3683 = 0,1897$.
4. $E(X) = 20 \times 0,04 = 0,8$ bouteille. $V(X) = 20 \times 0,04 \times 0,96 = 0,768$. $\sigma(X) = \sqrt{0,768} \approx 0,876$ bouteille.

EXERCICE RÉSOLU 26 Réussite au Baccalauréat (Série C/D/E/TL)

Énoncé : Dans un lycée, la probabilité qu'un élève de Terminale C obtienne son Bac est 0,72. On choisit au hasard un groupe de 15 élèves. Y = nombre de reçus.

1. Modéliser. Quelle est la probabilité qu'exactement 10 élèves soient reçus ?
2. Probabilité que la majorité (au moins 8) soit reçue ?
3. Combien d'élèves faut-il interroger pour être sûr à 99% d'avoir au moins un reçu ? (Utiliser $P(X \geq 1) \geq 0,99$).

Solution :

1. $Y \sim B(15; 0,72)$. $P(Y = 10) = \binom{15}{10} 0,72^{10} 0,28^5 = 3003 \times 0,72^{10} \times 0,28^5 \approx 0,206$.
2. $P(Y \geq 8) = 1 - P(Y \leq 7)$. Utiliser table ou calculatrice : $P(Y \leq 7) \approx 0,057$. Donc $P(Y \geq 8) \approx 0,943$.
3. On cherche n tel que $1 - (1 - 0,72)^n \geq 0,99 \iff 0,28^n \leq 0,01$. $n \ln(0,28) \leq \ln(0,01) \iff n \geq \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,28)} \approx \frac{-4,605}{-1,273} \approx 3,62$. Il faut au moins 4 élèves.

EXERCICE 19 Entraînement : Forage d'eau (MINEE)

On réalise des forages pour trouver de l'eau potable dans une zone rurale. La probabilité de succès (trouver de l'eau) pour un forage est de 0,35. On prévoit 10 forages indépendants. Z = nombre de forages fructueux.

1. Justifier la loi suivie par Z et donner ses paramètres.
2. Calculer la probabilité qu'exactement 3 forages soient fructueux.
3. Calculer la probabilité qu'au moins un forage soit fructueux.

4. Déterminer l'espérance et l'écart-type de Z .

CORRIGÉ Exercice : Forage d'eau

1. Schéma de Bernoulli : $n = 10$ forages, 2 issues (eau/sec), $p = 0,35$ constant, indépendance. $Z \sim B(10; 0,35)$.
2. $P(Z = 3) = \binom{10}{3} 0,35^3 0,65^7 = 120 \times 0,042875 \times 0,049022 \approx 0,252$.
3. $P(Z \geq 1) = 1 - P(Z = 0) = 1 - 0,65^{10} \approx 1 - 0,0135 = 0,9865$.
4. $E(Z) = 10 \times 0,35 = 3,5$ forages. $V(Z) = 10 \times 0,35 \times 0,65 = 2,275$. $\sigma(Z) = \sqrt{2,275} \approx 1,508$ forages.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Vocabulaire et Bases

- **Univers Ω** , **Événement** (partie de Ω), **Événement contraire $\bar{A}$** .
- **Équiprobabilité** : $P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$ (justifier toujours).
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$; $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- **Arbre pondéré** : Produit sur un chemin, Somme pour un événement.

2. Variable Aléatoire (V.A.)

- **Loi de probabilité** : Tableau valeurs x_i / probabilités p_i ($\sum p_i = 1$).
- **Fonction de répartition** $F(x) = P(X \leq x)$: croissante, escalier, sauts aux x_i .
- **Espérance** $E(X) = \sum x_i p_i$. Linéaire : $E(aX + b) = aE(X) + b$.
- **Variance** $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \sum p_i (x_i - E(X))^2$. $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.
- $V(aX + b) = a^2 V(X)$. Si X, Y indépendantes : $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$.

3. Loi Binomiale $B(n, p)$

- **Schéma de Bernoulli** : n épreuves, 2 issues, p constant, indépendance (avec remise).
- $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$ pour $k = 0, \dots, n$.
- $E(X) = np$; $V(X) = np(1 - p)$; $\sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}$.
- **Astuce** : $P(X \geq 1) = 1 - (1 - p)^n$.

À RETENIR

Checklist Bac — Suis-je prêt ?

- ☐ Je définis Ω , événement, événement élémentaire, événement contraire sans confusion.
- ☐ J'écris « Par équiprobabilité » avant d'appliquer $P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$.
- ☐ J'utilise $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ pour les « au moins un » ou « pas tous ».
- ☐ J'applique $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ sans oublier l'intersection.
- ☐ Je construis un arbre pondéré : probabilités sur les branches, produit le long du chemin, somme des chemins pour un événement.
- ☐ Je détermine la loi d'une v.a. X (tableau valeurs/probabilités) et je vérifie $\sum p_i = 1$.
- ☐ Je trace et j'interprète la fonction de répartition $F(x) = P(X \leq x)$.
- ☐ Je calcule $E(X)$, $E(X^2)$, $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, $\sigma(X)$.
- ☐ Je reconnais un schéma de Bernoulli (4 critères) et j'écris $X \sim B(n, p)$.
- ☐ Je calcule $P(X = k)$ avec la formule binomiale (attention aux exposants k et $n - k$).
- ☐ Je cite $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$ pour la binomiale.
- ☐ Je conclus par une phrase répondant à la question, avec arrondi si nécessaire.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+