

MATHÉMATIQUES • TLE E

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON 06

FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN

DURÉE CONSEILLÉE : 8 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit la fonction logarithme népérien comme primitive de $x \mapsto 1/x$ s'annulant en 1, établit ses propriétés algébriques fondamentales, ses limites, sa dérivée et sa courbe représentative. Elle fournit les outils pour résoudre équations, inéquations et systèmes, calculer des primitives de la forme u'/u et modéliser des situations concrètes de croissance, de désintégration ou d'échelles logarithmiques.

- À la fin de cette leçon, je sais définir la fonction $\ln$ et préciser son ensemble de définition
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les propriétés algébriques de $\ln$ pour simplifier ou développer une expression
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer les limites de $\ln$ aux bornes de son domaine et celles de fonctions composées avec $\ln$
- À la fin de cette leçon, je sais dériver une fonction de la forme $\ln u$ et étudier ses variations
- À la fin de cette leçon, je sais dresser le tableau de variation complet de $\ln$ et tracer sa courbe représentative avec ses éléments remarquables
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une primitive de la forme u'/u



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Définition et premières propriétés de la fonction $\ln$ | applications |
| 2. Propriétés algébriques de $\ln$ | 7. Logarithme de base a |
| 3. Limites de la fonction $\ln$ | 8. Activité d'intégration |
| 4. Dérivation, variations et courbe représentative | 9. Méthodes et exercices résolus |
| 5. Primitives de la forme u'/u | 10. Exercices |
| 6. Équations, inéquations, systèmes et | 11. Corrigés des exercices |
| | 12. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir la fonction $\ln$ et préciser son ensemble de définition
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les propriétés algébriques de $\ln$ pour simplifier ou développer une expression
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer les limites de $\ln$ aux bornes de son domaine et celles de fonctions composées avec $\ln$
- À la fin de cette leçon, je sais dériver une fonction de la forme $\ln u$ et étudier ses variations
- À la fin de cette leçon, je sais dresser le tableau de variation complet de $\ln$ et tracer sa courbe représentative avec ses éléments remarquables
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une primitive de la forme u'/u
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre des équations, inéquations et systèmes faisant intervenir $\ln x$
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser $\ln$ pour modéliser et résoudre des problèmes concrets (croissance, pH, échelle logarithmique)

PRÉREQUIS

- Notion de primitive d'une fonction continue sur un intervalle (début de Terminale)
- Dérivation des fonctions usuelles et dérivée des fonctions composées (Première)

- Étude de variations et limites de fonctions (Première et début de Terminale)
- Résolution d'équations et d'inéquations du premier et du second degré
- Fonction inverse $x \mapsto 1/x$: ensemble de définition, continuité, représentation graphique

1 DÉFINITION ET PREMIÈRES PROPRIÉTÉS DE LA FONCTION LN

Au Cameroun, le pH de l'eau de forage contrôlée par les services d'hygiène, l'échelle de Richter utilisée pour évaluer les séismes ressentis dans la région de l'Ouest, et le temps nécessaire pour doubler un capital placé à la microfinance reposent tous sur un même outil mathématique : le **logarithme népérien**. Comment une seule fonction peut-elle transformer des multiplications en additions et rendre calculables des phénomènes qui croissent très lentement ou très vite ? Cette leçon construit cette fonction à partir d'un problème d'**aire** sous une hyperbole et montre comment elle résout des équations que les outils de Première ne permettaient pas de traiter.

1.1 Un problème d'aire sous l'hyperbole

Le point de départ : une fonction sans primitive « simple ».

Depuis la classe de Première, tu sais dériver les fonctions polynômes, les puissances, les racines carrées. Mais voici une question embarrassante : quelle fonction a pour dérivée $x \mapsto \frac{1}{x}$? Essayons. La dérivée de x^2 est $2x$; celle de x est 1 ; celle d'une constante est 0 . En dérivant, les puissances descendent d'un cran : on ne peut jamais obtenir $\frac{1}{x} = x^{-1}$ en dérivant une puissance de x , car la dérivée de $x^0 = 1$ est 0 , pas x^{-1} . Aucune des fonctions « usuelles » de Première ne convient.

Pourtant, la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ est **continue** sur $]0 ; +\infty[$ (c'est une fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas sur cet intervalle). Or un théorème fondamental de l'analyse affirme que **toute fonction continue sur un intervalle y admet des primitives**. Il existe donc bel et bien des fonctions dont la dérivée est $\frac{1}{x}$: simplement, ce sont des fonctions nouvelles, que nous allons construire.

EXPÉRIENCE

Découverte : mesurer une aire sous l'hyperbole

Considérons la courbe de $t \mapsto \frac{1}{t}$ (une hyperbole) et intéressons-nous à l'aire du domaine compris entre la courbe, l'axe des abscisses, et les droites verticales d'abscisses 1 et x , pour un réel $x > 1$ fixé.

1. Pour $x = 1$, que vaut cette aire ? (Le domaine est réduit à un segment.)
2. Pour $x = 2$, encadre l'aire entre celle du rectangle de largeur 1 et de hauteur $\frac{1}{2}$ (sous la courbe) et celle du rectangle de largeur 1 et de hauteur 1 (au-dessus de la courbe). Qu'en déduis-tu ?
3. Si l'on note $F(x)$ cette aire, que vaut $F(1)$? Le nombre $F(x)$ augmente-t-il quand x augmente ?

Tu viens de définir, sans le savoir, la fonction logarithme népérien : $F(x) = \ln x$.

L'idée est donc la suivante : puisque $\frac{1}{x}$ admet des primitives sur $]0; +\infty[$, et que ces primitives diffèrent toutes d'une constante, on en choisit **une seule**, de manière canonique : celle qui vaut 0 en $x = 1$. C'est exactement l'aire mesurée à partir de l'abscisse 1.

1.2 Définition de la fonction logarithme népérien

DÉFINITION Fonction logarithme népérien

On appelle **fonction logarithme népérien**, notée $\ln$, l'unique primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur l'intervalle $]0; +\infty[$ qui s'annule en 1. Autrement dit, pour tout réel $x > 0$:

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt.$$

L'**ensemble de définition** de $\ln$ est donc $D_{\ln} =]0; +\infty[$.

ATTENTION Le domaine avant tout !

L'erreur la plus fréquente — et la plus sanctionnée au Baccalauréat — est d'écrire $\ln x$ pour un nombre $x \leq 0$. Le logarithme népérien n'existe que pour les réels strictement positifs. Avant tout calcul, toute équation ou toute étude de fonction contenant $\ln$, commence par déterminer l'ensemble de validité. Par exemple, $\ln(x-3)$ n'a de sens que si $x-3 > 0$, c'est-à-dire $x > 3$. Écrire $\ln(-2)$ ou $\ln 0$ est une absurdité mathématique.

PROPRIÉTÉ Dérivabilité et dérivée de $\ln$

La fonction $\ln$ est **dérivable** sur $]0; +\infty[$ (donc **continue** sur cet intervalle), et pour tout $x > 0$:

$$(\ln)'(x) = \frac{1}{x}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration (immédiate, mais à savoir rédiger)

C'est une conséquence directe de la définition. Dire que $\ln$ est une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ signifie exactement deux choses :

1. $\ln$ est dérivable sur $]0; +\infty[$;
2. sa dérivée est la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$, c'est-à-dire $(\ln)'(x) = \frac{1}{x}$ pour tout $x > 0$.


De plus, toute fonction dérivable sur un intervalle est continue sur cet intervalle, donc $\ln$

est continue sur $]0; +\infty[$.



1.3 Interprétation géométrique : le logarithme comme une aire

La définition intégrale donne une image mentale précieuse : pour $x > 1$, le nombre $\ln x$ est l'**aire** (en unités d'aire) du domaine délimité par l'hyperbole d'équation $y = \frac{1}{t}$, l'axe des abscisses et les droites $t = 1$ et $t = x$.



Pour $x > 1$, $\ln x$ est l'aire du domaine hachuré situé sous l'hyperbole $y = \frac{1}{t}$, entre les abscisses 1 et x .

À RETENIR Lecture géométrique du signe

- Si $x > 1$, l'intégrale $\int_1^x \frac{dt}{t}$ est l'aire d'un domaine situé au-dessus de l'axe des abscisses : elle est strictement positive.
- Si $0 < x < 1$, on intègre « à rebours » (de 1 vers une borne plus petite) : $\ln x = - \int_x^1 \frac{dt}{t}$, qui est strictement négatif.
- Si $x = 1$, le domaine est réduit à un segment, d'aire nulle : $\ln 1 = 0$.

1.4 Premières valeurs remarquables et le nombre e

PROPRIÉTÉ Valeurs remarquables

- $\ln 1 = 0$ (par définition même : la primitive choisie s'annule en 1).

- Il existe un unique réel, noté e , tel que $\ln e = 1$. On a $e \approx 2.718$.

L'existence et l'unicité de e seront justifiées rigoureusement dans la section 4 grâce au théorème des valeurs intermédiaires (la fonction $\ln$ est continue, strictement croissante, et prend des valeurs arbitrairement grandes). Retenons dès maintenant l'idée géométrique : e est l'abscisse telle que l'aire sous l'hyperbole entre 1 et e vaut exactement 1 unité d'aire.

EXEMPLE Premières valeurs à la calculatrice

À l'aide de la touche $\ln$ de la calculatrice, on obtient :

x	1	2	e	10
$\ln x$ (arrondi à 10^{-3})	0	0.693	1	2.303

On note aussi $\ln 0.5 \approx -0.693$: cohérent avec le fait que $0.5 < 1$, donc son logarithme est négatif. Remarque au passage : $\ln 0.5 = -\ln 2$ — ce n'est pas un hasard, la section 2 l'expliquera.

LESAVAIS-TU ? Le nombre e , star de la finance

Le nombre $e \approx 2.71828$ est appelé **nombre d'Euler**, en hommage au mathématicien suisse Leonhard Euler (XVIII^e siècle), même si c'est John Napier (Neper) qui donna son nom au logarithme « népérien » au début du XVII^e siècle. Le nombre e apparaît naturellement dans le calcul des intérêts composés : si une microfinance de Yaoundé plaçait un capital à un taux de 100 % par an en composant les intérêts de plus en plus souvent (chaque mois, chaque jour, chaque seconde...), le capital au bout d'un an tendrait vers e fois le capital initial, et non vers l'infini ! C'est pourquoi e gouverne tous les phénomènes de croissance continue : populations, radioactivité, épidémies.

1.5 Sens de variation et signe de la fonction $\ln$

PROPRIÉTÉ Stricte croissance de $\ln$

La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$.

EXPÉRIENCE Démonstration (exigible)

Pour tout $x > 0$, on a $(\ln)'(x) = \frac{1}{x}$. Or $x > 0$ implique $\frac{1}{x} > 0$: la dérivée est strictement positive sur $]0; +\infty[$. La fonction $\ln$ est donc strictement croissante sur cet intervalle. ■

Cette stricte croissance, combinée à la valeur $\ln 1 = 0$, donne immédiatement le signe de $\ln x$.

PROPRIÉTÉ **Signe de $\ln x$**

- Si $0 < x < 1$, alors $\ln x < 0$;
- si $x = 1$, alors $\ln x = 0$;
- si $x > 1$, alors $\ln x > 0$.

EXPÉRIENCE **Démonstration (exigible)**

La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$ et $\ln 1 = 0$.

- Si $x > 1$, la stricte croissance donne $\ln x > \ln 1 = 0$.
- Si $0 < x < 1$, la stricte croissance donne $\ln x < \ln 1 = 0$.

On retrouve exactement ce que l'interprétation géométrique par les aires nous avait fait deviner. ■

ATTENTION **Deux conséquences à ne jamais oublier**

1. Conservation de l'ordre : pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$,

$$\ln a < \ln b \iff a < b.$$

C'est la clé de toutes les inéquations avec $\ln$ (section 6) : on peut « enlever » les $\ln$ sans changer le sens de l'inégalité, car $\ln$ est croissante.

2. Unicité : $\ln a = \ln b \iff a = b$ (pour $a, b > 0$). La fonction $\ln$ est **injective** : deux nombres distincts ont des logarithmes distincts.

1.6 Exercices résolus de mise en route

EXERCICE RÉSOLU 1 **Domaine de définition d'une expression avec $\ln$**

Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f définie par $f(x) = \ln(2x - 6) + \ln(x + 1)$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Une expression $\ln(\text{quelque chose})$ n'existe que si ce « quelque chose » est strictement positif. Il faut donc que les deux conditions soient réalisées simultanément :

$$\begin{cases} 2x - 6 > 0 \\ x + 1 > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > 3 \\ x > -1 \end{cases}$$

Les deux conditions doivent être vraies en même temps : on prend la plus restrictive, c'est-à-dire $x > 3$.

$$D_f =]3; +\infty[.$$

Vérification mentale : pour $x = 4$, $2x - 6 = 2 > 0$ et $x + 1 = 5 > 0$, tout va bien ; pour $x = 2$, $2x - 6 = -2 < 0$, l'expression n'existe pas.

EXERCICE RÉSOLU 2 Comparaison et signe sans calculatrice

1. Comparer $\ln 5$ et $\ln 7$.
2. Déterminer le signe de $\ln 0.8$ et celui de $\ln \frac{3}{2}$.
3. Résoudre dans $]0; +\infty[$ l'équation $\ln x = 0$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La fonction $\ln$ est strictement croissante et $5 < 7$, donc $\ln 5 < \ln 7$.
2. $0.8 < 1$, donc $\ln 0.8 < 0$. De même $\frac{3}{2} = 1.5 > 1$, donc $\ln \frac{3}{2} > 0$.
3. On sait que $\ln 1 = 0$. Par injectivité de $\ln$ (stricte croissance), l'équation $\ln x = 0 = \ln 1$ équivaut à $x = 1$. L'unique solution est $x = 1$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Estimation d'une aire

Un technicien de CAMTEL modélise l'atténuation d'un signal par une formule faisant intervenir $\ln 3$. En utilisant l'interprétation géométrique, encadrer $\ln 3$ entre deux aires de rectangles, puis donner la valeur approchée à la calculatrice.

SOLUTION

Solution détaillée.

$\ln 3$ est l'aire sous l'hyperbole $y = \frac{1}{t}$ entre $t = 1$ et $t = 3$, sur un intervalle de largeur 2. Sur $[1; 3]$, la fonction $t \mapsto \frac{1}{t}$ est décroissante, donc :

$$\frac{1}{3} \leq \frac{1}{t} \leq 1 \quad \text{pour tout } t \in [1; 3].$$

En multipliant par la largeur 2 de l'intervalle :

$$2 \times \frac{1}{3} \leq \ln 3 \leq 2 \times 1, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \frac{2}{3} \leq \ln 3 \leq 2.$$

La calculatrice donne $\ln 3 \approx 1.099$, valeur bien comprise entre 0.667 et 2. L'encadrement est grossier (les rectangles épousent mal la courbe) mais il permet de vérifier un résultat et de détecter une erreur de saisie à la calculatrice.

À RETENIR L'essentiel de cette section

- $\ln$ est l'unique primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ qui s'annule en 1 : $\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}$.
- $\ln x$ n'existe que pour $x > 0$: toujours chercher le domaine en premier.
- $\ln$ est dérivable et continue sur $]0; +\infty[$, avec $(\ln)'(x) = \frac{1}{x} > 0$: $\ln$ est strictement croissante.
- $\ln 1 = 0$; $\ln e = 1$ avec $e \approx 2.718$.
- $\ln x < 0$ si $0 < x < 1$; $\ln x > 0$ si $x > 1$.
- Géométriquement, pour $x > 1$, $\ln x$ est l'aire sous l'hyperbole $y = \frac{1}{t}$ entre 1 et x .

EXERCICE 1 Pour s'entraîner

1. Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction : $g(x) = \ln(5 - x)$; $h(x) = \ln(x^2 - 4)$; $k(x) = \frac{\ln x}{x - 1}$.
2. Sans calculatrice, ranger dans l'ordre croissant : $\ln \frac{1}{2}$, $\ln 1$, $\ln 3$, $\ln 0.9$.
3. Résoudre dans $]0; +\infty[$: a) $\ln x = 1$; b) $\ln x < 0$; c) $\ln x \geq \ln 4$.
4. En utilisant la méthode des rectangles, encadrer $\ln 2$ entre $\frac{1}{2}$ et 1, puis vérifier à la cal-

culatrice.

CORRIGÉ Exercice : Pour s'entraîner

1. g : il faut $5 - x > 0$, soit $x < 5$: $D_g =]-\infty; 5[$. h : il faut $x^2 - 4 > 0$, soit $x < -2$ ou $x > 2$: $D_h =]-\infty; -2[\cup]2; +\infty[$. k : il faut $x > 0$ et $x \neq 1$: $D_k =]0; 1[\cup]1; +\infty[$.
2. La fonction $\ln$ est strictement croissante et $\frac{1}{2} < 0.9 < 1 < 3$, donc : $\ln \frac{1}{2} < \ln 0.9 < \ln 1 < \ln 3$.
3. a) $\ln x = 1 = \ln e$ donne $x = e$. b) $\ln x < 0 = \ln 1$ donne, par stricte croissance, $x < 1$: $S =]0; 1[$. c) $\ln x \geq \ln 4$ donne $x \geq 4$: $S = [4; +\infty[$.
4. Sur $[1; 2]$, $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{t} \leq 1$; en multipliant par la largeur 1 : $\frac{1}{2} \leq \ln 2 \leq 1$. La calculatrice donne $\ln 2 \approx 0.693$, conforme à l'encadrement.

2 PROPRIÉTÉS ALGÈBRIQUES DE LN

Dans la section précédente, nous avons défini la fonction logarithme népérien comme l'unique primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ qui s'annule en 1 :

$$\ln(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad \ln(1) = 0, \quad \ln'(x) = \frac{1}{x}.$$

Cette définition par une intégrale est précise, mais elle cache un trésor : la fonction $\ln$ possède des **propriétés algébriques** extraordinaires qui la rendent irremplaçable en calcul. L'idée centrale est la suivante : **le logarithme transforme les multiplications en additions**. Or additionner est bien plus facile que multiplier ! C'est exactement ce « miracle » que nous allons démontrer et exploiter dans toute cette section. Tu verras qu'une seule formule — la relation fonctionnelle $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ — engendre toutes les autres, comme un tronc d'arbre engendre ses branches.

2.1 La relation fonctionnelle fondamentale

Commençons par une intuition. Prenons $a = 2$ et $b = 3$. À la calculatrice : $\ln 2 \approx 0,693$, $\ln 3 \approx 1,099$ et $\ln 6 \approx 1,792$. Or $0,693 + 1,099 = 1,792$. Coïncidence ? Essayons avec $a = 5$ et $b = 7$: $\ln 5 \approx 1,609$ et $\ln 7 \approx 1,946$ et $\ln 35 \approx 3,555$. Encore exact ! Ce phénomène n'est pas un hasard : c'est un théorème, que nous allons démontrer proprement.

PROPRIÉTÉ Relation fonctionnelle fondamentale (théorème)

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

Autrement dit, le logarithme d'un produit est la somme des logarithmes. Cette démonstration est classique au Baccalauréat : il faut savoir la refaire.

EXPÉRIENCE**Démonstration guidée du théorème fondamental**

Fixons un réel $a > 0$ quelconque. L'astuce consiste à faire varier b : on étudie la fonction

$$\varphi : x \mapsto \ln(ax) - \ln x \quad \text{définie sur }]0; +\infty[.$$

1. **Dérivabilité.** La fonction $x \mapsto ax$ est dérivable et strictement positive sur $]0; +\infty[$, donc par composition φ est dérivable sur $]0; +\infty[$.
2. **Calcul de la dérivée.** Par la formule de dérivation d'une composée $(\ln \circ u)' = \frac{u'}{u}$ avec $u(x) = ax$, donc $u'(x) = a$:

$$\varphi'(x) = \frac{a}{ax} - \frac{1}{x} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x} = 0.$$

3. **Conclusion sur φ .** La dérivée de φ est nulle sur l'intervalle $]0; +\infty[$, donc φ est constante sur cet intervalle.
4. **Détermination de la constante.** Évaluons en $x = 1$:

$$\varphi(1) = \ln(a \times 1) - \ln 1 = \ln a - 0 = \ln a.$$

Donc pour tout $x > 0$: $\ln(ax) - \ln x = \ln a$, c'est-à-dire $\ln(ax) = \ln a + \ln x$.

5. **Conclusion.** En prenant $x = b$ (réel strictement positif quelconque) : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$. ■

ATTENTION**La dérivée nulle implique la constance... sur un intervalle !**

L'étape 3 de la démonstration utilise le théorème : « si $f' = 0$ sur un intervalle, alors f est constante sur cet intervalle ». Ici, $]0; +\infty[$ est bien un intervalle, donc tout va bien. Retiens aussi l'idée générale de la méthode : pour prouver qu'une expression est constante, on montre que sa dérivée est nulle, puis on calcule la constante en un point bien choisi (souvent $x = 1$ pour le logarithme).

EXEMPLE**Vérification numérique**

Avec $a = 8$ et $b = 4$: $\ln 8 + \ln 4 = 3 \ln 2 + 2 \ln 2 = 5 \ln 2$ (nous justifierons bientôt la formule des

puissances utilisée ici). Et $\ln(8 \times 4) = \ln 32 = \ln(2^5) = 5 \ln 2$. Les deux membres coïncident, comme prévu.

2.2 Logarithme de l'inverse et du quotient

Toutes les propriétés qui suivent sont des **conséquences directes** de la relation fondamentale. C'est la beauté de la théorie : une seule démonstration par dérivation, puis tout découle par de simples calculs algébriques.

PROPRIÉTÉ Logarithme de l'inverse

Pour tout réel $a > 0$:

$$\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a.$$

Démonstration. Appliquons la relation fondamentale au produit $a \times \frac{1}{a} = 1$:

$$\ln\left(a \times \frac{1}{a}\right) = \ln a + \ln\left(\frac{1}{a}\right).$$

Mais le membre de gauche vaut $\ln 1 = 0$. Donc $\ln a + \ln\left(\frac{1}{a}\right) = 0$, d'où $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a$. ■

PROPRIÉTÉ Logarithme d'un quotient

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b.$$

Démonstration. Un quotient est un produit par l'inverse : $\frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b}$. On applique successivement les deux propriétés précédentes :

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln\left(a \times \frac{1}{b}\right) = \ln a + \ln\left(\frac{1}{b}\right) = \ln a - \ln b. \quad \blacksquare$$

EXEMPLE Application directe

$\ln\left(\frac{1}{5}\right) = -\ln 5$ et $\ln\left(\frac{12}{3}\right) = \ln 12 - \ln 3$. Vérifions : $\ln 12 - \ln 3 = \ln(4 \times 3) - \ln 3 = \ln 4 + \ln 3 - \ln 3 = \ln 4$, et effectivement $\frac{12}{3} = 4$.

2.3 Logarithme d'une puissance et d'une racine

PROPRIÉTÉ Logarithme d'une puissance entière

Pour tout réel $a > 0$ et tout entier $n \in \mathbb{N}$:

$$\ln(a^n) = n \ln a.$$

Cette formule s'étend à $n \in \mathbb{Z}$ tout entier, et même à $n \in \mathbb{Q}$. (On admettra qu'elle reste valable pour tout exposant réel, une fois les puissances réelles définies.)

Démonstration (pour $n \in \mathbb{N}$, par récurrence).

- Initialisation : pour $n = 0$, $\ln(a^0) = \ln 1 = 0 = 0 \times \ln a$. La propriété est vraie.
- Hérédité : supposons $\ln(a^n) = n \ln a$ pour un entier n fixé. Alors, par la relation fondamentale :

$$\ln(a^{n+1}) = \ln(a^n \times a) = \ln(a^n) + \ln a = n \ln a + \ln a = (n+1) \ln a.$$

- Conclusion : par récurrence, $\ln(a^n) = n \ln a$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. ■

Extension à $\mathbb{Z}$: si n est un entier négatif, écrivons $n = -m$ avec $m \in \mathbb{N}$. Alors

$$\ln(a^n) = \ln\left(\frac{1}{a^m}\right) = -\ln(a^m) = -m \ln a = n \ln a.$$

Extension à $\mathbb{Q}$: pour $n = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$, on remarque que $(a^{p/q})^q = a^p$, donc $q \ln(a^{p/q}) = p \ln a$, d'où $\ln(a^{p/q}) = \frac{p}{q} \ln a$.

PROPRIÉTÉ Logarithme d'une racine carrée

Pour tout réel $a > 0$:

$$\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a.$$

Démonstration. Puisque $\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$, la relation fondamentale donne :


$$\ln a = \ln(\sqrt{a} \times \sqrt{a}) = \ln(\sqrt{a}) + \ln(\sqrt{a}) = 2 \ln(\sqrt{a}),$$

d'où $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a$. ■

EXEMPLE Calculs types

$$\ln(2^{10}) = 10 \ln 2; \ln\left(\frac{1}{9}\right) = -\ln 9 = -2 \ln 3; \ln(\sqrt{5}) = \frac{1}{2} \ln 5; \ln(\sqrt[3]{7}) = \ln(7^{1/3}) = \frac{1}{3} \ln 7.$$

L'arbre ci-dessous résume la structure logique de toute cette section : une seule racine, la relation fondamentale, et tout le reste en découle.



Arbre de démonstration : toutes les propriétés algébriques de $\ln$ naissent de la relation fondamentale $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.

2.4 Simplification d'expressions logarithmiques

En pratique, au Baccalauréat, on te demandera de faire deux types de manipulations inverses l'une de l'autre :

- **Regrouper** : écrire une somme ou une différence de logarithmes sous la forme d'un seul logarithme ;
- **Développer** : écrire le logarithme d'une expression compliquée comme une combinaison de logarithmes simples (par exemple en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$).

MÉTHODE Simplifier une expression avec des logarithmes

1. Repérer les coefficients devant les logarithmes et les faire « rentrer » en exposants : $n \ln a = \ln(a^n)$.
2. Regrouper les termes additionnés en un produit : $\ln a + \ln b = \ln(ab)$.
3. Regrouper les termes soustraits en un quotient : $\ln a - \ln b = \ln\left(\frac{a}{b}\right)$.
4. Simplifier l'argument obtenu (réduire la fraction, factoriser en puissances de nombres premiers).
5. Éventuellement, redévelopper pour faire apparaître $\ln 2$, $\ln 3$, etc.

EXEMPLE Exemple chiffré fondamental

Simplifions $A = \ln 8 + \ln 4 - \ln 2$.

$$A = \ln(8 \times 4) - \ln 2 = \ln\left(\frac{8 \times 4}{2}\right) = \ln 16 = \ln(2^4) = 4 \ln 2.$$

On a regroupé en un seul logarithme, puis réécrit le résultat en fonction de $\ln 2$.

EXERCICE RÉSOLU 4 Simplifications complètes

1. Écrire $B = 2 \ln 3 + \ln 5 - \frac{1}{2} \ln 25$ sous la forme d'un seul logarithme, puis simplifier.
2. Exprimer $C = \ln 48$ en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$.

SOLUTION

1. On applique la méthode étape par étape :

$$\begin{aligned} B &= \ln(3^2) + \ln 5 - \ln(25^{1/2}) && \text{(les coefficients deviennent des exposants)} \\ &= \ln 9 + \ln 5 - \ln(\sqrt{25}) \\ &= \ln(9 \times 5) - \ln 5 && \text{(regroupement en produit)} \\ &= \ln\left(\frac{45}{5}\right) && \text{(regroupement en quotient)} \\ &= \ln 9 = \ln(3^2) = 2 \ln 3. \end{aligned}$$

2. On décompose 48 en facteurs premiers : $48 = 16 \times 3 = 2^4 \times 3$. Donc :

$$C = \ln(2^4 \times 3) = \ln(2^4) + \ln 3 = 4 \ln 2 + \ln 3.$$

ATTENTION Le piège le plus fréquent : les sommes

Le logarithme ne possède aucune propriété pour les sommes :

$$\ln(a + b) \neq \ln a + \ln b \quad \text{et} \quad \ln(a \times b) \neq \ln a \times \ln b.$$

Par exemple, $\ln(2 + 3) = \ln 5 \approx 1,609$, alors que $\ln 2 + \ln 3 = \ln 6 \approx 1,792$. Ce n'est pas la même chose !

De même, $\ln(a) \times \ln(b) \neq \ln(ab)$: ne confonds pas le produit des logarithmes avec le logarithme du produit. Enfin, $\frac{\ln a}{\ln b} \neq \ln\left(\frac{a}{b}\right)$: le quotient des logarithmes n'est pas le logarithme du quotient. Retiens : $\ln$ simplifie les produits, les quotients et les puissances à l'intérieur de son argument, et rien d'autre.

ATTENTION Conditions d'existence

Toutes les formules de cette section exigent des arguments strictement positifs. Écrire $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ n'a de sens que si $a > 0$ et $b > 0$. Ainsi, $\ln((-2) \times (-3)) = \ln 6$ existe, mais on ne peut pas écrire $\ln(-2) + \ln(-3)$, qui n'a aucun sens. Dans les exercices, précisez toujours les conditions d'existence avant de manipuler les formules.

2.5 Complément culturel : l'unicité du logarithme**LESAVAIS-TU ?** Pourquoi les logarithmes ont changé le monde

C'est précisément la transformation produit $\rightarrow$ somme qui a rendu les logarithmes révolutionnaires. Au XVII^e siècle, les astronomes comme Kepler devaient multiplier à la main des nombres à dix chiffres pour calculer les orbites des planètes : un travail de plusieurs mois, plein d'erreurs. Grâce aux tables de logarithmes de Napier (1614) et Briggs, on remplaçait chaque multiplication par une simple addition : on lisait $\ln a$ et $\ln b$ dans la table, on additionnait, puis on cherchait dans la table le nombre dont le logarithme était cette somme. Laplace aurait dit que les logarithmes avaient « doublé la vie des astronomes ». Les règles à calcul, utilisées par les ingénieurs jusque dans les années 1970, reposent sur le même principe. Aujourd'hui encore, les échelles logarithmiques (pH en chimie, décibels en acoustique, magnitude des séismes) exploitent cette même propriété.

LESAVAIS-TU ? Caractérisation de la fonction $\ln$ (complément admis)

On peut démontrer — nous l'admettons ici — que la fonction $\ln$ est l'unique fonction f dérivable sur $]0; +\infty[$ vérifiant à la fois :

$$f(ab) = f(a) + f(b) \quad \text{pour tous } a, b > 0, \quad \text{et} \quad f'(1) = 1.$$

Autrement dit, la relation fonctionnelle n'est pas un simple « bonus » : elle caractérise entièrement le logarithme népérien. Toute fonction dérivable qui transforme les produits en sommes est de la forme $x \mapsto k \ln x$, et la condition $f'(1) = 1$ fixe $k = 1$. C'est ce point de vue que les mathématiciens adoptent pour définir les logarithmes de manière purement algébrique.

EXERCICE 2 À toi de jouer

1. Simplifier sous la forme d'un seul logarithme : $D = \ln 12 + \ln 3 - \ln 4 - \ln 9$.
2. Exprimer en fonction de $\ln 2$ et $\ln 5$: $E = \ln 200 - \ln 8 + \frac{1}{2} \ln 25$.

3. Montrer que pour tout $x > 0$: $\ln(x^2) - \ln\left(\frac{1}{x}\right) = 3 \ln x$.

CORRIGÉ Exercice

$$1. D = \ln\left(\frac{12 \times 3}{4 \times 9}\right) = \ln\left(\frac{36}{36}\right) = \ln 1 = 0.$$

$$2. E = \ln 200 - \ln 8 + \ln(\sqrt{25}) = \ln(2^3 \times 5^2) - \ln(2^3) + \ln 5 = 3 \ln 2 + 2 \ln 5 - 3 \ln 2 + \ln 5 = 3 \ln 5.$$

$$3. \text{ Pour } x > 0 : \ln(x^2) - \ln\left(\frac{1}{x}\right) = 2 \ln x - (-\ln x) = 2 \ln x + \ln x = 3 \ln x.$$

À RETENIR L'essentiel de la section

Pour tous $a, b > 0$ et tout entier n :

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b; \quad \ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a; \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b; \quad \ln(a^n) = n \ln a; \quad \ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a.$$

Toutes ces formules découlent de la première, démontrée en montrant que $x \mapsto \ln(ax) - \ln x$ a une dérivée nulle. Et surtout : $\ln(a + b)$ ne se simplifie pas.

Maintenant que nous maîtrisons l'algèbre du logarithme, il est temps d'étudier son comportement aux bornes de son ensemble de définition : que vaut $\ln x$ lorsque x se rapproche de 0, ou lorsque x devient immense ? C'est l'objet de la section suivante, consacrée aux limites de la fonction $\ln$.

3 LIMITES DE LA FONCTION LN

Dans la section précédente, nous avons établi les propriétés algébriques de la fonction logarithme népérien : elle transforme les produits en sommes, les quotients en différences et les puissances en produits. Ces propriétés vont maintenant devenir nos meilleurs outils pour répondre à une question essentielle : comment se comporte $\ln x$ lorsque x devient très grand, ou très proche de 0 ?

Cette question n'est pas anodine. Lorsqu'un ingénieur de CAMTEL modélise l'atténuation d'un signal dans une fibre optique, ou lorsqu'un chimiste mesure le pH d'une solution très diluée, ce sont des logarithmes qui interviennent, et il faut savoir prédire leur comportement aux « extrêmes ». Tu vas découvrir dans cette section un phénomène fascinant : la fonction $\ln$ grandit sans limite, mais avec une lenteur déconcertante.

3.1 Limite de $\ln x$ en $+\infty$

Intuition. Prenons la calculatrice et testons quelques valeurs :

$$\ln 10 \approx 2,30 \quad ; \quad \ln 100 \approx 4,61 \quad ; \quad \ln 1000 \approx 6,91 \quad ; \quad \ln 10^6 \approx 13,82.$$

Chaque fois que x est multiplié par 10, $\ln x$ n'augmente que d'environ 2,30 (ce qui n'est autre que $\ln 10$, conformément à la propriété $\ln(10x) = \ln x + \ln 10$). La fonction croît donc de plus en plus lentement... mais croît-elle quand même « jusqu'au bout », ou finit-elle par se bloquer devant un plafond ? La réponse est sans appel : il n'y a **aucun plafond**.

PROPRIÉTÉ Limite de $\ln$ en $+\infty$ — démonstration exigible

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

Autrement dit : pour tout réel A , aussi grand soit-il, il existe un rang au-delà duquel $\ln x > A$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : $\ln x$ dépasse toute borne

On veut montrer que $\ln x$ finit par dépasser n'importe quel réel A fixé.

1. Une suite qui file vers l'infini. Considérons les puissances de 2 : 2, 4, 8, 16, ..., 2^n , ... Par les propriétés algébriques de la section précédente :

$$\ln(2^n) = n \ln 2.$$

Or $\ln 2 > 0$ (car $2 > 1$ et $\ln$ est strictement croissante avec $\ln 1 = 0$). Donc $n \ln 2 \rightarrow +\infty$ quand $n \rightarrow +\infty$. La suite $(\ln(2^n))$ tend vers $+\infty$.

2. La croissance fait le reste. Soit A un réel quelconque. D'après l'étape 1, il existe un entier n_0 tel que $\ln(2^{n_0}) > A$. Posons $x_0 = 2^{n_0}$. Comme $\ln$ est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$, pour tout $x > x_0$:

$$\ln x > \ln(x_0) = \ln(2^{n_0}) > A.$$

3. Conclusion. Tout réel A est dépassé à partir d'un certain rang : c'est exactement la définition de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$. ■

EXEMPLE Quelle taille pour dépasser 100 ?

On cherche à partir de quelle valeur de x on a $\ln x > 100$. En anticipant sur la fonction exponentielle (fonction réciproque de $\ln$, strictement croissante, que nous étudierons bientôt) :

$$\ln x > 100 \iff x > e^{100}.$$

Or $e^{100} \approx 2,7 \times 10^{43}$: c'est un nombre astronomique, bien plus grand que le nombre d'ha-

bitants de la Terre ! Il faut donc aller très loin pour que $\ln x$ dépasse 100... mais on y arrive toujours. C'est toute la philosophie de cette limite : $\ln$ monte lentement mais sûrement vers $+\infty$.

ATTENTION Le piège du « plafond imaginaire »

Beaucoup d'élèves, voyant la courbe de $\ln$ s'aplatir, concluent à tort que $\ln x$ tend vers une limite finie (comme $x \mapsto \frac{1}{x}$ tend vers 0). C'est faux : la courbe s'aplatit mais ne cesse jamais de monter. Une tangente de pente de plus en plus faible n'empêche pas la fonction de croître indéfiniment. Retiens : $\ln x \rightarrow +\infty$, mais avec une **lenteur extrême**.

3.2 Limite de $\ln x$ en 0^+

Intuition. Que se passe-t-il lorsque x s'approche de 0 par valeurs positives ? Testons :

$$\ln 0,1 \approx -2,30 \quad ; \quad \ln 0,01 \approx -4,61 \quad ; \quad \ln 10^{-6} \approx -13,82.$$

Les valeurs plongent vers le bas. C'est logique : prendre l'inverse transforme « très proche de 0 » en « très grand », et nous savons déjà ce qui se passe en $+\infty$.

PROPRIÉTÉ Limite de $\ln$ en 0^+ — démonstration exigible

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln x = -\infty.$$

Graphiquement, la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est **asymptote verticale** à la courbe de $\ln$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : le changement de variable $X = \frac{1}{x}$

- Poser le changement de variable. Pour $x > 0$, posons $X = \frac{1}{x}$. Quand $x \rightarrow 0^+$, on a $X \rightarrow +\infty$.
- Réécrire $\ln x$ en fonction de X . Par la propriété du logarithme d'un quotient :

$$\ln x = \ln\left(\frac{1}{X}\right) = \ln 1 - \ln X = -\ln X.$$

- Composer les limites. Quand $x \rightarrow 0^+$:


$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = \lim_{X \rightarrow +\infty} (-\ln X) = -\infty,$$

car nous avons démontré que $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty$. ■

MÉTHODE Le changement de variable, un réflexe à acquérir

Face à une limite de $\ln$ en un point « inhabituel » :

1. Identifier où tend la quantité à l'intérieur du logarithme.
2. Poser un changement de variable ($X = \frac{1}{x}$, $X = x - a$, etc.) pour se ramener aux deux limites de référence : en $+\infty$ ou en 0^+ .
3. Conclure par composition des limites.



Courbe de $\ln$: asymptote verticale d'équation $x = 0$ en 0^+ , et branche infinie qui monte sans borne (mais de plus en plus lentement) en $+\infty$.

3.3 Croissances comparées : la lenteur de $\ln$ face aux puissances

Nous savons que $\ln x \rightarrow +\infty$ et que $x \rightarrow +\infty$. Mais lequel « gagne » la course ? La réponse, fondamentale pour lever les indéterminations, est que **toute puissance de x écrase $\ln x$** .

PROPRIÉTÉ Croissances comparées — résultats admis

Ces résultats sont admis à ce stade (leur démonstration deviendra accessible après l'étude de la fonction exponentielle) mais leur utilisation est exigible au Baccalauréat.

1. En $+\infty$, la puissance l'emporte sur le logarithme :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \text{et, plus généralement, pour tout } n \in \mathbb{N}^* : \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0.$$

2. En 0^+ , la puissance l'emporte encore :


$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln x = 0 \quad \text{et, plus généralement :} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^n \ln x = 0 \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

À RETENIR La hiérarchie des infinis

En $+\infty$, on retiendra l'ordre de « force » suivant :

$$\ln x \ll x \ll x^2 \ll \dots \ll e^x.$$

Concrètement : dans une somme ou un produit où $\ln x$ affronte une puissance de x , c'est toujours la puissance qui impose le comportement. On dit que la courbe de $\ln$ admet en $+\infty$ une **branche parabolique** de direction (Ox) : elle monte vers $+\infty$ mais « moins vite que toute droite ».



Comparaison de $\ln x$, $\sqrt{x}$ et x : dès que x grandit, $\ln x$ est distancé par toutes les puissances, même par $\sqrt{x}$. Voilà l'illustration visuelle de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

EXEMPLE Exemple chiffré : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - x)$

Il s'agit d'une forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». On factorise par le terme prépondérant, ici x :

$$\ln x - x = x \left(\frac{\ln x}{x} - 1 \right).$$

Or, par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, donc la parenthèse tend vers $0 - 1 = -1$, et $x \rightarrow +\infty$. Par produit :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - x) = -\infty.$$

Vérification numérique : pour $x = 10^6$, $\ln x - x \approx 13,8 - 1\,000\,000 \approx -999\,986$: la puissance écrase effectivement le logarithme.

3.4 Une limite de référence : le taux d'accroissement en 1

PROPRIÉTÉ Limite de référence en 0

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = 1.$$

EXPÉRIENCE Pourquoi cette limite vaut 1 ?

Reconnaissons un **taux d'accroissement**. La fonction $\ln$ est dérivable en 1 (nous le démontrerons dans la section 4) avec $\ln'(x) = \frac{1}{x}$, donc $\ln'(1) = 1$. Comme $\ln 1 = 0$:

$$\frac{\ln(1+h)}{h} = \frac{\ln(1+h) - \ln 1}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \ln'(1) = 1.$$

Cette limite est donc le nombre dérivé de $\ln$ en 1. Graphiquement, la tangente à la courbe de $\ln$ au point $(1; 0)$ a pour coefficient directeur 1 : au voisinage de 1, on a l'approximation $\ln(1+h) \approx h$.

EXEMPLE Application : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{x}$

On fait apparaître la forme de référence en écrivant :

$$\frac{\ln(1+3x)}{x} = 3 \times \frac{\ln(1+3x)}{3x}.$$

Posons $h = 3x$: quand $x \rightarrow 0$, $h \rightarrow 0$, donc $\frac{\ln(1+h)}{h} \rightarrow 1$. Conclusion :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{x} = 3 \times 1 = 3.$$

3.5 Limites de fonctions composées avec $\ln$

PROPRIÉTÉ Composition avec $\ln$

Soit u une fonction définie au voisinage d'un point a (fini ou infini), à valeurs strictement positives.

Si $u(x)$ tend vers...	Alors $\ln(u(x))$ tend vers...
$+\infty$	$+\infty$
0 par valeurs positives (0^+)	$-\infty$
un réel $\ell > 0$	$\ln \ell$ (continuité de $\ln$)

EXERCICE RÉSOLU 5 Trois limites composées

Déterminer les limites suivantes :

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x+1}{x-2}\right) \quad \text{b) } \lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x > 3}} \ln(x^2 - 9) \quad \text{c) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x^2 + 1).$$

SOLUTION

a) Posons $u(x) = \frac{x+1}{x-2}$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $u(x) = \frac{1 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{2}{x}} \rightarrow 1$, et $u(x) > 0$ pour $x > 2$. Par continuité de $\ln$ en 1 :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x+1}{x-2}\right) = \ln 1 = 0.$$

b) Posons $u(x) = x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$. Quand $x \rightarrow 3^+$, $u(x) \rightarrow 0$ avec $u(x) > 0$ (car $x > 3$). On est dans le cas « $u \rightarrow 0^+$ » :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x > 3}} \ln(x^2 - 9) = -\infty.$$

c) Posons $u(x) = x^2 + 1 \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$. On est dans le cas « $u \rightarrow +\infty$ » :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x^2 + 1) = +\infty.$$

ATTENTION Toujours vérifier le signe de l'intérieur

Avant de composer, assure-toi que $u(x) > 0$ au voisinage du point considéré : $\ln$ n'est définie que sur $]0; +\infty[$. Écrire $\lim_{x \rightarrow 3} \ln(x^2 - 9)$ sans préciser $x > 3$ est une erreur : pour $x < 3$ proche de 3, $x^2 - 9 < 0$ et l'expression n'existe pas !

3.6 Techniques de levée d'indétermination

Face à une forme indéterminée impliquant $\ln$ (types « $\infty - \infty$ », « $\frac{\infty}{\infty}$ », « $0 \times \infty$ »), deux stratégies dominent.

MÉTHODE Lever une indétermination avec $\ln$

1. Factoriser par le terme prépondérant. Dans une somme, on met en facteur le terme le plus « fort » selon la hiérarchie $\ln x \ll x \ll x^n \ll e^x$, puis on utilise les croissances comparées.
2. Poser $X = \ln x$ (ou $X = \frac{1}{x}$). Ce changement de variable transforme l'expression en une forme polynomiale ou exponentielle plus facile à traiter. Attention à bien convertir : $x = e^X$, et quand $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow +\infty$.
3. Faire apparaître une limite de référence : $\frac{\ln x}{x}$, $x \ln x$ ou $\frac{\ln(1+h)}{h}$.

EXERCICE RÉSOLU 6 Deux indéterminations classiques

Déterminer :

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x + 2}{x} \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x}.$$

SOLUTION

a) On sépare puis on applique les croissances comparées :

$$\frac{\ln x + 2}{x} = \frac{\ln x}{x} + \frac{2}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 + 0 = 0.$$

b) Forme « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Posons $X = \ln x$, donc $x = e^X$ avec $X \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$:

$$\frac{(\ln x)^2}{x} = \frac{X^2}{e^X}.$$

Or la croissance comparée exponentielle/puissance (que nous détaillerons dans la leçon sur l'exponentielle) donne $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{e^X}{X^2} = +\infty$, donc par passage à l'inverse :

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0.$$

Conclusion morale : même élevé au carré (ou à toute puissance), $\ln x$ reste écrasé par x .**EXERCICE RÉSOLU 7** Le changement de variable $X = \sqrt{x}$ en actionDéterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - 3\sqrt{x})$.

SOLUTION

Forme « $+\infty - \infty$ ». Factorisons par le terme prépondérant $\sqrt{x}$:

$$\ln x - 3\sqrt{x} = \sqrt{x} \left(\frac{\ln x}{\sqrt{x}} - 3 \right).$$

Pour la parenthèse, posons $X = \sqrt{x}$ (donc $x = X^2$, $X \rightarrow +\infty$) :

$$\frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \frac{\ln(X^2)}{X} = \frac{2 \ln X}{X} \xrightarrow{X \rightarrow +\infty} 2 \times 0 = 0.$$

La parenthèse tend donc vers -3 et $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$. Par produit :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - 3\sqrt{x}) = -\infty.$$

Encore une victoire de la puissance sur le logarithme !

LESAVAIS-TU ? Pourquoi le pH et les décibels utilisent-ils des logarithmes ?

L'échelle des pH en chimie va de 0 à 14, mais la concentration en ions H_3O^+ qu'elle mesure varie de 1 à 10^{-14} mol/L : un rapport de 1 à 100 000 000 000 000 ! De même, l'échelle des décibels comprime l'intensité sonore, et l'échelle de Richter comprime l'énergie des séismes. C'est précisément la lenteur de croissance de $\ln$ — le fait que $\ln x$ « écrase » les grandes valeurs — qui rend ces échelles pratiques. Les mathématiciens disent que le logarithme « comprime les ordres de grandeur » : un outil indispensable dès que les phénomènes s'étalent sur des rapports immenses, comme en sismologie, un domaine suivi de près au Cameroun avec la surveillance du mont Cameroun, volcan actif.

À RETENIR Bilan des limites à connaître par cœur

Limite	Résultat
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x$	$+\infty$ (montée lente, sans borne)
$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x$	$-\infty$ (asymptote verticale $x = 0$)
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$	0 (la puissance l'emporte)
$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$	0 (la puissance l'emporte)
$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h}$	1 (nombre dérivé en 1)

Face à une indétermination : factoriser par le terme dominant ou poser $X = \ln x$, puis se

ramener à ce tableau.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Déterminer les limites suivantes, en justifiant chaque étape :

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \ln x}{x} \quad \text{b) } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (x + x \ln x) \quad \text{c) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{2x^2 + 1}{x^2 + 3} \right) \quad \text{d) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 - 2x)}{x}.$$

CORRIGÉ Exercice « À toi de jouer »

$$\text{a) } \frac{x - \ln x}{x} = 1 - \frac{\ln x}{x} \rightarrow 1 - 0 = 1.$$

b) $x + x \ln x$: on a $x \rightarrow 0$ et $x \ln x \rightarrow 0$ (croissance comparée en 0^+), donc la somme tend vers 0.

$$\text{c) } \frac{2x^2 + 1}{x^2 + 3} = \frac{2 + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{3}{x^2}} \rightarrow 2 \text{ quand } x \rightarrow +\infty, \text{ et } 2 > 0, \text{ donc par continuité de } \ln \text{ en } 2 : \text{ la limite vaut } \ln 2.$$

$$\text{d) } \frac{\ln(1 - 2x)}{x} = -2 \times \frac{\ln(1 - 2x)}{-2x}. \text{ Avec } h = -2x \rightarrow 0, \text{ le quotient tend vers } 1, \text{ donc la limite vaut } -2.$$

Nous disposons désormais d'une vision complète du comportement de $\ln$ aux bornes de son ensemble de définition. Il reste à étudier ce qui se passe entre ces bornes : la dérivabilité, le sens de variation et le tracé précis de la courbe — ce sera l'objet de la section suivante.

4 DÉRIVATION, VARIATIONS ET COURBE REPRÉSENTATIVE

Dans la section précédente, nous avons établi les limites de la fonction logarithme népérien : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$. Nous savons donc comment la fonction se comporte aux bornes de son domaine. Mais que se passe-t-il entre ces bornes ? La fonction monte-t-elle ? Vite ou lentement ? Sa courbe est-elle bombée ou creuse ? Pour répondre à toutes ces questions, l'outil roi est la **dérivation**. C'est d'ailleurs ainsi que la fonction $\ln$ a été construite : rappelle-toi, $\ln$ est la primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ qui s'annule en 1. La dérivée de $\ln$ est donc connue avant même la fonction elle-même !

4.1 Dérivée de la fonction $\ln$ et stricte croissance

Intuition. Dire que $\ln$ est une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$, c'est dire que la pente de la tangente à la

courbe de $\ln$ au point d'abscisse x vaut exactement $\frac{1}{x}$. Or pour tout $x > 0$, on a $\frac{1}{x} > 0$: la tangente « monte » toujours. La fonction $\ln$ est donc constamment en train de croître. De plus, quand x devient grand, $\frac{1}{x}$ devient petit : la courbe monte de moins en moins vite, sans jamais s'arrêter de monter.

PROPRIÉTÉ Dérivée de la fonction $\ln$

La fonction $\ln$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et, pour tout réel $x > 0$:

$$(\ln)'(x) = \frac{1}{x}.$$

Comme $\frac{1}{x} > 0$ pour tout $x > 0$, la fonction $\ln$ est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée — dérivabilité de $\ln$

Cette démonstration est classique et formatrice ; sais-tu la refaire seul ?

1. Par définition, $\ln$ est la primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ qui s'annule en 1 : $\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$.
2. La fonction $t \mapsto \frac{1}{t}$ est continue sur $]0; +\infty[$. D'après le théorème fondamental de l'analyse, la fonction $x \mapsto \int_1^x \frac{1}{t} dt$ est dérivable sur $]0; +\infty[$, de dérivée $x \mapsto \frac{1}{x}$.
3. Donc $(\ln)'(x) = \frac{1}{x}$ pour tout $x > 0$. Comme $\frac{1}{x} > 0$ sur $]0; +\infty[$, $\ln$ est strictement croissante sur cet intervalle. $\square$

PROPRIÉTÉ Conséquences de la stricte croissance

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

$$\ln a = \ln b \iff a = b \quad \text{et} \quad \ln a < \ln b \iff a < b.$$

Autrement dit, $\ln$ conserve l'ordre : comparer deux logarithmes revient à comparer leurs arguments. Ces équivalences sont la clé de la résolution des équations et inéquations avec $\ln$ (section 6).

EXEMPLE Comparer sans calculatrice

Comparer $\ln 7$ et $\ln 9$, puis résoudre $\ln x \geq \ln 5$.

Comme $7 < 9$ et que $\ln$ est strictement croissante : $\ln 7 < \ln 9$.

Pour l'inéquation $\ln x \geq \ln 5$: la condition d'existence est $x > 0$, et par stricte croissance, $\ln x \geq \ln 5 \iff x \geq 5$. L'ensemble des solutions est $[5; +\infty[$.

4.2 Dérivée de la composée : la formule $(\ln u)' = u' / u$

En pratique, au Baccalauréat, on dérive rarement $\ln x$ tout seul : on dérive $\ln(u(x))$, par exemple $\ln(2x + 3)$ ou $\ln(x^2 + 1)$. C'est une simple application de la formule de dérivation des fonctions composées.

PROPRIÉTÉ Dérivée de $\ln u$

Soit u une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I . Alors la fonction $f : x \mapsto \ln(u(x))$ est dérivable sur I et :

$$f'(x) = (\ln u)'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée — pourquoi u' / u ?

1. Rappel : si v est dérivable sur I et g dérivable sur $v(I)$, alors $(g \circ v)' = v' \times (g' \circ v)$.
2. Ici $g = \ln$, donc $g'(t) = \frac{1}{t}$, et $v = u$. La condition « $\ln$ dérivable sur $u(I)$ » impose $u(x) > 0$ sur I .
3. On obtient : $(\ln u)'(x) = u'(x) \times \frac{1}{u(x)} = \frac{u'(x)}{u(x)}$. $\square$

EXEMPLE Deux dérivations types

a) Soit $f(x) = \ln(2x + 3)$. On pose $u(x) = 2x + 3$, strictement positive pour $x > -\frac{3}{2}$, et $u'(x) = 2$.
Donc, pour tout $x > -\frac{3}{2}$:

$$f'(x) = \frac{2}{2x + 3}.$$

b) Soit $g(x) = \ln(x^2 + 1)$. Ici $u(x) = x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x , donc g est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ tout entier, et $u'(x) = 2x$:

$$g'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

Le signe de g' est celui de $2x$: g est décroissante sur $] -\infty ; 0]$ et croissante sur $[0 ; +\infty[$.

ATTENTION La dérivée ne donne pas le domaine !

Erreur très fréquente au Bac : pour étudier $f(x) = \ln(u(x))$, des élèves dérivent d'abord et « déduisent » le domaine de la fraction $\frac{u'}{u}$. C'est un raisonnement faux et dangereux.

- Le domaine de f s'obtient en résolvant l'inéquation $u(x) > 0$ (strictement).
- Exemple piège : $f(x) = \ln(x^2 - 1)$. Le domaine est $x^2 - 1 > 0$, c'est-à-dire $]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$, alors que $f'(x) = \frac{2x}{x^2 - 1}$ laisse croire à tort qu'on pourrait évaluer f « presque partout ».
Non : $f(0) = \ln(-1)$ n'existe pas !

Retiens : domaine d'abord, dérivation ensuite.

MÉTHODE Étudier une fonction contenant $\ln u$

1. Domaine : résoudre $u(x) > 0$ (inéquation stricte). Écrire D_f proprement.
2. Limites aux bornes de D_f : utiliser les limites usuelles de $\ln$ et les théorèmes sur les composées (si $u(x) \rightarrow 0^+$, alors $\ln u(x) \rightarrow -\infty$; si $u(x) \rightarrow +\infty$, alors $\ln u(x) \rightarrow +\infty$).
3. Dérivée : $f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$ (ou dériver une expression plus complexe avec les règles usuelles).
4. Signe de f' : comme $u(x) > 0$ sur D_f , le signe de $\frac{u'}{u}$ est le signe de $u'(x)$. Dresser le tableau de variations.
5. Courbe : points remarquables, tangentes, asymptotes éventuelles.

4.3 Tableau de variations complet et courbe représentative de $\ln$

Réunissons tout ce que nous savons sur $\ln$: dérivée $\frac{1}{x} > 0$, limites $-\infty$ en 0^+ et $+\infty$ en $+\infty$, valeurs remarquables $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$.


x	0	$+\infty$
$(\ln)'(x) = \frac{1}{x}$		+
$\ln x$	$-\infty$	$\nearrow$ $+\infty$

À RETENIR Éléments remarquables de la courbe de $\ln$

- La courbe passe par les points $(1; 0)$ et $(e; 1)$, car $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$.

- Comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$, la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est **asymptote verticale** à la courbe.
- Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$, il n'y a pas d'asymptote horizontale.
- Le coefficient directeur de la tangente en $x = 1$ vaut $(\ln)'(1) = \frac{1}{1} = 1$. La tangente au point $(1; 0)$ a donc pour équation :

$$y = (x - 1) \times 1 + 0 \quad \text{c'est-à-dire} \quad y = x - 1.$$



Courbe de $y = \ln x$, sa tangente $y = x - 1$ au point $(1; 0)$ et l'asymptote verticale $x = 0$. La courbe reste sous sa tangente : c'est la concavité.

Complément utile au Bac : la concavité. La dérivée seconde se calcule facilement : pour tout $x > 0$,

$$(\ln)''(x) = \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2} < 0.$$

La fonction $\ln$ est donc **concave** sur $]0; +\infty[$: sa courbe est toujours située en dessous de chacune de ses tangentes. Ce n'est pas un savoir exigible du programme, mais c'est un atout précieux pour justifier rigoureusement certaines inégalités.

LESAVAIS-TU ? L'inégalité $\ln x \leq x - 1$: un classique des sujets de Bac

Puisque $\ln$ est concave, sa courbe est sous sa tangente en $(1; 0)$: pour tout $x > 0$,

$$\ln x \leq x - 1,$$

avec égalité si et seulement si $x = 1$. Cette inégalité, d'apparence anodine, est extraordinairement puissante : elle intervient dans les sujets de Baccalauréat (études de fonctions, suites, probabilités) et dans toutes les mathématiques modernes, de la théorie de

l'information à l'économie. Retiens-la, et sache la redémontrer en étudiant les variations de $h(x) = x - 1 - \ln x$: $h'(x) = 1 - \frac{1}{x}$, donc h admet un minimum en $x = 1$ valant $h(1) = 0$.

4.4 Étude complète d'une fonction type : $f(x) = \ln x / x$

Appliquons la méthode à une fonction très classique des sujets de Baccalauréat.

EXERCICE RÉSOLU 8 Étude complète de $f(x) = \ln x / x$

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{\ln x}{x}$.

1. Déterminer le domaine de définition de f .
2. Calculer les limites de f aux bornes de son domaine et interpréter graphiquement.
3. Calculer $f'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations de f .
4. Tracer l'allure de la courbe représentative de f .

SOLUTION

1. Domaine. Il faut $\ln x$ défini, c'est-à-dire $x > 0$, et le dénominateur non nul, c'est-à-dire $x \neq 0$. Donc $D_f =]0; +\infty[$.

2. Limites.

- En 0^+ : $\ln x \rightarrow -\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, donc par produit $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$. La droite $x = 0$ est asymptote verticale.
- En $+\infty$: c'est une forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ », levée par la limite de croissance comparée vue en section 3 : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. L'axe des abscisses ($y = 0$) est asymptote horizontale en $+\infty$.

3. Dérivée et variations. f est un quotient $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = \ln x$, $u'(x) = \frac{1}{x}$, $v(x) = x$, $v'(x) = 1$:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

Comme $x^2 > 0$ sur D_f , le signe de f' est celui de $1 - \ln x$:


$$1 - \ln x > 0 \iff \ln x < 1 \iff x < e \quad (\text{stricte croissance de } \ln).$$

Donc f est strictement croissante sur $]0; e]$ et strictement décroissante sur $[e; +\infty[$. Elle admet un maximum en $x = e$:

$$f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e} \approx 0,368.$$

x	0	e	$+\infty$
$1 - \ln x$		+	0 -
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow \frac{1}{e}$	$\searrow 0$

4. Courbe. Voir la figure ci-dessous : la courbe part de $-\infty$ le long de l'axe des ordonnées, coupe l'axe des abscisses en $x = 1$ (car $\ln 1 = 0$), culmine au point $(e; \frac{1}{e})$, puis redescend en s'approchant de l'axe des abscisses.



Courbe de $f(x) = \frac{\ln x}{x}$: maximum $\frac{1}{e}$ atteint en $x = e$, asymptote verticale $x = 0$ et asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$.

EXERCICE RÉSOLU 9 Second entraînement : $f(x) = x - \ln x$

Soit $f(x) = x - \ln x$. Étudier ses variations et en déduire le signe de $f(x)$ sur $]0; +\infty[$.

SOLUTION

Domaine : $D_f =]0; +\infty[$ à cause de $\ln x$.

Limites : en 0^+ , $-\ln x \rightarrow +\infty$ donc $f(x) \rightarrow +\infty$. En $+\infty$, forme indéterminée : on factorise, $f(x) = x \left(1 - \frac{\ln x}{x}\right)$. Or $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

Dérivée : $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$. Comme $x > 0$, le signe de f' est celui de $x-1$: f est décroissante sur $]0; 1]$ et croissante sur $[1; +\infty[$.

Minimum : $f(1) = 1 - \ln 1 = 1$. Le minimum de f vaut $1 > 0$, donc pour tout $x > 0$: $f(x) \geq 1 > 0$, c'est-à-dire $x - \ln x > 0$, soit $\ln x < x$. On retrouve ainsi l'inégalité $\ln x \leq x - 1$ (puisque $x - \ln x \geq 1 \Leftrightarrow \ln x \leq x - 1$) par une autre méthode !

EXERCICE 4 À toi de jouer

Soit g la fonction définie par $g(x) = \ln(x^2 + x + 1)$.

1. Montrer que g est définie sur $\mathbb{R}$ (penser au discriminant).
2. Calculer $g'(x)$ et dresser le tableau de variations de g .
3. Déterminer le minimum de g .

CORRIGÉ Exercice : $g(x) = \ln(x^2 + x + 1)$

1. Le discriminant de $x^2 + x + 1$ est $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$: le trinôme ne s'annule pas et est du signe de $a = 1 > 0$, donc $x^2 + x + 1 > 0$ pour tout réel x . Ainsi $D_g = \mathbb{R}$.

2. Avec $u(x) = x^2 + x + 1$, $u'(x) = 2x + 1$:

$$g'(x) = \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1}.$$

Le dénominateur est strictement positif, donc le signe de g' est celui de $2x + 1$: g est décroissante sur $]-\infty; -\frac{1}{2}]$ et croissante sur $[-\frac{1}{2}; +\infty[$.

3. Le minimum est atteint en $x = -\frac{1}{2}$:

$$g\left(-\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 1\right) = \ln \frac{3}{4}.$$

Comme $\frac{3}{4} < 1$, ce minimum est négatif : $\ln \frac{3}{4} \approx -0,29$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- $(\ln)'(x) = \frac{1}{x} > 0$ sur $]0; +\infty[$: $\ln$ est strictement croissante, d'où $\ln a = \ln b \iff a = b$ et $\ln a < \ln b \iff a < b$ (pour $a, b > 0$).
- $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$, valable uniquement là où u est dérivable et strictement positive.
- La courbe de $\ln$ passe par $(1; 0)$ et $(e; 1)$, admet la tangente $y = x - 1$ en $(1; 0)$ et l'asymptote verticale $x = 0$.
- $(\ln)''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: $\ln$ est concave, d'où l'inégalité $\ln x \leq x - 1$.
- Toute étude de fonction avec $\ln$ commence par la résolution de $u(x) > 0$: le domaine d'abord, la dérivée ensuite.

5 PRIMITIVES DE LA FORME U' / U

Dans la section précédente, nous avons établi que la fonction logarithme népérien est dérivable sur $]0; +\infty[$ et que, pour tout $x > 0$,

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}.$$

Nous avons même généralisé ce résultat : si u est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I , alors la fonction composée $\ln u$ est dérivable sur I et

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}.$$

Renversons maintenant le point de vue. Au lieu de dériver $\ln u$, demandons-nous : quelle fonction a pour dérivée $\frac{u'}{u}$? La réponse tombe sous le sens : c'est $\ln u$. Autrement dit, **la recherche de primitives est l'opération inverse de la dérivation**, et la formule de dérivation de $\ln u$ lue « de droite à gauche » devient une formule de primitives extrêmement puissante. C'est toute l'ambition de cette section : apprendre à **reconnaître** la forme $\frac{u'}{u}$ dans une expression, à **ajuster** les constantes, et à en déduire primitives et intégrales. Ce savoir-faire est l'un des plus rentables du programme de Terminale : il revient chaque année au Baccalauréat, dans les calculs d'aires, les équations différentielles et les problèmes d'évolution.

5.1 Le résultat fondamental

5.2 Intuition : dériver, c'est descendre ; primitiver, c'est remonter

Imagine un téléphérique qui relie deux quartiers de Yaoundé situés à des altitudes différentes. La dérivation, c'est le trajet descendant : à partir d'une fonction F (en haut), on obtient sa dérivée f (en bas). La recherche de primitives, c'est le trajet remontant : connaissant f , on cherche F telle que $F' = f$. Or nous venons de voir que la dérivation envoie $\ln u$ sur $\frac{u'}{u}$. Le trajet inverse envoie donc $\frac{u'}{u}$ sur $\ln u$. Il ne reste qu'à formaliser proprement, en faisant attention aux conditions de validité.

DÉFINITION Primitive d'une fonction

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On appelle **primitive** de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que, pour tout $x \in I$: $F'(x) = f(x)$.

Rappelons deux faits essentiels : une fonction qui admet une primitive sur I en admet une infinité, et deux primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent d'une constante. C'est pourquoi on écrira souvent $\ln u + C$, où C désigne une constante réelle quelconque.

PROPRIÉTÉ Théorème fondamental : primitive de u'/u

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si $u(x) > 0$ pour tout $x \in I$, alors la fonction $\frac{u'}{u}$ admet pour primitives sur I les fonctions

$$x \mapsto \ln(u(x)) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

- Plus généralement, si u ne s'annule pas sur I (donc garde un signe constant, d'après le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à la fonction continue u), alors $\frac{u'}{u}$ admet pour primitives sur I les fonctions

$$x \mapsto \ln|u(x)| + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée (exigible et formatrice)

Nous allons démontrer les deux cas. L'outil central est la dérivation des fonctions composées : $(v \cdot u)' = u' \times (v' \cdot u)$.

1. Cas $u > 0$ sur I . Posons $F = \ln u$, c'est-à-dire $F = \ln \cdot u$. La fonction $\ln$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et u est dérivable sur I à valeurs dans $]0; +\infty[$, donc F est dérivable sur I et, pour tout $x \in I$:

$$F'(x) = u'(x) \times \ln'(u(x)) = u'(x) \times \frac{1}{u(x)} = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

Donc $F = \ln u$ est bien une primitive de $\frac{u'}{u}$ sur I .

2. Cas $u < 0$ sur I . La fonction $\ln u$ n'est alors pas définie. L'idée est de poser $G = \ln(-u)$: comme $u < 0$, on a $-u > 0$, donc G est bien définie et dérivable sur I . La dérivée de $-u$ est $-u'$, donc :

$$G'(x) = \frac{-u'(x)}{-u(x)} = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

Miracle des signes : $G = \ln(-u)$ est aussi une primitive de $\frac{u'}{u}$!

3. Synthèse. Si $u > 0$, $|u| = u$ et $\ln|u| = \ln u$; si $u < 0$, $|u| = -u$ et $\ln|u| = \ln(-u)$. Dans les deux cas, $\ln|u|$ est dérivable sur I et

$$(\ln|u|)' = \frac{u'}{u}.$$

La formule $\ln|u|$ unifie donc les deux situations. ■

À RETENIR La formule à connaître par cœur

Si u est dérivable et ne s'annule pas sur l'intervalle I , alors :

$$\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln|u(x)| + C$$

En particulier, lorsque $u > 0$ sur I (cas le plus fréquent au Bac) : une primitive de $\frac{u'}{u}$ est $\ln u$.

ATTENTION La condition « u ne s'annule pas » n'est pas négociable

Trois erreurs reviennent sans cesse dans les copies :

- Oublier de vérifier que $u \neq 0$ sur I . La fonction $\frac{u'}{u}$ n'est même pas définie là où u s'annule. Par exemple, $\frac{2x}{x^2-1}$ n'a de sens que sur $] -\infty; -1[$, $] -1; 1[$ ou $]1; +\infty[$: il faut choisir l'intervalle de travail et le dire.
- Oublier la valeur absolue quand u peut être négatif. Sur $] -\infty; -1[$, $x^2-1 > 0$ donc $\ln(x^2-1)$ convient ; mais pour $\frac{1}{x}$ sur $] -\infty; 0[$, la primitive est $\ln(-x) = \ln|x|$, et non $\ln x$ qui n'existe pas !
- Croire que la primitive de $\frac{1}{u}$ est $\ln|u|$. C'est faux en général : il faut le u' au numérateur. Par exemple, une primitive de $\frac{1}{x^2+1}$ n'est pas $\ln(x^2+1)$ (c'est $\arctan x$, hors programme).

5.3 Reconnaître la forme u'/u : la stratégie du dénominateur

Tout l'art consiste à repérer, dans une fraction, que le numérateur est la dérivée du dénominateur — éventuellement à un facteur constant près.

MÉTHODE Reconnaître et traiter la forme u'/u

Face à une fonction f écrite comme une fraction (rationnelle, avec racines, avec $\ln$, etc.) :

1. Identifier le dénominateur et poser $u(x) = \text{dénominateur}$.
2. Calculer $u'(x)$ et le comparer au numérateur.
3. Trois cas possibles :
 - le numérateur est exactement u' : une primitive est $\ln|u|$;
 - le numérateur est $k \times u'$ (k constante) : une primitive est $k \ln|u|$;
 - le numérateur n'est pas proportionnel à u' : la forme u'/u ne s'applique pas directement (il faudra une autre technique : décomposition, forme $u' \times u^n$, etc.).

4. Vérifier le signe de u sur l'intervalle considéré pour décider si la valeur absolue peut être enlevée.
5. Contrôler le résultat en dérivant : la dérivée de la primitive trouvée doit redonner f . Cette vérification, rapide, est une excellente habitude de copie.

EXEMPLE Exemple chiffré fondamental

Déterminons une primitive de $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Le dénominateur est $u(x) = x^2 + 1$. Pour tout réel x , $x^2 + 1 \geq 1 > 0$: u est strictement positive sur $\mathbb{R}$, pas de problème de domaine.
2. $u'(x) = 2x$: c'est exactement le numérateur. La forme u' / u s'applique directement.
3. Conclusion : une primitive de f sur $\mathbb{R}$ est

$$F(x) = \ln(x^2 + 1).$$

4. Vérification : $F'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1} = f(x)$. $\square$

5.4 Ajustement par une constante multiplicative

En pratique, le numérateur est rarement exactement u' : il lui est proportionnel. Comme la primitivation est linéaire (une primitive de $k \times f$ est $k \times F$), on ajuste simplement par un facteur.

PROPRIÉTÉ Primitive de $k \cdot u' / u$

Si u est dérivable et ne s'annule pas sur I , et si k est une constante réelle, alors les primitives de $x \mapsto k \frac{u'(x)}{u(x)}$ sur I sont les fonctions

$$x \mapsto k \ln|u(x)| + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

La démonstration est immédiate : $(k \ln|u|)' = k \times \frac{u'}{u}$.

EXEMPLE Ajustement de la constante, étape par étape

Déterminons une primitive de $g(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$ sur $\mathbb{R}$.

1. $u(x) = x^2 + 4 > 0$ sur $\mathbb{R}$; $u'(x) = 2x$.

2. Le numérateur est $x = \frac{1}{2} \times 2x = \frac{1}{2} u'(x)$. On réécrit donc :

$$g(x) = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{x^2 + 4} = \frac{1}{2} \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

3. Une primitive est $G(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 4)$.

4. Vérification : $G'(x) = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{x^2 + 4} = \frac{x}{x^2 + 4} = g(x)$. $\square$

Autre cas : $h(x) = \frac{6x+3}{x^2+x}$ sur $]0; +\infty[$. Ici $u(x) = x^2+x$, $u'(x) = 2x+1$, et le numérateur est $6x+3 = 3(2x+1) = 3u'(x)$. Sur $]0; +\infty[$, $u(x) = x(x+1) > 0$, donc une primitive est $H(x) = 3 \ln(x^2+x)$.

ATTENTION On n'invente pas le u' : on l'ajuste, on ne le crée pas

L'ajustement ne fonctionne que pour un facteur constant. On peut écrire $x = \frac{1}{2} \times 2x$, mais on ne peut pas « faire apparaître » un x manquant : $\frac{1}{x^2+1}$ n'est pas de la forme $k \frac{u'}{u}$, car il faudrait multiplier par x , qui n'est pas une constante. De même, $\frac{x}{x+1}$ n'est pas de la forme u'/u (ici, on écrirait plutôt $\frac{x}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$, et là le second morceau est bien de la forme u'/u avec $u = x+1$).

5.5 Tableau-schéma de reconnaissance

Le tableau suivant rassemble les situations classiques à reconnaître instantanément le jour du Bac. Entraîne-toi à le refaire de mémoire, puis à vérifier chaque ligne en dérivant la primitive proposée.

Expression $f(x)$	$u(x)$	$u'(x)$	Primitive $F(x)$
$\frac{2x}{x^2+1}$	x^2+1	$2x$	$\ln(x^2+1)$
$\frac{x}{x^2+4}$	x^2+4	$2x$	$\frac{1}{2} \ln(x^2+4)$
$\frac{3}{3x-5}$	$3x-5$	3	$\ln 3x-5 $
$\frac{1}{x} \ (x < 0)$	x	1	$\ln(-x) = \ln x $
$\frac{2x+1}{x^2+x-3}$	x^2+x-3	$2x+1$	$\ln x^2+x-3 $
$\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$	$\sqrt{x^2+1}$	$\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$	$\ln(\sqrt{x^2+1}) = \frac{1}{2} \ln(x^2+1)$
$\frac{1}{x \ln x} \ (x > 1)$	$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\ln(\ln x)$
$\frac{1}{x \ln x} \ (0 < x < 1)$	$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\ln(-\ln x) = \ln \ln x $

Tableau de reconnaissance de la forme u'/u : à chaque ligne, le numérateur est la dérivée du dénominateur, à un facteur constant près.

Les deux dernières lignes méritent un arrêt. Pour $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$, le réflexe « dénominateur » consiste à écrire $f(x) = \frac{1/x}{\ln x}$ et à poser $u(x) = \ln x$: alors $u'(x) = \frac{1}{x}$, qui est exactement le numérateur ! D'où une primitive $F(x) = \ln|\ln x|$. Ce résultat, classique au Baccalauréat (souvent donné comme complément ou question intermédiaire), illustre la puissance de la méthode : le « u » peut lui-même contenir un logarithme.

EXERCICE RÉSOLU 10 Primitives de la forme u'/u : entraînement complet

Énoncé. Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle indiqué, en justifiant soigneusement :

- $f_1(x) = \frac{4x}{x^2+3}$ sur $\mathbb{R}$;
- $f_2(x) = \frac{5}{2x-7}$ sur $I =]\frac{7}{2}; +\infty[$;
- $f_3(x) = \frac{2x-1}{x^2-x-6}$ sur $J =]3; +\infty[$;
- $f_4(x) = \frac{1}{x \ln x}$ sur $K =]1; +\infty[$.

SOLUTION

Solution détaillée.

- Posons $u(x) = x^2 + 3$. Pour tout réel x , $u(x) \geq 3 > 0$, et $u'(x) = 2x$. Le numérateur est

$4x = 2 \times 2x = 2u'(x)$, donc $f_1 = 2 \frac{u'}{u}$. Une primitive est :

$$F_1(x) = 2 \ln(x^2 + 3).$$

Vérification : $F_1'(x) = 2 \times \frac{2x}{x^2 + 3} = \frac{4x}{x^2 + 3}$. $\square$

2. Posons $u(x) = 2x - 7$. Sur I , $x > \frac{7}{2}$ donc $u(x) > 0$: pas besoin de valeur absolue. On a $u'(x) = 2$ et le numérateur est $5 = \frac{5}{2} \times 2$, donc $f_2 = \frac{5}{2} \frac{u'}{u}$. Une primitive est :

$$F_2(x) = \frac{5}{2} \ln(2x - 7).$$

Vérification : $F_2'(x) = \frac{5}{2} \times \frac{2}{2x - 7} = \frac{5}{2x - 7}$. $\square$

3. Posons $u(x) = x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$. Sur $J =]3; +\infty[$, $x - 3 > 0$ et $x + 2 > 0$, donc $u(x) > 0$. On a $u'(x) = 2x - 1$: c'est exactement le numérateur. Une primitive est :

$$F_3(x) = \ln(x^2 - x - 6).$$

Vérification : $F_3'(x) = \frac{2x - 1}{x^2 - x - 6}$. $\square$

4. Écrivons $f_4(x) = \frac{1/x}{\ln x}$ et posons $u(x) = \ln x$. Sur $K =]1; +\infty[$, $\ln x > 0$, et $u'(x) = \frac{1}{x}$: exactement le numérateur. Une primitive est :

$$F_4(x) = \ln(\ln x).$$

Vérification : $F_4'(x) = \frac{1/x}{\ln x} = \frac{1}{x \ln x}$. $\square$

5.6 Lien avec le calcul intégral

La formule de primitives se traduit immédiatement en une formule d'intégration, grâce au théorème fondamental du calcul intégral : si F est une primitive de f continue sur $[a; b]$, alors $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

PROPRIÉTÉ Intégrale de u'/u

Soit u une fonction dérivable, dont la dérivée est continue, et qui ne s'annule pas sur le segment $[a; b]$. Alors :

$$\int_a^b \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \left[\ln |u(x)| \right]_a^b = \ln |u(b)| - \ln |u(a)| = \ln \left| \frac{u(b)}{u(a)} \right|.$$

La dernière égalité vient de la propriété algébrique $\ln A - \ln B = \ln \frac{A}{B}$ (avec $A, B > 0$), combinée à $|\ln |p| - \ln |q||$ qui se réécrit proprement. Cette forme « condensée » est très efficace en calcul.

EXEMPLE Calcul d'intégrale direct

Calculons $I = \int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} dx$. La fonction $u(x) = x^2 + 1$ est strictement positive sur $[0; 1]$ et $u'(x) = 2x$. Donc :

$$I = \left[\ln(x^2 + 1) \right]_0^1 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2.$$

Autre exemple : $J = \int_1^2 \frac{1}{x} dx = \left[\ln x \right]_1^2 = \ln 2$. Retrouver deux fois $\ln 2$ n'est pas un hasard : le changement de variable $t = x^2 + 1$... mais cela, c'est une autre histoire (hors programme, mais délicieuse).

EXERCICE RÉSOLU 11 Aire sous une courbe hyperbolique — contexte Bac

Énoncé. Soit f la fonction définie sur $[1; 3]$ par $f(x) = \frac{4x+2}{x^2+x}$. On admet que $f(x) > 0$ sur $[1; 3]$. Calculer, en unités d'aire, l'aire A du domaine délimité par la courbe de f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 3$. Donner la valeur exacte, puis une valeur approchée à 10^{-2} près.

SOLUTION

Solution détaillée. L'aire cherchée est $A = \int_1^3 f(x) dx$. Posons $u(x) = x^2 + x = x(x+1)$. Sur $[1; 3]$, $u(x) > 0$, et $u'(x) = 2x + 1$. Le numérateur est $4x + 2 = 2(2x + 1) = 2u'(x)$, donc $f = 2 \frac{u'}{u}$ et une primitive est $F(x) = 2 \ln(x^2 + x)$. Alors :

$$\begin{aligned} A &= \left[2 \ln(x^2 + x) \right]_1^3 = 2 \ln(12) - 2 \ln(2) \\ &= 2 \ln\left(\frac{12}{2}\right) = 2 \ln 6. \end{aligned}$$

Numériquement, $A = 2 \ln 6 \approx 2 \times 1,7918 \approx 3,58$ unités d'aire.

LES AVAIS-TU ? Pourquoi cette formule est partout

La forme $\frac{u'}{u}$ porte un nom en sciences : c'est la dérivée logarithmique de u . Elle mesure le taux de variation relatif d'une grandeur. C'est exactement elle qui apparaît dans les modèles de croissance : quand on dit qu'une population de bactéries croît « de 5 % par heure »

», on dit que $\frac{u'}{u} = 0,05$, et la solution est $u(t) = u_0 e^{0,05t}$ — dont le logarithme est une fonction affine du temps. Les ingénieurs de CAMTEL qui modélisent l'atténuation d'un signal dans une fibre optique, ou les pharmaciens qui suivent l'élimination d'un médicament dans le sang, manipulent sans le dire des primitives de $\frac{u'}{u}$. Historiquement, c'est Grégoire de Saint-Vincent qui, en 1647, remarqua que l'aire sous l'hyperbole $y = \frac{1}{x}$ possède la propriété $A(ab) = A(a) + A(b)$: il venait, sans le savoir, de découvrir le logarithme népérien comme primitive de $\frac{1}{x}$, vingt ans avant que Newton ne le baptise « logarithme naturel ».

MÉTHODE Réflexes de copie pour le jour du Bac

1. Devant toute fraction à intégrer, tester d'abord la forme $\frac{u'}{u}$: c'est le cas le plus fréquent et le plus rapide.
2. Toujours annoncer l'intervalle et le signe de u avant d'écrire $\ln u$ ou $\ln |u|$.
3. Écrire l'ajustement de constante explicitement : « $x = \frac{1}{2}(2x)$ » — le correcteur doit voir que tu sais ce que tu fais.
4. Terminer par la vérification mentale : dériver la primitive trouvée. Cinq secondes qui sauvent des points.

EXERCICE 5 À toi de jouer

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle proposé :

1. $f(x) = \frac{6x^2}{2x^3 + 5}$ sur $\mathbb{R}$;
2. $g(x) = \frac{1}{x \ln x}$ sur $]0; \frac{1}{2}]$ (attention au signe de $\ln x$!);
3. $h(x) = \frac{x-2}{x^2 - 4x + 5}$ sur $\mathbb{R}$ (vérifier d'abord que le dénominateur ne s'annule pas).

Puis calculer $\int_1^e \frac{1}{x \ln x \cdot \ln x} dx$... non, plutôt : calculer $\int_2^{e+1} \frac{1}{x-1} dx$ et donner la valeur exacte.

CORRIGÉ Exercice : primitives de la forme u'/u

1. $u(x) = 2x^3 + 5$, $u'(x) = 6x^2$: forme exacte. Mais u s'annule en $x = -\sqrt[3]{5/2}$! Sur $\mathbb{R}$ il faut

donc préciser : sur chaque intervalle où $u \neq 0$, une primitive est $F(x) = \ln |2x^3 + 5|$. (Sur $] -\sqrt[3]{5/2}; +\infty[$, $u > 0$ et $F(x) = \ln(2x^3 + 5)$.)

2. Sur $]0; \frac{1}{2}]$, $\ln x < 0$, donc $|\ln x| = -\ln x$ et une primitive est $G(x) = \ln(-\ln x) = \ln |\ln x|$.

3. $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 \geq 1 > 0$ sur $\mathbb{R}$. $u'(x) = 2x-4$ et $x-2 = \frac{1}{2}(2x-4)$, donc $H(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 4x + 5)$.

4. $\int_2^{e+1} \frac{dx}{x-1} = [\ln(x-1)]_2^{e+1} = \ln e - \ln 1 = 1$.

En résumé : la formule « une primitive de $\frac{u'}{u}$ est $\ln |u|$ » est le pendant intégral de la dérivée de $\ln u$ étudiée dans la section précédente. Maîtriser sa reconnaissance, l'ajustement des constantes et la gestion de la valeur absolue, c'est tenir entre ses mains l'un des outils les plus puissants du calcul intégral de Terminale. Nous allons maintenant mettre tous ces acquis — propriétés algébriques, limites, dérivation, primitives — au service de la résolution d'équations, d'inéquations, de systèmes et de problèmes concrets : c'est l'objet de la dernière section de cette leçon.

6 ÉQUATIONS, INÉQUATIONS, SYSTÈMES ET APPLICATIONS

Dans la section précédente, nous avons appris à remonter d'une fonction vers ses primitives : toute fonction de la forme $\frac{u'}{u}$ admet pour primitive $\ln |u|$. Nous allons maintenant utiliser le logarithme népérien comme un outil de résolution : grâce à ses propriétés algébriques et à sa stricte croissance, il transforme des équations apparemment compliquées en équations simples, et il permet de répondre à des questions très concrètes : en combien d'années un capital placé à la BEAC double-t-il ? Comment mesure-t-on l'acidité de l'eau distribuée par la CAMWATER ? Pourquoi l'échelle des séismes est-elle logarithmique ?

6.1 Le principe fondamental : l'injectivité de la fonction $\ln$

Intuition.

La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$: deux nombres strictement positifs distincts ont toujours des logarithmes distincts. Autrement dit, le logarithme ne peut pas « confondre » deux nombres : si deux logarithmes sont égaux, c'est que les nombres de départ étaient égaux. C'est cette propriété qui nous autorise à « supprimer le $\ln$ » des deux côtés d'une équation.

PROPRIÉTÉ Équivalence fondamentale

Pour tous réels a et b strictement positifs :

$$\ln a = \ln b \iff a = b \quad \text{et} \quad \ln a < \ln b \iff a < b.$$

De plus, $\ln$ réalise une **bijection** de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$: tout réel a est le logarithme d'un unique

réel strictement positif.

EXPÉRIENCE Pourquoi ces équivalences sont-elles vraies ?

Raisonnons pas à pas.

1. Sens direct ($\Rightarrow$). Si $a = b$, alors évidemment $\ln a = \ln b$.
2. Sens réciproque ($\Leftarrow$). Supposons $\ln a = \ln b$ et montrons que $a = b$. Raisonnons par l'absurde : si $a \neq b$, alors soit $a < b$, soit $a > b$. Comme $\ln$ est strictement croissante, on aurait $\ln a < \ln b$ ou $\ln a > \ln b$: dans les deux cas, contradiction avec $\ln a = \ln b$. Donc $a = b$.
3. Pour l'inégalité. Le sens direct vient de la croissance de $\ln$; le sens réciproque se démontre de la même façon par l'absurde.
4. Bijektivité. L'injectivité vient d'être prouvée. La surjectivité (tout réel est atteint) est admise à ce niveau : elle repose sur le fait que $\ln$ est continue sur $]0 ; +\infty[$ avec $\lim_{0^+} \ln = -\infty$ et $\lim_{+\infty} \ln = +\infty$ (théorème des valeurs intermédiaires). Nous la précisons avec la fonction exponentielle.

ATTENTION La condition d'existence, toujours en premier !

L'équivalence $\ln a = \ln b \iff a = b$ n'a de sens que si $a > 0$ et $b > 0$. Avant toute résolution, on doit déterminer l'ensemble sur lequel tous les logarithmes de l'équation existent. Une « solution » trouvée après transformation mais qui ne vérifie pas ces conditions doit être rejetée. C'est l'erreur la plus fréquente au Baccalauréat sur ce chapitre.

MÉTHODE Organigramme de résolution d'une équation ou inéquation avec $\ln$

Toute résolution suit le même schéma en quatre étapes :

1. Conditions d'existence : écrire que chaque quantité sous un $\ln$ est strictement positive ; en déduire le domaine D .
2. Transformation : utiliser les propriétés algébriques ($\ln a + \ln b = \ln(ab)$, etc.) ou poser $X = \ln x$.
3. Résolution : résoudre l'équation transformée (souvent une équation du 1^{re} ou 2^{ème} degré).
4. Vérification : ne retenir que les solutions appartenant à D , puis conclure par l'ensemble S .

Étape 1 — Conditions d'existenceChaque argument de $\ln$ est > 0 ; domaine D **Étape 2 — Transformation**Propriétés algébriques
ou changement $X = \ln x$ **Étape 3 — Résolution**Équation transformée (1^{re} ou 2^{ème} degré)**Étape 4 — Vérification et conclusion**Ne garder que les solutions dans D ; écrire S

Organigramme de résolution : la vérification finale (étape 4) est obligatoire.

6.2 Équations du type $\ln x = a$ et $\ln u(x) = \ln v(x)$ **Intuition.**

Puisque $\ln$ est bijective de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$, l'équation $\ln x = a$ possède, quel que soit le réel a , une unique solution. Graphiquement, c'est l'abscisse du point d'intersection de la courbe de $\ln$ avec la droite horizontale d'équation $y = a$.


PROPRIÉTÉ **Solution de $\ln x = a$**

Pour tout réel a , l'équation $\ln x = a$ admet une **unique solution** dans $]0; +\infty[$. On note cette solution $x = e^a$ (ou e^a). En particulier :

$$\ln x = 0 \iff x = 1 \quad \text{et} \quad \ln x = 1 \iff x = e.$$

LESAVAIS-TU ? **Ouverture : la fonction exponentielle**

Le nombre e^a est, par définition, l'unique réel strictement positif dont le logarithme vaut a . Cela définit une nouvelle fonction, la **fonction exponentielle** $x \mapsto e^x$, réciproque de $\ln$: on a $\ln(e^x) = x$ pour tout réel x et $e^{\ln x} = x$ pour tout $x > 0$. Elle sera étudiée en détail dans la leçon suivante ; ici, nous l'utilisons simplement comme une notation pour la solution de $\ln x = a$.



La solution de $\ln x = 2$ est l'abscisse $x = e^2 \approx 7,39$ du point d'intersection de la courbe avec la droite $y = 2$.

PROPRIÉTÉ Équations et inéquations du type $\ln u = \ln v$

Soient u et v deux fonctions. Sous les conditions $u(x) > 0$ et $v(x) > 0$:

$$\ln u(x) = \ln v(x) \iff u(x) = v(x) \quad \text{et} \quad \ln u(x) < \ln v(x) \iff u(x) < v(x).$$

Pour les inéquations, le sens de l'inégalité est conservé car $\ln$ est croissante.

EXERCICE RÉSOLU 12 Équation du type $\ln u = \ln v$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\ln(3x - 1) = \ln(x + 5)$.

SOLUTION

Étape 1 — Conditions d'existence.

$$\begin{cases} 3x - 1 > 0 \\ x + 5 > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > \frac{1}{3} \\ x > -5 \end{cases} \iff x > \frac{1}{3}.$$

Le domaine est $D = \left] \frac{1}{3}; +\infty \right[$.

Étapes 2 et 3 — Transformation et résolution. Sur D , par injectivité de $\ln$:

$$\ln(3x - 1) = \ln(x + 5) \iff 3x - 1 = x + 5 \iff 2x = 6 \iff x = 3.$$

Étape 4 — Vérification. $3 \in D$ car $3 > \frac{1}{3}$. De plus $3 \times 3 - 1 = 8$ et $3 + 5 = 8$: on a bien $\ln 8 = \ln 8$.

$$S = \{3\}.$$

EXERCICE RÉSOLU 13 Inéquation du type $\ln u < \ln v$ Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\ln(2x + 3) < \ln(6 - x)$.**SOLUTION**Étape 1 — Conditions. $2x + 3 > 0 \iff x > -\frac{3}{2}$ et $6 - x > 0 \iff x < 6$. Donc $D =]-\frac{3}{2}; 6[$.Étapes 2 et 3. $\ln$ étant croissante, elle conserve l'ordre :

$$2x + 3 < 6 - x \iff 3x < 3 \iff x < 1.$$

Étape 4. On intersecte avec le domaine : $S = D \cap]-\infty; 1[=]-\frac{3}{2}; 1[$.**ATTENTION** Ne jamais « croiser » avec le signe de $\ln$

On ne peut pas écrire $\ln u < \ln v \Rightarrow u < v$ sans avoir d'abord prouvé que $u > 0$ et $v > 0$. Par exemple, l'inéquation $\ln(x^2) < \ln 1$ exige $x \neq 0$: sa solution est $] -1; 0[\cup]0; 1[$, et non $] -1; 1[$. Le point $x = 0$ doit être exclu.

6.3 Équations et inéquations avec inconnue auxiliaire $X = \ln x$ **Intuition.**

Certaines équations contiennent à la fois $\ln x$ et $(\ln x)^2$: ce sont des équations du second degré « déguisées ». L'astuce consiste à poser $X = \ln x$: l'équation devient une équation classique en X , que l'on sait résoudre depuis la Première. On revient ensuite à x grâce à $x = e^X$.

MÉTHODE Résolution d'une équation en $\ln x$

1. Condition d'existence : $x > 0$.
2. Changement d'inconnue : poser $X = \ln x$ (avec $X \in \mathbb{R}$, sans autre restriction).
3. Résoudre l'équation en X (souvent du second degré : discriminant Δ).
4. Revenir à x : pour chaque solution X , écrire $x = e^X$. Comme $e^X > 0$ pour tout réel X , la condition $x > 0$ est toujours satisfaite : aucune solution n'est rejetée à cette étape.

EXEMPLE L'exemple classique du BaccalauréatRésolvons $(\ln x)^2 - \ln x - 2 = 0$.Condition : $x > 0$.

Posons $X = \ln x$. L'équation devient :

$$X^2 - X - 2 = 0.$$

Discriminant : $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 1 + 8 = 9 > 0$. Deux racines :

$$X_1 = \frac{1-3}{2} = -1 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{1+3}{2} = 2.$$

Retour à x : $\ln x = -1 \iff x = e^{-1} = \frac{1}{e}$ et $\ln x = 2 \iff x = e^2$.

$$S = \left\{ \frac{1}{e}; e^2 \right\}.$$

Vérification pour $x = e^2$: $(\ln e^2)^2 - \ln e^2 - 2 = 4 - 2 - 2 = 0$. Correct.

EXERCICE RÉSOLU 14 Inéquation du second degré en $\ln x$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $(\ln x)^2 - \ln x - 2 < 0$.

SOLUTION

Condition : $x > 0$. Posons $X = \ln x$: on obtient $X^2 - X - 2 < 0$.

Le trinôme $X^2 - X - 2$ a pour racines -1 et 2 (voir exemple précédent). Un trinôme est du signe de $a = 1 > 0$ à l'extérieur des racines, donc négatif entre les racines :

$$X^2 - X - 2 < 0 \iff -1 < X < 2 \iff -1 < \ln x < 2.$$

Comme $\ln$ est croissante et bijective, on applique la fonction exponentielle (qui conserve l'ordre) :

$$e^{-1} < x < e^2.$$

Ces bornes sont strictement positives : la condition $x > 0$ est satisfaite.

$$S = \left] \frac{1}{e}; e^2 \right[.$$

ATTENTION Deux pièges classiques

- Ne concluez jamais « $X = -1$ donc $x = -1$ » : on doit revenir à x par $x = e^X$, et e^{-1} est bien positif même si X est négatif.
- Pour une inéquation, n'oubliez pas que $\ln x < 0 \iff 0 < x < 1$: la borne 0 doit apparaître, car x doit rester strictement positif.

6.4 Systèmes à deux inconnues faisant intervenir $\ln x$ et $\ln y$

Intuition.

Un système où apparaissent $\ln x$ et $\ln y$ se ramène, en posant $X = \ln x$ et $Y = \ln y$, à un système linéaire de deux équations à deux inconnues, que l'on résout par substitution ou combinaison. On revient ensuite à $(x; y)$ par $x = e^X$ et $y = e^Y$.

MÉTHODE Résolution d'un système en $\ln x$ et $\ln y$

1. Écrire les conditions d'existence : $x > 0$ et $y > 0$.
2. Poser $X = \ln x$ et $Y = \ln y$; résoudre le système linéaire en $(X; Y)$.
3. Conclure : $(x; y) = (e^X; e^Y)$. Les conditions $x > 0, y > 0$ sont automatiquement satisfaites.

EXERCICE RÉSOLU 15 Système avec logarithmes

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système :

$$\begin{cases} \ln x + \ln y = \ln 6 \\ \ln x - \ln y = 0 \end{cases}$$

SOLUTION

Conditions : $x > 0$ et $y > 0$.

Posons $X = \ln x$ et $Y = \ln y$. Le système devient :

$$\begin{cases} X + Y = \ln 6 \\ X - Y = 0 \end{cases}$$

Par addition membre à membre : $2X = \ln 6$, donc $X = \frac{\ln 6}{2} = \ln \sqrt{6}$. La deuxième équation donne $Y = X = \ln \sqrt{6}$.

Retour aux inconnues : $x = e^{\ln \sqrt{6}} = \sqrt{6}$ et $y = \sqrt{6}$.

Vérification : $\ln \sqrt{6} + \ln \sqrt{6} = \ln(\sqrt{6} \times \sqrt{6}) = \ln 6$ et $\ln \sqrt{6} - \ln \sqrt{6} = 0$.

$$S = \{(\sqrt{6}; \sqrt{6})\}.$$

6.5 Applications : le logarithme, outil pour « inverser » les puissances

L'idée maîtresse.

Beaucoup de phénomènes (placements bancaires, croissance démographique, désintégration radioactive) sont modélisés par une puissance a^n . Pour trouver n connaissant a^n , on « des-

cend l'exposant » grâce au logarithme :

$$a^n = b \iff n \ln a = \ln b \iff n = \frac{\ln b}{\ln a}.$$

C'est l'une des applications les plus puissantes du logarithme népérien.

EXEMPLE Temps de doublement d'un capital

Mme Etoundi place un capital à intérêts composés au taux annuel de 7 %. Au bout de n années, son capital est multiplié par $1,07^n$. En combien d'années le capital aura-t-il doublé ? On résout :

$$1,07^n = 2 \iff n \ln 1,07 = \ln 2 \iff n = \frac{\ln 2}{\ln 1,07} \approx \frac{0,693}{0,0677} \approx 10,2.$$

Le capital double au bout d'environ 10,2 ans, c'est-à-dire lors de la 11^{ème} année (car n doit être entier : $1,07^{10} \approx 1,97 < 2$ et $1,07^{11} \approx 2,10 > 2$).

LESAVAIS-TU ? Le pH de l'eau de la CAMWATER

Le **pH** d'une solution mesure son acidité : $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$, où $[\text{H}^+]$ est la concentration en ions hydrogène et $\log$ désigne le logarithme décimal, lié au logarithme népérien par :

$$\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}.$$

L'eau potable distribuée par la CAMWATER doit avoir un pH compris entre 6,5 et 8,5. Comme le pH est une échelle logarithmique, une eau de pH 6 est dix fois plus acide qu'une eau de pH 7 ! La même idée d'échelle logarithmique se retrouve en sismologie (magnitude de Richter : +1 de magnitude correspond à une amplitude multipliée par 10) et en acoustique (le décibel : $\text{dB} = 10 \log \frac{I}{I_0}$). Ces échelles permettent d'« écraser » des grandeurs qui varient sur des ordres de grandeur immenses pour les rendre lisibles.

EXERCICE RÉSOLU 16 Application : croissance d'une population

La population d'une ville du littoral camerounais croît de 4 % par an. En combien d'années aura-t-elle été multipliée par 1,5 ? (On donnera la réponse à 0,1 près.)

SOLUTION

Au bout de n années, la population est multipliée par $1,04^n$. On résout :

$$1,04^n = 1,5 \iff n = \frac{\ln 1,5}{\ln 1,04} \approx \frac{0,4055}{0,0392} \approx 10,3.$$

La population aura été multipliée par 1,5 au bout d'environ 10,3 ans, donc au cours de la

11^{ème} année.

6.6 Synthèse méthodologique de la section

À RETENIR Les réflexes à acquérir

- Toujours commencer par les conditions d'existence : chaque argument d'un logarithme doit être strictement positif.
- Injectivité : $\ln u = \ln v \iff u = v$ (sous conditions); $\ln u < \ln v \iff u < v$ car $\ln$ est croissante (le sens de l'inégalité est conservé).
- Équation $\ln x = a$: unique solution $x = e^a$.
- Changement d'inconnue : poser $X = \ln x$ (ou $X = \ln x$, $Y = \ln y$ pour un système), résoudre, puis revenir par $x = e^X$, toujours positif.
- Puissances : $a^n = b \iff n = \frac{\ln b}{\ln a}$ — c'est l'outil des problèmes de doublement, de pH et d'échelles logarithmiques.
- Toujours finir par la vérification : toute solution hors du domaine est rejetée.

EXERCICE 6 Pour s'entraîner

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$: a) $\ln(2x - 4) = \ln(x + 1)$; b) $\ln(x^2 - 3) = 0$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\ln(3 - x) \geq \ln(2x)$.
3. Résoudre $(\ln x)^2 + \ln x - 6 = 0$.
4. Résoudre le système :
$$\begin{cases} \ln x + 2 \ln y = \ln 8 \\ 2 \ln x - \ln y = \ln 2 \end{cases}$$
5. Un capital placé à 5 % l'an à intérêts composés doit tripler. En combien d'années ?

CORRIGÉ Exercice

1. a) Conditions : $x > 2$ et $x > -1$, donc $D =]2; +\infty[$. Alors $2x - 4 = x + 1 \iff x = 5 \in D$. $S = \{5\}$.
b) Condition : $x^2 - 3 > 0 \iff x \in]-\infty; -\sqrt{3}[\cup]\sqrt{3}; +\infty[$. L'équation s'écrit $x^2 - 3 = 1$, soit $x^2 = 4$, $x = \pm 2$. Les deux valeurs vérifient $|2| > \sqrt{3}$: $S = \{-2; 2\}$.
2. Conditions : $x < 3$ et $x > 0$, donc $D =]0; 3[$. Comme $\ln$ est croissante : $3 - x \geq 2x \iff x \leq$

1. $S =]0; 1]$.

3. **Condition :** $x > 0$. Posons $X = \ln x : X^2 + X - 6 = 0, \Delta = 1 + 24 = 25, X = 2$ ou $X = -3$. Donc $x = e^2$ ou $x = e^{-3}$. $S = \{e^{-3}; e^2\}$.

4. **Conditions :** $x > 0, y > 0$. Posons $X = \ln x, Y = \ln y$:

$$\begin{cases} X + 2Y = \ln 8 = 3 \ln 2 \\ 2X - Y = \ln 2 \end{cases}$$

De la deuxième équation, $Y = 2X - \ln 2$. En reportant dans la première : $X + 2(2X - \ln 2) = 3 \ln 2 \iff 5X - 2 \ln 2 = 3 \ln 2 \iff 5X = 5 \ln 2 \iff X = \ln 2$. Alors $Y = 2 \ln 2 - \ln 2 = \ln 2$. D'où $x = e^{\ln 2} = 2$ et $y = 2$. Vérification : $\ln 2 + 2 \ln 2 = 3 \ln 2 = \ln 8; 2 \ln 2 - \ln 2 = \ln 2$. $S = \{(2; 2)\}$.

5. On résout $1,05^n = 3 \iff n = \frac{\ln 3}{\ln 1,05} \approx \frac{1,0986}{0,0488} \approx 22,5$. Le capital triple au bout d'environ 22,5 ans, donc lors de la 23^{ème} année.

7 LOGARITHME DE BASE A

Dans la leçon précédente, tu as découvert le logarithme népérien $\ln$, défini comme la primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ qui s'annule en 1. Historiquement, cependant, les logarithmes ont été inventés (par Neper et Briggs, au XVII^e siècle) dans une autre base : la base 10, pour simplifier les calculs astronomiques et commerciaux. Aujourd'hui encore, le pH d'une solution, la magnitude d'un séisme ou l'intensité d'un son en décibels s'expriment avec un logarithme de base 10. Ce complément te donne les outils pour passer de $\ln$ à n'importe quelle base a : tu verras que tout repose sur une seule formule, le changement de base.

7.1 Définition et premières propriétés

L'idée est simple : pour $a > 0$, $a \neq 1$, l'équation $a^y = x$ (avec $x > 0$) admet une unique solution y , car la fonction $y \mapsto a^y = e^{y \ln a}$ est continue et strictement monotone sur $\mathbb{R}$ (croissante si $\ln a > 0$, décroissante si $\ln a < 0$). En prenant le $\ln$ des deux membres de $a^y = x$, on obtient $y \ln a = \ln x$, d'où $y = \frac{\ln x}{\ln a}$. Cette remarque motive la définition suivante.

DÉFINITION Logarithme de base a

Soit a un réel tel que $a > 0$ et $a \neq 1$. On appelle **logarithme de base a** la fonction notée $\log_a$, définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$\log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

Pour tout $x > 0$ et tout réel y : $y = \log_a(x) \iff a^y = x$.

EXEMPLE Lecture directe

$\log_2(8) = 3$ car $2^3 = 8$; $\log_{10}(1000) = 3$ car $10^3 = 1000$; $\log_3\left(\frac{1}{9}\right) = -2$ car $3^{-2} = \frac{1}{9}$. Vérifie

avec la définition : $\log_2(8) = \frac{\ln 8}{\ln 2} = \frac{\ln(2^3)}{\ln 2} = \frac{3 \ln 2}{\ln 2} = 3$.

ATTENTION Conditions sur la base et sur la variable

La base a doit être strictement positive et différente de 1. En effet, $\ln 1 = 0$ rendrait le quotient $\frac{\ln x}{\ln a}$ impossible, et $1^y = x$ n'a de solution que si $x = 1$. De plus, $\log_a(x)$ n'existe que pour $x > 0$: écrire $\log_2(-4)$ n'a aucun sens. Avant tout calcul, commence donc par chercher l'ensemble de validité.

7.2 Propriétés algébriques et variations

Puisque $\log_a$ n'est que $\ln$ divisé par la constante $\ln a$, toutes les propriétés algébriques de $\ln$ se transmettent immédiatement. Par exemple :

$$\log_a(xy) = \frac{\ln(xy)}{\ln a} = \frac{\ln x + \ln y}{\ln a} = \log_a(x) + \log_a(y).$$

PROPRIÉTÉ Propriétés algébriques

Pour tous réels $x, y > 0$, tout entier relatif n et toute base $a > 0, a \neq 1$:

$$\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y); \quad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y);$$

$$\log_a(x^n) = n \log_a(x); \quad \log_a(\sqrt{x}) = \frac{1}{2} \log_a(x); \quad \log_a(1) = 0, \quad \log_a(a) = 1.$$

Formule de changement de base : pour deux bases a et b (toutes deux > 0 et $\neq 1$) et tout $x > 0$:

$$\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}.$$

En particulier, avec $b = e$: $\log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a}$, ce qui redonne la définition.


PROPRIÉTÉ Dérivée et sens de variation

La fonction $\log_a$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et, pour tout $x > 0$:

$$\log'_a(x) = \frac{1}{x \ln a}.$$

- Si $a > 1$: $\ln a > 0$, donc $\log_a$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$;
- Si $0 < a < 1$: $\ln a < 0$, donc $\log_a$ est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$.

Dans les deux cas, $\log_a(1) = 0$. Les limites se déduisent de celles de $\ln$: si $a > 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a(x) = +\infty$; si $0 < a < 1$, ces limites sont interverties.



Courbes de $\log_2$ (croissante, base > 1) et $\log_{1/2}$ (décroissante, base entre 0 et 1). Toutes deux passent par le point $(1; 0)$ et admettent l'axe des ordonnées comme asymptote verticale.

7.3 Le logarithme décimal $\log_{10}$

Le cas $a = 10$ est si important qu'on le note simplement $\log$ (sans indice) : c'est le **logarithme décimal**. On a $\log(10^n) = n$ pour tout entier relatif n . Dire que $\log x = 3,5$, c'est dire que $x = 10^{3,5} \approx 3162$. Le logarithme décimal mesure l'ordre de grandeur d'un nombre : c'est pourquoi il intervient dans de nombreuses échelles scientifiques.

LESAVAIS-TU ? Des échelles logarithmiques partout

Le pH d'une solution est $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$; la magnitude de Richter compare l'amplitude d'un séisme à une amplitude de référence en base 10; le niveau sonore en décibels est $L = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$. Ainsi, un séisme de magnitude 6 a des amplitudes 10 fois plus grandes qu'un séisme de magnitude 5 — une unité de plus, c'est un facteur 10 ! De même, doubler l'intensité sonore n'ajoute qu'environ 3 décibels, car $10 \log 2 \approx 3$.

MÉTHODE Résoudre une équation avec $\log_a$

1. Déterminer l'ensemble de validité (les quantités sous les logarithmes doivent être strictement positives).
2. Regrouper les logarithmes à l'aide des propriétés algébriques pour obtenir $\log_a(A) =$

$$\log_a(B) \text{ ou } \log_a(A) = k.$$

3. Utiliser l'injectivité ($A = B$) ou la définition ($A = a^k$).
4. Vérifier que les solutions trouvées appartiennent à l'ensemble de validité, puis conclure.

EXERCICE RÉSOLU 17 Équation logarithmique et pH d'une limonade

- 1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\log_2(x) + \log_2(x - 2) = 3$.
- 2) Application : une limonade a une concentration $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3} \text{ mol/L}$. Quel est son pH?

SOLUTION

- 1) Équation. Validité : $x > 0$ et $x - 2 > 0$, donc $x > 2$. On regroupe les logarithmes :

$$\log_2(x(x - 2)) = 3 \iff x(x - 2) = 2^3 = 8 \iff x^2 - 2x - 8 = 0.$$

$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-8) = 4 + 32 = 36$, d'où $x = \frac{2+6}{2} = 4$ ou $x = \frac{2-6}{2} = -2$. Seule $x = 4$ vérifie la condition $x > 2$: $S = \{4\}$.

- 2) pH. $\text{pH} = -\log(10^{-3}) = -(-3) = 3$. La limonade est acide ($\text{pH} < 7$).

ATTENTION Pièges fréquents

- $\log_a(x + y) \neq \log_a(x) + \log_a(y)$: la propriété porte sur un produit, pas une somme.
- Ne pas confondre $\frac{\ln x}{\ln a}$ avec $\ln\left(\frac{x}{a}\right)$: ce sont deux quantités différentes ! Par exemple $\frac{\ln 8}{\ln 2} = 3$ alors que $\ln\left(\frac{8}{2}\right) = \ln 4 \approx 1,39$.
- Si $0 < a < 1$, la fonction $\log_a$ est décroissante : dans une inéquation, $\log_a(u) < \log_a(v) \iff u > v$ (le sens de l'inégalité change).
- Une solution algébrique qui ne vérifie pas les conditions de validité doit être rejetée : toujours conclure après vérification.

EXERCICE 7 Pour t'entraîner

1. Calculer sans calculatrice : $\log_3(27)$, $\log_5\left(\frac{1}{25}\right)$, $\log_4(8)$ (penser à $8 = 2^3$ et $4 = 2^2$).
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\log(x + 1) + \log(x - 1) = \log 8$.

3. Le niveau sonore d'une moto est $L = 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$. De combien de décibels le niveau augmente-t-il si l'intensité I est multipliée par 100 ?

CORRIGÉ Exercice : Pour t'entraîner

- $\log_3(27) = \log_3(3^3) = 3$; $\log_5\left(\frac{1}{25}\right) = \log_5(5^{-2}) = -2$; $\log_4(8) = \frac{\ln 8}{\ln 4} = \frac{3 \ln 2}{2 \ln 2} = \frac{3}{2}$.
- Validité : $x > 1$. L'équation s'écrit $\log((x+1)(x-1)) = \log 8$, soit $x^2 - 1 = 8$, c'est-à-dire $x^2 = 9$, d'où $x = 3$ ou $x = -3$. Seule $x = 3$ convient : $S = \{3\}$.
- Si I devient $100 I$, le nouveau niveau est $L' = 10 \log\left(\frac{100 I}{I_0}\right) = 10 \log 100 + 10 \log\left(\frac{I}{I_0}\right) = 20 + L$. Le niveau augmente de 20 décibels.

8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

9 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION : GESTION D'UN FORAGE À NKONGSAMBA

9.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration te place dans une situation sanitaire et économique authentique : la gestion d'un forage par une coopérative agricole de Nkongsamba. À travers trois tâches complémentaires, tu vas mobiliser l'ensemble des savoir-faire de la leçon sur la fonction logarithme népérien :

- utiliser les propriétés algébriques de $\ln$ pour transformer une expression (passage du logarithme décimal au logarithme népérien) ;
- résoudre une équation de la forme $e^{at} = b$ et une inéquation de la forme $e^{at} > b$ en passant au logarithme népérien ;
- résoudre une équation et une inéquation faisant intervenir $\ln x$, en vérifiant les conditions d'existence ;
- interpréter les résultats obtenus dans un contexte concret (conformité d'une eau potable, croissance d'une population bactérienne, placement à intérêts composés) ;
- comparer des croissances exponentielles et rédiger une synthèse argumentée.

9.2 Situation

La coopérative agricole « Vallée du Moungo » de Nkongsamba, dans la région du Littoral, exploite un forage qui alimente en eau potable plusieurs quartiers et irrigue des plantations de bananiers. Trois préoccupations occupent actuellement le comité de gestion, qui te sollicite en tant qu'expert(e) en mathématiques.


Préoccupation 1 : la qualité sanitaire de l'eau. Le laboratoire de la coopérative mesure l'acidité de l'eau du forage grâce au pH, défini par

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+],$$

où $[\text{H}^+]$ désigne la concentration en ions hydrogène, exprimée en mol/L, et $\log$ le logarithme décimal. On rappelle la relation de conversion :

$$\log x = \frac{\ln x}{\ln 10} \quad (x > 0).$$

La dernière analyse donne un pH de 6,8. La norme camerounaise de potabilité exige que le pH soit compris entre 6,5 et 8,5.




Échelle de pH et position de la mesure du forage.

Préoccupation 2 : la prolifération bactérienne dans le réservoir. Le réservoir de stockage, mal protégé de la chaleur, abrite une population de bactéries dont l'effectif au temps t (en heures) est modélisé par

$$N(t) = N_0 e^{0,3t},$$

où N_0 est l'effectif initial ($N_0 > 0$). Le comité veut connaître le temps de doublement de cette population et le moment à partir duquel l'effectif dépassera 1000 N_0 , seuil au-delà duquel l'eau est déclarée impropre à la consommation.

Croissance bactérienne $N(t) = N_0 e^{0,3t}$: temps de doublement et seuil critique.

Préoccupation 3 : le placement de la recette. La coopérative place une recette de 2 000 000 FCFA à la CCA-Bank à un taux annuel de 6 %, à intérêts composés. Le capital au bout de n années est donc

$$C(n) = 2\,000\,000 \times (1,06)^n \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Le trésorier souhaite savoir au bout de combien d'années le capital aura doublé, et comparer ce temps de doublement à celui de la population bactérienne.

9.3 Consignes

La classe est répartie en trois groupes. Chaque groupe traite une tâche, puis présente ses résultats ; la classe confronte les méthodes et rédige une synthèse commune.

Tâche 1 (Groupe 1) : le pH de l'eau.

1. En utilisant la relation $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$, montrer que $\text{pH} = -\frac{\ln [H^+]}{\ln 10}$.
2. Déterminer la concentration $[H^+]$ correspondant à un pH de 6,8 (on donnera une valeur approchée en écriture scientifique).
3. Traduire la norme $6,5 \leq \text{pH} \leq 8,5$ en un encadrement de $[H^+]$, puis vérifier que l'eau du forage est conforme.

Tâche 2 (Groupe 2) : la croissance bactérienne.

1. Résoudre dans $\mathbb{R}_+$ l'équation $e^{0,3t} = 2$. En déduire le temps de doublement de la population, arrondi à la minute près.
2. Résoudre l'inéquation $N(t) > 1000 N_0$. Au bout de combien d'heures entières l'eau devient-elle impropre à la consommation?
3. Combien de temps s'écoule-t-il entre le premier doublement et le dépassement du seuil critique? Commenter.

Tâche 3 (Groupe 3) : le placement.

1. Montrer que le temps de doublement du capital est la plus petite solution entière de l'inéquation $(1,06)^n \geq 2$, puis résoudre cette inéquation à l'aide de $\ln$.
2. Au bout de combien d'années le capital atteindra-t-il 4 000 000 FCFA? Vérifier la cohérence avec la question précédente.
3. Comparer le temps de doublement du capital (en années) à celui des bactéries (en heures). Quelle conclusion économique et sanitaire en tires-tu?

Synthèse commune. Rédiger en quelques lignes un avis au comité de gestion : l'eau est-elle conforme? Quel danger représente le réservoir? Le placement est-il rentable par rapport aux risques?

9.4 Ressources à mobiliser**À RETENIR Boîte à outils de la leçon**

- Lien log-ln : $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$ pour tout $x > 0$.
- Propriétés algébriques de $\ln$: $\ln(ab) = \ln a + \ln b$; $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$; $\ln(a^n) = n \ln a$ ($n \in \mathbb{Z}$) ; $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a$ ($a > 0$).
- Réciproque et monotonie : pour $a > 0$ et $b > 0$, $\ln a = \ln b \iff a = b$; et $\ln a < \ln b \iff a < b$ (stricte croissance de $\ln$ sur $]0; +\infty[$).
- Équations exponentielles : $e^x = b$ (avec $b > 0$) $\iff x = \ln b$. Plus généralement $e^{at} = b \iff t = \frac{\ln b}{a}$ ($a \neq 0$).
- Inéquations exponentielles : si $a > 0$, $e^{at} > b \iff t > \frac{\ln b}{a}$; si $a < 0$, le sens change. De même $(1,06)^n \geq 2 \iff n \ln(1,06) \geq \ln 2$ car $\ln(1,06) > 0$.
- Condition d'existence : $\ln x$ n'existe que si $x > 0$ (ensemble de définition $D_{\ln} =]0; +\infty[$).
- Primitive de la forme u' / u : Si u est dérivable et strictement positive sur un intervalle I , une primitive de $\frac{u'}{u}$ sur I est $\ln \cdot u$ (démonstration exigible au Bac).

9.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 18 Corrigé complet de l'activité

Tâche 1. 1) Exprimer le pH avec $\ln$. 2) Calculer $[H^+]$ pour $\text{pH} = 6,8$. 3) Encadrer $[H^+]$ selon la norme et conclure.

Tâche 2. 1) Résoudre $e^{0,3t} = 2$. 2) Résoudre $N(t) > 1000 N_0$. 3) Comparer les durées.

Tâche 3. 1) Résoudre $(1,06)^n \geq 2$. 2) Temps pour atteindre 4 000 000 FCFA. 3) Comparaison et conclusion.

SOLUTION

Tâche 1 : le pH de l'eau.

1) Par définition, $\text{pH} = -\log [H^+]$. Or $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$ pour tout $x > 0$, donc en appliquant à $x = [H^+] > 0$:

$$\text{pH} = -\frac{\ln [H^+]}{\ln 10}.$$

2) On résout l'équation $-\frac{\ln [H^+]}{\ln 10} = 6,8$, d'inconnue $[H^+] > 0$ (condition d'existence satisfaite car une concentration est strictement positive) :

$$\ln [H^+] = -6,8 \ln 10$$

$$[H^+] = e^{-6,8 \ln 10} = (e^{\ln 10})^{-6,8} = 10^{-6,8}.$$

Valeur approchée : $10^{-6,8} = 10^{-7} \times 10^{0,2} \approx 1,58 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$. (On peut aussi écrire $[H^+] = 1,58e-7 \text{ mol/L}$.)

3) La norme s'écrit $6,5 \leq -\frac{\ln [H^+]}{\ln 10} \leq 8,5$. Comme $\ln 10 > 0$, le nombre $-\ln 10$ est strictement négatif. En multipliant les trois membres par $-\ln 10$, le sens des inégalités change :

$$-8,5 \ln 10 \leq \ln [H^+] \leq -6,5 \ln 10.$$

La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, on peut l'appliquer sans changer le sens :

$$e^{-8,5 \ln 10} \leq [H^+] \leq e^{-6,5 \ln 10} \iff 10^{-8,5} \leq [H^+] \leq 10^{-6,5}.$$

Numériquement : $10^{-8,5} \approx 3,16 \times 10^{-9}$ et $10^{-6,5} \approx 3,16 \times 10^{-7}$. L'encadrement est donc : $3,16 \times 10^{-9} \leq [H^+] \leq 3,16 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$. Comme $1,58 \times 10^{-7} \in [3,16 \times 10^{-9}; 3,16 \times 10^{-7}]$, l'eau du forage est conforme à la norme de potabilité.

Tâche 2 : la croissance bactérienne.

1) L'équation $e^{0,3t} = 2$ admet une solution unique car $t \mapsto e^{0,3t}$ est bijective de $\mathbb{R}$ vers $]0; +\infty[$.

$$e^{0,3t} = 2 \iff 0,3t = \ln 2 \quad (\text{car } \ln \text{ est la réciproque de } \exp)$$

$$\iff t = \frac{\ln 2}{0,3}.$$

Calcul : $\ln 2 \approx 0,693147$, donc $t \approx \frac{0,693147}{0,3} \approx 2,31049 \text{ h}$. Conversion en minutes : $0,31049 \times 60 \approx 18,6 \text{ min} \approx 19 \text{ min}$. Le temps de doublement est 2 h 19 min (arrondi à la minute près).

2) $N(t) > 1000 N_0 \iff N_0 e^{0,3t} > 1000 N_0$. Comme $N_0 > 0$, on divise par N_0 sans changer le sens : $e^{0,3t} > 1000$. La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$, donc :

$$0,3t > \ln 1000 \iff t > \frac{\ln 1000}{0,3}.$$

Or $\ln 1000 = \ln(10^3) = 3 \ln 10$, donc $t > \frac{3 \ln 10}{0,3} = 10 \ln 10$. Calcul : $\ln 10 \approx 2,302585$, donc $t > 23,02585$ h. L'eau devient impropre à la consommation au bout de 24 heures entières (dès le début de la 24^e heure, le seuil est dépassé ; on arrondit au-dessus pour un seuil de sécurité).

3) Durée entre le premier doublement ($t_2 \approx 2,31$ h) et le dépassement du seuil ($t_{\text{seuil}} \approx 23,03$ h) : $\Delta t \approx 23,03 - 2,31 = 20,72$ h, soit environ 20 h 43 min. Commentaire : On note que $1000 \approx 2^{10}$ (car $2^{10} = 1024$). Atteindre $1000 N_0$ correspond donc à environ 10 doublements successifs. $10 \times 2,31 \approx 23,1$ h, ce qui est cohérent avec 23,03 h. La croissance exponentielle est fulgurante : le réservoir doit être nettoyé quotidiennement.

Tâche 3 : le placement.

1) Le capital double lorsque $C(n) \geq 2 \times 2\,000\,000$, c'est-à-dire $(1,06)^n \geq 2$. La fonction $n \mapsto (1,06)^n$ est strictement croissante. On passe au $\ln$ (qui est strictement croissante) : comme $\ln(1,06) > 0$, le sens de l'inégalité est conservé.

$$\begin{aligned} (1,06)^n &\geq 2 \iff \ln((1,06)^n) \geq \ln 2 \\ &\iff n \ln(1,06) \geq \ln 2 \\ &\iff n \geq \frac{\ln 2}{\ln(1,06)}. \end{aligned}$$

Calcul : $\ln 2 \approx 0,693147$, $\ln(1,06) \approx 0,0582689$, rapport $\approx 11,8957$. n étant un entier (nombre d'années), la plus petite solution est $n = 12$. Le capital double au bout de 12 ans.

2) Atteindre 4 000 000 FCFA, c'est quadrupler le capital initial : $(1,06)^n \geq 4 = 2^2$.

$$n \geq \frac{\ln 4}{\ln(1,06)} = \frac{2 \ln 2}{\ln(1,06)} \approx 2 \times 11,8957 \approx 23,79.$$

La plus petite solution entière est $n = 24$. Vérification : $24 = 2 \times 12$. Quadrupler demande deux doublements, donc deux fois le temps de doublement : cohérent.

3) Les bactéries doublent en 2,31 heures, le capital en 12 années ($\approx 105\,120$ heures). Le rapport des vitesses est vertigineux : en une seule journée (24 h), la population bactérienne est multipliée par $2^{10} \approx 1000$, tandis que le capital ne croît que de 6 % par an. Conclusion : Le placement est sûr mais lent ; en revanche, le risque sanitaire évolue à une vitesse incomparable et exige une surveillance quotidienne du réservoir.

Synthèse commune (exemple de rédaction). « L'eau du forage est conforme à la norme de potabilité ($\text{pH} = 6,8 \in [6,5; 8,5]$). Cependant, la population bactérienne du réservoir double toutes les 2 h 19 min et rend l'eau impropre en moins de 24 h : un nettoyage quotidien s'impose. Le placement à 6 % double en 12 ans ; il est rentable à long terme mais ne doit pas faire oublier l'urgence sanitaire. »

9.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence plusieurs acquis essentiels de la leçon :

- **Le passage au logarithme népérien est la clé** de toute équation ou inéquation exponentielle : $e^{at} = b \iff t = \frac{\ln b}{a}$, et le signe du coefficient a (ou celui de $\ln$ de la base) détermine le sens de l'inégalité.
- **Les propriétés algébriques de $\ln$** simplifient les calculs : $\ln 1000 = 3 \ln 10$, $\ln(2^2) = 2 \ln 2$, et la conversion $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$ relie les deux logarithmes.
- **La stricte croissance de $\ln$** garantit l'équivalence des inégalités lors du passage au logarithme, à condition de vérifier que les quantités sont strictement positives (conditions d'existence).
- **Le temps de doublement** est un concept transversal : il vaut $\frac{\ln 2}{a}$ pour une croissance e^{at} ($a > 0$), et $\frac{\ln 2}{\ln(1+t)}$ pour des intérêts composés au taux t . Il ne dépend pas de la quantité initiale.
- **L'interprétation des résultats** est une compétence à part entière : arrondir correctement (à l'entier supérieur pour un seuil à atteindre), convertir les unités (heures, minutes, années) et formuler une recommandation argumentée sont des savoir-faire attendus au Baccalauréat comme dans la vie professionnelle.

ATTENTION Pièges rencontrés pendant l'activité

- Ne pas oublier que multiplier une inégalité par $-\ln 10$ (nombre négatif) en change le sens.
- Ne pas écrire $\ln(1000 N_0) = \ln 1000 \times \ln N_0$: c'est $\ln 1000 + \ln N_0$ (propriété $\ln(ab) = \ln a + \ln b$).
- Pour $n \geq 11,90$ avec n entier, la réponse est $n = 12$ et non $n = 11$: on arrondit toujours au-dessus pour un seuil à atteindre ou dépasser.
- Vérifier systématiquement la condition d'existence $x > 0$ avant d'appliquer $\ln x$ (ici concentrations, effectifs, capital sont > 0).

LESAVAIS-TU ? Le pH et le logarithme népérien dans la vie courante

L'échelle de pH, inventée par le chimiste danois Sørensen en 1909, est une échelle logarithmique : une variation de 1 unité de pH correspond à une multiplication par 10 de la concentration en ions H^+ . C'est pourquoi on utilise le logarithme (décimal ou népérien) pour manipuler des grandeurs qui varient sur plusieurs ordres de grandeur : échelle de Richter (séismes), décibels (son), magnitude (astronomie). Au Cameroun, le contrôle de la qualité

de l'eau (MINSANTE, CAMWATER) repose sur ces mesures logarithmiques.

10 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

11 FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN

11.1 Définition et premières propriétés

DÉFINITION Fonction logarithme népérien

On appelle logarithme népérien la fonction $\ln$ définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}.$$


C'est l'unique fonction dérivable sur $]0; +\infty[$ telle que $\ln' x = \frac{1}{x}$ et $\ln 1 = 0$. Le nombre e (constante d'Euler) est l'unique réel tel que $\ln e = 1$; on a $e \approx 2,718$.

PROPRIÉTÉ Propriétés fondamentales de $\ln$

- Ensemble de définition : $D_{\ln} =]0; +\infty[$.
- Dérivée : $\forall x > 0, \quad \ln' x = \frac{1}{x} > 0$.
- Variations : $\ln$ est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$.
- Limites aux bornes :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

- Valeurs remarquables : $\ln 1 = 0$; $\ln e = 1$; $\ln(e^a) = a$; $e^{\ln a} = a$ ($a > 0$).
- Courbe représentative : Elle passe par $(1,0)$ et $(e,1)$, est strictement croissante, convexe, avec l'axe des ordonnées ($x = 0$) comme asymptote verticale.



Courbe représentative de la fonction logarithme népérien $y = \ln x$.

EXPÉRIENCE Découverte des propriétés algébriques (démonstration guidée)

Soient $a > 0$ et $b > 0$. On veut montrer $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.

1. Poser $f(x) = \ln(ax) - \ln x$ sur $]0; +\infty[$. Calculer $f'(x)$.
2. En déduire que f est constante. Calculer cette constante en $x = 1$.
3. Conclure pour $\ln(ab)$. Adapter la méthode pour $\ln(a/b)$, $\ln(a^n)$, $\ln(\sqrt{a})$.

À RETENIR Propriétés algébriques de $\ln$

Pour tout $a > 0$, $b > 0$ et tout $n \in \mathbb{Z}$ (et même $n \in \mathbb{Q}$ pour les racines) :

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b \quad ; \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b \quad ; \quad \ln(a^n) = n \ln a \quad ; \quad \ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a.$$

Conséquences immédiates : $\ln 1 = 0$; $\ln e = 1$; $\ln(e^a) = a$; $e^{\ln a} = a$ ($a > 0$).

EXEMPLE Calculs directs

$$\ln 4 = 2 \ln 2 ; \ln \sqrt{e} = \frac{1}{2} ; \ln \frac{1}{e^3} = -3 ; \ln\left(\frac{e}{2}\right) = 1 - \ln 2.$$

11.2 Propriétés algébriques de $\ln$

Méthode : Simplifier une expression contenant des logarithmes

MÉTHODE Simplifier une expression contenant des logarithmes

1. Repérer les **produits**, **quotients**, **puissances** et **racines carrées** à l'intérieur des logarithmes.
2. Appliquer les formules fondamentales, valables pour $a > 0$, $b > 0$ et n entier :

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b ; \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b ; \quad \ln(a^n) = n \ln a ; \quad \ln(\sqrt[n]{a}) = \frac{1}{n} \ln a.$$

3. Factoriser $\ln 2$, $\ln 3$, etc., pour regrouper les termes semblables.
4. Conclure en donnant le résultat sous la forme demandée (souvent $a \ln 2 + b \ln 3$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$).

Réflexes : $\ln 1 = 0$; $\ln e = 1$; pour aller dans l'autre sens (regrouper), $p \ln a + q \ln b = \ln(a^p b^q)$.

EXERCICE RÉSOLU 19 Simplification d'une expression logarithmique (type Bac)

On pose $A = \ln 48 - 2 \ln 6 + \ln 3$ et $B = \ln\left(\frac{9}{4}\right) + \ln\left(\frac{8}{3}\right) - \ln 6$.

Écrire A et B sous la forme $a \ln 2 + b \ln 3$, où a et b sont des entiers relatifs.

SOLUTION

Calcul de A . On décompose chaque nombre en facteurs premiers : $48 = 2^4 \times 3$ et $6 = 2 \times 3$.

$$\begin{aligned} A &= \ln(2^4 \times 3) - 2 \ln(2 \times 3) + \ln 3 \\ &= 4 \ln 2 + \ln 3 - 2(\ln 2 + \ln 3) + \ln 3 \\ &= 4 \ln 2 + \ln 3 - 2 \ln 2 - 2 \ln 3 + \ln 3 \\ &= 2 \ln 2 + 0 \times \ln 3 = 2 \ln 2. \end{aligned}$$

Calcul de B . On utilise $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$:

$$\begin{aligned} B &= \ln 9 - \ln 4 + \ln 8 - \ln 3 - \ln 6 \\ &= 2 \ln 3 - 2 \ln 2 + 3 \ln 2 - \ln 3 - (\ln 2 + \ln 3) \\ &= 2 \ln 3 - 2 \ln 2 + 3 \ln 2 - \ln 3 - \ln 2 - \ln 3 \\ &= 0 \times \ln 2 + 0 \times \ln 3 = 0. \end{aligned}$$

Conclusion : $A = 2 \ln 2$ (c'est-à-dire $A = \ln 4$) et $B = 0$ (c'est-à-dire que l'argument vaut 1).

11.3 Limites de la fonction ln

PROPRIÉTÉ Limites usuelles et croissances comparées

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$.

- Croissances comparées (à connaître) :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0 \quad (n \geq 1).$$

- Composées : Si $\lim u(x) = \ell \in]0; +\infty[$, alors $\lim \ln(u(x)) = \ln \ell$ (continuité). Si $\lim u(x) = 0^+$, alors $\lim \ln(u(x)) = -\infty$; si $\lim u(x) = +\infty$, alors $\lim \ln(u(x)) = +\infty$.
- Limite remarquable en 1 : $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$ (taux d'accroissement de ln en 1).

Méthode : Calculer les limites d'une fonction contenant ln

MÉTHODE Lever les indéterminations avec ln

1. Identifier la forme : en $+\infty$, $\ln x \rightarrow +\infty$; en 0^+ , $\ln x \rightarrow -\infty$.
2. Formes indéterminées $\infty - \infty$ ou $\frac{\infty}{\infty}$: **factoriser par le terme dominant** (souvent x ou $\ln x$) puis utiliser les limites de croissances comparées.
3. Pour les **composées** : poser $X = u(x)$, déterminer la limite de u , puis appliquer la limite de ln en ce point.
4. Limite de référence en 1 : $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$.

EXERCICE RÉSOLU 20 Calculs de limites (type Bac)

Calculer les limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$; b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x - x)$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{2x+1}{x-3}\right)$.

SOLUTION

a) Forme indéterminée $\infty - \infty$. On factorise par le terme dominant x :

$$x - \ln x = x \left(1 - \frac{\ln x}{x}\right).$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (croissance comparée), donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\ln x}{x}\right) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$. Par produit :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x) = +\infty.$$

b) On sait que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ (croissance comparée) et $\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$. Par somme : $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x - x) = 0$.

c) Posons $u(x) = \frac{2x+1}{x-3}$. Pour $x \rightarrow +\infty$:

$$u(x) = \frac{x\left(2 + \frac{1}{x}\right)}{x\left(1 - \frac{3}{x}\right)} = \frac{2 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{3}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 2.$$

La fonction $\ln$ étant continue en 2 (avec $2 > 0$), par composition :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{2x+1}{x-3}\right) = \ln 2.$$

Conclusion : a) $+\infty$; b) 0 ; c) $\ln 2$.

11.4 Dérivation, variations et courbe représentative

PROPRIÉTÉ Dérivée de $\ln u$

Soit u une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I . La fonction $\ln u$ est dérivable sur I et :

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}.$$

Preuve : Dérivée de la composée $x \mapsto \ln(u(x))$: $\ln'(u(x)) \times u'(x) = \frac{1}{u(x)} \times u'(x)$.

Méthode : Étudier une fonction contenant $\ln u$ et tracer sa courbe

MÉTHODE Étude complète de $f(x)$ contenant $\ln u(x)$

1. Ensemble de définition : résoudre $u(x) > 0$.
2. Limites aux bornes de D_f ; en déduire les éventuelles **asymptotes** (verticale si limite infinie en un bord fini, horizontale si limite finie en $\pm\infty$).
3. Dérivée : si $f = \ln u$, alors $f' = \frac{u'}{u}$; si f est une somme ou un produit, dériver terme à terme en utilisant $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.
4. Signe de f' : attention, sur D_f on a $u(x) > 0$, donc le signe de $\frac{u'}{u}$ est celui de u' . Dresser le tableau de variations.
5. Points remarquables : intersection avec l'axe des abscisses ($f(x) = 0$), valeur en 1 ou

en e , tangente éventuelle.

6. Tracer la courbe en plaçant les points et en respectant les asymptotes.

EXERCICE RÉSOLU 21 Étude de $f(x) = x - \ln x$ (type Bac)

Soit f la fonction définie par $f(x) = x - \ln x$ et C_f sa courbe dans un repère orthonormé.

- Déterminer l'ensemble de définition de f et les limites aux bornes.
- Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.
- Montrer que l'équation $f(x) = 0$ n'admet aucune solution.

SOLUTION

1. Ensemble de définition et limites. $\ln x$ n'existe que pour $x > 0$, donc $D_f =]0; +\infty[$.

En 0^+ : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$: la droite $x = 0$ (axe des ordonnées) est asymptote verticale à C_f .

En $+\infty$: forme indéterminée ; on factorise : $f(x) = x \left(1 - \frac{\ln x}{x}\right)$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, on obtient $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

2. Variations. f est dérivable sur $]0; +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables :

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$


Sur $]0; +\infty[$, $x > 0$, donc $f'(x)$ a le signe de $x - 1$: $f'(x) < 0$ sur $]0; 1[$, $f'(1) = 0$, $f'(x) > 0$ sur $]1; +\infty[$.

Minimum : $f(1) = 1 - \ln 1 = 1$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$ 1 $\nearrow$	$+\infty$

3. Équation $f(x) = 0$. D'après le tableau de variations, f admet sur $]0; +\infty[$ un minimum égal à 1. Donc pour tout $x > 0$: $f(x) \geq 1 > 0$.

Conclusion : l'équation $f(x) = 0$ n'admet aucune solution dans $]0; +\infty[$. (On a au passage démontré l'inégalité classique $\ln x \leq x - 1$ pour tout $x > 0$.)



Courbe de $f(x) = x - \ln x$: minimum en $(1,1)$, asymptote verticale $x = 0$.

11.5 Primitives de la forme $\frac{u'}{u}$

PROPRIÉTÉ Primitive de $\frac{u'}{u}$

Soit u une fonction dérivable ne s'annulant pas sur un intervalle I . Une primitive de $\frac{u'}{u}$ sur I est $\ln |u|$. Si de plus $u > 0$ sur I , une primitive est $\ln(u)$.

$$\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln |u(x)| + C \quad \text{sur } I.$$

Méthode : Déterminer une primitive de la forme $\frac{u'}{u}$

MÉTHODE Primitives et logarithmes

1. Mettre le numérateur sous la forme $k \times u'(x)$ en identifiant la fonction u du dénominateur.
2. Appliquer la formule : si u est dérivable et ne s'annule pas sur l'intervalle I , alors

$$\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln |u(x)| + C \quad \text{sur } I.$$

Sur un intervalle où $u > 0$, on écrit simplement $\ln(u(x)) + C$.

3. Si le numérateur est $k u'$, sortir le facteur k : $\int k \frac{u'}{u} = k \ln |u| + C$.

4. Vérifier en dérivant le résultat obtenu.

Réflexe : $\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$ sur $]0; +\infty[$; $\int_1^e \frac{dx}{x} = 1$.

EXERCICE RÉSOLU 22 Primitives et calcul intégral (type Bac)

1. Déterminer une primitive F de $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ sur $]1; +\infty[$.

2. Déterminer la primitive G de $g(x) = \frac{2x+3}{x^2+3x+1}$ sur $[0; +\infty[$ qui s'annule en 0.

SOLUTION

1. Posons $u(x) = \ln x$. Alors $u'(x) = \frac{1}{x}$, et $f(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$.

Sur $]1; +\infty[$, $\ln x > 0$, donc u est strictement positive : une primitive est

$$F(x) = \ln(\ln x).$$

Vérification : $F'(x) = \frac{\frac{1}{x}}{\ln x} = \frac{1}{x \ln x} = f(x) \equiv$

2. Posons $u(x) = x^2 + 3x + 1$. Alors $u'(x) = 2x + 3$: le numérateur est exactement u' , donc $g = \frac{u'}{u}$.

Sur $[0; +\infty[$, $u(x) = x^2 + 3x + 1 \geq 1 > 0$ (somme de termes positifs, $u(0) = 1$). Les primitives de g sont donc :

$$G(x) = \ln(x^2 + 3x + 1) + C.$$

Condition $G(0) = 0$: $\ln 1 + C = 0$, soit $C = 0$.

Conclusion : $G(x) = \ln(x^2 + 3x + 1)$.

Vérification : $G'(x) = \frac{2x+3}{x^2+3x+1} = g(x)$ et $G(0) = \ln 1 = 0 \equiv$

11.6 Équations, inéquations, systèmes et applications

Méthode : Résoudre une équation ou inéquation logarithmique

MÉTHODE Résoudre une équation ou inéquation logarithmique

1. Étape indispensable : déterminer l'**ensemble de définition** en imposant que chaque argument de $\ln$ soit strictement positif.
2. Se ramener, grâce aux propriétés algébriques, à l'une des formes :
 - $\ln u = \ln v \iff u = v$ (le logarithme est **injectif**);
 - $\ln u = k \iff u = e^k$;
 - $\ln u < \ln v \iff u < v$ car $\ln$ est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$: le sens de l'inégalité est conservé.
3. Résoudre l'équation ou l'inéquation obtenue.
4. Ne pas oublier : confronter les solutions trouvées à l'ensemble de définition et rejeter celles qui n'y appartiennent pas.

Réflexe : $\ln x > 0 \iff x > 1$ et $\ln x < 0 \iff 0 < x < 1$.

EXERCICE RÉSOLU 23 Équation et inéquation logarithmiques (type Bac)

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E) : $\ln(x+1) + \ln(x-1) = \ln 3$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation (I) : $\ln(2x-3) \leq \ln(x+1)$.

SOLUTION

1. Résolution de (E).

Conditions d'existence : il faut $x+1 > 0$ et $x-1 > 0$, c'est-à-dire $x > -1$ et $x > 1$. L'ensemble de définition est donc $D =]1; +\infty[$.

Sur D , on regroupe : $\ln(x+1) + \ln(x-1) = \ln[(x+1)(x-1)] = \ln(x^2-1)$. L'équation devient $\ln(x^2-1) = \ln 3$, d'où, par injectivité de $\ln$:

$$x^2 - 1 = 3 \iff x^2 = 4 \iff x = 2 \text{ ou } x = -2.$$

Confrontation à D : $-2 \notin D$ est rejeté ; $2 \in D$ est accepté.

Conclusion : $S_E = \{2\}$.

2. Résolution de (I).

Conditions : $2x-3 > 0$ et $x+1 > 0$, soit $x > \frac{3}{2}$. Donc $D =]\frac{3}{2}; +\infty[$.

Sur D , $\ln$ étant strictement croissante :

$$\ln(2x-3) \leq \ln(x+1) \iff 2x-3 \leq x+1 \iff x \leq 4.$$

On intersecte avec D : $x \in]\frac{3}{2}; 4]$.

Conclusion : $S_I =]\frac{3}{2}; 4]$.

Méthode : Résoudre un système d'inconnue $\ln x$ (changement de variable)**MÉTHODE** Poser $X = \ln x$

1. Vérifier la condition $x > 0$ (ou les conditions sur les arguments).
2. Poser le **changement de variable** $X = \ln x$ (et $Y = \ln y$ pour un système) pour obtenir une équation polynomiale ou un système linéaire en X (et Y).
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation ou le système en X (et Y).
4. Revenir à l'inconnue initiale par $x = e^X$ (et $y = e^Y$) : toute valeur réelle de X donne une solution, car $e^X > 0$ automatiquement.
5. Conclure en donnant les valeurs exactes, éventuellement une valeur approchée.

EXERCICE RÉSOLU 24 Système logarithmique (type Bac)Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système :

$$\begin{cases} \ln x + \ln y = \ln 8 \\ 2 \ln x - \ln y = \ln 2 \end{cases}$$

SOLUTIONConditions : $x > 0$ et $y > 0$.Changement de variable : posons $X = \ln x$ et $Y = \ln y$. Le système devient :

$$\begin{cases} X + Y = \ln 8 \\ 2X - Y = \ln 2 \end{cases}$$

Résolution : additionnons les deux lignes : $3X = \ln 8 + \ln 2 = \ln 16$, donc $X = \frac{\ln 16}{3} = \frac{4 \ln 2}{3}$.De la première ligne : $Y = \ln 8 - X = 3 \ln 2 - \frac{4 \ln 2}{3} = \frac{9 \ln 2 - 4 \ln 2}{3} = \frac{5 \ln 2}{3}$.Retour à x et y :

$$x = e^X = e^{\frac{4 \ln 2}{3}} = 2^{4/3} = \sqrt[3]{16}; \quad y = e^Y = e^{\frac{5 \ln 2}{3}} = 2^{5/3} = \sqrt[3]{32}.$$

Ces valeurs sont strictement positives : elles conviennent.

Vérification : $\ln x + \ln y = \frac{4 \ln 2}{3} + \frac{5 \ln 2}{3} = 3 \ln 2 = \ln 8 \equiv$; $2 \ln x - \ln y = \frac{8 \ln 2 - 5 \ln 2}{3} = \ln 2 \equiv$.Conclusion : $S = \left\{ \left(\sqrt[3]{16}; \sqrt[3]{32} \right) \right\}$, soit approximativement $(2,52; 3,17)$.

Méthode : Modéliser et résoudre un problème de seuil (croissance/désintégration)

MÉTHODE Modéliser et résoudre un problème de seuil

1. Traduire l'énoncé par une inéquation du type $a^n \geq b$ ou $A e^{kt} \geq B$.
2. Pour $a^n \geq b$ (avec $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$) : appliquer $\ln$ aux deux membres ($\ln$ est croissante, le sens est conservé) : $n \ln a \geq \ln b$.
3. Attention au signe de $\ln a$: si $a > 1$, $\ln a > 0$ et on divise sans changer le sens ; si $0 < a < 1$, $\ln a < 0$ et la division change le sens de l'inégalité.
4. Conclure avec le plus petit entier n convenable (arrondir à l'entier supérieur) et rédiger une phrase de conclusion dans le contexte.

EXERCICE RÉSOLU 25 Croissance démographique à Yaoundé (type Bac)

La population d'un quartier de Yaoundé est de 50000 habitants et augmente de 4 % par an. On modélise la population après n années par $P(n) = 50000 \times (1,04)^n$.

À partir de combien d'années la population dépassera-t-elle 100000 habitants ?

SOLUTION

On résout l'inéquation $P(n) > 100000$, c'est-à-dire :

$$50000 \times (1,04)^n > 100000 \iff (1,04)^n > 2.$$

La fonction $\ln$ étant strictement croissante, elle conserve le sens de l'inégalité :

$$\ln((1,04)^n) > \ln 2 \iff n \ln(1,04) > \ln 2.$$

Comme $1,04 > 1$, on a $\ln(1,04) > 0$: on divise sans changer le sens :

$$n > \frac{\ln 2}{\ln(1,04)} \approx \frac{0,6931}{0,0392} \approx 17,67.$$

Le plus petit entier strictement supérieur à 17,67 est $n = 18$.

Vérification : $(1,04)^{17} \approx 1,948 < 2$ et $(1,04)^{18} \approx 2,026 > 2$. $\equiv$

Conclusion : c'est à partir de la 18^e année que la population du quartier dépassera 100000 habitants (elle aura alors doublé).

LESAVAIS-TU ? Le logarithme népérien : histoire et applications au Cameroun

- Histoire : John Napier (Neper, 1550–1617), Écossais, invente les logarithmes pour simplifier les calculs astronomiques (produits $\rightarrow$ sommes). Henry Briggs (1561–1630) propose la base 10. Leonhard Euler (1707–1783) impose la base e et la notation $\ln$ (logarithmus na-)

turalis).

- Échelle de Richter (séismes) : Magnitude $M = \log_{10}(A/A_0)$. Une magnitude 6 libère 10 fois plus d'énergie qu'une magnitude 5.
- pH (chimie, eau potable) : $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+]$. L'eau pure a $\text{pH} = 7$. Au Cameroun, le contrôle de la qualité de l'eau (CAMWATER, forages ruraux) utilise cette échelle.
- Niveau sonore (décibels) : $L = 10 \log_{10}(I/I_0)$. Une conversation ≈ 60 dB, un concert ≈ 110 dB.
- Démographie et finance : Modélisation de la croissance de la population (Douala, Yaoundé), calcul du temps de doublement, intérêts composés (banques : Afriland First Bank, UBA, BICEC).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier les conditions d'existence. Avant toute résolution d'équation ou d'inéquation avec $\ln$, écris systématiquement que chaque argument est strictement positif, et rejette à la fin les solutions hors de l'ensemble de définition. Une solution $x = -2$ acceptée pour $\ln(x - 1)$ fait perdre tous les points de la question.
2. Inventer des formules fausses. $\ln(a+b) \neq \ln a + \ln b$ et $\frac{\ln a}{\ln b} \neq \ln a - \ln b$. Les seules formules valables portent sur le produit, le quotient, la puissance et la racine.
3. Dériver $\ln u$ en $\frac{1}{u}$. La dérivée de $\ln u$ est $\frac{u'}{u}$: ne pas oublier le facteur u' . Par exemple $(\ln(x^2 + 1))' = \frac{2x}{x^2 + 1}$ et non $\frac{1}{x^2 + 1}$.
4. Changer le sens d'une inégalité sans raison... ou l'oublier quand il le faut. Composer par $\ln$ conserve le sens ($\ln$ est croissante); mais diviser par $\ln a$ quand $0 < a < 1$ (donc $\ln a < 0$) inverse le sens. Vérifie toujours le signe de la quantité par laquelle tu divises.
5. Écrire $\ln |u|$ à tort ou oublier le domaine dans les primitives. La primitive de $\frac{u'}{u}$ est $\ln |u|$ en général, mais sur un intervalle où $u > 0$ on écrit $\ln u$. Précise toujours l'intervalle de validité et vérifie ta primitive en la dérivant.

12 EXERCICES

13 FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN

13.1 Définition et premières propriétés

DÉFINITION Fonction logarithme népérien

La fonction logarithme népérien, notée $\ln$, est l'unique fonction dérivable sur $]0; +\infty[$ qui satisfait :

$$\forall x > 0, \quad \ln'(x) = \frac{1}{x} \quad \text{et} \quad \ln(1) = 0.$$

Son ensemble de définition est $D_{\ln} =]0; +\infty[$.

À RETENIR Conséquences immédiates de la définition

- $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$ car sa dérivée est strictement positive.
- $\ln$ est une bijection de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.
- La fonction $\ln$ est l'application réciproque de la fonction exponentielle : $\forall x > 0, e^{\ln x} = x$ et $\forall y \in \mathbb{R}, \ln(e^y) = y$.
- Le nombre e (base des logarithmes népériens) est l'unique réel tel que $\ln e = 1$ ($e \approx 2,718$).

ATTENTION Pièges classiques sur l'ensemble de définition

- $\ln x$ n'existe que si $x > 0$. On n'écrit jamais $\ln(-2)$ ni $\ln 0$.
- Dans un exercice, la première étape est toujours de déterminer les conditions d'existence (C.E.) : arguments des $\ln$ strictement positifs.

EXPÉRIENCE Découverte de la dérivée par la fonction réciproque

On sait que $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $\exp' = \exp$ et que $\ln$ est sa bijection réciproque. Soit $x > 0$. Posons $y = \ln x$, alors $x = e^y$. Dérivons l'égalité $x = e^y$ par rapport à x : $1 = e^y \cdot y' =$

$$x \cdot (\ln)'(x). \text{ Donc } (\ln)'(x) = \frac{1}{x}.$$

EXEMPLE Calculs directs de valeurs de $\ln$

Sachant $\ln 2 \approx 0,693$ et $\ln 3 \approx 1,099$ (valeurs à connaître), on utilise les propriétés algébriques (vues section suivante) :

$$\ln 6 = \ln(2 \times 3) = \ln 2 + \ln 3 \approx 1,792$$

$$\ln 12 = \ln(4 \times 3) = 2 \ln 2 + \ln 3 \approx 2,485$$

$$\ln \frac{3}{2} = \ln 3 - \ln 2 \approx 0,406$$

EXERCICE RÉSOLU 26 QCM : les fondamentaux de $\ln$

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entoure-la et justifie brièvement.

- La fonction $\ln$ est définie sur :
(a) $\mathbb{R}$ (b) $[0; +\infty[$ (c) $]0; +\infty[$ (d) $\mathbb{R}^*$
- Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$, $\ln(ab)$ est égal à :
(a) $\ln a \times \ln b$ (b) $\ln a + \ln b$ (c) $\ln(a + b)$ (d) $a \ln b$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x$ est égale à :
(a) 0 (b) 1 (c) $-\infty$ (d) $+\infty$
- Une primitive de $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 3}$ sur $\mathbb{R}$ est :
(a) $\ln(x^2 + 3)$ (b) $\frac{2}{x^2 + 3}$ (c) $2 \ln x$ (d) $\frac{1}{x^2 + 3}$

SOLUTION

Solutions et justifications :

- (c) $]0; +\infty[$. Par définition, l'argument du logarithme doit être strictement positif.
- (b) $\ln a + \ln b$. Propriété fondamentale : le logarithme transforme le produit en somme.
- (c) $-\infty$. La courbe de $\ln$ a une asymptote verticale $x = 0$ et tend vers $-\infty$ à droite de 0.
- (a) $\ln(x^2 + 3)$. On reconnaît la forme $\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = x^2 + 3$ ($u'(x) = 2x$). Comme $x^2 + 3 > 0$ sur $\mathbb{R}$, une primitive est $\ln(x^2 + 3)$.

EXERCICE RÉSOLU 27 Vrai ou faux, en justifiant

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, en justifiant la réponse.

1. Pour tout réel $x > 0$, $\ln(x^2) = 2 \ln x$.
2. Pour tout réel x , $\ln(x^2) = 2 \ln x$.
3. $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$.
4. La fonction $\ln$ est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$.
5. Si $\ln a = \ln b$, alors $a = b$.

SOLUTION

1. Vrai. Pour $x > 0$, $x^2 > 0$ et $\ln(x^2) = 2 \ln x$ (propriété $\ln(a^n) = n \ln a$).
2. Faux. Si $x < 0$, $\ln(x^2)$ est défini (car $x^2 > 0$) mais $2 \ln x$ n'a pas de sens ($\ln x$ non défini). L'égalité correcte pour tout $x \neq 0$ est $\ln(x^2) = 2 \ln |x|$.
3. Vrai. Par définition $\ln 1 = 0$; e est l'unique nombre tel que $\ln e = 1$.
4. Faux. $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$ car sa dérivée $1/x > 0$.
5. Vrai. $\ln$ est injective (strictement monotone) sur son ensemble de définition.

13.2 Propriétés algébriques de $\ln$ **PROPRIÉTÉ** Propriétés algébriques fondamentales

Pour tous réels strictement positifs a et b , et pour tout réel n (entier, rationnel, puis réel par continuité) :

$\ln(ab) = \ln a + \ln b$	(produit $\rightarrow$ somme)
$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$	(quotient $\rightarrow$ différence)
$\ln(a^n) = n \ln a$	(puissance $\rightarrow$ produit)
$\ln(\sqrt[n]{a}) = \frac{1}{n} \ln a$	(racine $\rightarrow$ division)

MÉTHODE Simplifier une expression contenant des $\ln$

1. Vérifier que tous les arguments sont > 0 (C.E.).
2. Appliquer les propriétés pour éclater les produits, quotients, puissances.

3. Regrouper les termes semblables (coefficients devant $\ln 2$, $\ln 3$, $\ln 5$, etc.).
4. Factoriser si nécessaire.

ATTENTION Erreurs fréquentes en calcul littéral

- $\ln(a + b) \neq \ln a + \ln b$ (le logarithme n'est pas linéaire).
- $\ln(a - b) \neq \ln a - \ln b$.
- $\frac{\ln a}{\ln b} \neq \ln\left(\frac{a}{b}\right)$.
- $\ln(x^2) = 2 \ln |x|$ (valeur absolue indispensable si x peut être négatif).

EXERCICE RÉSOLU 28 Calculs directs

Simplifier les expressions suivantes, en écrivant le résultat sous la forme $k \ln 2 + k' \ln 3$ avec $k, k' \in \mathbb{Q}$:

$$A = \ln 12 + \ln 3 - 2 \ln 6 + \ln \sqrt{2} \quad ; \quad B = \ln 48 - \ln 27 + \ln \frac{9}{4}.$$

SOLUTION

Expression A :

$$\begin{aligned} A &= \ln(2^2 \times 3) + \ln 3 - 2 \ln(2 \times 3) + \ln(2^{1/2}) \\ &= (2 \ln 2 + \ln 3) + \ln 3 - 2(\ln 2 + \ln 3) + \frac{1}{2} \ln 2 \\ &= 2 \ln 2 + \ln 3 + \ln 3 - 2 \ln 2 - 2 \ln 3 + \frac{1}{2} \ln 2 \\ &= \boxed{\frac{1}{2} \ln 2} \end{aligned}$$

Expression B :

$$\begin{aligned} B &= \ln(2^4 \times 3) - \ln(3^3) + \ln(3^2) - \ln(2^2) \\ &= (4 \ln 2 + \ln 3) - 3 \ln 3 + 2 \ln 3 - 2 \ln 2 \\ &= (4 - 2) \ln 2 + (1 - 3 + 2) \ln 3 \\ &= \boxed{2 \ln 2} \end{aligned}$$

13.3 Limites de la fonction $\ln$

PROPRIÉTÉ Limites usuelles de $\ln$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

La courbe $C_{\ln}$ a l'axe des ordonnées ($x = 0$) comme asymptote verticale.

PROPRIÉTÉ Croissance lente du logarithme

Le logarithme croît plus lentement que toute fonction puissance x^α ($\alpha > 0$) :

$$\forall \alpha > 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0.$$

En particulier : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

MÉTHODE Calcul de limites de fonctions composées avec $\ln$

1. Calculer la limite de l'expression intérieure (argument du $\ln$).
2. Si cette limite est $L \in]0 ; +\infty[$, alors $\lim \ln(u(x)) = \ln L$.
3. Si la limite de l'argument est 0^+ , le $\ln$ tend vers $-\infty$.
4. Si la limite de l'argument est $+\infty$, le $\ln$ tend vers $+\infty$.
5. En cas d'indétermination ($\frac{\ln x}{x}$, $x \ln x$, etc.), utiliser les résultats de croissance ou factoriser.

EXERCICE RÉSOLU 29 Calcul de limites

Calculer les limites suivantes, en levant soigneusement les éventuelles indéterminations :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$;
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$;
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$;

4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2 + 1};$

5. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1}.$

SOLUTION

1. Forme $\frac{+\infty}{+\infty}$. Croissance lente : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$

2. Forme $0 \times (-\infty)$. Posons $X = \frac{1}{x}$ ($X \rightarrow +\infty$). $x \ln x = \frac{1}{X}(-\ln X) = -\frac{\ln X}{X} \rightarrow 0$. Donc la limite est $\boxed{0}$.

3. $x - \ln x = x \left(1 - \frac{\ln x}{x}\right)$. Comme $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, le facteur $\rightarrow 1$. Produit $+\infty \times 1 = \boxed{+\infty}$.

4. Dénominateur $\sim x^2$. $\frac{\ln x}{x^2+1} \sim \frac{\ln x}{x^2} = \frac{1}{x} \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0 \times 0 = \boxed{0}$.

5. Taux d'accroissement de $\ln$ en 1 : $\frac{\ln x - \ln 1}{x-1} \rightarrow \ln'(1) = \frac{1}{1} = \boxed{1}$.

LESAVAIS-TU ?

Échelles logarithmiques au Cameroun et dans le monde

La fonction $\ln$ (ou $\log_{10}$) permet de compresser de grandes gammes de valeurs :

- pH (chimie, qualité de l'eau du Wouri, sols agricoles) : $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+]$. Une variation de 1 unité = facteur 10 en concentration.
- Échelle de Richter (sismicité, risque volcanique Mont Cameroun) : magnitude $M = \log_{10}(A/A_0)$.
- Décibels (dB) (acoustique, télécoms MTN/Orange, bruit urbain à Douala/Yaoundé) : $L = 10 \log_{10}(I/I_0)$.
- Échelle de magnitude stellaire (astronomie, observation ciel camerounais).

Dans tous ces cas, une échelle logarithmique transforme des rapports multiplicatifs en différences additives, facilitant la lecture et la comparaison.

13.4 Dérivation, variations et courbe représentative

PROPRIÉTÉ Dérivée de $\ln u$

Soit u une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I . La fonction $\ln u$ est dérivable sur I et :

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}.$$

Démonstration exigible au Bac : Dérivée de la composée $x \mapsto \ln(u(x))$ par la formule de la

chaîne : $\ln'(u(x)) \cdot u'(x) = \frac{1}{u(x)} \cdot u'(x)$.


À RETENIR Tableau de variations de $\ln x$ sur $]0; +\infty[$

x	0	1	$+\infty$
$\ln'(x) = \frac{1}{x}$		+	+
$\ln x$	$-\infty$	$\nearrow$ 0 $\nearrow$	$+\infty$

- Strictement croissante.
- Passe par (1,0).
- Tangente en 1 : $y = x - 1$ (car $\ln'(1) = 1$).
- Asymptote verticale $x = 0$ (branche infinie en 0^+).
- Pas d'asymptote horizontale ni oblique en $+\infty$ (croissance lente mais non bornée).

EXPÉRIENCE Démonstration de l'inégalité fondamentale $\ln x \leq x - 1$

Étudions $f(x) = x - 1 - \ln x$ sur $]0; +\infty[$. $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$. $f' < 0$ sur $]0,1[$, $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$. f admet un minimum global en $x = 1$, $f(1) = 0$. Donc $\forall x > 0$, $f(x) \geq 0 \iff \ln x \leq x - 1$. Égalité seulement pour $x = 1$.



Courbe de $y = \ln x$ et sa tangente en (1,0) : $y = x - 1$. L'axe des ordonnées est asymptote verticale.

13.5 Primitives de la forme $\frac{u'}{u}$

PROPRIÉTÉ Primitive de $\frac{u'}{u}$

Soit u une fonction dérivable et ne s'annulant pas sur un intervalle I . Une primitive de $\frac{u'}{u}$ sur I est $\ln |u|$ (ou $\ln u$ si $u > 0$ sur I).

$$\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln |u(x)| + C.$$

ATTENTION Valeur absolue et ensemble de définition

- Si l'intervalle I n'est pas précisé, on écrit systématiquement $\ln |u(x)|$.
- Si $u(x) > 0$ sur I (ex : $x^2 + 3$, e^x , $\cos x$ sur $] -\pi/2, \pi/2[$), on peut écrire $\ln(u(x))$.
- Piège : $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$ sur $\mathbb{R}^*$ (deux intervalles distincts : $] -\infty, 0[$ et $] 0, +\infty[$). Les constantes C peuvent être différentes de part et d'autre de 0.

MÉTHODE Rechercher une primitive de la forme $\frac{u'}{u}$

1. Identifier $u(x)$ (souvent le dénominateur ou une fonction à l'intérieur d'un $\ln$).
2. Calculer $u'(x)$.
3. Vérifier que le numérateur est bien $u'(x)$ (ou un multiple constant $k u'(x)$).
4. Écrire la primitive : $\ln |u(x)|$ (ou $k \ln |u(x)|$).
5. Préciser l'intervalle de validité (où $u(x) \neq 0$).

EXERCICE RÉSOLU 30 Recherche de primitives

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle indiqué :

1. $f(x) = \frac{3x^2}{x^3 + 5}$ sur $\mathbb{R}$;
2. $g(x) = \tan x$ sur $] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$;
3. $h(x) = \frac{1}{x \ln x}$ sur $]1; +\infty[$;

$$4. k(x) = \frac{1}{3x-2} \text{ sur }]\frac{2}{3}; +\infty[.$$

SOLUTION

1. $u(x) = x^3 + 5$, $u'(x) = 3x^2$. $u(x)$ s'annule pour $x = -\sqrt[3]{5}$. Sur $\mathbb{R}$, u change de signe. Primitive : $\boxed{\ln |x^3 + 5|}$.
2. $g(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = -\frac{-\sin x}{\cos x} = -\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = \cos x$. Sur $] -\pi/2, \pi/2[$, $\cos x > 0$. Primitive : $\boxed{-\ln(\cos x)}$ (ou $\ln |\sec x|$).
3. $u(x) = \ln x$, $u'(x) = \frac{1}{x}$. Sur $]1, +\infty[$, $\ln x > 0$. Primitive : $\boxed{\ln(\ln x)}$.
4. $u(x) = 3x - 2$, $u'(x) = 3$. $\frac{1}{3x-2} = \frac{1}{3} \frac{u'}{u}$. Sur $]2/3, +\infty[$, $u > 0$. Primitive : $\boxed{\frac{1}{3} \ln(3x - 2)}$.

13.6 Équations, inéquations, systèmes et applications

MÉTHODE Résoudre une équation ou inéquation avec $\ln$

1. Poser les C.E. : Tous les arguments des $\ln$ doivent être > 0 . Noter l'ensemble D .
2. Transformer : Utiliser les propriétés algébriques pour n'avoir qu'un seul $\ln$ de chaque côté (équation) ou mettre du même côté (inéquation).
3. Utiliser la monotonie : $\ln$ est strictement croissante.
 - $\ln A = \ln B \iff A = B$ (sur D).
 - $\ln A \leq \ln B \iff 0 < A \leq B$ (sur D).
 - $\ln A \geq k \iff A \geq e^k$ (si $k \in \mathbb{R}$).
4. Résoudre l'équation/inéquation algébrique obtenue.
5. Sélectionner les solutions appartenant à D .

EXERCICE RÉSOLU 31 Équations et inéquations avec conditions d'existence

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\ln(x+1) + \ln(x-1) = \ln 8$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\ln(2x-3) \leq \ln(x+4)$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\ln(3-x) \geq 0$.

SOLUTION

1. C.E. : $x + 1 > 0$ et $x - 1 > 0 \iff x > 1$. $D =]1, +\infty[$. $\ln((x+1)(x-1)) = \ln 8 \iff \ln(x^2 - 1) = \ln 8 \iff x^2 - 1 = 8 \iff x^2 = 9 \iff x = 3$ ou $x = -3$. Seul $x = 3 \in D$. Solution : $S = \{3\}$.
2. C.E. : $2x - 3 > 0 \iff x > \frac{3}{2}$ et $x + 4 > 0 \iff x > -4$. $D =]\frac{3}{2}, +\infty[$. $\ln$ croissante $\implies 2x - 3 \leq x + 4 \iff x \leq 7$. Intersection avec D : $S =]\frac{3}{2}, 7]$.
3. C.E. : $3 - x > 0 \iff x < 3$. $D =]-\infty, 3[$. $\ln(3 - x) \geq 0 = \ln 1 \iff 3 - x \geq 1 \iff x \leq 2$. Intersection avec D : $S =]-\infty, 2]$.

MÉTHODE Changement d'inconnue $X = \ln x$

Pour une équation du type $a(\ln x)^2 + b \ln x + c = 0$:

1. Poser $X = \ln x$ (donc $x = e^X$, $x > 0$ automatiquement).
2. Résoudre l'équation du second degré en X .
3. Revenir à x : $x = e^X$ (toujours > 0).

EXERCICE RÉSOLU 32 Changement d'inconnue et système

1. Résoudre (E) : $2(\ln x)^2 - 5 \ln x + 2 = 0$.
2. Résoudre dans $]0; +\infty[^2$ le système :

$$\begin{cases} \ln x + \ln y = \ln 6 \\ \ln x - \ln y = \ln 2 \end{cases}$$

SOLUTION

1. Posons $X = \ln x$. $2X^2 - 5X + 2 = 0$. $\Delta = 25 - 16 = 9$. $X_1 = \frac{5+3}{4} = 2$, $X_2 = \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}$. $x_1 = e^2$, $x_2 = e^{1/2} = \sqrt{e}$. $S = \{e^2; \sqrt{e}\}$.
2. Posons $X = \ln x$, $Y = \ln y$. Système linéaire :
$$\begin{cases} X + Y = \ln 6 \\ X - Y = \ln 2 \end{cases}$$
 Addition : $2X = \ln 6 + \ln 2 = \ln 12 \implies X = \frac{1}{2} \ln 12 = \ln \sqrt{12} = \ln(2\sqrt{3})$. Soustraction : $2Y = \ln 6 - \ln 2 = \ln 3 \implies Y = \frac{1}{2} \ln 3 = \ln \sqrt{3}$. $x = e^X = 2\sqrt{3}$, $y = e^Y = \sqrt{3}$. Vérification : $xy = 6$, $x/y = 2$. Solution unique : $(x, y) = (2\sqrt{3}; \sqrt{3})$.

13.7 Je me prépare au Bac : Problèmes de synthèse

EXERCICE 8 Étude complète de fonction et inégalité fondamentale — Manioc à Bafoussam

On considère la fonction f définie par $f(x) = x - 1 - \ln x$, et on note (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 2 cm).

Partie A : étude de la fonction

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f de f .
2. Calculer les limites de f aux bornes de D_f . (En $+\infty$, on factorisera par x .)
3. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe sur D_f .
4. Dresser le tableau de variations complet de f .
5. Montrer que f admet un minimum, et préciser sa valeur.
6. En déduire le signe de $f(x)$ sur D_f , puis démontrer l'inégalité : $\forall x > 0, \ln x \leq x - 1$. Pour quelle valeur de x a-t-on égalité ?
7. Tracer soigneusement (C_f) dans le repère, en précisant la tangente au point d'abscisse 1 et le comportement asymptotique en 0^+ .

Partie B : application Une entreprise de transformation de manioc à Bafoussam modélise son bénéfice mensuel, en centaines de milliers de francs CFA, par $B(x) = x - 1 - \ln x$, où x est la quantité de manioc transformée, en tonnes ($x > 0$).

1. Le bénéfice peut-il être négatif ? Justifier à l'aide de la Partie A.
2. Pour quelle quantité de manioc le bénéfice est-il minimal ? Quel est ce bénéfice minimal, en francs CFA ?

EXERCICE 9 Datation au carbone 14 d'un site archéologique — Grassfield

Les archéologues qui étudient les sites anciens du Grassfield camerounais utilisent la datation au carbone 14. La quantité de carbone 14 restant dans un échantillon de bois mort suit la loi :

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t},$$

où N_0 est la quantité initiale, t le temps écoulé en années depuis la mort du végétal, et $\lambda = \frac{\ln 2}{5730}$ (la période radioactive du carbone 14 est de 5730 ans).

1. Justifier que $\frac{N(t)}{N_0} = e^{-\lambda t}$, puis montrer que :

$$t = -\frac{1}{\lambda} \ln \left(\frac{N(t)}{N_0} \right).$$

2. Un échantillon de bois prélevé sur un site ne contient plus que 40 % de son carbone 14 initial.
 - (a) Écrire l'équation vérifiée par l'âge t de l'échantillon.
 - (b) Montrer que $t = \frac{5730 \times \ln(2,5)}{\ln 2}$.
 - (c) Donner une valeur approchée de t à l'année près (on donne $\ln 2 \approx 0,693$ et $\ln(2,5) \approx 0,916$).
3. Un second échantillon est daté de 11460 ans. Quelle proportion de carbone 14 initial contient-il encore ? Justifier sans calculatrice.
4. Un laboratoire ne sait pas mesurer des proportions inférieures à 1 %. Montrer que la datation au carbone 14 devient impossible pour des échantillons trop anciens, et déterminer l'âge limite correspondant (on donnera le résultat en fonction de $\ln 100$ et $\ln 2$, puis une valeur approchée sachant que $\ln 100 \approx 4,605$).

EXERCICE 10**La fonction $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$ et discussion d'une équation**

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

Partie A : étude de f

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
2. Calculer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. Interpréter graphiquement chacun des résultats.
3. Montrer que pour tout $x > 0$: $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.
4. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
5. Montrer que f admet un maximum égal à $\frac{1}{e}$, atteint en $x = e$.
6. Déterminer le signe de $f(x)$ sur $]0; +\infty[$.
7. Tracer l'allure de (C) en plaçant les éléments remarquables (asymptotes, maximum, intersection avec l'axe des abscisses).

Partie B : discussion graphique On cherche à déterminer, suivant les valeurs du réel k , le nombre de solutions dans $]0; +\infty[$ de l'équation :

$$(E_k) : \ln x = kx.$$

1. Montrer que résoudre (E_k) revient à résoudre $f(x) = k$.
2. En utilisant le tableau de variations de la Partie A, déterminer le nombre de solutions

de (E_k) dans chacun des cas :

$$k > \frac{1}{e} ; \quad k = \frac{1}{e} ; \quad 0 < k < \frac{1}{e} ; \quad k \leq 0.$$

3. Application : un opérateur télécoms modélise le nombre d'abonnés (en millions) d'une offre par $N(t)$, et la rentabilité impose de résoudre $\ln x = \frac{x}{4}$. À l'aide de la question précédente, montrer que cette équation admet exactement deux solutions. Encadrer chacune d'elles entre deux entiers consécutifs (on donne $f(1) = 0$, $f(2) \approx 0,347$, $f(8) \approx 0,260$, $f(9) \approx 0,244$ et $\frac{1}{4} = 0,25$).

LESAVAIS-TU ?

Le nombre e et l'histoire des logarithmes

John Napier (Neper), Écossais (1550–1617), a inventé les logarithmes pour simplifier les calculs astronomiques (multiplications $\rightarrow$ additions). Ses "logarithmes napiériens" n'étaient pas encore en base e . C'est Leonhard Euler (1707–1783) qui a identifié la base $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n \approx 2,71828$ et imposé la notation $\ln$ (logarithmus naturalis). Au Cameroun, les ingénieurs de CAMTEL ou de la SONEL utilisent quotidiennement les échelles logarithmiques (dB pour l'atténuation du signal sur la fibre optique, népers pour les lignes de transmission).

14 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — Étude complète de fonction et inégalité fondamentale (manioc à Bafoussam)

Partie A : étude de la fonction

1. Ensemble de définition. La fonction $f(x) = x - 1 - \ln x$ fait intervenir $\ln x$, qui n'existe que pour $x > 0$. Les termes x et -1 sont définis pour tout réel. Donc :

$$D_f =]0; +\infty[.$$

2. Limites aux bornes.

En 0^+ : on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} (-1) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$. Par somme de limites (aucune indétermination) :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 - 1 - (-\infty) = +\infty.$$

Interprétation graphique : la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à (C_f) .

En $+\infty$: on a une forme indéterminée du type « $+\infty - \infty$ ». On lève l'indétermination en factorisant par x (consigne de l'énoncé) :

$$f(x) = x \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \right).$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ et, par le théorème des croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. La parenthèse tend donc vers 1, et par produit de limites :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \times 1 = +\infty.$$

3. Dérivée et signe. f est dérivable sur $]0; +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables ($x \mapsto x - 1$ est polynomiale, $\ln$ est dérivable sur $]0, +\infty[$), et :

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

Comme $x > 0$ sur D_f , le dénominateur est strictement positif, donc $f'(x)$ a le signe de $x - 1$:

- $f'(x) < 0$ sur $]0; 1[$;
- $f'(1) = 0$;
- $f'(x) > 0$ sur $]1; +\infty[$.

4. Tableau de variations complet.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$ 0 $\nearrow$	$+\infty$

(On place les limites $+\infty$ aux deux bornes et la valeur $f(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0$.)

5. Minimum. f est strictement décroissante sur $]0,1]$ puis strictement croissante sur $[1,+\infty[$: elle admet donc en $x = 1$ un minimum global sur D_f , qui vaut :

$$f(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0.$$

6. Signe de f et inégalité fondamentale. Puisque le minimum de f sur D_f vaut 0, on a pour tout $x > 0$: $f(x) \geq f(1) = 0$, c'est-à-dire :

$$\forall x > 0, \quad x - 1 - \ln x \geq 0 \iff \boxed{\ln x \leq x - 1}.$$

L'égalité a lieu si et seulement si $f(x) = 0$, c'est-à-dire au point où le minimum est atteint : $\boxed{x = 1}$.

7. Tracé de (C_f) . Éléments à placer :

- asymptote verticale $x = 0$ (la courbe « monte » vers $+\infty$ en longeant l'axe des ordonnées);
- point $(1; 0)$, avec tangente horizontale car $f'(1) = 0$: la tangente en ce point a pour équation $y = f(1) + f'(1)(x - 1) = 0$;
- la courbe décroît de $+\infty$ vers 0 sur $]0,1]$, touche l'axe des abscisses en $(1,0)$ sans le traverser (c'est un minimum), puis croît vers $+\infty$;
- avec l'unité de 2 cm, le point $(1,0)$ est à 2 cm de l'origine sur l'axe des abscisses.

Partie B : application

1. D'après la question A.6, $\forall x > 0$, $B(x) = x - 1 - \ln x = f(x) \geq 0$. Le bénéfice ne peut donc jamais être négatif : quelle que soit la quantité de manioc transformée, l'entreprise ne perd pas d'argent dans ce modèle.

2. Le bénéfice est minimal lorsque f atteint son minimum, c'est-à-dire pour $x = 1$ tonne de manioc. Ce bénéfice minimal vaut $B(1) = 0$ centaine de milliers de francs CFA, soit $\boxed{0 \text{ FCFA}}$: avec une tonne, l'entreprise couvre exactement ses frais (seuil de rentabilité). Barème indicatif (sur 10) : D_f : 0,5 ; limites : 2 (dont 1 pour la factorisation en $+\infty$) ; dérivée et signe : 1,5 ; tableau : 1 ; minimum : 0,5 ; inégalité et cas d'égalité : 1,5 ; tracé : 1,5 ; Partie B : 1,5.

Points de vigilance :

- En $+\infty$, la limite est une forme indéterminée : il est obligatoire de factoriser par x et de citer la croissance comparée $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. Une réponse directe du type « $+\infty - \infty = +\infty$ » est sanctionnée.
- Pour le signe de $f'(x)$, préciser que $x > 0$ avant de conclure que f' a le signe de $x - 1$.
- Dans la question 6, le raisonnement doit passer par le minimum : « $f(x) \geq \text{minimum} = 0$ ». Le cas d'égalité est explicitement demandé, ne pas l'oublier.
- En B.2, l'unité du modèle est la centaine de milliers de FCFA : bien convertir le résultat.

CORRIGÉ Exercice 2 — Datation au carbone 14 d'un site du Grassfield

1. On part de $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$. Comme $N_0 > 0$, on peut diviser les deux membres par N_0 :

$$\frac{N(t)}{N_0} = e^{-\lambda t}.$$

Le membre de gauche est strictement positif (quotient de deux quantités strictement positives), on peut donc appliquer $\ln$ aux deux membres, l'égalité étant préservée car $\ln$ est une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$:

$$\ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right) = \ln(e^{-\lambda t}) = -\lambda t,$$

d'où, en divisant par $-\lambda \neq 0$ (car $\lambda > 0$) :

$$t = -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right).$$

2.(a) L'échantillon ne contient plus que 40 % de son carbone 14 initial : $N(t) = 0,4 N_0$, soit $\frac{N(t)}{N_0} = 0,4$. L'âge t vérifie donc :

$$e^{-\lambda t} = 0,4.$$

2.(b) D'après la question 1 avec $\lambda = \frac{\ln 2}{5730}$:

$$\begin{aligned} t &= -\frac{1}{\lambda} \ln(0,4) = -\frac{5730}{\ln 2} \ln(0,4) \\ &= \frac{5730}{\ln 2} \ln\left(\frac{1}{0,4}\right) \quad \left(\text{car } -\ln a = \ln \frac{1}{a}\right) \\ &= \frac{5730}{\ln 2} \ln(2,5) \quad \left(\text{car } \frac{1}{0,4} = \frac{10}{4} = 2,5\right). \end{aligned}$$

Donc $t = \frac{5730 \ln(2,5)}{\ln 2}.$

2.(c) Valeur approchée, avec $\ln(2,5) \approx 0,916$ et $\ln 2 \approx 0,693$:

$$t \approx 5730 \times \frac{0,916}{0,693} \approx 5730 \times 1,3218 \approx 7573,9.$$

L'échantillon a environ **7574 ans** (à l'année près).

3. On remarque que $11460 = 2 \times 5730$: l'échantillon a vécu exactement deux périodes radioactives. Calculons sans calculatrice :

$$\begin{aligned} \frac{N(t)}{N_0} &= e^{-\lambda \times 11460} = e^{-\frac{\ln 2}{5730} \times 2 \times 5730} = e^{-2 \ln 2} \\ &= e^{\ln(2^{-2})} = 2^{-2} = \frac{1}{4}, \end{aligned}$$

où l'on a utilisé $-2 \ln 2 = \ln(2^{-2})$ (propriété $a \ln b = \ln(b^a)$) puis $e^{\ln u} = u$. L'échantillon contient encore $\frac{1}{4} = 25\%$ de son carbone 14 initial. (Cohérent : une période divise la quantité par 2, deux périodes la divisent par 4.)

4. La datation devient impossible lorsque la proportion résiduelle passe sous le seuil de mesure de 1%. L'âge limite correspond à $\frac{N(t)}{N_0} = 0,01$:

$$t_{\text{lim}} = -\frac{1}{\lambda} \ln(0,01) = \frac{5730}{\ln 2} \ln\left(\frac{1}{0,01}\right) = \frac{5730 \ln 100}{\ln 2}.$$

Valeur approchée, avec $\ln 100 \approx 4,605$:

$$t_{\text{lim}} \approx 5730 \times \frac{4,605}{0,693} \approx 5730 \times 6,645 \approx 38\,076 \text{ ans.}$$

Comme $t \mapsto e^{-\lambda t}$ est strictement décroissante, pour $t > t_{\text{lim}}$ la proportion résiduelle est strictement inférieure à 1% et le laboratoire ne peut plus rien mesurer : la datation au carbone 14 est donc limitée aux échantillons de moins d'environ **38 000 ans**.

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2 ; question 2 : 3 (1 par sous-question) ; question 3 : 2 ; question 4 : 3 (expression littérale 1,5 ; valeur approchée 1 ; conclusion 0,5).

Points de vigilance :

- Justifier la positivité de $\frac{N(t)}{N_0}$ avant d'appliquer $\ln$: c'est la condition d'application du logarithme, elle est attendue dans la rédaction.
- Le signe moins : $-\ln(0,4) = \ln(2,5)$ et non $\ln(0,4)$. Une erreur de signe donne un âge négatif, absurde : pensez à vérifier la cohérence physique (un âge est toujours positif).
- Question 3 : l'énoncé exige une justification sans calculatrice ; il faut utiliser $e^{-2 \ln 2} = \frac{1}{4}$ via la relation $e^{a \ln b} = b^a$, et non une valeur approchée.
- Question 4 : bien conclure par une phrase d'interprétation (seuil de détection), pas seulement par le calcul.

CORRIGÉ

Exercice 3 — La fonction $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$ et discussion d'une équation

Partie A : étude de f

1. Le numérateur $\ln x$ exige $x > 0$ et le dénominateur x exige $x \neq 0$. La condition la plus restrictive est $x > 0$, donc :

$$D_f =]0 ; +\infty[.$$

2. Limites et interprétations graphiques.

En 0^+ : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$ avec $x > 0$. Le quotient est de la forme « $\frac{-\infty}{0^+}$ » : il n'y a pas d'indétermination, et par quotient de limites (numérateur négatif, dénominateur positif

tendant vers 0) :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty.$$

Interprétation : la droite $x = 0$ (axe des ordonnées) est asymptote verticale à (C), la courbe plonge vers $-\infty$ au voisinage de 0.

En $+\infty$: forme indéterminée du type « $\frac{\infty}{\infty}$ », levée par le théorème des croissances comparées :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

De plus $f(x) > 0$ pour $x > 1$, donc la limite est 0^+ . Interprétation : la droite $y = 0$ (axe des abscisses) est asymptote horizontale à (C) en $+\infty$, approchée par valeurs supérieures.

3. Dérivée. f est un quotient $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = \ln x$, $u'(x) = \frac{1}{x}$, $v(x) = x$, $v'(x) = 1$, fonctions dérivables sur $]0, +\infty[$ avec v qui ne s'annule pas :

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \boxed{\frac{1 - \ln x}{x^2}}.$$

4. Signe de f' et tableau de variations. Comme $x^2 > 0$ sur D_f , $f'(x)$ a le signe de $1 - \ln x$. Par stricte croissance de $\ln$:

$$f'(x) > 0 \iff \ln x < 1 \iff x < e; \quad f'(x) = 0 \iff x = e; \quad f'(x) < 0 \iff x > e.$$

Valeur au sommet : $f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow \frac{1}{e}$	$\searrow 0^+$

5. Maximum. f est strictement croissante sur $]0, e]$ puis strictement décroissante sur $[e, +\infty[$: elle admet donc en $x = e$ un maximum global sur $]0, +\infty[$, égal à :

$$f(e) = \frac{1}{e} \approx 0,368.$$

6. Signe de f . Pour $x > 0$, le dénominateur x est strictement positif, donc $f(x)$ a le signe de $\ln x$:

- $f(x) < 0$ sur $]0; 1[$;
- $f(1) = \frac{\ln 1}{1} = 0$;
- $f(x) > 0$ sur $]1; +\infty[$.

7. Allure de (C). Éléments remarquables à placer :

- asymptote verticale $x = 0$ (branche vers $-\infty$);
- unique intersection avec l'axe des abscisses au point $(1; 0)$;
- maximum au point $\left(e; \frac{1}{e}\right) \approx (2,72; 0,37)$, avec tangente horizontale en ce point;

- asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$, la courbe restant au-dessus de l'axe des abscisses pour $x > 1$.

Partie B : discussion graphique

1. Pour $x > 0$, on peut diviser les deux membres par x (non nul) :

$$\ln x = kx \iff \frac{\ln x}{x} = k \iff f(x) = k.$$

Résoudre (E_k) revient donc à chercher les abscisses des points d'intersection de (C) avec la droite horizontale d'équation $y = k$.

2. On détermine le nombre de solutions à l'aide du tableau de variations, en appliquant sur chaque intervalle de stricte monotonie le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires (une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection sur son intervalle image) :

- $k > \frac{1}{e}$: la droite est au-dessus du maximum de f : 0 solution.
- $k = \frac{1}{e}$: la droite touche (C) en son sommet : 1 solution, $x = e$.
- $0 < k < \frac{1}{e}$: sur $]0, e]$, f est continue, strictement croissante, et $k \in]0, \frac{1}{e}[\subset]-\infty, \frac{1}{e}[$: une unique solution dans $]0, e[$, qui est même dans $]1, e[$ car $f(x) \leq 0$ pour $x \leq 1$. Sur $]e, +\infty[$, f est continue, strictement décroissante, et $k \in]0, \frac{1}{e}[$: une unique solution dans $]e, +\infty[$. Au total : 2 solutions, l'une dans $]1, e[$, l'autre dans $]e, +\infty[$.
- $k \leq 0$: sur $]e, +\infty[$, $f(x) > 0 \geq k$: pas de solution. Sur $]0, e]$, f est continue, strictement croissante de $-\infty$ vers $\frac{1}{e}$, et $k \leq 0 < \frac{1}{e}$: exactement une solution, située dans $]0, 1]$ (pour $k = 0$, c'est $x = 1$). Au total : 1 solution.

3. Application. L'équation $\ln x = \frac{x}{4}$ équivaut, pour $x > 0$, à $f(x) = \frac{1}{4}$, c'est-à-dire au cas $k = \frac{1}{4} = 0,25$. Or $0 < 0,25 < \frac{1}{e} \approx 0,368$: d'après la question précédente, l'équation admet exactement deux solutions.

Encadrements, en utilisant la stricte monotonie de f sur chaque branche et les valeurs fournies par l'énoncé :

- Sur $]1, e[$, f est strictement croissante et $f(1) = 0 < 0,25 < f(2) \approx 0,347$, donc la première solution vérifie $1 < x_1 < 2$.
- Sur $]e, +\infty[$, f est strictement décroissante et $f(8) \approx 0,260 > 0,25 > f(9) \approx 0,244$ (les inégalités se renversent quand on applique une fonction décroissante), donc la seconde solution vérifie $8 < x_2 < 9$.

Barème indicatif (sur 12) : Partie A : ensemble de définition 0,5 ; limites et interprétations 2,5 ; dérivée 1,5 ; signe et tableau 1,5 ; maximum 0,5 ; signe de f 0,5 ; tracé 1. Partie B : équivalence 1 ; discussion (4 cas) 2,5 ; application et encadrements 1,5.

Points de vigilance :

- En 0^+ , il n'y a pas d'indétermination : écrire directement « $\frac{-\infty}{0^+} = -\infty$ » en précisant le

signe du dénominateur. En $+\infty$, au contraire, citer explicitement la croissance comparée.

- Chaque limite doit être suivie de son interprétation graphique (asymptote), c'est demandé par l'énoncé.
- Dans la discussion, la justification rigoureuse repose sur le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires appliqué sur chaque intervalle de stricte monotonie (existence et unicité), pas seulement sur une lecture du dessin.
- Pour l'encadrement de x_2 , la fonction est décroissante : les inégalités se renversent ($f(8) > 0,25 > f(9)$ donne $8 < x_2 < 9$). C'est l'erreur la plus fréquente.
- Ne pas confondre $\frac{1}{e} \approx 0,368$ avec $e \approx 2,718$ dans la comparaison avec $k = \frac{1}{4}$.

15 FICHE BILAN**16 DÉFINITION ET PREMIÈRES PROPRIÉTÉS DE LA FONCTION LN****DÉFINITION** Fonction logarithme népérien

On appelle **fonction logarithme népérien**, notée $\ln$, l'unique fonction dérivable sur $]0; +\infty[$ qui vérifie :

- $\forall x \in]0; +\infty[, \ln'(x) = \frac{1}{x}$ (c'est une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$);
- $\ln(1) = 0$ (elle s'annule en 1).

Son ensemble de définition est $D_{\ln} =]0; +\infty[$. On ne peut calculer $\ln x$ que pour $x > 0$.

PROPRIÉTÉ Valeurs remarquables et nombre e

- $\ln 1 = 0$ (par définition).
- Il existe un unique réel $e > 0$ tel que $\ln e = 1$. Ce nombre, appelé **nombre d'Euler**, vaut approximativement $e \approx 2,718\,281\,828$.
- Pour tout $x > 0$, $\ln x > 0 \Leftrightarrow x > 1$ et $\ln x < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$.

EXPÉRIENCE Découverte : $\ln$ comme aire sous l'hyperbole

On considère la fonction $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$. Pour $x > 0$, on note $A(x)$ l'aire du domaine borné par l'axe des abscisses, la courbe $y = \frac{1}{t}$, les droites $t = 1$ et $t = x$ (aire comptée positivement si $x > 1$, négativement si $x < 1$).

1. Montrer que $A'(x) = \frac{1}{x}$ et $A(1) = 0$.
2. En déduire que $A(x) = \ln x$.

Cette approche intégrale justifie l'existence et l'unicité de $\ln$ sans faire appel à la fonction exponentielle.

EXEMPLE Calculs directs et signe

1. $\ln e^2 = 2 \ln e = 2$ (on verra la propriété de puissance plus loin).
2. $\ln\left(\frac{1}{e}\right) = -\ln e = -1$.
3. Déterminer le signe de $\ln(0,5)$: comme $0 < 0,5 < 1$, $\ln(0,5) < 0$.
4. $\ln(\sqrt{e}) = \frac{1}{2}$.

ATTENTION Piège classique : ensemble de définition

Ne jamais écrire $\ln(-2)$, $\ln(0)$ ou $\ln(x^2 - 1)$ sans vérifier que l'argument est strictement positif.

- $\ln(x^2)$ n'est défini que si $x^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq 0$.
- $\ln(x^2 - 1)$ n'est défini que si $x^2 - 1 > 0 \Leftrightarrow x < -1$ ou $x > 1$.

Toujours commencer par : « Posons les conditions d'existence : ... ».

17 PROPRIÉTÉS ALGÈBRIQUES DE LN**PROPRIÉTÉ** Formules fondamentales – Démonstration exigible au Bac

Pour tous réels strictement positifs a et b , et pour tout entier relatif n (et même tout réel n en Terminale) :

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b \quad (\text{Produit})$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b \quad (\text{Quotient})$$

$$\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a \quad (\text{Inverse})$$

$$\ln(a^n) = n \ln a \quad (\text{Puissance})$$

$$\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a \quad (\text{Racine carrée, cas particulier } n = \frac{1}{2})$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de $\ln(ab) = \ln a + \ln b$

Soient $a > 0$, $b > 0$ fixés. On considère la fonction $g(x) = \ln(ax) - \ln x$ sur $]0; +\infty[$.

1. Calculer $g'(x)$.

2. En déduire que g est constante.

3. Calculer $g(1)$ et conclure.

Astuce : cette méthode (dériver pour montrer l'égalité) fonctionne pour toutes les propriétés.

MÉTHODE Simplifier une expression contenant des $\ln$

1. Vérifier les conditions d'existence (arguments > 0).
2. Transformer les sommes/différences en produits/quotients : $\ln A + \ln B = \ln(AB)$, $k \ln A = \ln(A^k)$.
3. Simplifier l'argument du $\ln$ final si possible.
4. Remettre sous forme développée si l'énoncé le demande.

EXERCICE RÉSOLU 33 Simplification

Simplifier $E = 2 \ln 3 - \ln 2 + \ln 6 - \ln 9$.

SOLUTION

Conditions : arguments $3, 2, 6, 9 > 0$ (OK). $E = \ln(3^2) - \ln 2 + \ln 6 - \ln 9 = \ln 9 - \ln 2 + \ln 6 - \ln 9$
 $E = \ln 6 - \ln 2 = \ln\left(\frac{6}{2}\right) = \ln 3$.

EXERCICE 11 Entraînement

Simplifier :

1. $\ln 50 - 2 \ln 5 + \ln 2$
2. $\frac{1}{2} \ln 8 - \ln 2 + \ln \sqrt{2}$
3. $\ln(x^2 - 1) - \ln(x - 1)$ (préciser le domaine)

18 LIMITES DE LA FONCTION LN

PROPRIÉTÉ Limites usuelles

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

La droite d'équation $x = 0$ (axe des ordonnées) est une **asymptote verticale** à la courbe $C_{\ln}$.

PROPRIÉTÉ Croissances comparées – Résultats à connaître

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad (\ln x \text{ croît plus lentement que toute fonction puissance } x^\alpha, \alpha > 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \quad (\text{Équivalence } \ln(1+x) \sim x \text{ en } 0)$$

MÉTHODE Calculer une limite faisant intervenir $\ln$

1. Identifier les formes indéterminées ($0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$).
2. Utiliser les croissances comparées : $\ln x = o(x)$ en $+\infty$, $x \ln x \rightarrow 0$ en 0^+ .
3. Pour les composées $\ln(u(x))$: calculer $\lim u(x) = \ell$, puis $\lim \ln(u(x)) = \ln \ell$ si $\ell > 0$, $-\infty$ si $\ell = 0^+$, $+\infty$ si $\ell = +\infty$.

EXERCICE RÉSOLU 34 Limites composées

Étudier les limites de $f(x) = \ln(x^2 - 3x + 2)$ aux bornes de son domaine.

SOLUTION

Domaine : $x^2 - 3x + 2 > 0 \Leftrightarrow (x-1)(x-2) > 0 \Leftrightarrow x \in]-\infty; 1[\cup]2; +\infty[$.

- $x \rightarrow 1^- : u(x) \rightarrow 0^+ \Rightarrow \ln(u(x)) \rightarrow -\infty$.
- $x \rightarrow 2^+ : u(x) \rightarrow 0^+ \Rightarrow \ln(u(x)) \rightarrow -\infty$.
- $x \rightarrow -\infty : u(x) \sim x^2 \rightarrow +\infty \Rightarrow \ln(u(x)) \rightarrow +\infty$.

- $x \rightarrow +\infty : u(x) \sim x^2 \rightarrow +\infty \Rightarrow \ln(u(x)) \rightarrow +\infty.$

LESAVAIS-TU ? Le pH et l'échelle logarithmique

En chimie, le **pH** (potentiel hydrogène) mesure l'acidité d'une solution : $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+] = -\frac{\ln[\text{H}^+]}{\ln 10}$. Une variation de 1 unité de pH correspond à une multiplication par 10 de la concentration en ions H^+ . Au Cameroun, le contrôle de la qualité de l'eau (CAMWATER, forages ruraux) utilise cette échelle : une eau potable a un pH entre 6,5 et 8,5.

19 DÉRIVATION, VARIATIONS ET COURBE REPRÉSENTATIVE

PROPRIÉTÉ Dérivée de $\ln u$


Soit u une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I . La fonction $\ln \circ u$ est dérivable sur I et :

$$(\ln u)'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

Preuve : Dérivée de la composée : $(\ln \circ u)' = \ln'(u) \times u' = \frac{1}{u} \times u' = \frac{u'}{u}.$

PROPRIÉTÉ Variations de $\ln$

La fonction $\ln$ est **strictement croissante** sur $]0; +\infty[$ car $\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$. Elle est **concave** car $\ln''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$.



Courbe représentative $y = \ln x$: passage par $(1; 0)$ et $(e; 1)$, asymptote verticale $x = 0$, concavité vers le bas.

MÉTHODE Étudier une fonction $f(x) = \ln(u(x))$

1. Domaine : Résoudre $u(x) > 0$.
2. Dérivée : $f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$. Le signe de f' est le signe de u' (car $u > 0$ sur le domaine).
3. Tableau de variations : D'après le signe de u' .
4. Limites aux bornes : Utiliser $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$.
5. Courbe : Tracer les asymptotes verticales (bornes où $u \rightarrow 0^+$), points remarquables ($u = 1 \Rightarrow f = 0$, $u = e \Rightarrow f = 1$), concavité ($f'' = \frac{u''u - (u')^2}{u^2}$).

EXERCICE RÉSOLU 35 Étude complète : $f(x) = \ln(x^2 - 2x + 2)$

SOLUTION

1. Domaine : $x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. $D_f = \mathbb{R}$.
2. Dérivée : $u(x) = x^2 - 2x + 2$, $u'(x) = 2x - 2 = 2(x - 1)$. $f'(x) = \frac{2(x-1)}{x^2 - 2x + 2}$. Dénominateur > 0 . Signe de f' = signe de $x - 1$.
3. Variations : Décroissante sur $] -\infty; 1]$, croissante sur $[1; +\infty[$. Minimum en 1 : $f(1) = \ln 1 = 0$.
4. Limites : $x \rightarrow \pm\infty \Rightarrow u(x) \sim x^2 \rightarrow +\infty \Rightarrow f(x) \rightarrow +\infty$.
5. Courbe : Symétrique par rapport à $x = 1$ (car u symétrique). Point bas $(1; 0)$. Pas d'asymptote verticale. Asymptote parabolique ? Non, $\ln(x^2) \sim 2 \ln |x|$.

ATTENTION Signe de la dérivée

Pour $f = \ln u$, $f' = \frac{u'}{u}$. Comme $u > 0$ sur le domaine, le signe de f' est exactement le signe de u' . Inutile de faire un tableau de signes avec u au dénominateur : il est positif !

20 PRIMITIVES DE LA FORME $\frac{u'}{u}$ **PROPRIÉTÉ** Primitive de $\frac{u'}{u}$

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I , ne s'annulant pas sur I . Une primitive de $\frac{u'}{u}$ sur I est $\ln |u|$.

$$\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln |u(x)| + C$$

Cas particulier : $\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C$ (sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$).

ATTENTION Valeur absolue obligatoire !

La primitive de $\frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$ est $\ln |x| + C$, pas $\ln x + C$. Exemple : $\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x} = [\ln |x|]_{-2}^{-1} = \ln 1 - \ln 2 = -\ln 2$. Si on utilisait $\ln x$, on aurait $\ln(-1)$ qui n'existe pas.

MÉTHODE Repérer et calculer $\int \frac{u'}{u}$

1. Identifier le dénominateur $u(x)$.
2. Vérifier que le numérateur est bien $u'(x)$ (éventuellement à une constante près).
3. Écrire $\ln |u(x)| + C$ (ou $k \ln |u(x)| + C$ si numérateur = ku').

EXERCICE RÉSOLU 36 Primitives

Calculer les primitives suivantes :

1. $\int \frac{2x}{x^2+1} dx$
2. $\int \tan x dx$ sur $] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$

3. $\int \frac{e^x}{e^x+3} dx$

SOLUTION

1. $u = x^2 + 1$, $u' = 2x$. Primitive = $\ln(x^2 + 1) + C$ (valeur absolue inutile car $x^2 + 1 > 0$). 2. $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{-\cos' x}{\cos x}$. $u = \cos x$, $u' = -\sin x$. Primitive = $-\ln |\cos x| + C = \ln |\sec x| + C$. 3. $u = e^x + 3$, $u' = e^x$. Primitive = $\ln(e^x + 3) + C$.

21 ÉQUATIONS, INÉQUATIONS, SYSTÈMES ET APPLICATIONS

PROPRIÉTÉ Résolution d'équations et inéquations

$\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$, donc pour $A > 0, B > 0$:

$$\ln A = \ln B \Leftrightarrow A = B$$

$$\ln A < \ln B \Leftrightarrow A < B$$

$$\ln A \leq \ln B \Leftrightarrow A \leq B$$

MÉTHODE Résoudre une équation $\ln(\dots) = \dots$

1. Conditions d'existence (C.E.) : Tous les arguments des $\ln$ doivent être > 0 . Noter l'ensemble D .
2. Transformer : Utiliser les propriétés algébriques pour n'avoir qu'un seul $\ln$ de chaque côté (ou isoler $\ln X$).
3. Résoudre : Passer à l'équation sans $\ln$ (ex : $\ln A = \ln B \rightarrow A = B$; $\ln X = k \rightarrow X = e^k$).
4. Vérifier : Ne garder que les solutions appartenant à D .

EXERCICE RÉSOLU 37 Équation

Résoudre $\ln(x+3) + \ln(x-1) = \ln 5$.

SOLUTION

1. C.E. : $x + 3 > 0$ et $x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1$. $D =]1; +\infty[$. 2. $\ln[(x + 3)(x - 1)] = \ln 5$. 3. $(x + 3)(x - 1) = 5 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 5 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 8 = 0 \Leftrightarrow (x + 4)(x - 2) = 0$. Solutions candidates : $x = -4$ ou $x = 2$. 4. Vérification : $-4 \notin D$, $2 \in D$. Solution : $S = \{2\}$.

MÉTHODE Résoudre un système d'inconnues $\ln x, \ln y$

Poser $X = \ln x$, $Y = \ln y$ (avec $x > 0$, $y > 0$). On obtient un système linéaire en X, Y . Résoudre pour X, Y , puis retrouver $x = e^X$, $y = e^Y$.

EXERCICE RÉSOLU 38 Système

Résoudre $\begin{cases} \ln x + 2 \ln y = 3 \\ 2 \ln x - \ln y = 0 \end{cases}$.

SOLUTION

C.E. : $x > 0$, $y > 0$. Posons $X = \ln x$, $Y = \ln y$. $\begin{cases} X + 2Y = 3 \\ 2X - Y = 0 \end{cases} \Rightarrow Y = 2X \Rightarrow X + 4X = 3 \Rightarrow X = \frac{3}{5}, Y = \frac{6}{5}$. $x = e^{3/5}$, $y = e^{6/5}$. Vérification : $x > 0$, $y > 0$ OK. $S = \{(e^{0,6}; e^{1,2})\}$.

LESAVAIS-TU ? Croissance exponentielle et datation au Carbone 14

La désintégration radioactive suit une loi $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$. Le **période** (demi-vie) T vérifie $e^{-\lambda T} = \frac{1}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{\ln 2}{T}$. Pour le Carbone 14 ($T \approx 5730$ ans), on date un échantillon en mesurant N/N_0 : $t = -\frac{1}{\lambda} \ln(N/N_0) = -T \frac{\ln(N/N_0)}{\ln 2}$. Au Cameroun, cette méthode aide à dater les sites archéologiques (ex : gisements de Shum Laka dans le Nord-Ouest).

EXEMPLE Application : Croissance démographique

La population d'une ville suit $P(t) = P_0 e^{kt}$ (t en années). En 2020 ($t = 0$), $P_0 = 500\,000$. En 2030, $P = 750\,000$. Trouver k et la date où la population atteindra 1 000 000.

$750\,000 = 500\,000 e^{10k} \Rightarrow 1,5 = e^{10k} \Rightarrow \ln 1,5 = 10k \Rightarrow k = \frac{\ln 1,5}{10} \approx 0,0405$. $1\,000\,000 = 500\,000 e^{kt} \Rightarrow 2 = e^{kt} \Rightarrow \ln 2 = kt \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{k} = 10 \frac{\ln 2}{\ln 1,5} \approx 17,1$ ans. Vers 2037.

EXERCICE 12 Synthèse Bac


Soit $f(x) = \ln(x^2 - 4x + 5)$.

1. Déterminer D_f et étudier la parité de f .
2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
3. Calculer les limites aux bornes et tracer la courbe C_f .
4. Résoudre $f(x) = \ln 2$.
5. Calculer $\int_1^3 f'(x) dx$ et interpréter graphiquement.

CORRIGÉ Exercice Synthèse

1. $x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1 \geq 1 > 0$, $D_f = \mathbb{R}$. $f(-x) = \ln(x^2 + 4x + 5) \neq f(x)$: ni paire ni impaire. Symétrie axiale $x = 2$ car $u(2+x) = u(2-x)$. 2. $u(x) = (x-2)^2 + 1$, $u'(x) = 2(x-2)$. $f'(x) = \frac{2(x-2)}{(x-2)^2+1}$. Signe de f' = signe de $x-2$. Décroissante sur $]-\infty; 2]$, croissante sur $[2; +\infty[$. Minimum $f(2) = \ln 1 = 0$. 3. $x \rightarrow \pm\infty \Rightarrow u \sim x^2 \rightarrow +\infty \Rightarrow f \rightarrow +\infty$. Asymptote parabolique? $f(x) - 2 \ln |x| \rightarrow \ln 1 = 0$. Courbe au-dessus de l'axe x (minimum 0), symétrique axe $x = 2$, point $(2; 0)$. 4. $\ln(x^2 - 4x + 5) = \ln 2 \Rightarrow x^2 - 4x + 5 = 2 \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow (x-1)(x-3) = 0$. $S = \{1; 3\}$. 5. $\int_1^3 f'(x) dx = f(3) - f(1) = \ln 2 - \ln 2 = 0$. Aire algébrique nulle (symétrie par rapport à $x = 2$).

21.1 Carte mentale de la leçon



Carte mentale de la leçon : la fonction logarithme népérien

21.2 L'essentiel à retenir

À RETENIR

Fonction logarithme népérien – Formulaire Bac

Définitions clés

- La fonction **logarithme népérien**, notée $\ln$, est l'unique **primitive** de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ qui **s'annule en 1** : $\ln 1 = 0$.
- Ensemble de définition : $D_{\ln} =]0; +\infty[$. On ne peut donc calculer $\ln x$ que si $x > 0$.
- Nombre d'Euler : e est l'unique réel tel que $\ln e = 1$ ($e \approx 2,718$).

Formules et théorèmes à connaître par cœur

Domaine	Formule
Produit	$\ln(ab) = \ln a + \ln b \quad (a > 0, b > 0)$
Quotient	$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b; \quad \ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a$
Puissance	$\ln(a^n) = n \ln a \quad (n \in \mathbb{R}, a > 0); \quad \ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a$
Dérivée	$(\ln x)' = \frac{1}{x}; \quad (\ln u)' = \frac{u'}{u} \text{ (avec } u > 0)$
Primitive	$\int \frac{u'}{u} dx = \ln u + C; \quad \int \frac{dx}{x} = \ln x + C$
Limites	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$
Croissances comparées	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$
Équivalence	$\ln a = \ln b \Leftrightarrow a = b; \quad \ln a < \ln b \Leftrightarrow a < b$ (ln est strictement croissante)
Signe	$\ln x < 0$ si $0 < x < 1$; $\ln x > 0$ si $x > 1$

Méthodes express

- **Simplifier** une expression : regrouper avec $\ln a + \ln b = \ln(ab)$ et $n \ln a = \ln(a^n)$.
- **Équation** avec ln : (1) poser les conditions d'existence, (2) se ramener à $\ln A = \ln B$ ou à $X = \ln x$, (3) résoudre, (4) vérifier que les solutions respectent les conditions.
- **Inéquation** : isoler $\ln x$, puis utiliser la stricte croissance : $\ln x \geq \ln a \Leftrightarrow x \geq a$.
- **Étude de fonction** $f = \ln u$: domaine ($u > 0$), dérivée $f' = \frac{u'}{u}$, signe de $f' =$ signe de u' , limites aux bornes.
- **Primitive** de $\frac{u'}{u}$: repérer que le numérateur est la dérivée du dénominateur, écrire $\ln |u| + C$.

À RETENIR Checklist avant le Bac

Avant l'épreuve, vérifie que tu sais :

- ☐ Donner la définition de ln comme primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ nulle en 1, et son ensemble de définition $]0; +\infty[$.
- ☐ Appliquer sans erreur $\ln(ab)$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right)$, $\ln(a^n)$ et $\ln(\sqrt{a})$.
- ☐ Citer les valeurs remarquables : $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$.
- ☐ Donner les limites de $\ln x$ en 0^+ et en $+\infty$, et interpréter les asymptotes de la courbe.
- ☐ Utiliser les croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.
- ☐ Dériver $\ln u$ en $\frac{u'}{u}$ et étudier le sens de variation d'une fonction contenant ln.

- ☐ Déterminer une primitive de la forme $\frac{u'}{u}$ sans oublier la valeur absolue ni la constante.
- ☐ Résoudre une équation ou une inéquation avec $\ln$ en commençant toujours par les conditions d'existence.
- ☐ Résoudre un système d'inconnues $\ln x$ et $\ln y$ par substitution.
- ☐ Tracer l'allure de la courbe de $\ln$ (passage par $(1; 0)$ et $(e; 1)$, concavité, croissance lente).
- ☐ Exploiter $\ln$ dans un problème concret : croissance exponentielle, désintégration radioactive, pH, échelle logarithmique.
- ☐ Rédiger proprement : justifier la positivité des quantités avant d'écrire un logarithme.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**