



## Relatório de Consultoria

### Áreas do Conhecimento:

engenharia mecânica, projetos de máquinas

### Palavras-Chave:

regressão linear, automobilismo, segurança, trânsito

### Autor para contato:

Aluno Consultor

e-mail: [aluno.consultor@email.com.br](mailto:aluno.consultor@email.com.br)

# Relação Entre Velocidade e Distância de Frenagem para Carros de Passeio

---

Aluno Consultor<sup>a,b</sup>, Consultante<sup>c,d</sup>, Marcus A. Nunes<sup>a,e</sup>

---

<sup>a</sup>Departamento de Estatística - UFRN

<sup>b</sup>Consultor

<sup>c</sup>Outro Departamento - UFRN

<sup>d</sup>Consultante

<sup>e</sup>Orientação

Este trabalho estuda a relação entre a velocidade de carros (mph) e a distância (pés) que eles levaram para parar completamente. Utilizamos o modelo de regressão linear simples para determinar se existe relação entre estas duas variáveis.

## 1. Objetivos

Diversos autores já publicaram estudos referentes à segurança no trânsito. [1], por exemplo, estuda a relação entre as habilidades dos motoristas e a percepção que eles possuem sobre estas habilidades. Além desta característica, existem diversas outras que, se estudadas, podem aumentar a segurança no trânsito. Uma destas características é a distância mínima necessária para que um carro pare completamente após seus freios serem acionados.

Neste trabalho estamos interessados em verificar qual é a relação que existe entre a velocidade de um carro (em milhas por hora) e a distância que ele levou para parar completamente (em pés). Este conjunto de dados foi fornecido pelo programa R: A Language and Environment for Statistical Computing ([2]). A hipótese com a qual trabalhamos é a de que existe uma relação positiva entre estas variáveis. Isto é, quanto mais rápido um carro estiver trafegando, maior vai ser a distância necessária para que este carro pare completamente.

Além de verificar se há correlação entre estas variáveis, desejamos obter uma relação capaz de prever o quanto uma variável varia em relação a outra. Ou seja, gostaríamos de poder estimar a distância necessária para um carro parar completamente se soubermos qual a sua velocidade de tráfego no momento em que os freios foram acionados.

## 2. metodologia

Os dados analisados neste trabalho foram obtidos a partir de uma amostra de 50 carros. As medições foram realizadas na década de 1920 e disponibilizadas originalmente por [3]. Não há informações a respeito dos modelos dos carros utilizados neste experimento.

Utilizaremos um método estatístico chamado regressão linear a fim de verificar se há relação entre a distância necessária para um carro parar completamente e sua velocidade. Este é um método bastante popular, capaz de descrever com bastante precisão a relação entre as variáveis que nos interessam.

Sejam  $x_1, x_2, \dots, x_n$  as observações referentes a velocidade dos carros em questão. Considere  $y_1, y_2, \dots, y_n$  as observações referentes a distância necessária para os carros pararem. De acordo com [4], podemos expressar a dependência entre  $y$  e  $x$  através da equação

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i,$$

onde  $\beta_0$  e  $\beta_1$  são coeficientes estimados pelas equações

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (2.1)$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} \quad (2.2)$$

As quantidades  $\bar{x}$  e  $\bar{y}$  são, respectivamente, as médias amostrais de  $x_1, x_2, \dots, x_n$  e  $y_1, y_2, \dots, y_n$ . Estas médias amostrais são dadas por


$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$
$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

Determinamos se o coeficiente  $\beta_1$  é estatisticamente significativo através de um teste  $t$ . Sob a hipótese nula, assumimos que o estimador possui distribuição  $t$  com  $n - 1$  graus de liberdade.

### 3. Resultados

A fim de verificar visualmente se há algum tipo de relação entre as variáveis consideradas neste estudo, exibimos o gráfico de dispersão dos dados na Figura 1. Note que é possível perceber uma forte tendência linear positiva na relação entre estas variáveis. Quanto maior o valor da velocidade, maior a distância necessária para o carro parar completamente.

```
ggplot(cars, aes(x=speed, y=dist)) +  
  geom_point() +  
  labs(x="Velocidade (mph)", y="Distância (pés)")
```




**Figura 1.** Gráfico de dispersão da distância de parada completa (pés) versus velocidade (mph) dos carros.

```
ggplot(cars, aes(x=speed, y=dist)) +  
  geom_point() +  
  labs(x="Velocidade (mph)", y="Distância (pés)") +  
  geom_smooth(method="lm", se=FALSE)
```

Além disso, adicionamos ao gráfico exibido na Figura 2 a reta que melhor descreve a relação entre estas variáveis. Esta reta foi obtida através do método descrito na seção anterior, fazendo uso das fórmulas (2.1) e (2.2). Explicitamente, a equação representada na Figura 2 é dada por

```
ajuste <- lm(dist ~ speed, data=cars)
```



**Figura 2.** Gráfico de dispersão da distância de parada completa (pés) versus velocidade (mph) dos carros com a reta que melhor se ajusta a estes dados.

$$\hat{y}_i = -17,5791 + 3,9324x_i. \quad (3.1)$$

Entretanto, precisamos testar se os coeficientes estimados e apresentados na relação (3.1) são, de fato, estatisticamente significantes. Para isto, testaremos as hipóteses

$$H_0 : \beta_0 = 0$$

$$H_1 : \beta_0 \neq 0$$

e

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

Os resultados destes testes estão apresentados na Tabela 1.


Note que, em ambos os casos, o p-valor encontrado é inferior a  $\alpha = 0,05$ . Portanto, podemos rejeitar ambas as hipóteses nulas e  $\beta_0$  e  $\beta_1$  são estatisticamente diferentes de zero.

Para finalizar a análise, devemos verificar se o modelo ajustado não viola as hipóteses do modelo de regressão linear. Para verificar isto, exibimos a análise de resíduos na Figura 3.

`autoplot(ajuste)`

**Tabela 1.** Resultados dos testes de hipóteses realizados para a análise de regressão.

Coefficiente	Estimativa	Erro Padrao	t	p-valor
$\beta_0$	-17,5791	6,7584	-2,601	0,0123
$\beta_1$	3,9324	0,4155	9,464	<0,0001



**Figura 3.** Análise de resíduos do modelo de regressão linear ajustado.

Note que na parte superior esquerda da imagem, embora o gráfico dos resíduos versus valores ajustados não apresente tendência, a variância não é constante. Note que os pontos próximos de zero estão mais próximos entre si do que os pontos mais a direita no gráfico. Portanto, há uma violação das hipóteses da regressão linear neste caso.

Assim, podemos sugerir uma transformação nestes dados ou a utilização de outro método de análise, como um modelo linear generalizado.

## Referências

1. McKenna FP, Stanier RA, Lewis C. 1991 Factors underlying illusory self- assessment of driving skill in males and females. *Accident Analysis and Prevention* **23**, 45–52.
2. R Core Team. 2017 *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing Vienna, Austria.
3. Ezekiel M. 1930 *Methods of Correlation Analysis*. New York: Wiley.
4. Kutner M, Nachtsheim C, Neter J, Li W. 2004 *Applied Linear Statistical Models - Fifth Edition*. New York: McGraw-Hill/Irwin.