



## Binomialfordelingen: egenskaber, estimation og test

Anders Tolver  
Institut for Matematiske Fag



## I dag

Dagens forelæsning dækkes af lærebogens kapitel 11

- Hvilken slags problemer skal vi se på?
- Binomialfordelingen (med kendt sandsynlighed)
- Statistik for en enkelt binomialfordeling
- Statistik for to binomialfordelinger (estimation og KI)

Generel info:

- **Afleveringsopgaver:** opgave 3 afleveres elektronisk senest onsdag (26/10). Husk, at du kan spørge hjælpelærerne om rettelser, som du ikke forstår (også til opgave 1+2).
- **Kursusevaluering:** Udfyld som minimum *multiple choice* rubrikker, men skriv gerne kommentarer, hvis du har noget på hjerte.



## Hvilken slags problemer skal vi se på?



## Eksempel: Binomialdata

Antag at vi ved at en bestemt slags frø spirer med ssh. 60%.

- Hvis vi ser på 8 frø, hvor stor er så sandsynligheden for at mindst 5 af dem spirer?
- Skal designe et forsøg, hvor der skal bruges mindst 10 planter.  
Hvor mange frø skal der plantes, hvis vi vil være 90% sikre på at mindst 10 frø bliver til noget?

Vi skal bruge **binomialfordelingen**.

Men som regel vil sandsynligheden ikke være kendt! Data  $\rightarrow$  estimat for sandsynlighed, konfidensinterval, hypotesetest.

Eksempel vedr. forelæserens fritidsinteresser:

- Implicit bias over for undervisere i statistik!



## Eksempel: Tabeller

Data fra 100 mus: Har kastrede mus større risiko for at udvikle diabetes end ikke-kastrede mus? Mere om det i dag og onsdag.

	Diabetes	Ikke diabetes	Total
Kastrede mus	26	24	50
Ikke-kastrede mus	12	38	50

Svar fra 1000 personer vedr. politisk ståsted og foretrukket finansøkonomisk redskab: Er der sammenhæng? På onsdag.

	Demokrat	Republikaner	Uafhængig
Begrænse udgifter	101	282	61
Øge skatter	38	67	25
Øge offentlige invest.	131	88	31
Lade underskuddet vokse	61	90	25



## Politiske meningsmålinger (kilde: voxmeter.dk)


##	parti	uge41 (%)	uge41 (n)	uge42 (%)	uge42 (n)
## 1	A-soc	26.1	263	25.7	242
## 2	B-Rad	4.8	48	4.7	44
## 3	C-Kons	8.9	90	6.7	63
## 4	D-NyeB	4.5	45	3.8	36
## 5	F-SF	8.7	88	9.1	86
## 6	I-LibAl	6.1	61	7.5	71
## 7	K-Krist	0.9	9	0.5	5
## 8	M-Mod	6.1	61	8.8	83
## 9	O-DF	2.6	26	2.4	23
## 10	Q-FrieG	0.4	4	0.5	5
## 11	V-Venst	14.4	145	14.2	134
## 12	Æ-Dan	7.9	80	6.8	64
## 13	Ø-Enhl	6.6	67	6.8	64
## 14	Øvrige	0.1	1	0.3	3
## 15	Å-Alt	1.9	19	2.2	21



## Politiske meningsmålinger

Meningsmålinger fra uge 41 og uge 42 (Voxmeter)

Baseret på ca. 1000 repræsentativt udvalgte danskere



## Valgtema: politiske meningsmålinger

Hvad er den aktuelle vælgertilslutning til de forskellige politiske partier?

- $n$ : antal personer i stikprøven
- $p$ : ukendt vælgertilslutning i befolkningen
- Usikkerhed og konfidensinterval (KI) for  $p$
- Test for hypotesen  $H_0 : p = p_0$  (fast værdi/tidligere valgresultat)

Er der forskel på vælgertilslutningen på to forskellige tidspunkter?

- $n_1, n_2$ : størrelse af to (uafhængige) stikprøver
- $p_1, p_2$ : ukendt vælgertilslutning på to tidspunkter
- Usikkerhed/KI for  $p_1$  og  $p_2$
- Usikkerhed/KI for forskel/ændring:  $p_2 - p_1$
- Test af hypotesen  $H_0 : p_1 = p_2$



## Fællestræk

Fælles for eksemplerne er at data består af **antal**.

Vi kan ikke bruge normalfordelingen. I stedet:

- I dag: **Binomialfordelingen**
- Onsdag: **Tabeldata**

I har nok set en del allerede i gymnasiet, men nu har I bedre forudsætninger for at forstå hvad der foregår og hvorfor.

På mange måder meget **nemmere** end normalfordelingsanalyserne!

Måske lidt forvirrende fordi man ofte kan gøre flere forskellige ting i R, som alle er fornuftige men ikke giver præcis samme resultater.



## Binomialfordelingen



## Eksempel: spiring af frø




Antag at vi ved, at et frø har en sandsynlighed på 60% for at spire.

Betragt tre frø.

- Hvad er sandsynligheden for at netop et frø spirer?
- Hvad er sandsynligheden for at mindst et frø spirer?



## Sandsynlighedstræ, $n = 3$



## Spørgsmål

- Hvilke antagelser lå egentlig bag beregningerne?
- Hvordan formaliserer vi sandsynlighedsberegningerne, så vi også kan klare et større antal frø?
- Hvordan beregner vi sandsynligheder i R?



## Independent trials

Independent trials / uafhængige gentagelser:

- **$n$  gentagelser** af simpelt eksperiment
- Hver gentagelser har **to mulige udfald**: succes/fiasco  
Kan være hvad som helst: død/levende, spiret eller ikke, prisen stiger/falder, korrekt/forkert, osv.
- **Samme sandsynlighed** for succes i hver gentagelse:  $p$
- Gentagelserne er **uafhængige**



## Binomialfordelingen

Lad  $Y$  betegne antallet af succeser fra  $n$  uafhængige forsøg med samme successandsynlighed  $p$ .

Så er  $Y$  **binomialfordelt** med antalsparameter (engelsk: size)  $n$  og sandsynlighedsparameter  $p$ . Vi skriver  $Y \sim \text{bin}(n, p)$ .

**Binomialsandsynlighederne** er givet ved

$$P(j \text{ "succeser"}) = P(Y = j) = \binom{n}{j} \cdot p^j \cdot (1 - p)^{n-j},$$

hvor **binomialkoefficienten** — antal måder man kan vælge  $j$  dimser ud af  $n$  dimser — er givet ved

$$\binom{n}{j} = \frac{n!}{j!(n-j)!}$$



## Eksempel: Spiring af frø

$n = 3$  frø der hver især har en sandsynlighed på 60% for at spire.

- $P(Y = 1)$  og  $P(Y \geq 1)$ , nu vha. formelen og i R
- Hvad er ssh. for at højst to frø spirer, altså  $P(Y \leq 2)$ ?

Hvis der i stedet er 8 frø: Hvad er sandsynlighederne så?



## R

Binomialsandsynligheder i R.

- Sandsynligheder  $P(Y = j)$  beregnes med `dbinom`
- Sandsynligheder  $P(Y \leq j)$  beregnes med `pbinom`.


I begge dele skal `size` (dvs.  $n$ ) og `prob` (dvs.  $p$ ) angives.

```
dbinom(1, size=3, prob=0.6) ## P(Y=1)
## [1] 0.288

pbinom(2, size=3, prob=0.6) ## P(Y<=2)
## [1] 0.784

dbinom(0, size=3, prob=0.6) ## P(Y=0)
## [1] 0.064

1-dbinom(0, size=3, prob=0.6) ## P(Y>=1)
## [1] 0.936
```

Binomialfordelinger, her med  $n = 20$ 

## Eksempel: Spiring af frø

Nyt spørgsmål:

- Skal designe et forsøg, hvor der skal bruges mindst 10 planter.
- Hvor mange frø skal der plantes, hvis vi vil være mindst 90% sikre på at mindst 10 frø bliver til noget?

Se dagens R-kode!



## Middelværdi og varians for binomialfordelinger

For en binomialfordelt variabel  $Y \sim \text{bin}(n, p)$  gælder:

**Middelværdien** er

$$EY = n \cdot p$$

**Spredningen**

$$\text{sd}(Y) = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}$$

Se figurerne fra før.



## Normalfordelingsapproximation

En binomialfordelt variabel er en sum af  $n$  0/1-variable.


Den centrale grænseværdisætning giver **normalfordelingsapproximation**:

- $\text{bin}(n, p)$  kan approksimeres med  $N(np, np(1-p))$ , dvs. normalfordelingen med den korrekte middelværdi og spredning
- Tømmelfingerregel: Approximation er "god" hvis både  $np \geq 5$  og  $n(1-p) \geq 5$ .

I bogen bliver dette bla. brugt til at beregne diverse binomialsandsynligheder — men brug blot pbinom og dbinom.



## Nogle normalfordelingsapproximationer



## Statistik for en enkelt binomialfordeling



## Statistik

Indtil nu har vi lavet beregninger når successsh. er kendt.

Men det er den sjældent i videnskabelige sammenhænge. Faktisk udfører vi snarere forsøg for at undersøge hvad sandsynligheden er!

Givet data vil vi gøre noget af „det sædvanlige“:

- **Estimere** sandsynligheden
- Lave et **konfidensinterval** for sandsynligheden
- Lave **hypotesetest** for om  $p$  er noget bestemt (hvis relevant)

Senere: Sammenligning af to eller flere binomialsandsynligheder.



## Eksempel: Forelæserens fritidsinteresser



Ved forelæsningsen d. 7/9-2022 blev I bedt om at gætte på forelæserens fritidsinteresser

- I havde ingen relevant information at basere jeres gæt på
- Jeg kunne gøre hvad jeg ville for at snyde jer
- Jeres gæt kan dog bruges til at estimere **implicit bias** omkring stereotypen: **statistik-forelæseren!**



## Implicit bias over for forelæsere i statistik

Baseret på en stikprøve fra 137 studerende

```
## # A tibble: 6 x 4
##   aktivitet      `FALSE` `TRUE`    pct
##   <chr>          <int> <int> <dbl>
## 1 fodbold           36    101  73.7
## 2 hækle            122     15  10.9
## 3 kantarel          86     51  37.2
## 4 klatre           101     36  26.3
## 5 renovere_bolig    75     62  45.3
## 6 rulleski          71     66  48.2
```

**Breaking news:** Fordomme lever i bedste velgående blandt studerende på KU. Forelæsere forventes at løbe rundt på rulleski, når de ikke renoverer bolig eller sidder og ser Liverpool spille fodbold.



## Fritidsinteresser: Set-up og spørgsmål

- **Statistisk model:**  $Y \sim \text{bin}(137, p)$  hvor  $p$  er ukendt.  
Fortolkning af  $p$ : Andel af studerende, som angiver aktivitet som fritidsinteresse for forelæseren.  
Er antagelserne for at  $Y$  er binomialfordelt egentlig OK?
- **Estimat** for  $p$ ? Tilhørende **standard error** (SE)?
- **Konfidensinterval?**
- Antag at I på forhånd vidste, at forelæseren dyrkede 3 af de angivne aktiviteter i fritiden. Hvilken værdi af  $p$  svarer til at I bare gættede?  
**Hypotesetest.**



## Generel teori: Statistisk model, estimation, SE

**Statistisk model:**  $Y \sim \text{bin}(n, p)$  med kendt  $n$  og ukendt  $p$ .

**Observation,**  $y$

**Estimation:** Naturligt estimat for  $p$  (når  $n$  er kendt):

$$\hat{p} = \frac{\text{antal succeser}}{\text{antal forsøg}} = \frac{y}{n}$$

**Standard error:** Husk at SE for  $\hat{p}$  er (estimeret) spredning for  $\hat{p}$ .

$$\begin{aligned} \text{sd}(Y) &= \sqrt{np(1-p)} \\ \text{sd}(\hat{p}) &= \text{sd}\left(\frac{Y}{n}\right) = \frac{1}{n} \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \\ \text{SE}(\hat{p}) &= \frac{\sqrt{n\hat{p}(1-\hat{p})}}{n} = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \end{aligned}$$



## Generel teori: Konfidensinterval

Pga. normalfordelingsapproximationen kan vi lave et **95% konfidensinterval** for  $p$  som

$$\hat{p} \pm 1.96 \cdot \text{SE}(\hat{p}) = \hat{p} \pm 1.96 \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

Bemærk, at vi bruger 97.5%-fraktilen i standardnormalfordelingen  $N(0, 1)$ , nemlig 1.96.

Hvis vi i stedet ønsker 90% KI: Udskift 1.96 med 1.645 som er 95% fraktilen i standardnormalfordelingen.



## Generel teori: Forbedret konfidensinterval

KI på forrige slide bygger på  $N$ -approx. som kun er OK hvis  $np \geq 5$  og  $n(1 - p) \geq 5$ , altså hvis  $p$  ikke er for tæt på 0 eller 1 eller  $n$  er for lille.

Ellers kan vi risikere at konfidensgraden for vores KI slet ikke er 95% som vi troede, og det kan indeholde værdier udenfor (0, 1).

Kan i stedet bruge følgende **forbedrede KI**:

$$\tilde{p} \pm 1.96 \cdot \sqrt{\frac{\tilde{p}(1 - \tilde{p})}{n + 4}} \quad \text{med} \quad \tilde{p} = \frac{y + 2}{n + 4}$$

Bemærk at  $\tilde{p} = \frac{y+2}{n+4}$  er **"rykket væk" fra 0 og 1** ift.  $\hat{p} = \frac{y}{n}$ .



## Eksempel: fritidsinteresser

**Observation:**  $y = 51$  gætter på at forelæseren kan lide at plukke kantareller.

**Statistisk model:**  $Y \sim \text{bin}(137, p)$  hvor  $p$  er ukendt.

**Estimation:**

$$\hat{p} = \frac{51}{137} = 0.372, \quad \text{SE}(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{137}} = 0.041$$

**Simpelt 95% konfidensinterval:**

$$\hat{p} \pm 1.96 \cdot \text{SE}(\hat{p}) = 0.372 \pm 1.96 \cdot 0.041 = (0.291, 0.453)$$

**Forbedret 95% KI:**  $\tilde{p} = 0.376$ , 95% KI

$$\tilde{p} \pm 1.96 \cdot \text{SE}(\tilde{p}) = 0.376 \pm 1.96 \cdot 0.041 = (0.296, 0.456)$$



## R: Det simple KI

Det simple KI beregnes "manuelt", ved indsættelse i formler:

```
p <- 51/137
p
## [1] 0.3722628
SE <- sqrt(p * (1-p) / 137)
SE
## [1] 0.04130032
p - 1.96 * SE
## [1] 0.2913141
p + 1.96 * SE
## [1] 0.4532114
```





## R: Forbedret KI

Det forbedrede KI beregnes "manuelt", ved indsættelse i formler:

```
p <- (51 + 2)/(137 + 4)
p
## [1] 0.3758865
SE <- sqrt(p * (1-p) / 141)
SE
## [1] 0.04078971
p - 1.96 * SE
## [1] 0.2959387
p + 1.96 * SE
## [1] 0.4558344
```



## Fritidsinteresse: Test af hypotese

**Observation:**  $y = 51$  gætter på at forelæseren kan lide at plukke kantareller.

**Statistisk model:**  $Y \sim \text{bin}(137, p)$  hvor  $n$  er kendt og  $p$  er ukendt.

**Hypotese:** Hvis studerende gætter, så er  $p = 1/2 = 0.500$ . Vi tester derfor hypotesen  $H_0 : p = 1/2$ .


"Løsning" via KI: Check om  $1/2$  ligger i konfidensintervallet.

Men vi kan også lave et egentligt hypotesetest:

- Under hypotesen, dvs. hvis  $H_0$  er sand, kender vi fordelingen af  $Y$  fuldstændigt:  $Y \sim \text{bin}(137, 1/2)$
- $p$ -værdi: ssh. for — hvis  $H_0$  er sand — at få data der passer lige så dårligt eller dårligere med hypotesen, som  $y = 51$ .



## Fritidsinteresser: Fordeling af $Y$ under hypotesen



- Store/små værdier passer dårligt med  $H_0$
- Værdier „længere væk fra midten“ end 51 passer dårligere. Skal formuleres lidt mere præcist...



## Fritidsinteresser: $p$ -værdi

Husk at vi kender fordelingen under hypotesen:  $Y \sim \text{bin}(137, 1/2)$

Bruger observationen  $y = 51$  selv som **teststørrelse**.


- Observationer med  $P(Y = y) \leq P(Y = 51)$  passer mindst lige så dårligt med hypotesen som værdien 51
- Læg punktsandsynlighederne for disse  $y$  sammen

Formelt:

$$p\text{-værdi} = \sum_{y: P(Y=y) \leq P(Y=51)} P(Y=y).$$



## Fritidsinteresser: $p$ -værdi



- Røde punkter har samme eller mindre ssh. end  $y = 51$ .
- $p$ -værdi = **sum af røde sandsynligheder** = 0.0035
- Vi forkaster  $H_0$ ; Ikke rimeligt at tro på, at vi blot gættede



## R: binom.test

$p$ -værdien kan beregnes med binom.test (eller manuelt)

```
binom.test(51, 137, p=1/2)

##
## Exact binomial test
##
## data: 51 and 137
## number of successes = 51, number of trials = 137, p-value = 0.00352
## alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
## 95 percent confidence interval:
##  0.2912522 0.4589238
## sample estimates:
## probability of success
##      0.3722628
```



## R: prop.test

Bemærk at prop.test (-se nedenfor) også kan bruges til beregning af en  $p$ -værdi. Men dette test benytter en anden teststørrelse (og giver et lidt andet resultat).

Et forbedret KI kan dog **næsten** beregnes med prop.test og option correct=FALSE. Ikke helt det samme som på slide 30, men I må gerne bruge det!

```
prop.test(51, 137, p=1/2, correct=FALSE)

##
## 1-sample proportions test without continuity correction
##
## data: 51 out of 137, null probability 1/2
## X-squared = 8.9416, df = 1, p-value = 0.002787
## alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5
## 95 percent confidence interval:
##  0.2958352 0.4556584
## sample estimates:
##      p
## 0.3722628
```



## Generel teori: Hypotesetest

- **Stat. model:**  $Y \sim \text{bin}(n, p)$  hvor  $n$  er kendt og  $p$  er ukendt.
- **Observation,**  $y = y_0$
- **Hypotese,**  $H_0 : p = p_0$  for hypoteseværdi  $p_0$ . Under hypotesen er  $Y \sim \text{bin}(n, p_0)$ . Kan tegne denne fordeling!
- **$p$ -værdi** = sandsynligheden for at få observationer der passer lige så dårligt eller dårligere med hypotesen end  $y_0$ , dvs.

$$p\text{-værdi} = \sum_{y: P(Y=y) \leq P(Y=y_0)} P(Y=y).$$

- **Konklusion** som sædvanlig



## Eksempel: Tilslutning til politisk parti

Repetition af centrale begreber:

- **Data:**  $y$  antal personer som vil stemme på parti baseret på meningsmåling med  $n$  personer
- **Stat. model:**  $y$  opfattes som udfaldet af  $Y \sim \text{bin}(n, p)$
- **Parametre:**  $p$  andelen i population som vil stemme på partiet
- **Estimat:**  $\hat{p} = y/n$
- (Simpelt) **95 %-KI:**  $\hat{p} \pm 1.96 \cdot \underbrace{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/n}}_{\text{statistiske usikkerhed}}$

I meningsmålinger fremhæves ofte den **statistiske usikkerhed** i %-point.

Med stikprøve af størrelse  $n = 1000$ :

- For store partier ( $p \approx 0.5$ ) er stat. usikkerhed  $\pm 3.1$  %-point
- For mindre partier ( $p \approx 0.1$ ) er stat. usikkerhed  $\pm 1.9$  %-point
- For små partier ( $p \approx 0.02$ ) er stat. usikkerhed  $\pm 0.9$  %-point



## Statistik for to binomialfordelinger



## Eksempel: Kastrering og diabetes

Mistanke om at tidlig kastrering øger risikoen for diabetes.

Forsøg:

- 100 mus inddelt tilfældigt i to grupper (50+50).
- Den ene gruppe mus blev kastreret dagen efter fødsel; den anden gruppe mus blev ikke kastreret
- Efter 112 dage undersøgte man om musene havde udviklet diabetes

	Diabetes	Ikke diabetes	Total
Kastrerede mus	26	24	50
Ikke-kastrerede mus	12	38	50

Er der forskel er der på risikoen for at udvikle diabetes? Hvor stor?



## Kastrering og diabetes: Statistisk model og formål

Statistisk model:

- Data fra de to grupper er uafhængige
- Kastrerede mus: Observation  $y = 26$  fra  $\text{bin}(50, p)$
- Ikke-kastrerede mus: Observation  $x = 12$  fra  $\text{bin}(50, q)$

Interesseret i **forskellen mellem de to grupper:**

- Estimat og konfidensinterval for  $p - q$
- Test for hypotesen  $H_0 : p = q$ .



## Generel teori: Statistisk model, estimation

Generelt set-up:

- Statistisk model:  $Y \sim \text{bin}(n, p)$  og  $X \sim \text{bin}(m, q)$ , uafhængige
- Observationer  $y$  og  $x$
- Interesseret i forskellen  $p - q$ .

**Estimat** for forskel:

$$\widehat{p - q} = \hat{p} - \hat{q} = \frac{y}{n} - \frac{x}{m}$$



## Generel teori: Standard error (SE) for forskel

Vi ved godt hvordan vi beregner SE for  $\hat{p}$  og  $\hat{q}$ :

$$\text{SE}(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot (1 - \hat{p})}{n}}, \quad \text{SE}(\hat{q}) = \sqrt{\frac{\hat{q} \cdot (1 - \hat{q})}{m}},$$

Regneregler for varianser/spredninger giver **SE for forskel**:

$$\text{SE}(\hat{p} - \hat{q}) = \sqrt{\text{SE}(\hat{p})^2 + \text{SE}(\hat{q})^2} = \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot (1 - \hat{p})}{n} + \frac{\hat{q} \cdot (1 - \hat{q})}{m}}$$



## Generel teori: KI for forskel mellem sandsynligheder

**95% KI** for differensen mellem de to sandsynligheder,  $p - q$ :

$$\hat{p} - \hat{q} \pm 1.96 \cdot \text{SE}(\hat{p} - \hat{q})$$

Altså:

$$\hat{p} - \hat{q} \pm 1.96 \cdot \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot (1 - \hat{p})}{n} + \frac{\hat{q} \cdot (1 - \hat{q})}{m}}$$

Vi kan bruge dette konfidensinterval til at lave et "groft" test for hypotesen  $H_0 : p = q$ . På onsdag laves et egentligt hypotesetest.



## Kastrering og diabetes: Estimat og KI

	Diabetes	Ikke diabetes	Total
Kastrerede mus	26	24	50
Ikke-kastrerede mus	12	38	50

Estimerer for hver gruppe:

$$\hat{p} = \frac{26}{50} = 0.52 \text{ (SE 0.071)}, \quad \hat{q} = \frac{12}{50} = 0.24 \text{ (SE 0.060)}$$

Estimat for forskel:  $\hat{p} - \hat{q} = 0.28$  (SE 0.093)

95% KI for differens  $p - q$ :

$$0.28 \pm 1.96 \cdot 0.093 = (0.098, 0.462)$$

Nul ligger ikke i KI, så risikoen er større blandt de kastrerede mus.



## R

SE for forskel kan beregnes manuelt; se dagens R-kode.

KI for forskel kan beregnes med `prop.test`:

```
prop.test(c(26,12), c(50,50), correct=FALSE)

##
## 2-sample test for equality of proportions without continuity
## correction
##
## data: c(26, 12) out of c(50, 50)
## X-squared = 8.3192, df = 1, p-value = 0.003923
## alternative hypothesis: two.sided
## 95 percent confidence interval:
##  0.09781821 0.46218179
## sample estimates:
## prop 1 prop 2
##  0.52  0.24
```



## Opsummering vedr. R

En enkelt binomialfordeling

- Simpelt KI skal laves "i hånden", dvs. beregn selv de forskellige størrelser
- `prop.test` giver næsten (men ikke helt) det forbedrede KI. Med/uden "kontinuitetskorrektion": Bogens formler svarer til *ikke* at bruge korrektionen.
- `binom.test` giver  $p$ -værdi for hypotesen  $H_0 : p = p_0$
- `prop.test` giver også en  $p$ -værdi, men en anden end vi har beregnet. Fornuftig nok så længe  $np$  og  $n(1 - p)$  er  $\geq 5$

I må selv vælge metoden medmindre I bliver spurgt om noget eksplicit.



## Opsummering vedr. R

To binomialfordelinger

- `prop.test` giver estimater for hver ssh. samt KI for forskel. Med/uden "kontinuitetskorrektion": Bogens formler svarer til *ikke* at bruge korrektionen.
- SE for forskel skal beregnes manuelt, hvis den bruges
- Giver også en  $p$ -værdi. Mere om det på onsdag.

I må selv vælge metoden medmindre I bliver spurgt om noget eksplicit.



## Hjemmeopgave: valgkamp

Voxmeter offentliggør hver uge politiske meningsmålinger baseret på telefoninterview med ca. 1000 repræsentativt udvalgte danskere.

- Moderaterne opnåede en tilslutning på 8.8 % ved meningsmålingen i uge 42 ( $n = 942$ ).
- Moderaterne opnåede en tilslutning på 6.1 % ved meningsmålingen i uge 41 ( $n = 1008$ ).

Medierne fokuserede i weekenden kraftigt på, at partiet Moderaterne oplever medvind i valgkampen.

- Er det rimeligt at hævde, at de to meningsmålinger tyder på, at tilslutningen for Moderaterne har ændret sig fra uge 41 til uge 42?
- Angiv et estimat og et 95 %-KI for ændringen i Moderaternes vælgertilslutning fra uge 41 til uge 42.

