

Analysis III

Vorlesung von
PROF. DR. FELIX FINSTER
im Wintersemester 2011/2012
Überarbeitung und Textsatz in LyX von
ANDREAS VÖLKLEIN



Stand: 16. Februar 2012

ACHTUNG

Diese Mitschrift ersetzt *nicht* die Vorlesung.

Es wird daher *dringend* empfohlen, die Vorlesung zu besuchen.

Copyright Notice

Copyright © 2011-2012 ANDREAS VÖLKLEIN

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation;

with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

A copy of the license is included in the section entitled “GNU Free Documentation License”.

Disclaimer of Warranty

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING AND TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, **THE COPYRIGHT HOLDERS AND ANY OTHER PARTY, WHO MAY DISTRIBUTE THE DOCUMENT AS PERMITTED ABOVE, PROVIDE THE DOCUMENT “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND**, EXPRESSED, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE.

Limitation of Liability

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING **WILL THE COPYRIGHT HOLDERS, OR ANY OTHER PARTY, WHO MAY DISTRIBUTE THE DOCUMENT AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR ANY DAMAGES**, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES, HOWEVER CAUSED, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR RELATED TO THIS LICENSE OR ANY USE OF OR INABILITY TO USE THE DOCUMENT, EVEN IF THEY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

IN NO EVENT WILL THE COPYRIGHT HOLDERS’/DISTRIBUTOR’S LIABILITY TO YOU, WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), OR OTHERWISE, **EXCEED THE AMOUNT YOU PAID THE COPYRIGHT HOLDERS/DISTRIBUTOR** FOR THE DOCUMENT UNDER THIS AGREEMENT.

Links

Der Text der „GNU Free Documentation License“ kann auch auf der Seite

<https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.de.html>

nachgelesen werden.

Eine transparente Kopie der aktuellen Version dieses Dokuments kann von

<https://github.com/andiv/analysisIII>

heruntergeladen werden.

Literatur**Maßtheorie**

- THEODOR BRÖCKER: *Analysis II*, Spektrum Akad. Verl., 1995, ISBN 3-86025-418-9; Kap. I-III (recht knapp)
- WALTER RUDIN: *Real and complex analysis*, McGraw-Hill, 2009, ISBN 978-0-07-054234-1; Kap. I-III

Funktionentheorie

- KLAUS JÄNICH: *Funktionentheorie*, Springer, 2011, ISBN 978-3-540-20392-6
- LARS V. AHLFORS: *Complex Analysis*, McGraw-Hill, 1979, ISBN 0-07-000657-1; (ausführlich)

Inhaltsverzeichnis

1	Integrationstheorie	1
1.1	Maßräume, Maße	4
1.1.1	Definition (σ -Algebra, Maßraum, messbare Menge)	4
1.1.2	Bemerkung	4
1.1.3	Beispiele (Erzeugnis, offene Menge, Topologie, Borelalgebra)	5
1.1.4	Definition (Erzeugendensystem, messbare Abbildung)	7
1.1.5	Beispiel	7
1.1.6	Satz (Messbarkeit ist transitiv)	7
1.1.7	Bemerkung und Definition (Kompaktifizierung)	8
1.1.8	Satz (Messbarkeit)	8
1.1.9	Satz (Limes ist messbar)	11
1.1.10	Definition (Stufenfunktion)	12
1.1.11	Satz	12
1.1.12	Korollar (Approximation durch Stufenfunktionen)	12
1.1.13	Definition (Maß)	13
1.1.14	Beispiele	13
1.1.15	Satz	13
1.2	eindimensionales Lebesgue-Maß	14
1.2.1	Lemma (Maßregeln) und Definition (Mengenalgebra, σ -Additivität, Prämaß)	15
1.2.2	Bemerkung	17
1.2.3	Theorem (Satz von Hahn über Maßerweiterungen)	17
1.2.4	Definition (äußeres Maß)	18
1.2.5	Lemma	18
1.2.6	Bemerkung	20
1.2.7	Definition (μ^* -messbar)	20
1.2.8	Lemma (Caratheodory)	20
1.2.9	Definition (Lebesguesche Nullmenge)	26
1.2.10	Definition (μ -messbar)	26
1.2.11	Definition (Lebesgue-Komplettierung, fast überall, Lebesgue-Maß)	27
1.3	Konstruktion des Integrals	27
1.3.1	Bemerkung und Definition (Treppenfunktion, Integral, Norm)	27
1.3.2	Lemma	28
1.3.3	Definition (Lebesgue-integrierbar, Integral)	30
1.3.4	Lemma	31
1.3.5	Satz (Regeln für das Integral)	32
1.3.6	Satz	33
1.3.7	Satz (Normkonvergenzsatz)	34

1.3.8	Proposition und Definition ($(L^1(X, \mu), \ \cdot\ _1)$ ist normierter Vektorraum)	35
1.3.9	Korollar ($(L^1(X, \mu), \ \cdot\ _1)$ ist Banachraum)	36
1.4	Die Konvergenzsätze	36
1.4.1	Beispiel	36
1.4.2	Theorem (monotone Konvergenz, Beppo-Levi)	37
1.4.3	Theorem (dominierte Konvergenz)	37
1.4.4	Beispiel	38
1.5	Integration nicht-neg. Fkt.	38
1.5.1	Satz	39
1.5.2	Theorem (monotone Konvergenz)	40
1.6	Zsh. zum Riemann-Integral	40
1.6.1	Satz	41
1.6.2	Beispiele	42
1.7	Die Räume L^p	42
1.7.1	Theorem	44
1.7.2	Theorem	44
1.8	Das Lebesgue-Maß auf \mathbb{R}^n	46
1.8.1	Satz	47
1.8.2	Satz	47
1.8.3	Definition	47
1.8.4	Lemma	47
1.8.5	Lemma	47
1.8.6	Satz (Cavalierisches Prinzip)	47
1.8.7	Satz	47
1.8.8	Definition (monotones Mengensystem)	48
1.8.9	Satz	48
1.8.10	Lemma	48
1.8.11	Korollar	49
1.8.12	Theorem (Fubini)	50
1.8.13	Beispiel	51
1.8.14	Beispiel	52
1.9	Die Transformationsformel	53
2	Komplexe Analysis	54
2.1	Grundlagen, die Riemannsche Zahlenkugel	54
2.1.1	Definition	54
2.2	Cauchy-Riemann DGLn	55
2.2.1	Definition	55
2.2.2	Beispiele	55
2.2.3	Satz	56
2.2.4	Definition	59
2.3	Potenzreihen	61
2.3.1	Satz	61
2.3.2	Beispiel	63
2.3.3	Theorem (Satz von Abel)	63
2.4	Exp- und Log-Funktion	64
2.4.1	Eigenschaften der Exponentialfunktion	64
2.4.2	Eigenschaften der Logarithmusfunktion	65

2.5	Kurven, Konformität	66
2.5.1	Definition (Kurve)	66
2.5.2	Beispiel	67
2.6	Komplexe Integration	68
2.6.1	Definition (komplexes Integral)	69
2.6.2	Satz	69
2.6.3	Beispiel	69
2.6.4	Definition	70
2.6.5	Lemma	70
2.6.6	Definition	71
2.7	Weg(un)abhängigkeit	71
2.7.1	Theorem	72
2.7.2	Korollar	73
2.7.3	Satz	74
2.8	Das Cauchysche Theorem	74
2.8.1	Theorem	74
2.8.2	Theorem	76
2.8.3	Theorem	77
2.8.4	Theorem	78
2.9	Der Cauchysche Integralsatz	79
2.9.1	Lemma	79
2.9.2	Definition (Index)	80
2.9.3	Theorem (Cauchyscher Integralsatz)	80
2.9.4	Korollar	81
2.9.5	Satz	82
2.9.6	Lemma	83
2.10	Einfache Folgerungen aus dem Cauchyschen Integralsatz	83
2.10.1	Lemma	84
2.10.2	Theorem	87
2.10.3	Theorem (Moera)	87
2.10.4	Theorem (Liouville)	87
2.10.5	Eleganter Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra	88
2.11	Hebbare Singularitäten, Taylorreihen	88
2.11.1	Satz	88
2.11.2	Beispiel	90
2.11.3	Definition (isolierte, hebbare, wesentliche Singularität, Pol)	90
2.11.4	Satz und Definition (Ordnung eines Pols)	91
2.11.5	Definition (meromorphe Funktion)	91
2.11.6	Beispiel	92
2.11.7	Satz	92
2.12	Die Laurententwicklung	93
2.12.1	Definition (Laurent-Reihe)	93
2.12.2	Theorem	94
2.12.3	Proposition	97
2.12.4	Beispiel	97
2.12.5	Proposition	98
2.12.6	Erinnerung (Hauptwertintegrale)	99
2.12.7	Proposition	99
2.12.8	Integrale über Intervalle	100

2.12.9	Beispiel	100
2.13	Die Gamma- und Zetafunktion	101
2.13.1	Lemma	102
2.13.2	Lemma	102
2.13.3	Komplexe Fortsetzung	103
2.13.4	Theorem	103
2.13.5	Riemannsche Vermutung	103
2.14	Der Riemannsche Abbildungssatz	104
2.14.1	Definition (biholomorph)	104
2.14.2	Definition	105
2.14.3	Theorem (Riemannscher Abbildungssatz für $\Omega \subseteq \mathbb{C}$)	105
2.14.4	Satz	105
Anhang		108
	GNU Free Documentation License	108

1 Integrationstheorie

Motivation und Überblick

Riemann-Integral

Das *Riemann-Integral* haben wir schon kennen gelernt.

Sei $I = [a, b]$ mit $a < b \in \mathbb{R}$ und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion.

TODO: Funktionsplot einfügen

Bilde eine Zerlegung $Z = (x_0, \dots, x_n)$ mit $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$, $x_0 = a, x_n = b$ und $x_{k-1} < x_k \in \mathbb{R}$ in die Teilintervalle $I_k := [x_{k-1}, x_k]$ für $k \in \{1, \dots, n\}$.

Mit $|I_k| := x_k - x_{k-1}$ ist die Feinheit:

$$\Delta Z := \max_{1 \leq k \leq n} |I_k|$$

Wähle Zwischenpunkte $\zeta_k \in I_k$ und definiere die Riemannsche Summe:

$$\sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \cdot |I_k|$$

f heißt Riemann-integrierbar (Abkürzung: R-integrierbar), falls der Limes

$$\lim_{\Delta Z \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \cdot |I_k| =: \int_a^b f(x) \, dx$$

unabhängig von der Wahl der Zerlegung und der Zwischenpunkte existiert.

Bezeichne die Menge der auf dem Intervall I Riemann-integrierbaren Funktionen mit $\mathcal{R}(I)$.

Jede stetige Funktion ist Riemann-integrierbar, das heißt $C^0(I) \subseteq \mathcal{R}(I)$.

Nachteile des Riemann-Integrals	Vorteile des Lebesgue-Integrals
Es ist nicht einfach zu entscheiden, welche Funktionen Riemann-integrierbar sind.	Die Lebesgue-integrierbaren Funktionen sind „schön“ charakterisiert.
Viele nicht-stetige Funktionen sind nicht Riemann-integrierbar, zum Beispiel: $f : [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ $x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{falls } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$	Man kann allgemeine Funktionen integrieren: $\int_0^1 f(x) dx = 0$
Uneigentliche Integrale müssen gesondert betrachtet werden: $\int_0^\infty f(x) dx := \lim_{l \rightarrow \infty} \int_0^l f(x) dx$	Uneigentliche Integrale sind einfach handhabbar.
Konvergiere $f_n \rightarrow f$, gegen was konvergiert das Integral? $\int_a^b f_n(x) dx \rightarrow ?$	Diese Frage ist mit den Lebesgueschen Integrationssätzen einfach zu entscheiden.
Funktionenräume $\mathcal{R}(I)$ Führe Norm ein: $\ f(I)\ = \int_a^b f(x) dx$ Aber $(\mathcal{R}(I), \ \cdot\)$ ist nicht vollständig.	L^p -Räume sind vollständig, also Banachräume. Zum Beispiel: $L^1([0,1]) =$ $= \left\{ f \text{ ist L.-intbar.} \wedge \int_0^1 f(x) dx < \infty \right\}$ Für die L^1 -Norm gilt: $\ f\ \geq 0$ $\ f\ = 0 \Rightarrow f = 0$ $\ f + g\ \leq \ f\ + \ g\ $ Aber: $f(x) = \begin{cases} 1 & x = 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$ $\int_{-1}^1 f(x) dx = ?$

Historischer Ursprung

Das Riemann-Integral geht auf NEWTON zurück, der sich mit folgender Thematik beschäftigte:

TODO: Bild: Sonne-Erde-Potential einfügen

Berechnung des Gravitationspotential der Sonne als Summe infinitesimal kleiner Punktquellen:

$$\Phi = \lim_{i \rightarrow \infty} \sum_i \frac{\Delta Q_i}{r_i}$$

Dieses Vorgehen wurde von RIEMANN mathematisch präzise gefasst und lieferte in der Mitte des 19. Jahrhunderts das Riemannsche Integral.

BOREL und LEBESGUE wählten am Anfang des 20. Jahrhunderts einen anderen Ansatz:

Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt, also $f(I) \subseteq [\alpha, \beta]$ für $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Zerlege den Bildbereich in Streifen, also y_0, \dots, y_n mit $y_0 = \alpha, y_n = \beta$ und $y_{k-1} < y_k$ sowie $J_k := [y_{k-1}, y_k]$ für $1 \leq k \leq n$.

TODO: Abbildung: Funktion mit Streifen

Es ist $f^{-1}(J_k) \in \mathbb{R}$ und man definiert ein „Maß“ $\mu(f^{-1}(J_k))$ dieser Menge. („Volumen“ oder „Länge“ des Intervalls)

Für stetige Funktionen liefert dies das Gleiche wie das Riemann-Integral, ist aber allgemeiner und hat viele Vorteile.

Sei $M \subseteq \mathbb{R}$ eine Teilmenge so ist

$$\mu : M \rightarrow \mathbb{R}_0^+$$

eine Abbildung, für die

$$\sum_{k=1}^n y_k \cdot \mu(f^{-1}(J_k)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \, dx$$

gegen das Lebesgue-Integral konvergiert.

Sie werden sich fragen: Für welche Mengen kann man sinnvoll ein Maß definieren? Wie geht das?

Für ein Intervall $K = [x_0, x_1]$ sollte gelten:

$$\mu(K) = |K| = x_1 - x_0$$

Für paarweise disjunkte Intervalle I_1, \dots, I_l mit $l \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ und

$$J = \bigcup_{k=1}^l I_k$$

sollte gelten:

$$\mu(J) = \sum_{k=1}^l \mu(I_k)$$

Geht das auch für beliebige, also unendliche Vereinigungen?

Sei I eine beliebige Indexmenge.

$$A := \bigcup_{\alpha \in I} I_\alpha$$

Vermutung:

$$\mu(A) = \sum_{\alpha \in I} \mu(I_\alpha)$$

Beispiel: $A = [0, 1]$

Dann soll $\mu(A) = 1$ gelten.

Sei $I = A$. Für $x \in I$ wähle $I_x := \{x\} = [x, x]$ und es gilt:

$$\mu(I_x) = |I_x| = 0$$

Aber:

$$A = \bigcup_{x \in I} I_x$$

$$1 = \mu(A) \stackrel{?}{=} \sum_{x \in I} \mu(I_x) = \sum_{x \in I} 0 = 0$$

Dies geht also nicht. Das Problem liegt bei der überabzählbaren Summe.

Um solche grundsätzlichen Probleme zu vermeiden, arbeitet man in der Maßtheorie immer nur mit *abzählbaren* oder endlichen Mengenoperationen.

Mit diesen Dingen im Hinterkopf führen wir nun einige abstrakte Begriffe ein.

1.1 Maßräume, Maße

1.1.1 Definition (σ -Algebra, Maßraum, messbare Menge)

Sei $X \neq \emptyset$ eine Menge (zum Beispiel $X \subseteq \mathbb{R}^n$).

Eine σ -Algebra \mathcal{M} über X ist eine Menge von Teilmengen von X , so dass gilt:

- i) $\emptyset \in \mathcal{M}$
- ii) $A \in \mathcal{M} \Rightarrow \mathbb{C}A := X \setminus A \in \mathcal{M}$
- iii) Ist $(A_j)_{j \in \mathbb{N}}$ eine abzählbare Familie von Mengen in \mathcal{M} , so ist auch ihre Vereinigung

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathcal{M}$$

ein Element von \mathcal{M} .

„ σ “ steht für abzählbar.

(X, μ) heißt *Maßraum* (Messraum, measurable space).

Die Elemente von \mathcal{M} heißen *messbare Mengen*.

1.1.2 Bemerkung

- Seien $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{M}$ gegeben, so bilde:

$$(B_k)_{k \in \mathbb{N}} := (A_1, \dots, A_n, A_n, \dots)$$

Nach iii) gilt:

$$\bigcup_{k=1}^n A_k = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} B_k \in \mathcal{M}$$

Damit sind *endliche* Vereinigungen von Elementen aus \mathcal{M} wieder messbar.

- Seien $A_k \in \mathcal{M}$ messbar für $k \in \mathbb{N}_{\geq 1}$. Dann folgt:

$$\mathbb{C} \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = \underbrace{\bigcup_{k=1}^{\infty} \left(\underbrace{\mathbb{C}A_k}_{\in \mathcal{M} \text{ (wg. ii)}} \right)}_{\in \mathcal{M} \text{ (wg. iii)}}$$

Also gilt:

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = \mathbb{C} \left(\mathbb{C} \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k \right) = \mathbb{C} \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} (\mathbb{C}A_k) \right) \in \mathcal{M}$$

Damit sind *abzählbare* Schnitte messbarer Mengen wieder messbar.

1.1.3 Beispiele (Erzeugnis, offene Menge, Topologie, Borelалgebra)

- a) $\mathcal{M} = \{\emptyset, X\}$ ist die kleinste σ -Algebra über X .

Die Potenzmenge $\mathcal{M} = \mathcal{P}(X)$ ist als „Menge aller Teilmengen“ die größte σ -Algebra über X .

Beide sind im Folgenden nicht interessant.

- b) Sei $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ ein beliebiges System von Teilmengen.

$\mathcal{M}(\mathcal{A})$ ist definiert als die kleinste σ -Algebra, die \mathcal{A} als Teilmenge enthält, und heißt *das Erzeugnis von \mathcal{A}* .

$$\mathcal{M}(\mathcal{A}) = \bigcap \{ \mathcal{M} \supseteq \mathcal{A} \text{ ist eine } \sigma\text{-Algebra} \}$$

- c) Sei $X = \mathbb{R}^n$. Definiere:

$\Omega \subseteq \mathbb{R}$ heißt *offen*, falls für alle $x \in \Omega$ ein $\varepsilon > 0$ mit $B_\varepsilon(x) \subseteq \Omega$ gibt.

$$\mathcal{O} = \{ \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \text{ ist offen} \}$$

heißt *Topologie*.

Führe jetzt *die von der Topologie erzeugte σ -Algebra $\mathcal{B} := \mathcal{M}(\mathcal{O})$, die Borelалgebra* ein. Man kann also auf jedem topologischen Raum eine kanonische σ -Algebra einführen.

Ein $A \in \mathcal{B}$ heißt *Borelmenge*.

Wegen $\mathcal{O} \subseteq \mathcal{B}$ ist jede offene Menge eine Borelmenge.

Jede abgeschlossene Menge A ist eine Borelmenge, denn $\mathbb{C}A$ ist offen, also ist $\mathbb{C}A$ eine Borelmenge und damit nach 1.1.1 ii) auch $A = \mathbb{C}(\mathbb{C}A)$.

Es gibt Borelmengen, die weder offen noch abgeschlossen sind, zum Beispiel ist die abgeschlossene Menge $[0,1] \in \mathcal{B}$ und auch die offene Menge $(2,3) \in \mathcal{B}$ und daher auch deren Vereinigung $[0,1] \cup (2,3) \in \mathcal{B}$, die aber weder offen noch abgeschlossen ist.

Anderes Beispiel: $[0,1] \cup (1,2) = [0,2) \in \mathcal{B}$

- d) Betrachte für $z \in \mathbb{Z}$ und $k \in \mathbb{N}$ die offenen Würfel:

$$W_{z,k} \left\{ x \in \mathbb{R}^n \left| \frac{z_j - 1}{2^{k+1}} < x_j < \frac{z_j + 1}{2^{k+1}} \right. \right\}$$

$$\mathcal{A} := \{ W_{z,k} | z \in \mathbb{Z} \wedge k \in \mathbb{N} \}$$

TODO: Abbildung Würfel

$\mathcal{M}(\mathcal{A})$ ist die von den Würfeln erzeugte σ -Algebra und wieder die Borelалgebra, denn sei $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ eine offene Teilmenge.

Schöpfe Ω durch abzählbar viele Würfel aus, also

$$\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} W_n \in \mathcal{A}$$

mit $W_n \in \mathcal{A}$.

TODO: Abbildung Ausschöpfung

Da eine σ -Algebra unter abzählbaren Mengenoperationen abgeschlossen ist, folgt $\Omega \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$. Es liegen also alle offenen Mengen in $\mathcal{M}(\mathcal{A})$.

Da \mathcal{B} die *kleinste* σ -Algebra ist, die alle offenen Mengen enthält, folgt $\mathcal{B} = \mathcal{M}(\mathcal{A})$.

Genauer in einer Dimension:

Sei $X = \mathbb{R}$. Ist $k \in \mathbb{N}$ gegeben, so bilde das Gitter:

$$2^{-k+1} \cdot \mathbb{Z} = \left\{ \frac{l}{2^{k+1}} \mid l \in \mathbb{Z} \right\}$$

Für $l \in \mathbb{Z}$ definiere:

$$W_{l,k} = \left((l-1) \cdot 2^{-k+1}, (l+1) \cdot 2^{-k+1} \right)$$

TODO: Abbildung eindimensionales Gitter

Dann ist

$$W_k = \{W_{l,k} \mid l \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R})$$

abzählbar und auch

$$W := \bigcup_{k=1}^{\infty} W_k$$

ein abzählbares Mengensystem.

Behauptung

Die Würfel erzeugen bereits die gesamte Borel algebra:

$$\mathcal{M}(W) = \mathcal{B}$$

Beweis

Offensichtlich ist $\mathcal{M}(W) \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{O}) = \mathcal{B}$.

Zu zeigen ist, dass $\mathcal{M}(W)$ alle offenen Mengen enthält.

Sei also $\Omega \subseteq \mathbb{R}$ offen. Dann ist

$$A = \bigcup \{U \subseteq \Omega \mid U \in W\}$$

ist eine abzählbare Vereinigung von Würfeln, also ist $A \in \mathcal{M}(W)$.

Es gilt:

$$A = \Omega$$

$A \subseteq \Omega$ ist klar, da $U \subseteq \Omega$ ist.

Umgekehrt ist $A \supseteq \Omega$, denn für $x \in \Omega$ gibt es ein $\varepsilon > 0$ mit $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \in \Omega$.

Wähle k so groß, dass $2^{-k} < \frac{\varepsilon}{4}$ ist.

TODO: Abbildung Zahlenstrahl

Dann gibt es ein $l \in \mathbb{Z}$ mit $x \in W_{l,k}$, also ist $A = \Omega$.

Daher ist $A = \Omega \in \mathcal{M}(W)$ und somit folgt

$$\mathcal{M}(\mathcal{O}) \subseteq \mathcal{M}(W) \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{O})$$

Also ist $\mathcal{M}(W) = \mathcal{M}(\mathcal{O})$.

□ Behauptung

Alle Borelmengen sollten also messbar sein.

Betrachte auf topologischen Räumen, sofern nichts anderes gesagt wird, stets die Borelalgebra als σ -Algebra.

1.1.4 Definition (Erzeugendensystem, messbare Abbildung)

Eine Teilmenge $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}$ heißt *Erzeugendensystem* von \mathcal{M} , falls $\mathcal{M}(\mathcal{A}) = \mathcal{M}$ ist.

Eine Abbildung $f : X \rightarrow Y$ zwischen Maßräumen (X, \mathcal{M}) und (Y, \mathcal{M}') heißt *messbar*, falls das Urbild messbarer Mengen messbar ist.

Bemerkung

Die Definition der Messbarkeit hat Ähnlichkeit mit der Definition der Stetigkeit:

Eine Abbildung $f : X \rightarrow Y$ heißt *stetig*, falls das Urbild *offener* Mengen *offen* ist.

1.1.5 Beispiel

- W ist ein Erzeugendensystem der Borelalgebra von \mathbb{R} .
- Nach Definition ist jede stetige Funktion automatisch messbar, denn es gilt:
Sei $f : X \rightarrow Y$ stetig, dann ist für jede offene Menge Ω nach Definition auch $f^{-1}(\Omega)$ offen.
Beachte für Mengen $V, V_j \subseteq Y$ mit $j \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} f^{-1}\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} V_j\right) &= \bigcup_{j=1}^{\infty} f^{-1}(V_j) \\ f^{-1}(\mathbb{C}V) &= \mathbb{C}f^{-1}(V) \end{aligned}$$

Die Mengenoperatoren sind also mit dem Bilden des Urbilds verträglich.

Sei $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}(Y)$ messbar, also in $\mathcal{B}(Y)$. Dann ist $f^{-1}(\mathcal{A}) \in \mathcal{B}(X)$, also ist f tatsächlich messbar.

1.1.6 Satz (Messbarkeit ist transitiv)

Seien X ein Maßraum und Y, Z topologische Räume mit zugehöriger Borelalgebra.

Ist $f : X \rightarrow Y$ messbar und $g : Y \rightarrow Z$ messbar, so ist $g \circ f : X \rightarrow Z$ messbar.

Beweis

Zu zeigen ist, dass für alle messbaren $A \subseteq Z$ schon $(g \circ f)^{-1}(A)$ messbar ist.

Es genügt wieder A in einem Erzeugendensystem zu betrachten. Wähle als solches die offenen Mengen.

Sei also $A \in \mathcal{O}$, dann ist $g^{-1}(A)$ messbar, weil g messbar ist und daher auch

$$f^{-1}(g^{-1}(A)) = (f^{-1} \circ g^{-1})(A) = (g \circ f)^{-1}(A)$$

messbar, weil f messbar ist.

Insgesamt ist also $g \circ f$ messbar.

□_{1.1.6}**1.1.7 Bemerkung und Definition** (Kompaktifizierung)

Betrachte im Folgenden \mathbb{R} , \mathbb{R}^n mit $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ oder *die Kompaktifizierung der reellen Zahlen* $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$.

$$\mathcal{O} = \langle \{\text{offene Teilmengen von } \mathbb{R}\} \cup \{(a, \infty] | a \in \mathbb{R}\} \cup \{[-\infty, a) | a \in \mathbb{R}\} \rangle$$

Dies ist die von diesen Mengen erzeugte Topologie.

Konkreter: Bilde die Bijektion

$$\phi : \overline{\mathbb{R}} \rightarrow [-1, 1]$$

$$x \mapsto \begin{cases} \tanh(x) & x \in \mathbb{R} \\ +1 & x = +\infty \\ -1 & x = -\infty \end{cases}$$

TODO: Abbildung Kompaktifizierung

Betrachte auf $\overline{\mathbb{R}}$ die Topologie, die von ϕ induziert wird, also ist $\Omega \subseteq \overline{\mathbb{R}}$ genau dann offen, wenn $\phi(\Omega) \subseteq [-1, 1]$ offen ist.

1.1.8 Satz (Messbarkeit)

Sei X ein Maßraum.

- i) $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ ist genau dann messbar, wenn für jedes $a \in \mathbb{Q}$ die Mengen mit $\{x | f(x) > a\}$ messbar sind.
- ii) $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ ist genau dann messbar, wenn ihre Komponenten messbar sind.
- iii) Die messbaren Abbildungen $X \rightarrow \mathbb{R}^n$ bilden einen Vektorraum.
- iv) Ist $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ messbar, so ist auch $|f| : X \rightarrow \mathbb{R}_0^+$.
Sind $g, h : X \rightarrow \mathbb{R}$ messbar, so auch ihr Produkt $g \cdot h : X \rightarrow \mathbb{R}$.

Beweis

i) „ \Rightarrow “: Ist klar, da $\{x|f(x) > a\} = f^{-1}((a, \infty])$ als Urbild einer messbaren Menge messbar ist.

„ \Leftarrow “: Seien $a < b \in \mathbb{R}$. Auf $\overline{\mathbb{R}}$ betrachten wir die Borelalgebra, die von den offenen Intervallen und $(a, \infty], [-\infty, a)$ erzeugt wird.

Wir betrachten ein möglichst einfaches Erzeugendensystem:

$$\mathcal{E} = \{(a, \infty] | a \in \mathbb{R}\}$$

Es ist $[-\infty, a] \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$, da Komplemente gebildet werden können.

Es ist $[-\infty, a) = [-\infty, a-1] \cup (a-2, a) \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$, da Vereinigungen gebildet werden können.

Es ist $(a, b] = [-\infty, b] \cap (a, \infty) \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$ und $(a, b) = [-\infty, b) \cap (a, \infty) \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$, da Schnitte gebildet werden können.

Also ist $\mathcal{M}(\mathcal{E}) = \mathcal{B}$.

Betrachte nun $\mathcal{E}_{\mathbb{Q}} = \{(a, \infty] | a \in \mathbb{Q}\}$.

Behauptung

$$\mathcal{M}(\mathcal{E}_{\mathbb{Q}}) = \mathcal{M}(\mathcal{E}) = \mathcal{B}$$

Beweis

Man muss zeigen, dass $\mathcal{M}(\mathcal{E}_{\mathbb{Q}}) \supseteq \mathcal{M}(\mathcal{E})$ ist.

Sei also $(a, \infty]$ und $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, so wähle eine Folge $a_n \in \mathbb{Q}$ mit $a_n \searrow a$.

$$(a, \infty] = \bigcup_{n=1}^{\infty} \underbrace{(a_n, \infty]}_{\in \mathcal{E}_{\mathbb{Q}}} \in \mathcal{M}(\mathcal{E}_{\mathbb{Q}})$$

□ Behauptung

Weil für $V, V_j \in \overline{\mathbb{R}}$ für $j \in \mathbb{N}$ schon

$$\begin{aligned} f^{-1}\left(\bigcup_j V_j\right) &= \bigcup_j f^{-1}(V_j) \\ f^{-1}(\mathbb{C}V) &= \mathbb{C}f^{-1}(V) \end{aligned}$$

gilt, brauchen wir die Messbarkeit von $f^{-1}(\Omega)$ nur für alle Ω eines Erzeugendensystems zeigen.

$$f^{-1}((a, \infty]) = \{x | f(x) > a\}$$

ist aber nach Voraussetzung messbar, also f messbar.

□_{i)}

ii) „ \Leftarrow “: Es genügt wieder ein Erzeugendensystem von $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ beziehungsweise $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ zu betrachten.

Sei $z \in \mathbb{Z}^n$, dann ist

$$W_{z,k} = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \left| \frac{z_l - 1}{2^{k+1}} < x_l < \frac{z_l + 1}{2^{k+1}}, l \in \{1, \dots, n\} \right. \right\}$$

ein Würfel mit der Kantenlänge 2^{-k} .

$$\begin{aligned} f^{-1}(W_{z,k}) &= \{x \in X \mid f(x) \in W_{z,k}\} = \left\{ x \in X \left| \frac{z_l - 1}{2^{k+1}} < f_l(x) < \frac{z_l + 1}{2^{k+1}}, l \in \{1, \dots, n\} \right. \right\} = \\ &= \bigcap_{l=1}^n \left\{ x \in X \left| f_l(x) \in \left(\frac{z_l - 1}{2^{k+1}}, \frac{z_l + 1}{2^{k+1}} \right) \right. \right\} = \bigcap_{l=1}^n f_l^{-1} \left(\left(\frac{z_l - 1}{2^{k+1}}, \frac{z_l + 1}{2^{k+1}} \right) \right) \end{aligned}$$

Nehme an, die $f_l : X \rightarrow \mathbb{R}$ sind messbar. Dann ist

$$f_l^{-1} \left(\left(\frac{z_l - 1}{2^{k+1}}, \frac{z_l + 1}{2^{k+1}} \right) \right)$$

messbar und somit auch:

$$\bigcap_{l=1}^n f_l^{-1} \left(\left(\frac{z_l - 1}{2^{k+1}}, \frac{z_l + 1}{2^{k+1}} \right) \right) = f^{-1}(W_{z,k})$$

Daher ist $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ messbar.

„ \Rightarrow “: Sei f messbar. Dann ist

$$f_l^{-1}((a,b)) = f^{-1} \left(\overbrace{\mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R} \times \underbrace{(a,b)}_{l\text{-tes Argument}} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}^{\text{ist offen in } \mathbb{R}^n} \right)$$

messbar, da f messbar ist.

□_{ii)}

iii) Für messbare Abbildungen $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ ist auch

$$\begin{aligned} (f, g) : X &\rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \\ x &\mapsto (f(x), g(x)) \end{aligned}$$

messbar und für $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ist die Abbildung

$$\begin{aligned} \langle + \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ (x, y) &\mapsto \alpha x + \beta y \end{aligned}$$

stetig, also insbesondere messbar. Nach 1.1.6 ist dann auch die Verkettung

$$\begin{aligned} \langle + \rangle \circ (f, g) : X &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ x &\mapsto \alpha f(x) + \beta g(x) \end{aligned}$$

messbar.

□_{iii)}

iv) Es folgt mit 1.1.6 analog zu iii) für messbare Abbildungen $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ und $g, h : X \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} |f| : X &\xrightarrow{\text{messbar}} \mathbb{R}^n \xrightarrow{\text{stetig}} \mathbb{R} \\ x &\xrightarrow{\text{messbar}} f(x) \xrightarrow{\text{stetig}} |f(x)| \\ g \cdot h : X &\xrightarrow{\text{messbar}} \mathbb{R} \times \mathbb{R} \xrightarrow{\text{stetig}} \mathbb{R} \\ x &\xrightarrow{\text{messbar}} (g(x), h(x)) \xrightarrow{\text{stetig}} g(x) \cdot h(x) \end{aligned}$$

□_{1.1.8}

Bemerkung

ii) ist sehr nützlich, weil wir uns daher im Folgenden oft auf reelle Funktionen beschränken können.

Schön ist, dass Messbarkeit sich auf Grenzwerte überträgt.

1.1.9 Satz (Limes ist messbar)

- i) Sei $f_n : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ eine Folge messbarer Funktionen, so sind auch die punktweise definierten Funktionen

$$\sup_n f_n, \inf_n f_n, \limsup_n f_n, \liminf_n f_n$$

messbar.

- ii) Konvergiert $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ punktweise gegen f , so ist f auch messbar.

Beweis

- i) Zu zeigen ist nach 1.1.8 i), dass für jedes $a \in \mathbb{Q}$ schon $\{x \mid (\sup_n f_n)(x) > a\}$ messbar ist. Die Menge

$$\left\{x \mid \left(\sup_n f_n\right)(x) > a\right\} = \left\{x \mid \sup_n (f_n(x)) > a\right\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \underbrace{\{x \mid f_n(x) > a\}}_{\text{messbar, da } f \text{ messbar ist}}$$

ist als Vereinigung messbarer Mengen wieder messbar.

Für $\inf_n f_n$ folgt analog:

$$\left\{x \mid \left(\inf_n f_n\right)(x) > a\right\} = \left\{x \mid \inf_n (f_n(x)) > a\right\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \underbrace{\{x \mid f_n(x) > a\}}_{\text{messbar, da } f \text{ messbar ist}}$$

Dieser Schnitt messbarer Mengen ist wieder messbar.

Außerdem ist

$$\limsup_n f_n = \inf_{j \in \mathbb{N}} \sup_{n \geq j} f_n$$

als Verkettung von messbaren Funktionen messbar.

Für den Limes inferior folgt die Behauptung analog.

□_{i)}

ii) Sei f_n punktweise konvergent. Dann ist

$$f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

nach i) messbar.

□_{1.1.9}

1.1.10 Definition (Stufenfunktion)

Eine messbare Funktion $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$, die nur endlich viele Werte annimmt, heißt *Stufenfunktion*.

TODO: Abbildung Stufenfunktion einfügen

1.1.11 Satz

Ist $f : X \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ messbar, so gibt es eine aufsteigende Folge von Stufenfunktionen φ_n , die punktweise gegen f konvergiert.

Beweis

$$\varphi_j(x) := \begin{cases} (k-1) \cdot 2^{-j} & \text{falls } \exists k \in \mathbb{N}_{< j \cdot 2^j} : (k-1) \leq f(x) \cdot 2^j \leq k \\ j & f(x) > j \end{cases}$$

hat offensichtlich die gewünschten Eigenschaften.

Die punktweise Konvergenz $\varphi_j \rightarrow f$ ist klar.

TODO: Skizze erstellen

Bemerkung

Der Limes ist sogar gleichmäßig.

□_{1.1.11}

1.1.12 Korollar (Approximation durch Stufenfunktionen)

$f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ ist genau dann messbar, wenn f punktwieser Limes von Stufenfunktionen ist.

Beweis

„ \Leftarrow “: Diese Aussage folgt direkt aus Satz 1.1.9 ii).

„ \Rightarrow “: Nach Satz 1.1.8 ii) genügt es den Fall $n = 1$ zu betrachten. Setze:

$$f_+ := \max(f, 0) \qquad f_- := \max(-f, 0)$$

Dann ist $f = f_+ - f_-$.

f_+ und f_- sind analog zu 1.1.8 iv) messbar, da gilt:

$$\begin{aligned} f_+ &= \frac{1}{2} (f + |f|) \\ f_- &= \frac{1}{2} (|f| - f) \end{aligned}$$

Approximiere sie nun gemäß Satz 1.1.11 durch Stufenfunktionen.

□_{1.1.12}

1.1.13 Definition (Maß)

Ein *Maß* auf einem Maßraum (X, \mathcal{M}) ist eine Funktion

$$\mu : \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$$

mit den folgenden Eigenschaften:

- i) $\mu(\emptyset) = 0$
- ii) Ist $(M_j)_{j \in \mathbb{N}}$ eine Folge paarweise disjunkter messbarer Mengen, so gilt:

$$\mu\left(\underbrace{\bigcup_{j=1}^{\infty} M_j}_{\in \mathcal{M}}\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(M_j)$$

Diese Eigenschaft nennt man σ -Additivität.

(X, \mathcal{M}, μ) heißt auch Messraum mit Maß.

1.1.14 Beispiele

- i) $\mathcal{M} = \{\emptyset, X\}$, $\mu(\emptyset) = 0$, $\mu(X) \in [0, \infty]$ kann beliebig gewählt werden, zum Beispiel $\mu(X) = 1$.
- ii) $\mathcal{M} = \mathcal{P}(X)$; Sei $p \in X$.

$$\mu_p(A) := \begin{cases} 1 & \text{falls } p \in A \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Dies ist das sogenannte Dirac-Maß $\delta(x - p) dx$.

- iii) Sei $X = \{1, \dots, n\}$ eine endliche Menge und $\mathcal{M} = \mathcal{P}(X)$. Verwende das Zählmaß:

$$\mu(A) := \#A$$

1.1.15 Satz

Es gilt für alle $n \in \mathbb{N}$ für alle $A_n \in \mathcal{M}$.

- a) Ist $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, so folgt die Additivität:

$$\mu(A_1 \dot{\cup} A_2) = \mu(A_1) + \mu(A_2)$$

- b) Monotonie:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

- c) Für eine aufsteigende Folge $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$ messbarer Mengen gilt:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$$

Beweis

a) Setze $A_3 = A_4 = \dots = \emptyset$. Aus der σ -Additivität folgt:

$$\mu(A_1 \dot{\cup} A_2) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \mu(A_1) + \mu(A_2)$$

□_{a)}

b) Setze $B_1 = A_1$ und für $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$:

$$B_n := A_n \setminus \{A_1 \cup \dots \cup A_{n-1}\}$$

TODO: Abbildung von B_n einfügen

Die B_n sind nach Konstruktion paarweise disjunkt und es gilt:

$$\begin{aligned} \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n &= \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \\ \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) &= \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) \stackrel{\sigma\text{-Additivität}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) \end{aligned}$$

Letzteres folgt, da gilt:

$$\mu(A_n) = \mu(B_n \dot{\cup} A_n \setminus B_n) \stackrel{\text{a)}}{=} \mu(B_n) + \underbrace{\mu(A_n \setminus B_n)}_{\geq 0} \geq \mu(B_n)$$

□_{b)}

c) Setze B_n wie in b), so folgt wegen $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$ schon $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$. Es folgt:

$$\mu(A_n) = \mu(B_1 \dot{\cup} \dots \dot{\cup} B_n) = \sum_{j=1}^n \underbrace{\mu(B_j)}_{\geq 0}$$

$(\mu(A_n))_{n \in \mathbb{N}}$ ist eine monoton steigende Folge, womit folgt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(B_j) = \mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} B_j\right) = \mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right)$$

□_{1.1.15}

1.2 Konstruktion des eindimensionalen Lebesgue-Maßes

Ziel

Konstruiere ein Maß auf der Borelmenge von \mathbb{R} .

Höhere Dimensionen werden später auf das eindimensionale Maß zurückgeführt.

Das Maß soll die „Länge eines Intervalls“ verallgemeinern.

Ursprünge

HENRI LEON LEBESGUE (1875-1941): Doktorarbeit (1902)

BOREL: Konstruktion „zu Fuß“

CARATHEODORY: Maßerweiterungen (1918); „unser Zugang“:

Idee

Beginne mit „einfachen“ Mengensystemen \mathcal{A} :

Sei $X = \mathbb{R}$. Betrachte endliche Vereinigung beschränkter Intervalle:

$A \in \mathcal{A}$ ist darstellbar als eine disjunkte Vereinigung beschränkter Intervalle $I_k \subseteq \mathbb{R}$ mit $|I_k| < \infty$ für $1 \leq k \leq n$:

$$A = I_1 \dot{\cup} \dots \dot{\cup} I_n$$

Führe das Maß ein:

$$\mu(A) = |I_1| + \dots + |I_n|$$

Bemerkung

Beachte, dass (X, \mathcal{A}, μ) kein Maßraum ist, da \mathcal{A} keine σ -Algebra ist.

1.2.1 Lemma (Maßregeln) und Definition (Mengenalgebra, σ -Additivität, Prämaß)

Sei (X, \mathcal{A}, μ) wie oben.

i) \mathcal{A} ist eine *Mengenalgebra*, das heißt:

$$\begin{aligned} \emptyset &\in \mathcal{A} \\ A, B \in \mathcal{A} &\Rightarrow A \cup B, A \cap B, A \setminus B \in \mathcal{A} \end{aligned}$$

ii) μ ist *additiv*, das heißt:

$$\mu(A \dot{\cup} B) = \mu(A) + \mu(B)$$

iii) μ ist *σ -additiv*, das heißt für $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit paarweise disjunkten $A_n \in \mathcal{A}$ und falls

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n =: A$$

in \mathcal{A} liegt, gilt:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

iv) μ ist *σ -endlich*, das heißt, es gibt für $n \in \mathbb{N}$ schon $S_n \in \mathcal{A}$ mit $\mu(S_n) < \infty$ und:

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$$

Man nennt μ mit diesen Eigenschaften auch ein *Prämaß auf \mathcal{A}* und (X, \mathcal{A}, μ) ein *Prämaß*.

Beweis

- i) Ist klar.
- ii) Ist klar.
- iii) Setze $B_n := A \setminus (A_1 \cup \dots \cup A_n)$.

Dann ist wegen $A \in \mathcal{A}$ nach Voraussetzung und i) mehrfach angewendet $B_n \in \mathcal{A}$.

$$B_n \supseteq B_{n+1} \supseteq \dots$$

ist eine absteigende Folge von Mengen und es gilt:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = \emptyset$$

Zu zeigen ist:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = 0$$

Denn es gilt:

$$\mu(B_n) = \mu(A) - \sum_{k=1}^n \mu(A_k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \Rightarrow \quad \mu(A) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$$

Sei $\varepsilon > 0$, so wähle kompakte $C_n \subseteq B_n$ mit

$$\mu(B_n \setminus C_n) < \frac{\varepsilon}{2^n}$$

zum Beispiel endlich viele kompakte Intervalle.

TODO: Abbildung B_n

Setze $D_n = C_1 \cap \dots \cap C_n$.

Dann ist $D_n \subseteq B_n$ und es gilt:

$$B_n \setminus D_n = \bigcup_{k=1}^n (B_n \setminus C_k) \subseteq \bigcup_{k=1}^n (B_k \setminus C_k)$$

Damit folgt wegen der Monotonie bei endlichen Mengenoperationen:

$$\mu(B_n \setminus D_n) \leq \sum_{k=1}^n \frac{\varepsilon}{2^k} < \varepsilon \cdot \left(\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^k - 1 \right) = \varepsilon \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}} - 1 \right) = \varepsilon$$

Also sind die D_n kompakt und steigen ab:

$$D_n \supseteq D_{n+1} \supseteq \dots \supseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} D_n = \emptyset$$

Letzteres folgt aus:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} D_n \subseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = \emptyset$$

Deswegen gibt es ein N mit $D_N = \emptyset$, denn ansonsten wähle beliebige $x_n \in D_n$ und diese besitzen einen Häufungspunkt $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} D_n$.

Also folgt

$$\mu(D_n) = 0$$

und damit ergibt sich

$$\mu(B_n) = \underbrace{\mu(D_n)}_{=0} + \underbrace{\mu(B_n \setminus D_n)}_{< \varepsilon} < \varepsilon$$

und es gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = 0$$

iv) Wähle $S_n = (-n, n) \in \mathcal{A}$.

□_{1.2.1}

1.2.2 Bemerkung

Beachte, dass im Allgemeinen nicht jede abzählbare Vereinigung von Mengen aus \mathcal{A} schon in \mathcal{A} liegt, da \mathcal{A} keine σ -Algebra, sondern nur eine Mengenalgebra ist.

Die σ -Additivität gilt nur unter folgender zusätzlichen Annahme:

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$$

Im Folgenden ist unser Ziel, das Prämaß zu einem Maß zu erweitern.

1.2.3 Theorem (Satz von Hahn über Maßerweiterungen)

Sei (X, \mathcal{A}, μ) ein Prämaß.

Dann lässt sich μ *eindeutig* zu einem Maß auf der von \mathcal{A} erzeugten σ -Algebra $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ *erweitern* und es gilt für $M \in \mathcal{M} := \mathcal{M}(\mathcal{A})$:

$$\mu(M) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) \mid \forall_{n \in \mathbb{N}} : A_n \in \mathcal{A} \wedge M \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right\}$$

TODO: Abbildung: Überdeckung von M

Bemerkung

Dieser Satz ist recht tief gehend und hat sich über längere Zeit unter Mitwirkung von LEBESGUE, BOREL und CARATHEODORY entwickelt.

Der Beweis geht in mehreren Schritten.

1.2.4 Definition (äußeres Maß)

Sei \mathcal{N} eine σ -Algebra auf X .

Ein *äußeres Maß* auf \mathcal{N} ist eine Abbildung

$$\mu^* : \mathcal{N} \rightarrow [0, \infty]$$

mit den folgenden Eigenschaften:

i) $\mu^*(\emptyset) = 0$

ii) Monotonie: Für $A, B \in \mathcal{N}$ gilt:

$$A \subseteq B \quad \Rightarrow \quad \mu^*(A) \leq \mu^*(B)$$

iii) Ist $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge in \mathcal{N} , so gilt:

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} Y_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(Y_n)$$

Beachte: Die σ -Additivität muss hier nicht gelten!

1.2.5 Lemma

Unter den Voraussetzungen von Theorem 1.2.3 definiert

$$\mu^*(Y) := \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) \mid \forall_{n \in \mathbb{N}} : A_n \in \mathcal{A} \wedge Y \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right\} \quad (1.1)$$

ein äußeres Maß auf $\mathcal{N} := \mathcal{P}(X)$.

Es gilt für alle $A \in \mathcal{A}$:

$$\mu^*(A) = \mu(A) \quad (1.2)$$

Beweis

Zunächst zum Beweis von (1.2):

Sei $A \in \mathcal{A}$ gegeben, dann gilt:

$$A = \underbrace{A}_{=: A_1} \cup \underbrace{\emptyset}_{=: A_2} \cup \underbrace{\emptyset}_{=: A_3} \cup \dots$$

Und es folgt, weil in der Definition des äußeren Maßes in (1.1) ein Infimum gebildet wird:

$$\mu^*(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \mu(A)$$

Umgekehrt wähle für ein beliebiges $\varepsilon > 0$ eine Folge $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $A_n \in \mathcal{A}$,

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \supseteq A$$

und:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) \leq \mu^*(A) + \varepsilon \quad (1.3)$$

Dies ist möglich, da das Infimum $\mu^*(A)$ beliebig genau durch ein Element $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$ der bestimmenden Menge genähert werden kann.

Wegen $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap A) \in \mathcal{A}$ kann man die σ -Additivität verwenden und es folgt:

$$\mu(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n \cap A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) \leq \mu^*(A) + \varepsilon$$

Weil dies für alle $\varepsilon > 0$ gilt, folgt $\mu(A) \leq \mu^*(A)$.

Insgesamt gilt also $\mu(A) = \mu^*(A)$.

Zeige nun, dass μ^* ein äußeres Maß ist.

i) $\mu^*(\emptyset) = 0$ ist klar nach der Definition: Wähle als Überdeckung $\emptyset \cup \emptyset \cup \dots$

ii) Monotonie: Sei $A \subseteq B$. Wegen $A \subseteq B$ gilt

$$\left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n) \mid \forall_{n \in \mathbb{N}} : B_n \in \mathcal{A} \wedge B \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right\} \subseteq \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) \mid \forall_{n \in \mathbb{N}} : A_n \in \mathcal{A} \wedge A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right\} \quad (1.4)$$

und es folgt:

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &= \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) \mid \forall_{n \in \mathbb{N}} : A_n \in \mathcal{A} \wedge A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right\} \leq \\ &\stackrel{(1.4)}{\leq} \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n) \mid \forall_{n \in \mathbb{N}} : B_n \in \mathcal{A} \wedge B \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right\} = \mu^*(B) \end{aligned}$$

iii) Sei $(Y_j)_{j \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathcal{N} = \mathcal{P}(X)$, also nicht in \mathcal{A} .

Wähle $A_{jn} \in \mathcal{A}$ für alle $n \in \mathbb{N}$, so dass

$$Y_j \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_{jn}$$

ist und gilt:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_{jn}) \leq \mu^*(Y_j) + \frac{\varepsilon}{2^j}$$

Dies ist aufgrund der Definition des äußeren Maßes immer möglich.

Dann ist

$$Y := \bigcup_{j=1}^{\infty} Y_j \subseteq \bigcup_{j,n=1}^{\infty} A_{jn}$$

und es gilt:

$$\mu^*(Y) \stackrel{\substack{\text{Def. des} \\ \text{äußeren Maßes}}}{\leq} \underbrace{\sum_{n,j=1}^{\infty} \mu(A_{nj})}_{\text{auch abzählbar}} \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(Y_j) + \varepsilon$$

Da ε beliebig ist, folgt:

$$\mu^*(Y) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(Y_n)$$

□_{1.2.5}

1.2.6 Bemerkung

Der große Nachteil des äußeren Maßes ist, dass es nicht σ -additiv ist.

Idee

Wähle ein System von Teilmengen so aus, dass dieses System eine σ -Algebra bildet und außerdem die Einschränkung des äußeren Maßes σ -additiv wird, also ein Maß definiert.

1.2.7 Definition (μ^* -messbar)

Sei μ^* ein äußeres Maß auf $\mathcal{P}(X)$.

Eine Teilmenge $A \subseteq X$ heißt μ^* -messbar, wenn für jede Teilmenge $Z \subseteq X$ gilt:

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \setminus A)$$

Bemerkung

Also „zerlegt“ man eine beliebige Teilmenge Z mit Hilfe von A , so gilt die Additivität.

TODO: Abbildung $A, Z \subseteq X$ einfügen

1.2.8 Lemma (Caratheodory)

Seien μ^* ein äußeres Maß auf $\mathcal{P}(X)$ und \mathcal{M} das System der μ^* -messbaren Mengen von X .

Dann ist \mathcal{M} eine σ -Algebra und μ^* ein Maß auf \mathcal{M} .

Beweis

Gehe schrittweise vor.

– $\emptyset \in \mathcal{M}$ ist klar, wegen:

$$\begin{aligned} Z &= \underbrace{(Z \cap \emptyset)}_{=\emptyset} \dot{\cup} \underbrace{(Z \setminus \emptyset)}_{=Z} \\ \mu^*(Z) &= \underbrace{\mu^*(Z \cap \emptyset)}_{=0} + \mu^*(Z \setminus \emptyset) \end{aligned}$$

- Sei $A \in \mathcal{M}$, das heißt es gilt für alle $Z \subseteq X$:

$$\mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \setminus A) = \mu^*(Z \setminus \complement A) + \mu^*(Z \cap \complement A)$$

Also ist auch $\complement A$ μ^* -messbar, das heißt $\complement A \in \mathcal{M}$.

- Seien $A, B \in \mathcal{M}$ und $Z \subseteq X$ beliebig.

Es genügt $A' = A \cap Z$ und $B' = B \cap Z$ zu betrachten.

TODO: Abbildung A', B', Z einfügen

Da B bereits μ^* -messbar ist, gilt für alle $\tilde{Z} \subseteq X$:

$$\mu^*(Z) = \mu^*(\tilde{Z} \cap B) + \mu^*(\tilde{Z} \setminus B)$$

Wähle $\tilde{Z} = A'$, dann gilt

$$\tilde{Z} \cap B = A' \cap B = (A \cap Z) \cap B = A \cap Z \cap B = (A \cap Z) \cap (B \cap Z) = A' \cap B'$$

$$\tilde{Z} \setminus B = A' \setminus B = (A \cap Z) \setminus B = (A \cap Z) \setminus (B \cap Z) = A' \setminus B'$$

und es folgt:

$$\mu^*(A' \cap B') + \mu^*(A' \setminus B') = \mu^*(A')$$

Wegen der μ^* -Messbarkeit von A folgt:

$$\mu^*(A') + \mu^*(Z \setminus A) = \mu^*(Z)$$

Addiere jetzt die beiden Gleichungen:

$$\begin{aligned} \mu^*(A' \cap B') + \mu^*(A' \setminus B') + \mu^*(A') + \mu^*(Z \setminus A) &= \mu^*(A') + \mu^*(Z) \\ \mu^*(A' \cap B') + \underbrace{\mu^*(A' \setminus B') + \mu^*(Z \setminus A)}_{\stackrel{?}{=} \mu^*(Z \setminus (A' \cap B'))} &= \mu^*(Z) \end{aligned}$$

Verwende nochmals die μ^* -Messbarkeit von A für $\tilde{Z} := Z \setminus (A' \cap B')$:

$$\mu^*\left(\underbrace{A \cap (Z \setminus (A' \cap B'))}_{=A' \setminus B'}\right) + \mu^*\left(\underbrace{(Z \setminus (A' \cap B')) \setminus A}_{=Z \setminus A'}\right) = \mu^*(Z \setminus (A' \cap B'))$$

Daher ist $A \cap B \in \mathcal{M}$.

- Für $A, B \in \mathcal{M}$ sind dann auch

$$\begin{aligned} A \setminus B &= A \cap \complement B \\ A \cup B &= \complement(\complement A \cap \complement B) \end{aligned}$$

in \mathcal{M} .

Wir wissen also, dass \mathcal{M} eine Mengenalgebra ist.

- Additivität: Seien $A, B \in \mathcal{M}$ disjunkte Mengen, dann folgt für $\tilde{Z} := Z^* := Z \cap (A \dot{\cup} B)$:

$$\begin{aligned}\mu^*(Z^*) &= \mu^*(Z^* \cap A) + \mu^*(Z^* \setminus A) = \\ &= \mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \cap B)\end{aligned}$$

Verwende dabei, dass A und B disjunkt sind.

Setze $Z = X$, so folgt:

$$\mu^*(A \dot{\cup} B) = \mu^*(A) + \mu^*(B)$$

Wegen $A \dot{\cup} B \dot{\cup} C = (A \dot{\cup} B) \dot{\cup} C$ für $C \in \mathcal{M}$ folgt per Induktion für $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{M}$:

$$\mu^*(Z \cap (A_1 \dot{\cup} \dots \dot{\cup} A_n)) = \mu^*(Z \cap A_1) + \dots + \mu^*(Z \cap A_n)$$

- Zeige, dass \mathcal{M} eine σ -Algebra ist:

Sei $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge paarweiser disjunkter Teilmengen in \mathcal{M} mit:

$$A := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{M}$$

Das heißt, es gilt für alle $Z \subseteq X$:

$$\mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \setminus A) = \mu^*(Z)$$

Sei also $Z \subseteq X$. Dann ist für jedes $n \in \mathbb{N}$ schon

$$A_1 \dot{\cup} \dots \dot{\cup} A_n \in \mathcal{M}$$

und deshalb gilt:

$$\begin{aligned}\mu^*(Z) &= \mu^*(Z \cap (A_1 \dot{\cup} \dots \dot{\cup} A_n)) + \mu^*(Z \setminus (A_1 \dot{\cup} \dots \dot{\cup} A_n)) \geq \\ &\geq \sum_{k=1}^n \underbrace{\mu^*(Z \cap A_k)}_{\geq 0} + \mu^*(Z \setminus A)\end{aligned}$$

Verwende dabei:

$$\begin{aligned}A &\supseteq A_1 \dot{\cup} \dots \dot{\cup} A_n \\ \mu^*(Z \setminus A) &\leq \mu^*(Z \setminus (A_1 \dot{\cup} \dots \dot{\cup} A_n))\end{aligned}$$

Da $n \in \mathbb{N}$ beliebig ist, folgt wegen $Z \cap A = \bigcup_{k=1}^{\infty} Z \cap A_k$ und

$$\mu^*(Z \cap A) = \inf \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(Z \setminus B_k)$$

mit $Z \cap A \supseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k$:

$$\begin{aligned}\mu^*(Z) &\geq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(Z \cap A_k) + \mu^*(Z \setminus A) \geq \\ &\stackrel{\text{Def. äußeres Maß}}{\geq} \mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \setminus A)\end{aligned}$$

Umgekehrt gilt für äußere Maße immer:

$$\mu^*(Z) \leq \mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \setminus A)$$

Für alle $i \in \mathbb{N}$ gibt es $B_i, C_i \in \mathcal{A}$ mit $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} B_i \supseteq Z \cap A$, $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} C_i \supseteq Z \setminus A$ und:

$$\begin{aligned} \mu^*(Z \cap A) &\geq \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu^*(B_i) - \varepsilon \\ \mu^*(Z \setminus A) &\geq \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu^*(C_i) - \varepsilon \end{aligned}$$

$(B_i, C_i)_{i \in \mathbb{N}} := (B_1, C_1, B_2, C_2, \dots)$ überdeckt Z , womit folgt:

$$\mu^*(Z) \leq \sum_{i \in \mathbb{N}} (\mu^*(B_i) + \mu^*(C_i)) \leq \mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \setminus A) + 2\varepsilon$$

Da ε beliebig ist, folgt die Behauptung:

$$\mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \setminus A) = \mu^*(Z)$$

Daher ist $A := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ wieder μ^* -messbar, das heißt $A \in \mathcal{M}$.

Insgesamt folgt, dass \mathcal{M} eine σ -Algebra ist. □iii)

– Das Maß ist σ -additiv, denn:

Sei wieder $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $A_n \in \mathcal{M}$ ein System paarweise disjunkter messbarer Mengen. Es folgt:

$$\sum_{k=1}^n \mu^*(A_k) \stackrel{\text{Additivität}}{=} \mu^*\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) \stackrel{\text{Monotonie}}{\leq} \mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \stackrel{\text{Def. von } \mu^*}{\underset{\text{als Infimum}}{\leq}} \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(A_k)$$

Im Limes $n \rightarrow \infty$ erhalten wir überall Gleichheit, also:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(A_k) = \mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right)$$

□1.2.8

Beweis von 1.2.3

Sei $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ die σ -Algebra, die aus dem Lemma von Caratheodory kommt, und das Maß $\mu := \mu^*|_{\mathcal{M}(\mathcal{A})}$ auf $\mathcal{M}(\mathcal{A})$.

Es bleibt noch zu zeigen:

1. $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}$ (Nur dann wissen wir, dass auch $\mathcal{M}(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}$ gilt.)
2. Eindeutigkeit

Zu 1.: Sei $A \in \mathcal{A}$. Zeige, dass A schon μ^* -messbar ist.

Sei $Z \subseteq X$ beliebig. Dann gilt nach der Definition des äußeren Maßes als Infimum:

$$\mu^*(Z) \leq \mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \setminus A)$$

Um die umgekehrte Ungleichung zu beweisen, sei $\varepsilon > 0$.

Es gibt eine Folge $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$, mit $A_n \in \mathcal{A}$,

$$Z \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

und:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) \leq \mu^*(Z) + \varepsilon$$

Dann folgt:

$$\begin{aligned} Z \cap A &\subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap A) \\ Z \setminus A &\subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \setminus A) \end{aligned}$$

Es ergibt sich:

$$\begin{aligned} \mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \setminus A) &\stackrel{\text{Def. äußeres Maß}}{\leq} \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n \cap A) + \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n \setminus A) = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) \leq \mu^*(Z) + \varepsilon \end{aligned}$$

Da ε beliebig ist, ist A tatsächlich μ^* -messbar.

Also ist $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}$.

Zu 2.: Zeige schließlich noch die Eindeutigkeit:

Sei μ wie oben konstruiert, ν ein weiteres Maß auf $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ und $\mu = \nu$ auf \mathcal{A} .

Wegen der σ -Endlichkeit (vergleiche das Lemma 1.2.1 iv) über Maßregeln) gibt es eine Folge $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in \mathcal{A} , so dass gilt:

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n \quad \mu(S_n) < \infty$$

Sei $Y \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$. Zu zeigen ist $\mu(Y) = \nu(Y)$.

Wegen der σ -Additivität genügt es zu zeigen, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\mu(Y \cap S_n) = \nu(Y \cap S_n) \tag{1.5}$$

(Denn: $\bigcup_{n=1}^{\infty} Y \cap S_n = Y$)

Um paarweise disjunkte Mengen zu bekommen, wähle

$$Z_1 = Y \cap S_1 \quad Z_2 = Y \cap (S_2 \setminus S_1) \quad Z_3 = Y \cap (S_3 \setminus (S_1 \cup S_2)) \quad \dots$$

und es gilt für alle $n \in \mathbb{N}$:

$$\mu(Z_n) = \nu(Z_n)$$

Wegen der σ -Additivität von μ und ν folgt:

$$\mu(Y) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} Z_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(Z_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(Z_n) = \nu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} Z_n\right) = \nu(Y)$$

Um die Notation zu vereinfachen, zeige anstelle von 1.5 allgemein für alle $A \in \mathcal{A}$ mit $\mu(A) < \infty$:

$$\mu(Y \cap A) = \nu(Y \cap A)$$

Oder zeige noch etwas einfacher:

Hat $A \in \mathcal{A}$ endliches Maß und ist $Y \in \mathcal{M}$ mit $Y \subseteq A$, so gilt:

$$\mu(Y) = \nu(Y)$$

Nach Definition von μ gilt

$$\mu(Y) = \mu^*(Y) = \inf \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \inf \sum_{n=1}^{\infty} \nu(A_n) \geq \nu(Y)$$

wobei wieder $Y \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ und $A_n \in \mathcal{A}$ ist.

Wegen der σ -Additivität von ν wissen wir außerdem, dass $\nu(Y) \leq \inf \sum_{n=1}^{\infty} \nu(A_n)$ gilt, womit für alle $Y \in \mathcal{M}$ mit $Y \subseteq A$ folgt:

$$\nu(Y) \leq \mu(Y)$$

Diese Ungleichung gilt auch für $\tilde{Y} := A \setminus Y$:

$$\nu(A \setminus Y) \leq \mu(A \setminus Y)$$

Wegen der Additivität folgt:

$$\mu(A) = \nu(A) = \nu(A \setminus Y) + \nu(Y) \leq \mu(A \setminus Y) + \mu(Y) = \mu(A) < \infty$$

Also muss überall schon Gleichheit gelten. Also ist $\mu(Y) = \nu(Y)$.

□_{1.2.3}

Bemerkung

Auf die Bedingung, dass das Prämaß σ -endlich ist, kann bei vielen Konstruktionen verzichtet werden.

Setze $\inf \emptyset = \infty$.

Wir haben also das Maß μ auf $\mathcal{M}(\mathcal{A})$.

Falls $(X = \mathbb{R}, \mathcal{A}, \mu)$ das Prämaß von Lemma 1.2.1, also \mathcal{A} alle offenen Intervalle enthält, ist $\mathcal{M}(\mathcal{A}) = \mathcal{B}$ die Borelalgebra.

Wir wollen jetzt μ auf eine etwas größere σ -Algebra erweitern.

1.2.9 Definition (Lebesguesche Nullmenge)

Eine Menge $A \in \mathcal{P}(X)$ heißt *Lebesguesche Nullmenge*, falls $\mu^*(A) = 0$ ist. Es gilt

$$0 = \mu^*(A) = \inf \left(\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) \right)$$

mit $A_n \in \mathcal{A}$ und $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \supseteq A$.

Daher gibt es für alle $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ eine Folge $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) < \varepsilon$, $A_n \in \mathcal{A}$ und $A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$.

Aus $A_n \in \mathcal{A}$ folgt, dass $M := \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ eine Borelmenge ist und

$$\mu(M) \stackrel{\sigma\text{-Additivität}}{\leq} \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) < \varepsilon$$

gilt.

Lemma

Ist A eine Lebesguesche Nullmenge, so gibt es zu jedem $n \in \mathbb{N}$ eine Borelmenge M_n mit $\mu(M_n) < \frac{1}{n}$.

$$M := \bigcap_{n=1}^{\infty} M_n$$

ist wieder eine Borelmenge und:

$$\mu(M) \leq \mu(M_n) < \frac{1}{n}$$

Also ist $\mu(M) = 0$ und daher gilt:

- Jede Lebesguesche Nullmenge ist eine Teilmenge einer Borelmenge vom Maß 0.
- Aber nicht jede Lebesguesche Nullmenge ist eine Borelmenge.

1.2.10 Definition (μ -messbar)

Eine Menge $A \subseteq \mathbb{R}$ heißt μ -messbar, falls A mit Hilfe einer Borelmenge B und einer Lebesgueschen Nullmenge N in folgender Form dargestellt werden kann:

$$A = B \cup N$$

Die μ -messbaren Mengen bilden wieder eine σ -Algebra $\mathcal{M} \supseteq \mathcal{B}$.

1.2.11 Definition (Lebesgue-Komplettierung, fast überall, Lebesgue-Maß)

\mathcal{M} heißt die *Lebesgue-Komplettierung*.

Die Mengen $A \in \mathcal{M}$ heißen Lebesgue-messbar.

Eine Aussage gilt Lebesgue-fast überall, falls die Punkte, für die sie nicht gilt, eine Lebesguesche Nullmenge bilden.

$(\mathbb{R}, \mu, \mathcal{M})$ heißt eindimensionales Lebesgue-Maß.

Bemerkung

Die Konstruktion könnte man analog auch im \mathbb{R}^n durchführen.

Wir betrachten stattdessen später das Produktmaß.

1.3 Konstruktion des Integrals

In diesem Abschnitt sei (X, \mathcal{M}, μ) ein Maßraum, zum Beispiel das eindimensionale Lebesgue-Maß.

1.3.1 Bemerkung und Definition (Treppenfunktion, Integral, Norm)

Eine Funktion $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ heißt *Treppenfunktion*, falls $|\varphi(X)| < \infty$ ist und für alle $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ das Urbild $\varphi^{-1}(\{c\})$ endliches Maß hat.

TODO: Abbildung Treppenfunktion einfügen

Die Treppenfunktionen bilden einen Vektorraum $\mathcal{T}(X)$, denn seien $\varphi, \psi \in \mathcal{T}(X)$ zwei Treppenfunktionen, so gilt:

$$\begin{aligned} (\varphi + \psi)(x) &= \varphi(x) + \psi(x) \\ |(\varphi + \psi)(X)| &\leq |\varphi(X)| + |\psi(X)| < \infty \\ (\varphi + \psi)^{-1}(\{c\}) &\subseteq \varphi^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\}) + \psi^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\}) \\ \mu\left((\varphi + \psi)^{-1}(\{c\})\right) &\leq \mu\left(\varphi^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\}) + \psi^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})\right) \leq \\ &\leq \underbrace{\sum_{\substack{c \in \varphi(X) \\ \text{endlich}}} \underbrace{\mu(\varphi^{-1}(c))}_{< \infty}}_{\text{endlich}} + \underbrace{\sum_{\substack{c \in \psi(X) \\ \text{endlich}}} \underbrace{\mu(\psi^{-1}(c))}_{< \infty}}_{\text{endlich}} < \infty \end{aligned}$$

Die Abgeschlossenheit unter Skalarmultiplikation ist klar.

Für Treppenfunktionen definiere das Integral:

$$\int_X \varphi d\mu := \sum_{y \in \varphi(X)} y \cdot \mu(\varphi^{-1}(y)) < \infty$$

Wir wollen diesen Integralbegriff durch Approximation auf allgemeine Funktionen ausdehnen.

Dazu betrachten wir

$$\|\varphi\|_1 := \int_X |\varphi| d\mu$$

und nennen dies L^1 -, „Norm“.

Idee

Betrachte die „Cauchy-Folge“ $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $\varphi_n \in \mathcal{T}(X)$ für die es für alle $\varepsilon > 0$ schon ein $N \in \mathbb{N}$ mit $\|\varphi_n - \varphi_m\| \leq \varepsilon$ für alle $n, m \in \mathbb{N}_{>N}$ gibt.

Hoffnung: $\varphi_n \xrightarrow{?} \varphi$ und $\int_X \varphi d\mu := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \varphi_n d\mu$.

Ist $\|\cdot\|_1$ eine Norm?

Aus der Linearität der Summe und den entsprechenden Eigenschaften des Betrages folgt, wie direkt zu überprüfen ist, dass gilt:

- i) $\|\varphi\|_1 \geq 0$
- ii) $\|\lambda\varphi\|_1 = |\lambda| \cdot \|\varphi\|_1$
- iii) $\|\varphi + \psi\| \leq \|\varphi\| + \|\psi\|$

Also ist $\|\cdot\|_1$ eine Seminorm.

Definitheit:

$$\begin{aligned} \|\varphi\|_1 = 0 &\Leftrightarrow \int_X |\varphi| d\mu = 0 \Leftrightarrow \sum_{y \in \varphi(X)} |y| \cdot \underbrace{\mu(\varphi^{-1}(y))}_{\text{muss 0 sein für } y \neq 0} = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \varphi(x) = 0 \quad \forall_{x \in X \setminus N} \text{ für eine Menge } N \text{ mit } \mu(N) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \varphi = 0 \text{ fast überall} \end{aligned}$$

Also ist $\|\cdot\|_1$ nicht definit und damit keine Norm.

$$\mathcal{N}(\mu) := \{\varphi \in \mathcal{T}(X) \mid \|\varphi\|_1 = 0\}$$

ist ein Teilraum von $\mathcal{T} := \mathcal{T}(\mu) := \mathcal{T}(X)$.

Bemerkung

Auf $\mathcal{T}(\mu)/\mathcal{N}(\mu)$ ist $\|\cdot\|_1$ eine Norm.

Aber $(\mathcal{T}, \|\cdot\|_1)$ ist nicht vollständig, denn man kann zum Beispiel stetige Funktionen bezüglich der L^1 -Norm durch Treppenfunktionen approximieren.

Man könnte nun $\mathcal{T}(\mu)$ abstrakt vervollständigen, dies wäre aber unpraktisch.

1.3.2 Lemma

Sei $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine L^1 -Cauchy-Folge in $\mathcal{T}(X)$.

Dann gibt es eine Teilfolge $(\varphi_{n_j})_{j \in \mathbb{N}}$, die fast überall punktweise konvergent ist, also:

$$\varphi_{n_j}(x) \mapsto \varphi(x) \quad \text{für fast alle } x \in X$$

Zusätzlich existiert für alle $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ ein $Z \subseteq X$ mit $\mu(Z) < \varepsilon$, sodass

$$\varphi_{n_j} \Big|_{X \setminus Z} \rightrightarrows \varphi \Big|_{X \setminus Z}$$

gleichmäßig konvergiert.

Beachte: Für eine L^1 -Cauchy-Folge $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $\varphi_n \in \mathcal{T}$ ist

$$z_n := \int_X \varphi_n d\mu$$

eine Cauchy-Folge in \mathbb{R} , weil für $m \in \mathbb{N}_{>n}$ gilt:

$$\begin{aligned} |z_n - z_m| &= \left| \int_X \varphi_n d\mu - \int_X \varphi_m d\mu \right| = \left| \int_X (\varphi_n - \varphi_m) d\mu \right| \leq \\ &\leq \int_X |\varphi_n - \varphi_m| d\mu = \|\varphi_n - \varphi_m\| \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Beweis

Wähle induktiv eine Teilfolge (zur Einfachheit wieder mit $(\varphi_j)_{j \in \mathbb{N}}$ bezeichnet), sodass für alle $n, k \in \mathbb{N}$ mit $n \geq k$ gilt:

$$\|\varphi_n - \varphi_k\|_1 \leq 2^{-2k}$$

Setze:

$$Y_n := \{x \mid |\varphi_{n+1}(x) - \varphi_n(x)| \geq 2^{-n}\}$$

Die Y_n sind messbar, denn die Funktion $\varphi_{n+1} - \varphi_n \in \mathcal{T}$ messbar ist und daher auch $|\varphi_{n+1} - \varphi_n|$, weswegen das Urbild

$$|\varphi_{n+1} - \varphi_n|^{-1}([2^{-n}, \infty))$$

der Borelmenge $[2^{-n}, \infty]$ messbar ist. Es folgt:

$$\begin{aligned} 2^{-n} \cdot \mu(Y_n) &\leq \int_{Y_n} |\varphi_{n+1} - \varphi_n| d\mu \leq \int_X |\varphi_{n+1} - \varphi_n| d\mu \leq 2^{-2n} \\ \Rightarrow \mu(Y_k) &\leq 2^{-k} \end{aligned}$$

Setze nun $Z_k := \bigcup_{n=k}^{\infty} Y_n$, dann folgt:

$$\mu(Z_k) \stackrel{\sigma\text{-Additivität}}{\leq} \sum_{n=k}^{\infty} \mu(Y_n) \leq \sum_{n=k}^{\infty} 2^{-n} = 2^{-k} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \cdot 2^{-k}$$

Sei $x \notin Z_k$, dann ist $x \notin Y_n$ für alle $n \geq k$:

$$|\varphi_{n+1}(x) - \varphi_n(x)| \leq 2^{-n}$$

Die Reihe $\sum_{n=k}^{\infty} |\varphi_{n+1} - \varphi_n|$ konvergiert absolut und gleichmäßig in x .

Also ist $\varphi_n(x)$ eine Cauchy-Folge in \mathbb{R} , gleichmäßig in x .

$$\varphi_n(x) \rightrightarrows f(x) \quad \forall_{x \notin Z_k}$$

Für $m \geq n$ gilt:

$$\begin{aligned} |\varphi_n(x) - \varphi_m(x)| &\leq |\varphi_n(x) - \varphi_{n-1}(x)| + \dots + |\varphi_{m+1}(x) - \varphi_m(x)| = \\ &= \sum_{k=m}^{n-1} |\varphi_{k+1}(x) - \varphi_k(x)| \leq \sum_{k=m}^{\infty} |\varphi_{k+1}(x) - \varphi_k(x)| \leq \sum_{k=m}^{\infty} 2^{-k} = 2 \cdot 2^{-m} \end{aligned}$$

Bilde nun $Z = \bigcap_{k=0}^{\infty} Z_k$. Für jedes $x \notin Z$ gibt es ein $k := k(x)$ mit $x \in Z_k$ und deswegen konvergiert

$$\varphi_k(x) \rightarrow f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) \in \mathbb{R}$$

punktweise.

$$\mu(Z) = \mu\left(\bigcap_{k=0}^{\infty} Z_k\right) \leq \mu(Z_k) \leq 2 \cdot 2^{-k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

Da k beliebig ist, folgt $\mu(Z) = 0$, also ist Z eine Lebesguesche Nullmenge.

Beachte: Für eine L^1 -Cauchy-Folge $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $\varphi_n \in \mathcal{T}(X)$ ist

$$z_n := \int_X \varphi_n d\mu$$

eine Folge reeller Zahlen.

Diese Folge $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist auch eine Cauchy-Folge in \mathbb{R} , weil gilt:

$$\begin{aligned} |z_n - z_m| &= \left| \int_X \varphi_n d\mu - \int_X \varphi_m d\mu \right| = \left| \int_X (\varphi_n - \varphi_m) d\mu \right| \leq \\ &\leq \int_X |\varphi_n - \varphi_m| d\mu = \|\varphi_n - \varphi_m\|_1 \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

Wir können also folgenden Grenzwert bilden:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \varphi_n d\mu$$

1.3.3 Definition (Lebesgue-integrabel, Integral)

Eine Funktion $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ heißt *(Lebesgue-)integrabel*, wenn es eine L^1 -Cauchy-Folge $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ von Treppenfunktionen gibt, die fast überall punktweise gegen f konvergiert. Die Zahl

$$\int_X f d\mu := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \varphi_n d\mu < \infty$$

heißt das *Integral* von f über X . Für eine messbare Menge $Y \subseteq X$ setzt man

$$\int_Y f d\mu = \int \chi_Y \cdot f d\mu$$

wobei

$$\chi_Y(x) := \begin{cases} 1 & \text{falls } x \in Y \\ 0 & \text{falls } x \notin Y \end{cases}$$

die charakteristische Funktion von Y ist.

Beachte, dass $\chi_Y \cdot \varphi_n \rightarrow \chi_Y \cdot \varphi$ fast überall konvergiert.

1.3.4 Lemma

Seien $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(\psi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ zwei L^1 -Cauchy-Folgen von Treppenfunktionen, die beide fast überall punktweise gegen eine Funktion $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ konvergieren.

Dann gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\varphi_n - \psi_m\| = 0$$

Also ist:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \varphi_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \psi_n d\mu$$

Beweis

Setze $\tau_n := \varphi_n - \psi_n$. Dann ist $\tau_n \in \mathcal{T}(X)$ und $(\tau_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine L^1 -Cauchy-Folge und $\tau_n \rightarrow 0$ fast überall punktweise konvergent.

Zu zeigen ist: $\tau_n \rightarrow 0$ in L^1 , also $\|\tau_n\|_1 \rightarrow 0$.

- Es genügt, dies für eine Teilfolge zu zeigen, denn nehme an, dass $\|\tau_{n_j}\| \rightarrow 0$ konvergiert. Sei $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Da $(\tau_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine L^1 -Cauchy-Folge ist, gibt es ein $N \in \mathbb{N}$ mit $\|\tau_n - \tau_m\| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ für alle $n, m \in \mathbb{N}_{\geq N}$. Da $\|\tau_{n_j}\| \rightarrow 0$ gibt es ein $K \in \mathbb{N}_{>N}$ mit $\|\tau_K\| \leq \frac{\varepsilon}{2}$, womit für alle $n \in \mathbb{N}_{\geq N}$ folgt:

$$\|\tau_n\| \leq \|\tau_n - \tau_K\| + \|\tau_K\| \leq \varepsilon$$

- Sei $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ und $k \in \mathbb{N}$ fest gewählt. Wähle die Teilfolge (die wir zur Einfachheit wieder mit $(\tau_n)_{n \in \mathbb{N}}$ bezeichnen) so, dass für alle $n \in \mathbb{N}_{\geq k}$ gilt:

$$\|\tau_n - \tau_k\| \leq \varepsilon$$

τ_n konvergiert gleichmäßig auf $X \setminus Z$ und $\mu(Z) < \frac{\varepsilon}{\|\tau_k\|_\infty}$. (genau wie in Lemma 1.3.2)

Es gilt:

$$\|\tau_k\|_\infty := \sup(\tau_k) < \infty$$

Denn τ_k nimmt als Treppenfunktion nur endlich viele Funktionswerte an. Setze:

$$M = \{x | \tau_k(x) \neq 0\} \quad (\text{wieder für unser festes } k)$$

$$\|\tau_n\|_1 = \int_X |\tau_n| d\mu \leq \int_Z |\tau_n| d\mu + \int_{M \setminus Z} |\tau_n| d\mu + \int_{X \setminus M} |\tau_n| d\mu$$

$$\int_Z |\tau_n| d\mu \leq \int_Z |\tau_n - \tau_k| + \int_Z |\tau_k| \leq \|\tau_n - \tau_k\|_1 + \underbrace{\sup |\tau_k| \cdot \mu(Z)}_{< \varepsilon \text{ nach Konstruktion von } Z \text{ auf } M \setminus Z} \leq$$

$$\leq \|\tau_n - \tau_k\|_1 + \varepsilon$$

$$\int_{M \setminus Z} |\tau_n| d\mu \leq \sup_{M \setminus Z} |\tau_n| \cdot \underbrace{\mu(M)}_{< \infty, \text{ da } \tau_n \text{ Treppenfkt.}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \text{da } \tau_n \xrightarrow{\text{p.w.}} 0$$

$$\int_{X \setminus M} |\tau_n| d\mu = \int_{X \setminus M} |\tau_n - \tau_k| d\mu \leq \|\tau_n - \tau_k\|$$

(Da $\tau_k = 0$ auf $X \setminus M$ ist.)

Also insgesamt:

$$\|\tau_n\|_1 \leq 2 \|\tau_n - \tau_k\|_1 + \varepsilon + \varepsilon \quad \text{falls } n > N(\varepsilon)$$

Indem wir k genügend groß wählen können wir erreichen, dass $\|\tau_n - \tau_k\|_1 < \varepsilon$. Damit folgt für alle $n \in \mathbb{N}_{>N(k)}$:

$$\|\tau_n\|_1 \leq 4\varepsilon$$

□_{1.3.4}

1.3.5 Satz (Regeln für das Integral)

- i) Die integrierbaren Funktionen bilden einen Vektorraum $\mathcal{L}^1(\mu)$. Das Integral ist darauf eine lineare Abbildung:

$$\int : \mathcal{L}^1(\mu) \rightarrow \mathbb{R}$$

- ii) Sind $f, g \in \mathcal{L}^1$ und ist $f \geq g$ fast überall, so folgt:

$$\int_X f d\mu \geq \int_X g d\mu \quad (\text{Monotonie})$$

- iii) Sei $Y \subseteq X$ messbar und von endlichem Maß, dann gilt:

$$\int_X \chi_Y d\mu = \int_Y d\mu = \mu(Y)$$

- iv) Seien Y und Z messbar und disjunkt. Ist außerdem $f : Y \cup Z \rightarrow \mathbb{R}$ integrierbar, dann sind $f|_Y$ und $f|_Z$ integrierbar und es gilt:

$$\int_{Y \cup Z} f d\mu = \int_Y f d\mu + \int_Z f d\mu$$

- v) Ist f integrierbar, so auch $|f|$ und es gilt:

$$\left| \int_X f d\mu \right| \leq \int_X |f| d\mu$$

- vi) Die L^1 -Norm ist eine Seminorm auf $\mathcal{L}^1(\mu)$. Das Integral ist stetig.
- vii) Ändert man eine integrierbare Funktion auf einer Nullmenge ab, so ist die neue Funktion wieder integrierbar und das Integral ändert sich nicht.

Bemerkung

Aus v) folgt, dass auch die Funktionen

$$f_+ := \frac{1}{2}(|f| + f) = \max(0, f)$$

$$f_- := \frac{1}{2}(|f| - f) = \max(0, -f)$$

integrierbar sind.

Beweis

Seien $f, g \in \mathcal{L}^1(X)$. Wähle L^1 -Cauchy-Folgen $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}, (\gamma_n)_{n \in \mathbb{N}}$ von Treppenfunktionen, so dass:

$$\begin{aligned} \varphi_n &\rightarrow f && \text{fast überall} \\ \gamma_n &\rightarrow g && \text{fast überall} \end{aligned}$$

Wir wissen dann, dass die Integrale $\int_X \varphi_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu$, $\int_X \gamma_n d\mu \rightarrow \int_X g d\mu$ konvergieren.

Es genügt deshalb, die Rechenregeln für Treppenfunktionen zu überprüfen und dann zum Limes überzugehen.

Zum Beispiel ist $\varphi_n + \gamma_n$ eine L^1 -Cauchy-Folge und es konvergiert $\varphi_n + \gamma_n \rightarrow f + g$ fast überall, womit folgt:

$$\begin{aligned} \int_X (f + g) d\mu &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X (\varphi_n + \gamma_n) d\mu = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_X \varphi_n d\mu + \int_X \gamma_n d\mu \right) \stackrel{\text{Konvergenzsätze für Folgen}}{=} \int_X f d\mu + \int_X g d\mu \end{aligned}$$

Zu v): Wähle eine L^1 -Cauchy-Folge $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $\varphi_n \rightarrow f$. Dann ist $(|\varphi_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ auch eine L^1 -Cauchy-Folge, da gilt:

$$||\varphi_n| - |\varphi_m|| \leq |\varphi_n - \varphi_m|$$

□_{1.3.5}

1.3.6 Satz

Integrierbare Funktionen sind μ -messbar, also messbar nach Änderung auf einer Nullmenge und es gilt:

$$\|f\|_1 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad f = 0 \quad \text{fast überall}$$

Beweis

Nach Satz 1.1.9 ist der punktweise Limes messbarer Funktionen wieder messbar, weswegen f als punktweiser Limes von Treppenfunktionen messbar.

Nach Satz 1.1.11 ist $|f|$ der Limes einer aufsteigenden Folge $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ von Stufenfunktionen, also:

$$0 \leq \varphi_n \leq |f|$$

Die φ_n sind sogar Treppenfunktionen, denn $|f|$ ist außerhalb einer Menge Z gleichmäßiger Limes von Treppenfunktionen.

Wäre ein $\varphi_n = c > 0$ auf einer Menge M vom Maß $\mu(M) = \infty$, dann wäre eine Treppenfunktion größer als $\frac{c}{2}$ auf $M \setminus Z$, was ein Widerspruch ist, da $\mu(M \setminus Z) = \infty$ ist.

Aus $\|f\|_1 = 0$ folgt $\|\varphi_n\|_1 = 0$ und somit $\varphi_n = 0$ fast überall.

$$\mu(\{|f| > 0\}) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{\varphi_n > 0\}\right) = 0$$

Also gilt fast überall $f = 0$. □_{1.3.6}

1.3.7 Satz (Normkonvergenzsatz)

Sei $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine L^1 -Cauchy-Folge integrierbarer Funktionen (nicht notwendigerweise Treppenfunktionen!).

Dann gilt:

- i) Es gibt eine Teilfolge $(f_{n_j})_{j \in \mathbb{N}}$ mit $f_{n_j} \rightarrow f$ fast überall.
Außerdem gibt es für alle $\varepsilon > 0$ ein $Z \subseteq X$ mit $\mu(Z) < \varepsilon$ und $f_{n_j}|_{X \setminus Z} \rightrightarrows f|_{X \setminus Z}$.
- ii) Je zwei solche Grenzfunktionen stimmen fast überall überein.
- iii) $\|f_n - f\|_1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ und insbesondere gilt:

$$\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

Beweis

- i) Dies beweist man genauso wie im Konstruktionslemma 1.3.2.

Beachte nun, dass

$$Y_k := \left\{ |f_{k+1} - f_k| \geq 2^{-k} \right\}$$

nach 1.3.5 und 1.3.6 messbar ist. □_{i)}

- ii) Sei $(f_{n_j})_{j \in \mathbb{N}} \rightarrow f$ eine konvergente Teilfolge, also $\|f - f_{n_j}\|_1 \rightarrow 0$ und sei $(f_{m_j})_{j \in \mathbb{N}} \rightarrow g$ eine weitere konvergente Teilfolge, also $\|f_{m_j} - g\|_1 \rightarrow 0$.

Mit der Dreiecksungleichung folgt:

$$\|f - g\|_1 \leq \underbrace{\|f - f_{n_j}\|_1}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\|f_{n_j} - f_{m_j}\|_1}_{\rightarrow 0 \text{ (C.-F.)}} + \underbrace{\|f_{m_j} - g\|_1}_{\rightarrow 0} \rightarrow 0$$

Also $\|f - g\|_1 = 0$ und somit $f = g$ fast überall. □_{ii)}

- iii) Vorüberlegung: Falls $\varphi_n \rightarrow g$ fast überall konvergiert und eine L^1 -Cauchy-Folge von Treppenfunktionen ist, dann gilt

$$\begin{aligned} \|\varphi_n - g\|_1 &= \lim_{k \rightarrow \infty} \|\varphi_n - \varphi_k\|_1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \|\varphi_n - g\|_1 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{k \rightarrow \infty} \|\varphi_n - \varphi_k\|_1 = 0 \end{aligned}$$

nach der Definition einer Cauchy-Folge.

Zeige nun, dass f integrierbar ist:

Wir können annehmen, dass $f_n \rightarrow f$ punktweise konvergiert, sonst gehe zu einer Teilfolge über. Außerdem gibt eine Menge $Z \subseteq X$ mit $\mu(Z) = 0$ und:

$$f_n|_{X \setminus Z} \rightrightarrows f$$

Wähle eine Folge von Treppenfunktionen τ_n so, dass $|f_n - \tau_n| < \frac{1}{n}$ auf $X \setminus Z_n$ mit $\mu(Z_n) < \frac{1}{2^n}$ und $\|f_n - \tau_n\|_1 < \frac{1}{n}$.

Es folgt:

$$\|\tau_l - \tau_n\|_1 \leq \|\tau_l - f_l\| + \|f_l - f_n\| + \|f_n - \tau_n\| \xrightarrow{n, l \rightarrow \infty} 0$$

Also ist $(\tau_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine L^1 -Cauchy-Folge. Zudem ist klar, dass $\tau_n \rightarrow f$ fast überall konvergiert, nämlich außerhalb von:

$$Z := \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{l=k}^{\infty} Z_l \right)$$

Wegen

$$\mu\left(\bigcup_{l=k}^{\infty} Z_l\right) < \sum_{l=k}^{\infty} \frac{1}{2^l} = 2 \cdot 2^{-k}$$

ist $\mu(Z) = 0$. Also konvergiert $\tau_n \rightarrow f$ fast überall und daher ist f nach der Definition integrierbar.

Nach der Vorüberlegung gilt $\|\tau_n - f_n\|_1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Mit der Dreiecksungleichung folgt für eine Teilfolge $(f_{n_j})_{j \in \mathbb{N}}$, die gegen f konvergiert:

$$\|f_n - f\|_1 \leq \|f_n - \tau_n\|_1 + \|\tau_n - f\|_1 \rightarrow 0$$

Da f_n eine L^1 -Cauchy-Folge ist, folgt $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$ auch für die gesamte Folge.

Hieraus folgt auch, dass $\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$ ist.

□_{1.3.7}

1.3.8 Proposition und Definition ($(L^1(X, \mu), \|\cdot\|_1)$ ist normierter Vektorraum)

$\mathcal{L} := \mathcal{L}(X) := \mathcal{L}(X, \mu)$ bezeichnet die Menge aller integrierbaren Funktionen. Auf dieser gibt es die L^1 -Seminorm.

Der Kern

$$\mathcal{N} := \mathcal{N}(X) := \mathcal{N}(X, \mu) := \left\{ f \in \mathcal{L} \mid \|f\|_1 = 0 \right\} \subseteq \mathcal{L}$$

dieser Seminorm ist ein Untervektorraum.

Betrachte die Äquivalenzrelation:

$$f \sim \tilde{f} \Leftrightarrow f - \tilde{f} \in \mathcal{N} \Leftrightarrow \left\| f - \tilde{f} \right\|_1 = \int_X |f - \tilde{f}| d\mu = 0 \Leftrightarrow f - \tilde{f} = 0 \text{ fast überall}$$

Durch herausdividieren des Kerns erhalten wir die Menge der Äquivalenzklassen $L^1(X, \mu) := \mathcal{L} / \mathcal{N}$.

$(L^1(X, \mu), \|\cdot\|_1)$ ist ein normierter Raum.

Beweis

Das Integral auf $L^1(X, \mu)$ ist definiert durch:

$$\int_X [f] d\mu = \int_X f d\mu$$

Es ist wohldefiniert, denn die Funktionen einer Äquivalenzklasse unterscheiden sich nur auf einer Nullmenge und dies ändert das Integral nicht.

Zudem gilt:

$$\|[f]\|_1 = \|f\|_1 = 0 \Leftrightarrow f = 0 \text{ fast überall} \Leftrightarrow [f] = 0 \in L^1(X, \mu)$$

Daher ist $(L^1(X, \mu), \|\cdot\|_1)$ ein normierter Vektorraum.

□_{1.3.8}**1.3.9 Korollar** $((L^1(X, \mu), \|\cdot\|_1)$ ist Banachraum)

$(L^1(X, \mu), \|\cdot\|_1)$ ist ein Banachraum.

Beweis

Zu zeigen ist, dass $(L^1(X, \mu), \|\cdot\|_1)$ vollständig ist.

Sei also $([f_n])_{n \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge.

Nach 1.3.7 gibt es eine Teilfolge $(f_{n_j})_{j \in \mathbb{N}}$ mit $f_{n_j} \rightarrow f$ fast überall. Außerdem ist die Grenzfunktion f eindeutig bis auf eine Nullmenge und es gilt $\|f_n - f\|_1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Daher gilt $[f_n] \rightarrow [f]$ und $[f]$ ist eindeutig, da sich die Grenzfunktionen nur auf einer Nullmenge unterscheiden.

□_{1.3.9}**1.4 Die Konvergenzsätze****Frage**

Wenn $f_n \rightarrow f$ punktweise konvergiert und alle f_n integrabel sind, wann ist f integrabel?

Wann kann man das Integral und den Grenzwert vertauschen?

1.4.1 Beispiel

$$f_n := \begin{cases} n^2(x + \frac{1}{n}) & \text{falls } -\frac{1}{n} < x \leq 0 \\ n^2(\frac{1}{n} - x) & \text{falls } 0 < x < \frac{1}{n} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

TODO: Abbildung δ -Funktions-Näherung

Für alle $x \neq 0$ gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$$

Also folgt:

$$0 = \int_{-1}^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx \neq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 f_n(x) dx = 1$$

Derartige Probleme kann man auf zwei Arten vermeiden:

- a) Die f_n sind monoton steigend.
- b) Die f_n werden von einer integrierbaren Funktion g dominiert.

1.4.2 Theorem (monotone Konvergenz, Beppo-Levi)

Sei $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $f_n \in L^1(X)$ eine fast überall monoton steigende Folge integrierbarer Funktionen, also $f_{n+1}(x) \geq f_n(x)$ für fast alle $x \in X$ und alle $n \in \mathbb{N}$, die gegen f konvergiere, und für alle $n \in \mathbb{N}$ sei das Integral $\int_X f_n d\mu \leq C < \infty$ beschränkt und f_n .

Dann gilt für das Integral:

$$\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

Beweis

Da $L^1(\mathbb{R}, \mu)$ vollständig ist, genügt es zu zeigen, dass $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine L^1 -Cauchy-Folge ist.

Für $n \geq m$ gilt:

$$\|f_n - f_m\|_1 = \int_X |f_n - f_m| d\mu \stackrel{f_n \text{ mon. steigend}}{=} \int_X (f_n - f_m) d\mu = \int_X f_n d\mu - \int_X f_m d\mu$$

Da $(\int_X f_n d\mu)_{n \in \mathbb{N}}$ monoton steigend und durch C beschränkt ist, ist es demnach eine Cauchy-Folge. $\square_{1.4.2}$

1.4.3 Theorem (dominierte Konvergenz)

Sei $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $f_n \in L^1(X)$ eine Folge integrierbarer Funktionen, die von der integrierbaren Funktion $g \in L^1$ dominiert sind, das heißt $|f_n| \leq g \in L^1$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und fast alle $x \in X$, und $f_n \rightarrow f$ konvergiere fast überall.

Dann ist $f \in L^1$ integrierbar und für das Integral gilt:

$$\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

Beweis

Zeige wiederum, dass f_n eine L^1 -Cauchy-Folge ist.

Ohne Einschränkung konvergiere $f_n \rightarrow f$ überall und es gelte $|f_n| \leq g$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Bilde die Funktionenfolge $(h_k)_{k \in \mathbb{N}}$ definiert durch:

$$h_k(x) = \sup \left\{ |f_n(x) - f_m(x)| \mid n, m \in \mathbb{N}_{\geq k} \right\}$$

Behauptung Die h_k sind integrierbar.

Beweis $|f_n - f_m|$ ist für alle $n, m \in \mathbb{N}$ integrierbar. Also ist für alle $l \in \mathbb{N}_{\geq k}$ schon

$$v_l := \max \left\{ |f_n - f_m| \mid k \leq n, m \leq l \right\}$$

integrabel.

Außerdem ist $(v_l)_{l \in \mathbb{N}_{\geq k}}$ eine monoton steigende Folge und nach der Dreiecksungleichung gilt:

$$\int_X v_l d\mu \leq 2 \int_X g d\mu$$

Wegen der monotone Konvergenz folgt $h_k = \lim_{l \rightarrow \infty} v_l \in L^1$.

□ Behauptung

$(h_k)_{k \in \mathbb{N}}$ ist also eine absteigende Folge integrierbarer Funktionen, die punktweise gegen 0 konvergiert. Damit folgt:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_X h_k d\mu = 0$$

Also gibt es für alle $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ ein $N \in \mathbb{N}$ mit:

$$\|f_n - f_m\|_1 = \int_X |f_n - f_m| d\mu \leq \int_X h_N d\mu < \varepsilon$$

Also ist $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tatsächlich eine L^1 -Cauchy-Folge.

□ 1.4.3

1.4.4 Beispiel

TODO: Abb1 einfügen

Betrachte die Funktionenfolge für $n \in \mathbb{N}$:

$$f_n(x) := \begin{cases} 1 & \text{falls } n \leq x < n+1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$f_n(x) \rightarrow 0$ konvergiert punktweise, aber es gilt:

$$0 = \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx \neq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) dx = 1$$

Beachte, dass für jede dominierende Funktion g schon $\int_{-1}^1 g d\mu = \infty$ gilt, weswegen $g \notin L^1$ ist, der Satz über dominierte Konvergenz also nicht anwendbar ist.

1.5 Integration nicht-negativer Funktionen

TODO: Rest überarbeiten

Sei $f : X \rightarrow [0, \infty] \subseteq \overline{\mathbb{R}}$ messbar (muss nicht in L^1 sein!). Setze:

$$\int_X f d\mu := \sup \left\{ \int_X \varphi d\mu \text{ mit } \varphi \text{ Stufenfunktion und } 0 \leq \varphi \leq f \right\} \quad (*) \quad (1.6)$$

Definition

φ ist eine Stufenfunktion, falls $\varphi : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ messbar und $\#\varphi(X) < \infty$.

φ ist eine Treppenfunktion, falls φ Stufenfunktion und $\mu(\varphi^{-1}(c)) < \infty$ für alle $c \neq 0$.

z. B. $\varphi(x) = \begin{cases} 0 & \text{falls } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{sonst} \end{cases}$ ist eine Stufenfunktion, aber keine Treppenfunktion.

$$\int_X \varphi d\mu := \sum_{y \in \varphi(X)} y \cdot \mu(\varphi^{-1}(y))$$

Treppenfunktion $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$: $y \in \mathbb{R}$, $\mu(\varphi^{-1}(y)) < \infty \Rightarrow \int_X \varphi d\mu < \infty$.

Stufenfunktion: $\varphi : X \rightarrow [0, \infty]$: $y \in [0, \infty]$, $\mu(\varphi^{-1}(y)) \leq \infty \Rightarrow \int_X \varphi d\mu \leq \infty$ ist wohldefiniert.

1.5.1 Satz

Ist $f \in L^1$, so stimmt (*) tatsächlich mit der früheren Integral-Definition (von Definition ??1.3.3) überein.

Beweis

Sei $f \in L^1$. Wegen der Monotonie gilt:

$$\int_X \varphi d\mu \leq \int_X f d\mu \quad \forall \varphi \text{ mit } 0 \leq \varphi \leq f$$

Gehe zum Supremum über

$$\int_X f d\mu \geq \sup \left\{ \int_X \varphi d\mu \mid \varphi \text{ ist Stufenfunktion und } 0 \leq \varphi \leq f \right\}$$

Umgekehrt gibt es nach Satz ??1.1.8 eine aufsteigende Folge (φ_n) von Treppenfunktionen (also auch Stufenfunktionen), die fast überall gegen f konvergieren. Nach dem Theorem von der monotonen Konvergenz ist dann:

$$\int_X f d\mu \leq \sup \left\{ \int_X \varphi d\mu \mid \varphi \text{ ist Stufenfunktion und } 0 \leq \varphi \leq f \right\}$$

□_{1.5.1}

$f : X \rightarrow [0, \infty]$ messbar.

$$\int_X f d\mu := \sup \left\{ \int_X \varphi d\mu \mid \varphi \text{ ist Stufenfunktion und } 0 \leq \varphi \leq f \right\}$$

Beispiel

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & \text{falls } x \neq 0 \\ \infty & \text{falls } x = 0 \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) d\mu = +\infty$$

Denn:

TODO Abb 2

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi_n d\mu = n^2 \cdot \frac{2}{n} = 2n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$$

Die Rechenregeln für Integrale übertragen sich alle, wenn man (konsequent) $0 \cdot \infty = 0$ als Regel verwendet.

z. B.

$$f(x) = \begin{cases} +\infty & \text{falls } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$f : [0,1] \rightarrow [0,\infty]$$

$\int_X f d\mu = 0$, da jede Stufenfunktion φ mit $0 \leq \varphi \leq f$ identisch verschwindet.

$$\int_X f d\mu = \sum_{y \in f(x)} y \cdot \mu(f^{-1}(y)) = \infty \cdot \mu(\mathbb{Q} \cap [0,1]) + 0 \cdot \mu((\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0,1]) = \infty \cdot 0 + 0 \cdot \infty = 0$$

1.5.2 Theorem (monotone Konvergenz)

Sei $f_n : X \rightarrow [0,\infty]$ eine monoton aufsteigende Folge messbarer Funktionen mit:

$$f(x) = \sup_n f_n(x)$$

Dann ist:

$$\int_X f(x) d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n(x) d\mu$$

Beweis

Ist die linke Seite endlich, so sind alle f_n fast überall endlich, wende Theorem 1.4.2 an.

Ist die linke Seite unendlich, so wegen der Monotonie auch die rechte Seite.

□_{1.5.2}

1.6 Zusammenhang zum Riemann-Integral

Sei $I = [a,b] \subset \mathbb{R}$ kompaktes Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt.

Zerlegung $Z = \{x_0, \dots, x_{k+1}\}$ mit $x_0 = a < x_1 < \dots < x_k < x_{k+1} = b$

Feinheit $\Delta(Z) = \max_{j=0,\dots,k} (x_{j+1} - x_j)$

$$\overline{S}_Z = \sum_{j=0}^k \sup_{[x_j, x_{j+1}]} f \cdot |x_{j+1} - x_j|$$

$$\underline{S}_Z = \sum_{j=0}^k \inf_{[x_j, x_{j+1}]} f \cdot |x_{j+1} - x_j|$$

Definition:

f ist R -integrierbar, falls es für jedes $\varepsilon > 0$ eine Zerlegung Z gibt, mit:

$$\overline{S}_Z(f) - \underline{S}_Z \leq \varepsilon$$

Satz:

f ist R -integrierbar $\Leftrightarrow \forall_{\varepsilon > 0} \exists_{\delta > 0}$ mit $\overline{S}_Z(f) - \underline{S}_Z \leq \varepsilon \forall_Z$ mit $\Delta(Z) < \delta$

$$R - \int_Y f(x) dx := \sup_Z \underline{S}_Z(f)$$

1.6.1 Satz

Jede R -integrierbar Funktion ist Lebesgue-integrierbar und:

$$R - \int_Y f(x) dx = \int_Y f d\mu$$

(Insbesondere: Jede stetige Funktion auf $[a,b]$ ist integrierbar)

Beweis

Sei f R -integrierbar. Es gibt dann eine absteigende Familie von Treppenfunktionen ψ_n und eine aufsteigende Folge von Treppenfunktionen φ_n mit:

$$\varphi_n \leq f \leq \psi_n$$

und:

$$\|\psi_n - \varphi_n\| \rightarrow 0$$

Genauer: Betrachte Z_n mit $\Delta(Z_n) < \frac{1}{n}$ und $Z_{n+1} \supset Z_n$ (also Z_{n+1} ist eine Verfeinerung von Z_n)

$$\begin{aligned} \psi_n|_{[x_j, x_{j+1})} &= \sup_{[x_j, x_{j+1})} f \\ \varphi_n|_{[x_j, x_{j+1})} &= \inf_{[x_j, x_{j+1})} f \end{aligned}$$

TODO: Abb 4

$$\|\psi_n - \varphi_n\|_1 = \int_X |\psi_n - \varphi_n| d\mu = \sum_{j=0}^k \left(\sup_{[x_j, x_{j+1})} f - \inf_{[x_j, x_{j+1})} f \right) \cdot |x_{j+1} - x_j| \xrightarrow{\Delta(Z) \rightarrow 0} 0$$

Da $|\varphi_n| \leq |\psi_1| + |\varphi_1|$ und $|\psi_1| + |\varphi_1| \in L^1$, kann man den Satz der dominierten Konvergenz anwenden und erhält:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \varphi_n d\mu = \int_X \varphi d\mu \quad \text{und} \quad \varphi_n \rightarrow \varphi \text{ fast überall}$$

Genauso ist $|\psi_n| \leq |\psi_1| + |\varphi_1|$ und $|\psi_1| + |\varphi_1| \in L^1$, also nach der dominierten Konvergenz:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \psi_n d\mu = \int_X \psi d\mu \quad \text{und } \psi_n \rightarrow \psi \text{ fast überall}$$

Da

$$\begin{aligned} \int \psi_n d\mu &= R - \int \varphi_n d\mu \rightarrow R - \int_Y f dx \\ \int \varphi_n d\mu &= R - \int \psi_n d\mu \rightarrow R - \int_Y \psi d\mu \end{aligned}$$

folgt:

$$\int |\varphi - \psi| d\mu = 0 = \|\varphi - \psi\|_1$$

Also gilt $\varphi = \psi$ fast überall. Da $\varphi \leq f \leq \psi$ folgt f ist Lebesgue-integrierbar und $\int_Y f d\mu = R - \int_Y \varphi d\mu = \int_Y \psi d\mu = R - \int_Y \varphi d\mu = \int_Y f d\mu$.

□_{1.6.1}

1.6.2 Beispiele

- i) $f = \chi_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ ist fast überall 0, also ist f Lebesgue-integrierbar und $\int_{[0,1]} f d\mu = 0$ aber $\bar{S}_f - \underline{S}_f \geq 1$ für beliebige Zerlegungen, also ist f nicht R -integrierbar.
- ii) Konstruiere Funktion f , die Lebesgue-integrierbar ist, die aber nicht R -integrierbar ist, selbst wenn man sie auf einer Nullmenge beliebig abändert $\mathbb{Q} \cap [0,1] = \{q_n | n \in \mathbb{N}\}$ ist abzählbar. Setze $U_n = B_{\frac{\varepsilon}{2^n}}(q_n)$ mit $0 < \varepsilon < 1$. $U := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n \leq \sum_n \mu(U_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\varepsilon}{2^n} = 2\varepsilon$. Setze $f = \chi_U$, dann ist $f|_{\mathbb{Q} \cap [0,1]} = 1$.

$$\int f d\mu = \mu(U) < \varepsilon$$

TODO: Rest einfügen

1.7 Die Räume L^p

TODO: Rest einfügen

Einschub

Sei $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ messbar.

Frage: Wann ist die Funktion integrierbar?

Definition

f ist integrierbar, falls es eine Folge (φ_n) von Treppenfunktionen gibt, die

- L^1 -Cauchy-Folge ist und
- $\varphi_n \rightarrow f$ fast überall punktweise gilt.

$$\int_X d\mu := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \varphi_n d\mu$$

Einfacher ist folgende Methode:

$|f| : X \rightarrow [0, \infty)$ ist wieder messbar und

$$\int_X |f| d\mu := \sup \left\{ \int_X \varphi d\mu \text{ mit } 0 \leq \varphi \leq f \text{ und } \varphi \text{ Stufenfunktion} \right\} \in [0, \infty]$$

ist wohldefiniert.

Falls (X, μ) schon σ -endlich ist, kann man hier „Stufenfunktion“ durch „Treppenfunktion“ ersetzen.

Stufenfunktion: $\#\varphi(X) < \infty$ und φ messbar:

$$\varphi(x) = \sum_{y \in \varphi(X)} y \cdot \chi_{\varphi^{-1}(y)}(x) \geq 0$$

Betrachte $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$ mit $\bigcup A_n = X$ und $\mu(A_n) < \infty$.

$$\varphi_n(x) = \sum_{y \in \varphi(X)} y \cdot \chi_{A_n \cap \varphi^{-1}(y)}(x)$$

$\varphi_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \varphi$ punktweise und φ_n aufsteigend.

Die φ_n sind dann Treppenfunktionen und nach monotoner Konvergenz ist:

$$\int_X \varphi d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \varphi_n d\mu$$

Also ist

$$\sup \left\{ \int_X \varphi d\mu \text{ mit } 0 \leq \varphi \leq f \text{ Stufenfunktion} \right\} \\ \sup \left\{ \int_X \varphi d\mu \text{ mit } 0 \leq \varphi \leq f \text{ Treppenfunktion} \right\}$$

1. Fall: $\int_X |f| d\mu = +\infty$. Dann ist f nicht integrierbar ($\notin L^1$), weil die L^1 -Norm $\int_X |f| d\mu$ nicht endlich ist.

2. Fall: $\int_X |f| d\mu < \infty$

Dann ist f tatsächlich integrierbar, wie man folgendermaßen sieht:

Zerlege $f = f_+ - f_-$ mit $f_+ = \max\{f, 0\}$ und $f_- = \max\{-f, 0\}$.

Die Funktionen f_{\pm} sind messbar und nicht-negativ, außerdem $f_{\pm} \leq |f|$. Damit folgt:

$$\int_X f_+ d\mu, \int_X f_- d\mu < \infty$$

Nach Satz ??1.1.8 gibt es Treppenfunktionen $(\varphi_n^+), (\varphi_n^-)$ mit $\varphi_n^+ \xrightarrow{\text{steigender Pfeil}} f_+$ und $\varphi_n^- \xrightarrow{\text{steigender Pfeil}} f_-$.

Setze $f_n := \varphi_n^+ - \varphi_n^-$. Dann ist $f_n \rightarrow f$ und $|f_n| \leq |f|$.

Nach dominierter Konvergenz ist dann f integrierbar und:

$$\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

1.7.1 Theorem

$L^p(X)$ ist ein normierter Raum.

Beweis

$\|\cdot\|_p$ ist eine Norm:

– Homogenität:

$$\begin{aligned} \|\lambda f\|_p &= \left(\int_X |\lambda f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} = |\lambda| \|f\|_p \\ \|\lambda f\|_\infty &= \supess |\lambda f| = \supess |\lambda| |f| = |\lambda| \|f\|_\infty \end{aligned}$$

– Dreiecksungleichung:

$$\begin{aligned} \|f + g\|_p &\stackrel{\text{Monotonie}}{\leq} \| |f| + |g| \|_p \\ &\stackrel{\text{Minkowski}}{\leq} \|f\|_p + \|g\|_p \end{aligned}$$

– Definitheit: $\|f\|_p = 0 \Rightarrow f = 0$

Sei $0 = \left(\int |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}$, also folgt:

$$\begin{aligned} \int |f|^p d\mu &= 0 \\ \Rightarrow |f|^p &= 0 \text{ fast überall} \\ \Rightarrow f &= 0 \text{ fast überall} \\ \Rightarrow f &= 0 \text{ in } L^p(X) \end{aligned}$$

Sei $\|f\|_\infty = 0$, dann folgt: $\supess |f| = 0$, also $|f| = 0$ fast überall, also $|f| \leq \varepsilon$ fast überall für alle $\varepsilon > 0$. Damit folgt $|f| = 0$ fast überall, also $f = 0$ in L^∞ .

□_{1.7.1}

1.7.2 Theorem

$L^p(X)$ ist vollständig. ($1 \leq p \leq \infty$)

Beweis

1. Zunächst der Fall
- $p = \infty$
- :

Sei (f_n) eine Cauchy-Folge in L^∞ , also $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$ mit $\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon \forall n, m \in \mathbb{N}_{>N}$.

$f_k(x) \leq \|f_k\|_\infty$ fast überall, also mit Ausnahme einer Nullmenge A_k

Entsprechend:

$|f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty$ fast überall, also mit Ausnahme einer Nullmenge B_{nm}

Die Menge

$$E := \bigcup_k A_k \cup \bigcup_{m,n} B_{mn}$$

ist als Vereinigung abzählbar vieler Nullmengen wieder eine Nullmenge.

Wir wissen $\forall k, m, n \in \mathbb{N}$ und für $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$:

$$\begin{aligned} |f_k(x)| &\leq \|f_k\|_\infty && \forall x \in X \setminus E \\ |f_n(x) - f_m(x)| &\leq \|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon && \forall x \in X \setminus E \end{aligned}$$

Also $f_n \rightrightarrows f$ auf $X \setminus E$.

(Wobei $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ durch diesen Grenzwert definiert)

Setze $f = 0$ auf E .

Dann ist $f \in L^\infty(X)$ und $\|f_n - f\| = \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in X \setminus E} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

2. Fall
- $p < \infty$
- :

Sei (f_n) eine Cauchy-Folge in L^p . wähle eine Teilfolge (zur Einfachheit wieder mit (f_n) bezeichnet), so dass $\|f_{n+1} - f_n\| < 2^{-n}$.

Setze:

$$g_n = \sum_{i=1}^n |f_{i+1} - f_i| \qquad g = \sum_{i=1}^{\infty} |f_{i+1} - f_i|$$

(a) Fall a): Reihe konvergiert: $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = \sup_n g_n(x)$.

(b) Fall b): Reihe divergiert: $g(x) = \infty$ und $g_n(x)$ ist unbeschränkt, also $g(x) = \sup_n g_n(x)$.

$$\begin{aligned} \|g_n\| &= \| |f_2 - f_1| + |f_3 - f_2| + \dots + |f_{n+1} - f_n| \|_p \leq \\ &\leq \|f_2 - f_1\|_p + \|f_3 - f_2\|_p + \dots + \|f_{n+1} - f_n\|_p \leq \sum_{i=1}^n 2^{-i} < 1 \end{aligned}$$

Also gilt $\int_X |g_n|^p d\mu = \|g_n\|_p^p \leq 1$.

Also $g_n \nearrow (TODO : arrow)$ und $g(x) = \sup_n g_n(x)$.

Nach monotoner Konvergenz (Theorem ??1.5.2) folgt:

$$\int_X g^p d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n^p d\mu \leq 1$$

Also ist $g \in L^p$ und $\|g\|_p \leq 1$. Insbesondere ist g fast überall endlich.

Das heißt, dass die Reihe $\sum_{i=1}^{\infty} |f_{i+1}(x) - f_i(x)|$ für fast alle x konvergiert.

$$f_{n+1} = f_1 + \sum_{i=1}^n (f_{i+1} - f_i)$$

$$f(x) := f_1(x) + \sum_{i=1}^{\infty} (f_{i+1}(x) - f_i(x))$$

$f(x)$ ist fast überall wohldefiniert, weil die Reihe fast überall absolut konvergiert.

Für alle x , für welche die Reihe *nicht* absolut konvergiert, setzen wir $f(x) := 0$.

$f_n \rightarrow f$ fast überall. Also auch $|f_n - f|^p \rightarrow 0$ fast überall.

$$|f_n - f|^p \leq \left| \underbrace{f_1}_{\in L^p} + \underbrace{g}_{\in L^p} \right| \in L^1$$

Nach dem Satz von der dominierten Konvergenz folgt: $\int_X |f - f_n|^p d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, also $f_n \rightarrow f$ in L^p .

□_{1.7.2}

Beispiel

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

$$\sup_{\mathbb{R}} f = \inf \left\{ \alpha \in \mathbb{R} \mid f(x) \leq \alpha \ \forall_{x \in \mathbb{R}} \right\} = 1$$

$$\text{supess}_{\mathbb{R}} f = \inf \{ \alpha \in \mathbb{R} \mid f(x) \leq \alpha \text{ für fast alle } x \in \mathbb{R} \} = 0$$

1.8 Das Lebesgue-Maß auf \mathbb{R}^n

Ziel: Konstruiere das n -dimensionale Lebesgue-Maß induktiv aus dem eindimensionalen.

Gebe vor: (X, \mathcal{A}, μ) und (Y, \mathcal{B}, ν) σ -endliche Maße.

Zum Beispiel: $X = Y = \mathbb{R}$, $\mathcal{A} = \mathcal{B} = \mathcal{M}(\mathbb{R})$ und $\mu = \nu$ Lebesgue-Maß.

$$X \times Y = \{(x; y) \mid x \in X, y \in Y\}$$

Wir wollen auf $X \times Y$ ein Maß konstruieren, das sogenannte *Produktmaß*.

Definition

$A \times B$ mit $A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}$ nenne „Rechteck“.

TODO: Abb1

$\mu(A) \cdot \nu(B)$ liefert darauf einen sinnvollen „Volumenbegriff“.

$$A \times B \in \mathcal{P}(X \times Y)$$

$$\mathcal{A} \times \mathcal{B} := \left\{ \bigcup_{k=1}^n A_k \times B_k \mid A_k \in \mathcal{A}, B_k \in \mathcal{B}, n \in \mathbb{N} \right\} \subseteq \mathcal{P}(X \times Y)$$

$\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ bezeichnet die von $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ erzeugte σ -Algebra.

1.8.1 Satz

$\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ ist eine Mengenalgebra.

Beweis

Zeige, dass Schnitte und Komplemente von Elementen aus $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ wieder in $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ liegen.

TODO: Abb2

$$\begin{aligned}(A_1 \times B_1) \cap (A_2 \times B_2) &= (A_1 \cap A_2) \times (B_1 \cap B_2) \\ \complement(A \times B) &= R_1 \dot{\cup} \dots \dot{\cup} R_2 = (\complement A) \times B \dot{\cup} A \times (\complement B) \dot{\cup} (\complement A) \times (\complement B) \\ R_1 \dot{\cup} R_5 &= (\complement A) \times B \\ R_3 \dot{\cup} R_7 &= A \times (\complement B)\end{aligned}$$

□_{1.8.1}

TODO: Rest einfügen

1.8.2 Satz

TODO: Rest einfügen

1.8.3 Definition

TODO: Rest einfügen

1.8.4 Lemma

TODO: Rest einfügen

1.8.5 Lemma

TODO: Rest einfügen

1.8.6 Satz (Cavalierisches Prinzip)

TODO: Rest einfügen

Bonaventura Cavalieri 1598-1647

TODO: Abb1

(gleiche Schnittflächen, gleiche Volumina)

1.8.7 Satz

Seien (X, \mathcal{A}, μ) , (Y, \mathcal{B}, ν) σ -endliche Maßräume. Dann existiert genau ein Maß $\mu \otimes \nu : \mathcal{A} \otimes \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ mit $(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A) \cdot \nu(B)$, das sogenannte *Produktmaß*.

$$\begin{aligned}
 (\mu \otimes \nu)(M) &= \int_X \left(\int_Y \chi_M(x,y) \, dy \right) dx = \\
 &= \int_Y \underbrace{\left(\int_X \chi_M(x,y) \, dx \right)}_{=\mu(M)} dy
 \end{aligned}$$

1.8.8 Definition (monotones Mengensystem)

Sei $A_i \in \mathcal{M}$.

$$\begin{aligned}
 A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots &\Rightarrow \bigcup_i A_i \in \mathcal{M} \\
 A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots &\Rightarrow \bigcap_i A_i \in \mathcal{M}
 \end{aligned}$$

1.8.9 Satz

Ist \mathcal{M} das kleinste monotone Mengensystem, das $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ enthält, so ist $\mathcal{M} = \mathcal{A} \times \mathcal{B}$.

1.8.10 Lemma

Sei $M \in \mathcal{A} \times \mathcal{B}$. Dann gilt:

- i) $\chi_M(X, \cdot)$ ist \mathcal{B} -messbar.
- ii) $x \mapsto \int \chi_M(x, y) \, dy$ ist \mathcal{A} -messbar.

Beweis

Sei $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{A} \times \mathcal{B}$ das Mengensystem, das (i) und (ii) erfüllt.

- $\mathcal{A} \times \mathcal{B} \subseteq \mathcal{M}$
- \mathcal{M} ist ein monotones Mengensystem.
Sei χ_{M_n} messbar $\Rightarrow \sup \chi_{M_n}, \inf \chi_{M_n}$, punktweiser Limes wieder messbar
- monotone Konvergenz
- dominierte Konvergenz $\Rightarrow \mathcal{M} = \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$

Beweis von Satz 8.6

Definiere $(\mu \otimes \nu)(M) := \int_X \left(\int_Y \chi_M(x, y) \, dy \right) dx : \mathcal{A} \otimes \mathcal{B} \rightarrow [0, \infty]$ wohldefiniert und σ -additiv.

Seien $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $M_n \subseteq \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ paarweise disjunkt, $M := \bigcup_{n=1}^{\infty} M_n$.

$\sum_{n=1}^{\infty} \chi_{M_n} = \chi_{M_1 \cup \dots \cup M_n} \nearrow \chi_M$ ist eine aufsteigende Folge messbarer Funktionen, die punktweise konvergiert.

Nach monotoner Konvergenz folgt

$$g_N(x) := \int_Y \chi_{M_1 \cap \dots \cap M_N}(x, y) dy \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \int_Y \chi_M(x, y) dy = g(x)$$

und $g_N(x)$ ist aufsteigend (also $g_{N+1}(x) \geq g_N(x)$).

Nochmals monotone Konvergenz liefert:

$$\begin{aligned} \int_X g_N(x) dx &\xrightarrow{N \rightarrow \infty} \int_X g(x) dx = \int_X \left(\int_Y \chi_M(x, y) dy \right) dx = (\mu \otimes \nu)(M) \\ (\mu \otimes \nu)(M_1 \cup \dots \cup M_N) &= \int_X \underbrace{\left(\int_Y \chi_{M_1 \cup \dots \cup M_N}(x, y) dy \right)}_{=g_N(x)} dx \end{aligned}$$

Also $\sum_{n=1}^{\infty} (\mu \otimes \nu)(M_n) = (\mu \otimes \nu)(M)$. Also ist $\mu \otimes \nu$ ein Maß auf $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$.

Eindeutigkeit:

$\mu \otimes \nu|_{\mathcal{A} \times \mathcal{B}}$ ist ein Prämaß auf der Mengenalgebra $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$, weil die σ -Additivität bei Einschränkung auf $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ erhalten bleibt.

Nach dem Satz von Hahn ist die Erweiterung von $\mu \otimes \nu|_{\mathcal{A} \times \mathcal{B}}$ zu einem Maß auf $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ eindeutig.

□_{1.8.10}

1.8.11 Korollar

Sei $f : X \rightarrow [0, \infty]$ messbar.

Betrachte das Produktmaß $\mu \otimes \lambda$ auf $X \otimes \mathbb{R}$, wobei λ das 1-dimensionale Lebesguemaß ist.

Dann ist die Menge

$$M^f := \{(x, t) \mid 0 \leq t < f(x)\} \subseteq X \times \mathbb{R}$$

messbar und:

$$(\mu \otimes \lambda)(M^f) = \int_X f dy$$

TODO: Abb2

Beweis

Die Funktion $\varphi : (x, t) \mapsto f(x) - t$ ist messbar, also ist auch $M^f = \varphi^{-1}((0, \infty]) \cap X \times \mathbb{R}_{\geq 0}$.

Nach dem Cavalierischen Prinzip ist $(\chi_{M^f}(x, t) = \chi_{[0, f(x))})$:

$$\begin{aligned} (\mu \otimes \lambda)(M^f) &= \int_X \underbrace{\left(\int_{\mathbb{R}} \chi_{M^f}(x, t) dt \right)}_{= \int_0^{f(x)} dt = f(x)} dx = \\ &= \int_X f(x) dx \end{aligned}$$

□_{1.8.11}

Seien nun X, Y zwei σ -endliche Maßräume und $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ messbar.

$$\int_{X \times Y} f(x, y) d(\mu \otimes \nu) \stackrel{?}{=} \int_Y \left(\int_X f(x, y) dx \right) dy$$

1.8.12 Theorem (Fubini)

a) Ist $f \geq 0$, so gilt:

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) dx \right) dy \in [0, \infty] \quad (X) \quad (1.7)$$

b) Ist f integrierbar (, das heißt $\int_{X \times Y} |f(x, y)| d(\mu \otimes \nu) < \infty$), so ist

$$\int_X f(x, y) dx$$

für fast alle $y \in Y$ definiert, ist eine integrierbare Funktion und (X) gilt (mit Werten in \mathbb{R}).

Beweis

a) $\int_X f(x, y) dx = (\mu \otimes \lambda)(M_y^f)$ und $M_y^f = \{(x, t) | 0 \leq t < f(x, y)\} \subseteq X \times \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu) &= \underbrace{(\nu \otimes (\mu \otimes \lambda))}_{=\nu \otimes \mu \otimes \lambda} (M^f) = \nu \otimes \mu \otimes \lambda (M^f) = \\ &= \int_Y \mu \otimes \lambda (M^f) dy = \int_Y \left(\int_X f(x, y) dx \right) dy \end{aligned}$$

nach letztem Korollar. (Man kann beliebig assoziativ Klammern, weil das Produktmaß eindeutig ist.)

b) Sei $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ messbar.

Schreibe $f = f^+ - f^-$ mit $f_+ = \max(f, 0)$ und $f_- = \max(-f, 0)$. f_{\pm} sind nicht-negativ und messbar.

Ist f außerdem integrierbar, so ist:

$$\begin{aligned} \int_{X \times Y} |f(x, y)| d(\mu \otimes \nu) &< \infty \\ &\geq \int_{X \times Y} f_{\pm}(x, y) d(\mu \otimes \nu) \end{aligned}$$

Nach a) gilt:

$$\begin{aligned} \int_{X \times Y} f_+(x, y) d(\mu \otimes \nu) &= \int_Y \left(\int_X f_+(x, y) dx \right) dy < \infty \\ \int_{X \times Y} f_-(x, y) d(\mu \otimes \nu) &= \int_Y \left(\int_X f_-(x, y) dx \right) dy < \infty \end{aligned}$$

$$\int_{X \times Y} f(x, y) d(\mu \otimes \nu) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) dx \right) dy < \infty$$

Guido Fubini (1879-1943)

Beppo Levi (1875-1961)

Die Bedingung f integrierbar ist notwendig, wie folgendes Beispiel zeigt:

1.8.13 Beispiel

$$g_n(t) := \begin{cases} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)^{-1}, & \text{falls } \frac{1}{n+1} \leq t < \frac{1}{n} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

TODO: Abb 3

$$\int_0^1 g_n(t) dt = 1$$

$$f(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot (g_n(x) - g_{n+1}(x)) g_n(y)$$

$$f : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{messbar}$$

[[mit $a_n - a_{n-1} = 2^{-n}$]]

TODO: Abb4

—

$$\int_0^1 f(x, y) dx = \int n \cdot (g_n(x) - g_{n+1}(x)) g_n(y)$$

Dabei ist n so gewählt, dass $\frac{1}{n+1} \leq y < \frac{1}{n}$.

$$\int f(x, y) dx = n \cdot g_n(y) \left(\underbrace{\int_{\mathbb{R}} g_n(x)}_{=1} - \underbrace{\int_{\mathbb{R}} g_{n+1}(x)}_{=1} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dx \right) dy = 0$$

— Mit $\frac{1}{n+1} \leq x < \frac{1}{n}$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x, y) dy &= g_n(x) \int (n \cdot g_n(y) - (n-1) g_{n-1}(y)) dy = \\ &= g_n(x) \left(n \cdot \underbrace{\int_0^1 g_n(y) dy}_{=1} - (n-1) \underbrace{\int_0^1 g_{n-1}(y) dy}_{=1} \right) = g_n(x) [[\cdot 2^{-n}]] \end{aligned}$$

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dy \right) dx = \sum_n \int_0^1 g_n(x) dx = +\infty [[\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1]]$$

Also $0 = \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dx \right) dy \neq \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dy \right) dx = +\infty$.

Grund: $\int_{[0,1] \times [0,1]} |f(x, y)| dx \otimes dy = +\infty$, also nicht integrierbar.

- [[Man kann erreichen, dass $0 = \int (\int f(x,y) dx) dy \neq \int (\int f(x,y) dy) dx = 1$. Auch hier gilt:

$$\begin{aligned} & \int_{[0,1] \times [0,1]} |f(x,y)| dx \otimes dy = +\infty \\ &= \int_0^1 \left(\int_0^1 |f(x,y)| dx \right) dy = \int \left(\int |f(x,y)| dy \right) dx \end{aligned}$$

]]

Wichtigster Fall:

$d\mu, d\nu$ ist jeweils das 1-dimensionale Lebesguemaß.

$\underbrace{d\mu \otimes \dots \otimes d\mu}_{n \text{ Faktoren}}$ ist das Lebesguemaß auf \mathbb{R}^n .

Was ist eine Lebesguesche Nullmenge?

$$\begin{aligned} \{0\} \times \mathbb{R} &\subseteq \mathbb{R}^2 \\ (\mu \otimes \mu)(\{0\} \times \mathbb{R}) &= \mu(\{0\}) \cdot \mu(\mathbb{R}) = „0 \cdot \infty“ = 0 \end{aligned}$$

Beweis

$$A := \{0\} \times \mathbb{R} = \bigcup_{n=-\infty}^{\infty} \underbrace{\{0\} \times [n, n+1)}_{=: A_n} = \dot{\bigcup}_{n=-\infty}^{\infty} A_n$$

Wegen σ -Additivität folgt:

$$\mu(A) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mu(A_n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (0 \cdot 1) = 0$$

1.8.14 Beispiel

$$\int_0^{\infty} \left(\int_0^{\infty} e^{-\frac{x}{y}-y^2} dy \right) dx$$

Der Integrand ist nicht-negativ. Darum können wir die Integrale nach Fubini vertauschen. Wir können $x, y > 0$ annehmen.

$$\int_0^{\infty} \left(\int_0^{\infty} e^{-\frac{x}{y}-y^2} dx \right) dy = e^{-y^2} \int_0^{\infty} e^{-\frac{x}{y}} dx = e^{-y^2} \left(-ye^{-\frac{x}{y}} \right) \Big|_0^{\infty} = e^{-y^2} \cdot y$$

$$\int_0^{\infty} e^{-y^2} \cdot y dy = -\frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{d}{dy} (e^{-y^2}) dy = -\frac{1}{2} e^{-y^2} \Big|_0^{\infty} = -\frac{1}{2}$$

1.9 Die Transformationsformel

1-dimensionale Variablentransformation

$$\varphi : [a, b] \rightarrow [\varphi(a), \varphi(b)] \in C^1$$

und (streng) monoton steigend.

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u) \, du = \int_a^b f(\varphi(t)) \cdot |\varphi'(t)| \, dt$$

In höherer Dimension: $V = \varphi(U)$ und $\varphi : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow V \subseteq \mathbb{R}^n$ ein C^1 -Diffeomorphismus.

$$\int_{V \subseteq \mathbb{R}^n} f(y) \, dy = \int_U f(\varphi(x)) \cdot \left| \det \underbrace{D\varphi}_{\text{Jacobi-Matrix}} \right| dx$$

2 Komplexe Analysis

2.1 Grundlagen, die Riemannsche Zahlenkugel

2.1.1 Definition

Sei $X \neq \emptyset$ eine Menge.

TODO: Rest

TODO: Abb1

Riemannsche Zahlenkugel

$$\varphi : S^2 \setminus \{N\} \rightarrow \mathbb{C}$$

bijektiv, stetig, φ^{-1} stetig

$$\varphi : S^2 \rightarrow \overline{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup \{\infty\}, N \mapsto \infty$$

bijektiv.

Wähle auf $\overline{\mathbb{C}}$ die Topologie $\mathcal{O} := \{\varphi(\Omega) \mid \Omega \subseteq S^2 \text{ offen}\}$.

$S^2 \subseteq S^3$ ist ein kompakter topologischer Raum. Also auch $\overline{\mathbb{C}}$.

$\overline{\mathbb{C}}$ ist eine Kompaktifizierung von \mathbb{C} .

1-Punkt-Kompaktifizierung (denn nur ein Punkt ∞ wurde hinzugenommen)

Andere Beispiele von Kompaktifizierungen:

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$$

2-Punkt-Kompaktifizierung

$\varphi : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ (zum Beispiel $\tan(\frac{\pi}{2}x)$) Homomorphismus.

Erweitere nun:

$$\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$$

$$1 \mapsto +\infty$$

$$-1 \mapsto -\infty$$

Wähle auf \mathbb{R} die Topologie:

$$\mathcal{O} := \{\varphi(\Omega) \mid \Omega \text{ offen in } [-1, 1] \text{ bezüglich der Relativtopologie}\}$$

Beispiel für eine andere Kompaktifizierung von \mathbb{C} .

TODO: Abb2

$$\tilde{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup S^1$$

erweitere φ :

$$\begin{aligned}\varphi : \overline{\mathcal{H}} = \mathcal{H} \dot{\cup} S^1 &\rightarrow \tilde{\mathbb{C}} \\ x \in S^1 &\rightarrow x \in S^1\end{aligned}$$

Sei (z_n) , $z_n \in \mathbb{C}$ eine Folge. Betrachte $x_n \in \mathcal{H}$ mit $\varphi(x_n) = z_n$. (x_n) besitzt Häufungspunkt $x \in \overline{\mathcal{H}}$.

Falls $x \in \mathcal{H}$, dann folgt $\varphi(x)$ ist Häufungspunkt von (z_n) .

Falls $x \in S^1$, dann folgt $\varphi(x) \in \overline{\mathbb{C}} \setminus \mathbb{C}$ ist ein Häufungspunkt in $\overline{\mathbb{C}}$.

2.2 Analytische Funktionen, die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen

Sei $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ offen.

2.2.1 Definition

Eine Funktion $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ heißt in $z \in \Omega$ (komplex) differenzierbar mit komplexer Ableitung f' , falls der Limes

$$\lim_{z \rightarrow z', z' \neq z} \frac{\overbrace{f(z') - f(z)}^{\in \mathbb{C}}}{\underbrace{z' - z}_{\in \mathbb{C}}} = f'(z) \in \mathbb{C}$$

existiert. Ist f für jedes $z \in \Omega$ differenzierbar, so heißt f in Ω holomorph.

2.2.2 Beispiele

a) $f(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0$ komplexes Polynom, das heißt $a_k \in \mathbb{C}$.

$$\begin{aligned}f(z') - f(z) &= a_n (z'^n - z^n) + a_{n-1} (z'^{n-1} - z^{n-1}) + \dots + a_1 (z' - z) = \\ &= (z' - z) \left(a_n \left((z')^{n-1} + (z')^{n-2} \cdot z + (z')^{n-3} z^2 + \dots + z^{n-1} \right) + \dots + a_1 \right)\end{aligned}$$

Dividiere durch $z' - z$ und bilden den Limes $z' \rightarrow z$:

$$f'(z) = n a_n z^{n-1} + (n-1) a_{n-1} z^{n-2} + \dots + a_1$$

Dies ist dasselbe wie die Ableitung eines reellen Polynoms.

b) Nehme an, $f(z)$ ist reellwertig (zum Beispiel $f(z) = |z|^2$) und komplex differenzierbar.

Das heißt

$$f'(z) = \lim_{z' \rightarrow z, z' \neq z} \frac{f(z') - f(z)}{z' - z}$$

existiert. Betrachte speziell $z' = z + h$ mit $h \in \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$.

Dann ist

$$f'(z) = \lim_{h \rightarrow 0, h \neq 0} \frac{\overbrace{f(z+h)}^{\in \mathbb{R}} - \overbrace{f(z)}^{\in \mathbb{R}}}{\underbrace{h}_{\in \mathbb{R}}} \in \mathbb{R}$$

reell.

Betrachte nun $z' = z + \mathbf{i}h$ mit $h \in \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$. Dann ist

$$f'(x) = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{\overbrace{f(z+h)}^{\in \mathbb{R}} - \overbrace{f(z)}^{\in \mathbb{R}}}{\underbrace{\mathbf{i}h}_{\in \mathbf{i}\mathbb{R}}} \in \mathbf{i}\mathbb{R}$$

rein imaginär.

Insgesamt folgt $f'(z) = 0$.

Was heißt komplex differenzierbar?

Sei $f: \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ mit $z = x + \mathbf{i}y \in \Omega$, $x, y \in \mathbb{R}$ und $f = u + \mathbf{i}v$, $u = \operatorname{Re}(f)$, $v = \operatorname{Im}(f)$.

$$f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}: (x, y) \mapsto \begin{pmatrix} u(x, y) \\ v(x, y) \end{pmatrix}$$

Wir wissen, was *reell* differenzierbar bedeutet, nämlich:

$$f(x + h_1, y + h_2) = f(x, y) + A \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} + o(h)$$

$g \in o(h)$ heißt:

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{g(h)}{\|h\|} = 0$$

Dabei ist $h = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}$ und $\|h\| = \sqrt{h_1^2 + h_2^2}$.

Außerdem ist $A \in L(\mathbb{R}^2)$ die Jacobi-Matrix.

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix}$$

2.2.3 Satz

f ist genau dann in $z \in \mathbb{C}$ komplex differenzierbar, wenn f in (x, y) reell differenzierbar ist und die sogenannte *Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen* erfüllt:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

Günstige Notation:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &:= \frac{\partial u}{\partial x} + \mathbf{i} \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &:= \frac{\partial u}{\partial y} + \mathbf{i} \frac{\partial v}{\partial y}\end{aligned}$$

Dann kann man die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen in folgender Form schreiben:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\mathbf{i} \frac{\partial f}{\partial y}$$

Realteil:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$$

Imaginärteil:

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$$

Beweis

Die Bedingung von komplexer Differenzierbarkeit kann man auch mit einer „Approximationsformel“ schreiben:

$$f(z+h) = f(z) + f'(z)h + o(h)$$

$h = h_1 + \mathbf{i}h_2$ mit:

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{o(h)}{|h|} = 0$$

Dies ist äquivalent zu:

$$\frac{f(z+h) - f(z)}{h} - f'(z) = \frac{o(h)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

Diese Approximationsformel ist also tatsächlich äquivalent zur Existenz des Limes des Differenzenquotienten.

Schreibe nun den Real- und Imaginärteil aus.

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \Big|_{(x+h_1, y+h_2)} = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \Big|_{(x, y)} + \begin{pmatrix} \operatorname{Re}(f'(z)) & -\operatorname{Im}(f'(z)) \\ \operatorname{Im}(f'(z)) & \operatorname{Re}(f'(z)) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} + o(h)$$

$$\operatorname{Re}(f'(z) \cdot h) = \operatorname{Re}(f'(z)) \cdot \operatorname{Re}(h) - \operatorname{Im}(f'(z)) \cdot \operatorname{Im}(h)$$

$$\operatorname{Im}(f'(z) \cdot h) = \operatorname{Re}(f'(z)) \cdot \operatorname{Im}(h) + \operatorname{Im}(f'(z)) \cdot \operatorname{Re}(h)$$

$$h_1 = \operatorname{Re}(h), h_2 = \operatorname{Im}(h)$$

Hierin sieht man folgendes:

1. Ist f komplex differenzierbar, so auch reell differenzierbar und:

$$\begin{aligned}\operatorname{Re}(f'(z)) &= \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \operatorname{Im}(f'(z)) &= -\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x}\end{aligned}$$

Also sind die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen erfüllt.

2. Ist f reell differenzierbar und die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen sind erfüllt.

Dann erfüllt $\alpha := \frac{\partial u}{\partial x} + \mathbf{i} \frac{\partial v}{\partial x} \in \mathbb{C}$ die Approximationsformel:

$$f(z+h) = f(z) + \alpha h + o(h)$$

Denn:

$$\begin{pmatrix} \operatorname{Re}(\alpha h) \\ \operatorname{Im}(\alpha h) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \operatorname{Re}(\alpha) & -\operatorname{Im}(\alpha) \\ \operatorname{Im}(\alpha) & \operatorname{Re}(\alpha) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \operatorname{Re}(h) \\ \operatorname{Im}(h) \end{pmatrix}$$

□_{2.2.3}

Beispiel und Definition

Cauchy-Riemannsche Differentialgleichungen:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad (1) \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (2)$$

Nehme an, dass u und v zweimal stetig reell differenzierbar sind. Dann folgt:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \stackrel{(1)}{=} \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} \stackrel{(2)}{=} -\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

Laplace-Operator:

$$\Delta := \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

Laplace-Gleichung:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \stackrel{!}{=} 0$$

Lösungen der Laplace-Gleichung nennt man auch *harmonisch*.

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \stackrel{(2)}{=} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \stackrel{(1)}{=} -\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$$

u und v sind durch die Cauchy-Riemannsche Differentialgleichungen miteinander verknüpft.

Man sagt dazu auch: u und v sind zueinander *konjugierte harmonische Funktionen*.

Hilfreich: $z = x + \mathbf{i}y$ und $\bar{z} = x - \mathbf{i}y$. Fasse x und y als komplexe Zahlen auf. Dann sind z und \bar{z} zwei unabhängige komplexe Variablen.

$$f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, f(x, y) = f(z, \bar{z})$$

$z = x + \mathbf{i}y$ also:

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{\partial x}{\partial z} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial z} \frac{\partial}{\partial y}$$

$$x = \frac{1}{2}(z + \bar{z}) \qquad y = \frac{1}{2\mathbf{i}}(z - \bar{z})$$

TODO: Rest

Wiederholung:

- Rationale Funktionen für Polynome P, Q :

$$R(z) := \frac{P(z)}{Q(z)}$$

- **Satz 2.4.1** (Partialbruchzerlegung)

Sei $Q(z) = (z - \zeta_1) \cdot \dots \cdot (z - \zeta_n)$, dann \exists_{G, G_j} so dass

$$R(z) = G(z) + \sum_{j=1}^n G_j \left(\frac{1}{z - \zeta_j} \right)$$

\leadsto in Argumenten $z, \frac{1}{z - \zeta_j}$

ENDE: Wiederholung

Dies führt einen dazu, die Transformationen $z \mapsto \frac{1}{z - \zeta}$ zu betrachten. Etwas allgemeiner:

2.2.4 Definition

Eine rationale Funktion

$$\zeta(z) = \frac{az + b}{cz + d}$$

mit $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ und $ad - cb \neq 0$ heißt *Möbiustransformation*.

Bemerkung

Die Bedingung $ad - bc \neq 0$ bedeutet gerade, dass die Nullstellen von Zähler und Nenner verschieden sind, denn:

$$z_{\text{Nenner}} = -\frac{d}{c} \neq -\frac{b}{a} = z_{\text{Zähler}}$$

Somit:

$$s \neq 0$$

S ist eine Abbildung:

$$S : \mathbb{C} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\} \rightarrow \mathbb{C}$$

Erweitere durch die Vorschrift:

$$S(\infty) := \frac{a}{c} \qquad S\left(-\frac{d}{c}\right) := \infty$$

zu

$$S : \overline{\mathbb{C}} \rightarrow \overline{\mathbb{C}}$$

bijektiv, stetig und hat stetige Inverse, dies nennt man *Homöomorphismus der Riemannschen Zahlenkugel*.

Betrachte nun *homogene Koordinaten*:

$$z =: \frac{z_1}{z_2} \qquad w =: \frac{w_1}{w_2}$$

(Beachte: $w_j, z_j \in \mathbb{C}$ sind nicht eindeutig bestimmt, da nur der Quotient von Bedeutung ist.)

Die Möbiustransformation lässt sich dann schreiben als

$$\frac{w_1}{w_2} = \frac{az_1 + bz_2}{cz_1 + dz_2}$$

oder in Matrixform:

$$\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}}_{=:S} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

Die Möbiustransformationen bilden also eine Gruppe unter der Matrixmultiplikation, da S^{-1} existiert, weil die Determinante $\det(S) = ad - cb \neq 0$ nicht verschwindet).

Dies ist die sogenannte *Projektive Gruppe*:

$$P(1, \mathbb{C}) \subseteq \mathrm{Gl}(2, \mathbb{C})$$

Jede Matrix $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ kann als Produkt folgender Faktoren mit $\alpha, h \in \mathbb{C}$ und $h \neq 0$ geschrieben werden:

$$\begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_1, \begin{pmatrix} h & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_2, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_3.$$

Bedeutung:

1. $S(z) = z + \alpha$ (Parallelverschiebung)
2. $S(z) = k \cdot \alpha$ (Rotation falls $|k| = 1$, zentrische Streckung falls $k > 1$)
3. $S(z) = \frac{1}{z}$ (Inversion am Einheitskreis)

Beachte: Diese Abbildungen sind winkeltreu.

2.3 Potenzreihen, der Konvergenzsatz von Abel

Erinnerung

Potenzreihe: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ mit $a_n, z \in \mathbb{C}$

Konvergenzradius:

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

Satz (aus der Analysis I)

i) Für alle $z \in \mathbb{C}$ mit $|z| < R$ konvergiert die Potenzreihe absolut.

Für jedes $0 < \varrho < R$ ist die Konvergenz auf $B_\varrho(0)$ gleichmäßig.

ii) Falls $|z| > R$ ist, divergiert die Potenzreihe.

Wegen der gleichmäßigen Konvergenz kann man im Innern des Konvergenzradius gliedweise differenzieren.

2.3.1 Satz

Auf $\Omega = \{|z| < R\}$ ist die Funktion $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ holomorph und $f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$.

Beweis

Definiere die Polynome:

$$f_n := \sum_{k=0}^n a_k z^k$$

$$g_n := f'_n$$

Sei nun $z \in \Omega$, so wähle ein $\varepsilon > 0$ mit $B_{2\varepsilon}(z) \subseteq \Omega$.

TODO: Abb1

Auf $B_\varepsilon(z)$ gilt dann:

$$f_n \rightrightarrows f \qquad g_n \rightrightarrows g$$

g existiert, da der Konvergenzradius von g gegeben ist durch:

$$\frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k} |a_k|} = \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k} \cdot \sqrt[k]{|a_k|}} = R$$

Denn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k} = \lim_{k \rightarrow \infty} e^{\frac{\log k}{k}} = 1$$

Gleichmäßige Konvergenz:

Sei $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge von auf $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ definierten Funktionen mit $f_n \rightrightarrows f$ (das heißt f_n konvergiert gleichmäßig gegen f), wenn:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$$

Aus der gleichmäßigen Konvergenz und der Konvergenz der Ableitung folgt allgemein, dass man Differentiation und Summation vertauschen kann. Zur Deutlichkeit im Detail:

Schreibe: $f = f_n + R_n$ mit $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k z^k$

Dann ist:

$$\frac{f(z') - f(z)}{z' - z} - g(z) = \left(\frac{f_n(z') - f_n(z)}{z' - z} - g_n(z) \right)^1 - (g(z) - g_n(z))^2 + \left(\frac{R_n(z') - R_n(z)}{z' - z} \right)^3.$$

Zeige nun, dass alle Terme im Limes $z' \rightarrow z$ verschwinden (für hinreichend großes n).

1. Term verschwindet, da Polynome differenzierbar sind und wegen der Definition von g_n .
2. Term verschwindet, da die Potenzreihe g_n in z konvergiert, denn:

$$g(z) - g_n(z) = \sum_{k=n+1}^{\infty} k a_k z^{k-1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

3.

$$\frac{R_n(z') - R_n(z)}{z' - z} = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k \frac{z'^k - z^k}{z' - z} = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k (z'^{k-1} + z'^{k-2}z + \dots + z^{k-1})$$

Sei $0 < \varrho < R$ so gewählt, dass $z \in B_{\varrho}(0)$, dann folgt:

$$\left| \frac{R_n(z') - R_n(z)}{z' - z} \right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} k a_k \varrho^{k+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Induktiv folgt sofort, dass $f = \sum_n a_n z^n$ innerhalb des Konvergenzradius beliebig oft differenzierbar ist und:

$$\begin{aligned} f(z) &= a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \dots \\ f'(z) &= a_1 + 2a_2 z + 3a_3 z^2 + \dots \\ &\vdots \\ f^{(k)}(z) &= k! a_k + \frac{(k+1)!}{1!} a_{k+1} z + \dots \end{aligned}$$

Damit ergibt sich:

$$a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$$

Einsetzen liefert dann sofort die Taylorreihe:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n$$

2.3.2 Beispiel

Die Funktion

$$f(z) := \frac{1}{1+z^2}$$

lässt sich für $|z| < 1$ als geometrische Reihe umschreiben

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-z^2)^n$$

Konvergenzradius $R = 1$

Pole von f : $z = \pm i$

TODO: Abb2

Dieses Beispiel haben wir schon früher als reelle Funktion betrachtet.

Wir verstehen jetzt, warum den Konvergenzradius 1 ist, denn f hat Pole in der komplexen Ebene, deren Betrag 1 ist.

Wir überlegen nun, was auf dem Rand des Konvergenzgebiets passiert:

2.3.3 Theorem (Satz von Abel)

Sei $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ mit Konvergenzradius 1.

Falls $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert, dann ist für jedes $k > 0$:

$$f(1) = \lim_{z \rightarrow 1} f(z)$$

mit $\frac{|1-z|}{1-|z|} \leq k$.

TODO: Abb3

Geometrische Bedeutung: z muss im „Kegel“ liegen.

Beachte:

- Konvergenzradius 1 ist keine Einschränkung (reskaliere sonst).
- $\sum a_n$ braucht *nicht* absolut zu konvergieren.
- Es gilt auch $f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$, für $|z_0| = 1$ mit $\frac{|z-z_0|}{1-|z|} \leq K$. (von Vertretung)

Beweis

Ohne Einschränkung gilt:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = 0$$

geometrische
Reihe:

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$$

für $|z| < 1$.

(Ansonsten addiere eine Konstante zu a_0 .)

Setze:

$$\begin{aligned} S_n &:= a_0 + \dots + a_n \\ S_n(z) &:= a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n = \\ &= S_0 + (S_1 - S_0)z + \dots + (S_n - S_{n-1})z^n = \\ &= S_0(1-z) + S_1(z-z^2) + \dots + S_{n-1}(z^{n-1} - z^n) + S_n z^n = \\ &= (1-z)(S_0 + S_1 z + \dots + S_{n-1} z^{n-1}) + S_n z^n \end{aligned}$$

Es gilt $S_n z^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, da $S_n \rightarrow 0$ und z^n beschränkt ist.

Somit ist $f(z) = (1-z) \sum_{n=0}^{\infty} S_n z^n$

Wir nehmen an, dass $|1-z| \leq K(1-|z|)$, und zudem gilt $S_n \rightarrow 0$.

Wähle N so groß, dass $S_n < \varepsilon$ für alle $n \geq N$. Dann folgt:

$$\sum_{n=N}^{\infty} |S_n z^n| \leq \varepsilon \frac{|z|^N}{1-|z|} < \frac{\varepsilon}{1-|z|} \leq \frac{K\varepsilon}{|1-z|}$$

Und es ergibt sich:

$$|f(z)| \leq |1-z| \left| \sum_{k=0}^{N-1} S_k z^k \right| + K\varepsilon \xrightarrow{z \rightarrow 1} K\varepsilon$$

Also gilt:

$$f(z) \xrightarrow{z \rightarrow 1} 0$$

□_{2.3.3}

2.4 Exponential- und Logarithmusfunktionen

2.4.1 Eigenschaften der Exponentialfunktion

$\exp(z) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ hat Konvergenzradius ∞ , ist also holomorph auf ganz \mathbb{C} .

$$\frac{d}{dz} e^z = e^z$$

Mit der Cauchy-Produktformel folgt:

$$e^{z_1} \cdot e^{z_2} = e^{(z_1+z_2)}$$

Bereits in Analysis I wurde gezeigt:

$$\begin{aligned} e^z &= r e^{i\varphi} && \text{Polardarstellung mit } r = e^{\operatorname{Re}(z)}, \varphi = \operatorname{Im}(z) \\ e^{i\varphi} &= \cos(\varphi) + i \sin(\varphi) \end{aligned}$$

Dies erlaubt es, die trigonometrischen Funktionen für komplexe Argumente zu erweitern.

$$\begin{aligned}\cos(z) &:= \frac{1}{2} (e^{iz} + e^{-iz}) \\ \sin(z) &:= \frac{1}{2i} (e^{iz} - e^{-iz})\end{aligned}$$

Diese sind als Linearkombination holomorpher Funktionen holomorph auf ganz \mathbb{C} und können als Potenzreihe dargestellt werden.

Periodizität:

$$\cos(2\pi) = 1 \qquad \sin(2\pi) = 0$$

Oder:

$$e^{2\pi i} = 1$$

Allgemeiner für ein $a \in \mathbb{Z}$:

$$e^{z+2\pi ai} = e^z \tag{2.1}$$

2.4.2 Eigenschaften der Logarithmusfunktion

Bestimmungsgleichung:

$$e^{\log(z)} = z$$

Man sieht sofort:

- Diese Gleichung ist nur für $z \neq 0$ lösbar und
- nur bis auf ein Vielfaches von $2\pi i$ bestimmt. (Wegen (2.1))

Betrachte Absolutbetrag $|e^{\log(z)}| = e^{\operatorname{Re}(\log(z))} = |z|$.

Daher ist $\operatorname{Re}(\log(z))$ eindeutig bestimmt.

Für $n \in \mathbb{Z}$ und $\theta \in \mathbb{R}$ folgt mit der Argumentfunktion $\arg(z) := \varphi = 2 \cdot \arctan\left(\frac{y}{1+x}\right) \in [\theta, \theta + 2\pi)$, für $z = |z| e^{i\varphi} = x + iy$:

$$\operatorname{Im}(\log(z)) = \arg(z) + 2\pi n$$

$$\log(z) = \log(|z|) + i\arg(z) \tag{2.2}$$

Also ist die Bestimmungsgleichung für \log mehrdeutig lösbar.

Die Gleichung (2.2) definiert einen eindeutigen Logarithmus.

Problem: \log ist unste tig an $L_\theta := \{te^{i\theta} | t \geq 0\}$.

Lösung: „Schneide die komplexe Ebene auf.“, zum Beispiel so:

TODO: Abb1

$$L_\theta := \{te^{i\theta} | t \geq 0\}$$

Dann ist $\log : \mathbb{C} \setminus L_\theta \rightarrow \mathbb{C}$ stetig.

2.5 Kurven, Konformität

2.5.1 Definition (Kurve)

Seien $I := [a, b]$ für $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a \neq b$.

Eine *Kurve* γ ist eine stetige Abbildung $\gamma : I \rightarrow \mathbb{C}$.

- $\gamma(a)$ heißt der *Anfangspunkt*.
- $\gamma(b)$ heißt der *Endpunkt*.
- Falls $\gamma(a) = \gamma(b)$ heißt γ *geschlossene Kurve*.
- $\tau \in I$ heißt *Parameter der Kurve* ($\tau \mapsto \gamma(\tau)$)
- Falls die (reelle) Ableitung $\gamma'(\tau) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\gamma(\tau + h) - \gamma(\tau)}{h}$ existiert und stetig ist, heißt γ *stetig differenzierbar*.
- γ heißt *regulär*, falls γ stetig differenzierbar ist und für alle $\tau \in I$ schon $\gamma'(\tau) \neq 0$ gilt.
- γ heißt *stückweise (stetig) differenzierbar*, falls γ stetig auf I ist und es Intervalle I_j gibt, so dass $\gamma|_{I_j}$ stetig differenzierbar ist, und $I = I_1 \dot{\cup} \dots \dot{\cup} I_n$ gilt.

Beispiel und Definition

Betrachte die holomorphe Abbildung $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ und die reguläre Kurve $x : I \rightarrow \Omega$.

Ziel: Gewinne geometrische Informationen über f , indem man das Bild der Kurve betrachtet.

TODO: Abb2

$f \circ \gamma$ ist eine Kurve in $f(\Omega)$.

TODO: Abb3 ändere u in v , \tilde{u} in \tilde{v}

$v := \gamma'(\tau)$ ist die Tangente an γ in z_0 .

$$\tilde{v} := \frac{d}{d\tau} (f \circ \gamma)(\tau_0) = f'(\gamma(\tau_0)) \cdot \gamma'(\tau_0) = \underbrace{f'(z_0)}_{\in \mathbb{C}} \cdot v$$

Schreibe nun Real- und Imaginärteil aus:

$$v = v_1 + \mathbf{i}v_2 \qquad \tilde{v} = \tilde{v}_1 + \mathbf{i}\tilde{v}_2$$

$$\begin{pmatrix} \tilde{v}_1 \\ \tilde{v}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

– Determinante:

$$\det(A) = a^2 - b \cdot (-b) = a^2 + b^2 \geq 0$$

Also erhält A die Orientierung („Drehstreckung“ einschließlich Achsenstreckung).

– Es gilt:

$$\underbrace{A^*}_{=A^T} A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix} = (a^2 + b^2) \cdot E_2$$

Eine unitäre Matrix U erfüllt:

$$U^* U = E$$

Dies ist eine Drehung.

Also ist A eine Drehung verkettet mit einer zentrischen Streckung. Hierbei bleiben die *Winkel erhalten*.

Statt winkelerhaltend sagt man auch *konform*.

Also beschreibt die Multiplikation mit $f'(z_0)$ eine orientierungs- und winkelerhaltende Transformation der komplexen Ebene.

Genauer: $u, v \in \mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$

$$\cos \varphi = \frac{\langle u, v \rangle_{\mathbb{R}^2}}{\|u\| \cdot \|v\|} = \frac{\langle \tilde{u}, \tilde{v} \rangle_{\mathbb{R}^2}}{\|\tilde{u}\| \cdot \|\tilde{v}\|} = \cos \tilde{\varphi}$$

Nebenrechnung:

$$\tilde{v} = Av$$

$$\tilde{u} = Au$$

$$\langle \tilde{u}, \tilde{v} \rangle = \langle Au, Av \rangle = \langle u, A^* Av \rangle = (a^2 + b^2) \cdot \langle u, v \rangle$$

$$\|\tilde{u}\|^2 = \langle \tilde{u}, \tilde{u} \rangle = \langle Au, Au \rangle = \langle u, A^* Au \rangle = (a^2 + b^2) \cdot \langle u, u \rangle$$

$$\|\tilde{v}\|^2 = \langle \tilde{v}, \tilde{v} \rangle = \langle Av, Av \rangle = \langle v, A^* Av \rangle = (a^2 + b^2) \cdot \langle v, v \rangle$$

Analog kann man den Winkel zwischen zwei Kurven betrachten:

TODO: Abb1

Polarzerlegung: $u = |u| e^{i\varphi}$

$\arg u := \varphi \pmod{2\pi} \in [0, 2\pi)$ nach der üblichen Konvention.

$$\alpha = \arg u - \arg v = \arg \frac{u}{v}$$

$$\hat{\alpha} = \arg \frac{(f \circ \gamma)'(\tau_0)}{(f \circ \tilde{\gamma})'(\tau_0)} = \arg \frac{f(z_0) \cdot \gamma'(\tau_0)}{f(z_0) \cdot \tilde{\gamma}'(\tau_0)} = \arg \frac{\gamma'(\tau_0)}{\tilde{\gamma}'(\tau_0)} = \arg \frac{u}{v} = \alpha$$

2.5.2 Beispiel

Betrachte Kurvenscharen $\gamma_x(t), \delta_y(t)$.

$$\gamma_x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} : t \mapsto x + \mathbf{i}t$$

$$\delta_y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} : t \mapsto t + \mathbf{i}y$$

TODO: Abb2

Betrachte nun die Kurven $\exp \circ \gamma_x$ und $\exp \circ \delta_y$:

$$\begin{aligned}(\exp \circ \gamma_x)(t) &= e^{\gamma_x(t)} = e^{x+it} = e^x \cdot e^{it} \\ (\exp \circ \delta_y)(t) &= e^{\delta_y(t)} = e^{t+iy} = e^t \cdot e^{iy}\end{aligned}$$

TODO: Abb3, Abb4

Die Winkel bleiben erhalten, aber Längen und Flächeninhalte bleiben aber im Allgemeinen *nicht* erhalten.

2.6 Kurvenintegrale, Komplexe Integration

Betrachte wieder Kurve $\gamma : I = [a, b] \rightarrow \Omega \subseteq \mathbb{C}$ (Ω offen) sei stetig und stückweise differenzierbar.

TODO: Abb4

Identifiziere zunächst \mathbb{C} mit \mathbb{R}^2 .

Dann kann man die *Bogenlänge* $L(\gamma)$ folgendermaßen einführen:

$$L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(\tau)| \, d\tau$$

(Nehme hier zur Einfachheit an, dass γ differenzierbar ist, sonst stückweise integrieren und Integrale addieren.)

$L(\gamma)$ soll unabhängig von der Parametrisierung sein. Rechne dies nach:

$$\tilde{\gamma}(t) = (\gamma \circ \tau)(t) \qquad \tau : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$$

τ sei streng monoton steigend und $\tau'(t) \neq 0$ für alle $t \in [\alpha, \beta]$.

$$\int_{\alpha}^{\beta} |\tilde{\gamma}'(t)| \, dt \stackrel{\text{Kettenregel}}{=} \int_{\alpha}^{\beta} \left| \gamma'(t) \cdot \underbrace{\frac{d\tau}{dt}}_{>0} \right| dt = \int_{\alpha}^{\beta} |\gamma'(t)| \frac{d\tau}{dt} dt =$$

$$\stackrel{\text{Substitution}}{=} \int_{t=\tau(\alpha), dt=\frac{d\tau}{d\tau} d\tau}^{\beta} |\gamma'(\tau)| \, d\tau = L(\gamma)$$

$$\int_{\alpha}^{\beta} \gamma'(\tau) \frac{d\tau}{dt} dt = \int_a^b \gamma'(\tau) \, d\tau$$

Sei nun außerdem $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ stetig (wichtigstes Beispiel: f holomorph).

Wir wollen „ f längs γ integrieren“:

$$\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\int_a^b f(\gamma(\tau)) |\gamma'(\tau)| \, d\tau$$

Dies wäre eine Möglichkeit, denn dies ist unabhängig von der Parametrisierung.

In der komplexen Analysis ist das Integral

$$\int_a^b f(\gamma(\tau)) \gamma'(\tau) \, d\tau$$

interessanter, weil keine komplexe Konjugation eingeht.

2.6.1 Definition (komplexes Integral)

Sei $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega \subseteq \mathbb{C}$ stetig und stückweise differenzierbar und $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ stetig. Dann heißt

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \int_a^b f(\gamma(\tau)) \gamma'(\tau) d\tau$$

das *komplexe Integral* oder *Konturintegral* von f über γ .

Beachte

Wir integrieren über eine *reelle Variable* $t \in [a, b]$, aber der Integrand ist komplexwertig. Man kann das auf reellwertige Integrale zurückführen.

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \int_a^b \operatorname{Re}(f(\gamma(\tau)) \gamma'(\tau)) d\tau + i \int_a^b \operatorname{Im}(f(\gamma(\tau)) \gamma'(\tau)) d\tau$$

Riemann- beziehungsweise Lebesgue-Integral im Reellen.

Insbesondere sieht man:

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} \left(\int_{\gamma} f(z) dz \right) &= \int_a^b \operatorname{Re}(f(\gamma(\tau)) \gamma'(\tau)) d\tau \\ &\neq \int_{\gamma} \operatorname{Re}(f(z)) dz = \int_a^b \operatorname{Re}(f(\gamma(\tau)) \gamma'(\tau)) d\tau \end{aligned}$$

2.6.2 Satz

$\int_{\gamma} f(z) dz$ ist unabhängig von der Parametrisierung.

Beweis

Sei $t : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ streng monoton steigend, stetig, stückweise differenzierbar.

Dann folgt mit $\tilde{\gamma}(\tau) = (\gamma \circ t)(\tau)$:

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} (f \circ \gamma \circ t)(\tau) \cdot (\gamma \circ t)'(\tau) d\tau &= \int_{\alpha}^{\beta} (f \circ \gamma)(t(\tau)) \cdot \gamma'(t(\tau)) \frac{dt}{d\tau} d\tau = \\ &\stackrel{\text{Transformationsformel}}{=} \int_{\alpha}^{\beta} (f \circ \gamma)(t) \cdot \gamma'(t) dt \end{aligned}$$

□_{2.6.2}

2.6.3 Beispiel

i) $f(z) = \frac{1}{z^2}$, $\gamma : [1, 2] \rightarrow \mathbb{C} : t \mapsto t$

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_1^2 f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = \int_1^2 \frac{1}{t^2} \cdot 1 dt = \left. \frac{-1}{t} \right|_1^2 = \frac{-1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$$

ii) $f(z) = z^n, n \geq 0$

Wähle eine Parametrisierung zum Beispiel

$$\gamma_1 : [0,1] \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\gamma_1(\tau) = \tau(1 + \mathbf{i})$$

$$\gamma_1'(\tau) = (1 + \mathbf{i})$$

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_1} f(z) dz &= \int_0^1 f(\gamma(\tau)) \cdot \gamma'(\tau) d\tau = \int_0^1 ((1 + \mathbf{i}) \cdot \tau)^n \cdot (1 + \mathbf{i}) d\tau = \\ &= (1 + \mathbf{i})^{n+1} \cdot \int_0^1 \tau^n d\tau = \frac{1}{n+1} \cdot (1 + \mathbf{i})^{n+1} \end{aligned}$$

γ_2 : Parametrisiere so:

$$\gamma_2 : [0,2] \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\gamma(\tau) = \begin{cases} \tau & 0 \leq \tau \leq 1 \\ (1 + (\tau - 1)\mathbf{i}) & 1 \leq \tau \leq 2 \end{cases}$$

$$\gamma'(\tau) = \begin{cases} 1 & 0 < \tau < 1 \\ \mathbf{i} & 1 < \tau < 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_2} f(z) dz &= \int_0^1 \tau^n \cdot 1 d\tau + \int_1^2 (1 + (\tau - 1)\mathbf{i})^n \cdot \mathbf{i} d\tau = \frac{1}{n+1} + \mathbf{i} \cdot \frac{1}{(n+1)\mathbf{i}} (1 + (\tau - 1)\mathbf{i})^{n+1} \Big|_1^2 = \\ &= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} \left((1 + \mathbf{i})^{n+1} - 1 \right) = \frac{1}{n+1} \cdot (1 + \mathbf{i})^{n+1} \end{aligned}$$

Der Wert des Integrals ist also für beide Integrationswege gleich.

2.6.4 Definition

Sei $\gamma : [0,1] \rightarrow \mathbb{C}$.

Setze

$$-\gamma := \tilde{\gamma} : [0,1] \rightarrow \mathbb{C}, \tilde{\gamma}(\tau) = \gamma(1 - \tau)$$

also „durchlaufe die Kurve rückwärts“.

Sei $\gamma_1 : [a,b] \rightarrow \mathbb{C}$ und $\gamma_2 : [b,c] \rightarrow \mathbb{C}$ mit $\gamma_1(b) = \gamma_2(b)$.

Setze dann $\gamma_1 + \gamma_2 : [a,c] \rightarrow \mathbb{C}$ definiert durch:

$$(\gamma_1 + \gamma_2)(\tau) = \begin{cases} \gamma_1(\tau) & \tau \in [a,b] \\ \gamma_2(\tau) & \tau \in [b,c] \end{cases}$$

2.6.5 Lemma

$$\int_{-\gamma} f(z) dz = - \int_{\gamma} f(z) dz$$

$$\int_{\gamma_1 + \dots + \gamma_n} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \dots + \int_{\gamma_n} f(z) dz$$

Beweis

TODO: Fehlt???

2.6.6 Definition

Setze:

$$\begin{aligned}\int_{\gamma} f(z) d\bar{z} &= \overline{\int_{\gamma} \overline{f(z)} dz} \\ \int_{\gamma} f(z) dx &= \frac{1}{2} \left(\int_{\gamma} f(z) dz + \int_{\gamma} f(z) d\bar{z} \right) \\ \int_{\gamma} f(z) dy &= \frac{1}{2i} \left(\int_{\gamma} f(z) dz - \int_{\gamma} f(z) d\bar{z} \right)\end{aligned}$$

Dann gilt:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma} f(z) dx + i \int_{\gamma} f(z) dy$$

Also: „ $dz = dx + i dy$ “

Etwas ausführlicher:

$$\begin{aligned}x + iy &= z = \gamma(\tau) \\ x(\tau) &:= \operatorname{Re}(\gamma(\tau)) & \Rightarrow \operatorname{Re}(\gamma'(\tau)) = x'(\tau) \\ y(\tau) &:= \operatorname{Im}(\gamma(\tau)) & \Rightarrow \operatorname{Im}(\gamma'(\tau)) = y'(\tau) \\ dx &= x'(\tau) d\tau \\ dy &= y'(\tau) d\tau\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_{\gamma} f(z) dz &= \int_a^b f(\gamma(\tau)) \gamma'(\tau) d\tau \\ \int_{\gamma} f(z) d\bar{z} &= \overline{\int_{\gamma} \overline{f(z)} dz} = \int_a^b \overline{f(\gamma(\tau))} \overline{\gamma'(\tau)} d\tau = \int_a^b f(\gamma(\tau)) \overline{\gamma'(\tau)} d\tau \\ \int_{\gamma} f(z) dx &= \int_a^b f(\gamma(\tau)) \cdot \underbrace{\operatorname{Re}(\gamma'(\tau))}_{=x'(\tau)} d\tau \\ \int_{\gamma} f(z) dy &= \int_a^b f(\gamma(\tau)) \cdot \underbrace{\operatorname{Im}(\gamma'(\tau))}_{=y'(\tau)} d\tau \\ \int_{\gamma} f(z) dy &= \int_{\gamma} p dx + \int_{\gamma} q dy\end{aligned}$$

Später: Setze $p = f$ und $q = if$.

2.7 Abhängigkeit vom Integrationsgebiet

Sei $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ offen, $z_0, z \in \Omega$, $p, q : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ stetig und wegzusammenhängend.

Frage

Wann gilt folgende Gleichheit?

$$\int_{\gamma_1} (pdx + qdy) = \int_{\gamma_2} (pdx + qdy)$$

Seien γ_1, γ_2 zwei differenzierbare Kurven, die z_0 mit z verbinden.

TODO: Abb2

Allgemeine Frage

Wann ist das Integral unabhängig vom Weg?

2.7.1 Theorem

Das Linienintegral

$$\int_{\gamma} (pdx + qdy)$$

ist genau dann wegunabhängig, wenn es eine Funktion $U : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ gibt, so dass:

$$p = \frac{\partial U}{\partial x} \qquad q = \frac{\partial U}{\partial y} \qquad (2.3)$$

(Frobenius, Poincaré, ...)

Beweis

„ \Leftarrow “: Nehme an, dass (2.3) gilt, womit folgt:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} (pdx + qdy) &= \int_a^b \left(\frac{\partial U}{\partial x} x'(\tau) d\tau + \frac{\partial U}{\partial y} y'(\tau) d\tau \right) = \int_a^b \frac{d}{d\tau} (U(x(\tau), y(\tau))) d\tau \\ &= U(x(b), y(b)) - U(x(a), y(a)) = U(z) - U(z_0) \end{aligned}$$

Also hängt das Integral tatsächlich nur von Anfangs- und Endpunkt ab.

„ \Rightarrow “: Nehmen an, dass das Integral wegunabhängig ist.

$z_0 = (x_0, y_0)$ sei fest, während $z = (x, y)$ variabel.

Wähle als Kurve speziell ein Polygonzug, der parallel zur x - oder y -Achse verläuft.

TODO: Abb3

γ kann durch einen solchen Polygonzug approximiert werden.

Verwende hierbei, dass Ω offen und bogenzusammenhängend ist.

Definiere:

$$U(x, y) := \int_{\gamma} (pdx + qdy)$$

Dies ist wohldefiniert, weil das Integral nach Voraussetzung wegunabhängig ist.

Berechne $\frac{\partial U}{\partial x}$:

Wähle den Polygonzug so, dass er in einer Umgebung von (x,y) horizontal verläuft.

Dann gilt:

$$U(x,y) = \int^x p(\tilde{x},y) d\tilde{x} + \text{Konstante}$$

$$\frac{\partial U}{\partial x} = p(x,y)$$

Berechne $\frac{\partial U}{\partial x}$:

Wähle den Polygonzug so, dass er in einer Umgebung von (x,y) vertikal verläuft.

Dann gilt:

$$U(x,y) = \int^y q(x,\tilde{y}) d\tilde{y} + \text{Konstante}$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = q(x,y)$$

Also sind die Differentialgleichungen (2.3) erfüllt.

□_{2.7.1}

Schreibe auch:

$$\int p dx + q dy = U$$

$$p dx + q dy = \frac{\partial U}{\partial x} dx + \frac{\partial U}{\partial y} dy (= dU)$$

Und man nennt dU das *totale Differential*.

Das totale Differential ist *exakt*, das heißt es kann in obiger Form geschrieben werden.

Zurück zum Konturintegral:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int \left(\underbrace{f}_{=p} dx + \underbrace{\mathbf{i}f}_{=q} dy \right)$$

Nach Theorem 2.7.1 ist das Konturintegral genau dann wegunabhängig, wenn ein $F(z)$ in Ω existiert, so dass gilt:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = f(z) \qquad \frac{\partial F}{\partial y} = \mathbf{i}f(z)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial F}{\partial x} = -\mathbf{i} \frac{\partial F}{\partial y}$$

Also erfüllt F die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen und $f(z) = F'(z)$.

2.7.2 Korollar

$\int_{\gamma} f(z) dz$ ist genau dann wegunabhängig, wenn es eine holomorphe Funktion $F : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ gibt mit $f(z) = F'(z)$.

Beweis

TODO: ???

2.7.3 Satz

Für jedes Polynom $P(z)$ und jede geschlossene Kurve gilt:

$$\int_{\gamma} P(z) \, dz = 0$$

Beweis

$$P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0$$

$$Q(z) = \frac{a_n}{n+1} z^{n+1} + \frac{a_{n-1}}{n} z^n + \dots + a_0 z$$

$Q(z)$ ist eine holomorphe Stammfunktion, also $Q'(z) = P(z)$.

□_{2.7.3}

2.8 Das Cauchysche Theorem

Betrachte das Rechteck $R : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$. $R \subseteq \Omega \subseteq \mathbb{C}$

TODO: Abb4

Frage

Äquivalente Fragestellungen:

1. Für welche f ist $\int_{\gamma} f(z) \, dz$ unabhängig vom Integrationsweg.
2. Für welche f gibt es eine holomorphe Stammfunktion.

Notwendiges Kriterium:

Falls $f \in C^1$ ist, sehen wir, dass für alle geschlossenen Wege γ schon $\oint_{\gamma} f(z) \, dz = 0$ nur dann, wenn f holomorph ist.

TODO: Rest überprüfen $f \in C^1 = \text{holomorph?}$

$f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ ist holomorph, denn wenn es eine holomorphe Stammfunktion F gibt, so ist $f = F'$ auch holomorph.

Beginne mit einfachen Integrationswegen und zwar dem Integral längs des Randes von R .

2.8.1 Theorem

Ist $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph, so gilt:

$$\int_{\partial R} f(z) \, dz = 0$$

Beweis (nach Goursat)

Zerlege R in vier kongruente Rechtecke $R^{(1)}, \dots, R^{(4)}$.

TODO: Abb5

$$\int_{\partial R} f(z) dz = \int_{\partial R^{(1)}} f(z) dz + \dots + \int_{\partial R^{(4)}} f(z) dz$$

Dies gilt, da sich die Integrale längs der „inneren Kanten“ gegenseitig aufheben.

Für eines der Rechtecke $R^{(k)}$ gilt:

$$\left| \int_{\partial R_1} f(z) dz \right| \geq \frac{1}{4} \left| \int_{\partial R} f(z) dz \right|$$

Dieses nennen wir R_1 .

Wähle nun induktiv Rechtecke $R = R_0 \supseteq R_1 \supseteq R_2 \supseteq \dots$ so, dass gilt:

$$|\eta(R_n)| \geq \frac{1}{4^n} |\eta(R)|$$

Zudem gilt

$$\text{Vol}(R_n) = 4^{-n} \cdot \text{Vol}(R)$$

und die Kantenlängen von R_n sind schon 2^{-n} mal die Kantenlängen von R .

Seien z_n die Mittelpunkte dieser Rechtecke.

Die Folge (z_n) besitzt einen Häufungspunkt $z^* \in R$.

TODO: Abb6

Verwende nun ein lokales Argument:

Da f in z^* holomorph ist, gilt:

$$f(z) = f(z^*) + f'(z^*)(z - z^*) + o(|z - z^*|)$$

Anders ausgedrückt gibt es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$, so dass gilt für alle $z \in B_\delta(z^*) \setminus \{z^*\}$:

$$|f(z) - f(z^*) - f'(z^*)(z - z^*)| < \varepsilon |z - z^*|$$

Dies ist ein Polynom, es hat also eine holomorphe Stammfunktion.

Wähle nun n so groß, dass $R_n \subseteq B_\delta(z^*)$ ist.

Dann gilt:

$$\int_{\partial R_n} [f(z^*) + f'(z^*)(z - z^*)] \stackrel{2.7.3}{=} 0$$

Beachte dabei, dass wir ein Polynom integrieren.

$$\eta(R_n) = \int_{\partial R_n} f(z) dz = \int_{\partial R_n} (f(z) - f(z^*) - f'(z^*)(z - z^*)) dz$$

Also gilt:

$$\begin{aligned}
 |\eta(R_n)| &= \left| \int_{\partial R_n} \underbrace{\left(f(z) - f(z^*) - f'(z^*)(z - z^*) \right)}_{|\dots| \leq \varepsilon |z - z^*|} dz \right| \leq \\
 &\leq \varepsilon \left| \int_{\partial R_n} \underbrace{|z - z^*|}_{\leq 2^{-n} \cdot \max\{b-a, d-c\}} dz \right| \leq \\
 &\leq \varepsilon \cdot \underbrace{d_n}_{\text{Durchmesser von } R_n} \cdot \underbrace{L_n}_{\text{Umfang von } R} \\
 &\leq \varepsilon \cdot 4^{-n} \cdot \underbrace{d}_{\text{Durchmesser von } R} \cdot \underbrace{L}_{\text{Umfang von } R_n}
 \end{aligned}$$

Andererseits gilt:

$$\eta(R_n) \geq 4^{-n} |\eta(R)|$$

Damit folgt:

$$\eta(R) \leq \varepsilon \cdot d \cdot L$$

Da ε beliebig ist, folgt $\eta(R) = 0$.

□_{2.8.1}

2.8.2 Theorem

Sei $R' = R \setminus \{\zeta_1, \dots, \zeta_n\}$ ein Rechteck ohne endlich viele innere Punkte, also $\zeta_1 \in R^\circ$.

Sei f auf R' holomorph und es gelte:

$$\lim_{z \rightarrow \zeta_j} (z - \zeta_j) f(z) = 0$$

Dann gilt:

$$\int_{\partial R} f(z) dz = 0$$

Beweis

Es genügt, einen Ausnahmepunkt zu betrachten, da wir das Rechteck ansonsten in endlich viele Rechtecke zerlegen können.

TODO: Abb1-b

Nenne den Ausnahmepunkt ζ .

Wähle ein kleines Rechteck R_0 um ζ und nenne die restlichen Rechtecke R_i .

TODO: Abb2

Weil f in R_i für $i \geq 1$ holomorph ist, folgt:

$$\int_{\partial R_i} f(z) dz = 0$$

Damit folgt:

$$\int_{\partial R} f(z) dz = \int_{\partial R_0} f(z) dz$$

Nach Voraussetzung können wir zu einem gegebenen $\varepsilon > 0$ das Rechteck R_0 so klein wählen, dass für alle $z \in \partial R_0$ gilt:

$$\begin{aligned} |f(z) \cdot (z - \zeta)| &\leq \varepsilon \\ |f(z)| &\leq \frac{\varepsilon}{|z - \zeta|} \end{aligned}$$

Also gilt:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\partial R_0} f(z) dz \right| &\leq \varepsilon \int_{\partial R_0} \frac{\overbrace{|dz|}^{=|\gamma'(t)|dt}}{|z - \zeta|} \leq \\ &\leq \frac{\varepsilon}{\frac{d_0}{4}} \cdot L_0 = \varepsilon \cdot \frac{4L_0}{d_0} \leq 16\varepsilon \end{aligned}$$

Da ε beliebig ist, folgt:

$$\int_{\partial R} f(z) dz = 0$$

□_{2.8.2}

Verallgemeinere dies nun auf beliebige Kurven in einer Kreisscheibe.

2.8.3 Theorem

Sei f in $\Delta := B_R(0) \in \mathbb{C}$ holomorph.

Dann gilt für jede geschlossene Kurve γ in Δ :

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

Beweis

Sei $z = x + iy \in \Delta$.

TODO: Abb3

Wähle ein Rechteck R so, dass die linke untere Ecke der Ursprung und die rechte obere Ecke z ist.

Nach Theorem 2.8.1 ist

$$\int_{\partial R} f(z) dz = 0$$

und deshalb ist

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz =: F(z)$$

wohldefiniert.

Nach Korollar ??2.9.2 genügt es zu zeigen, dass $F(z)$ eine holomorphe Stammfunktion von f ist.

Sei γ_h ein Weg, der z und $z + h$ parallel zur reellen Achse verbindet.

Sei γ_g ein Weg, der z und $z + ih$ parallel zur imaginären Achse verbindet.

TODO: Abb4

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial x} &= \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\gamma_h} f(z) dz = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^h f(z+h) \cdot \underbrace{\gamma'(h)}_{=1} dh = f(z) \\ \frac{\partial F}{\partial y} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (F(z+ih) - F(z)) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^h f(z+ih) \cdot i dh = if(z)\end{aligned}$$

Damit sind die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen erfüllt, also ist F holomorph und es gilt:

$$F'(z) = f(z)$$

□_{2.8.3}

2.8.4 Theorem

Sei f holomorph in $\Delta' = \Delta \setminus \{\zeta_1, \dots, \zeta_n\}$ mit $\zeta_j \in \Delta$ für $1 \leq j \leq n$ und es gelte für $1 \leq j \leq n$:

$$\lim_{z \rightarrow \zeta_j} (z - \zeta_j) f(z) = 0$$

Dann ist

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

für jede geschlossene Kurve γ in Δ' .

Beweis

TODO: Abb5

Wähle Kurven γ_1 und γ_2 so, dass

- die Kurven keinen der ζ_j schneiden.
- in einer Umgebung von z die Kurve γ_1 parallel zur imaginären Achse und γ_2 parallel zur reellen Achse ist.

Da nach Theorem ??2.10.2

$$\int_{\partial R} f(z) dz = 0$$

ist, folgt wieder:

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz =: F(z)$$

Ab jetzt geht der Beweis genau wie der von Theorem ??2.10.3.

□_{2.8.4}

2.9 Der Cauchysche Integralsatz

Sei γ wieder eine geschlossene Kurve.

Wir wollen nun Funktionen integrieren, die Pole haben.

Beginne speziell mit der Funktion

$$\frac{1}{z-a}$$

wobei $a \notin \text{im}(\gamma)$ ist.

TODO: Abb6

2.9.1 Lemma

Es gilt

$$\int_{\gamma} \frac{1}{z-a} dz = 2\pi i \cdot n$$

für ein $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

$\log(z-a)$ ist eine holomorphe Stammfunktion, aber nicht auf ganz \mathbb{C} .

TODO: Abb7

Beweis

Wähle eine Parametrisierung

$$\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$$

und setze $z(t) = \gamma(t)$ und

$$h(t) := \int_{\alpha}^t \frac{z'(t)}{z(t)-a} dt$$

TODO: Abb8

$$h'(t) = \frac{z'(t)}{z(t)-a}$$

Dann gilt:

$$e^{-h(t)} (z(t) - a)$$

ist stetig und stückweise differenzierbar und hat die Ableitung:

$$\left(e^{-h(t)} (z(t) - a) \right)' = e^{-h(t)} (-h'(t) (z(t) - a) + z'(t)) = 0$$

Also ist es eine Konstante $K \in \mathbb{C}$.

$$e^{-h(t)} = \frac{K}{z(t) - a}$$

Da $h(\alpha) = 0$ ist, folgt:

$$e^{-h(t)} = \frac{z(\alpha) - a}{z(t) - a}$$

Also gilt:

$$e^{-h(\beta)} = \frac{z(\alpha) - a}{z(\beta) - a} = 1$$

Denn die Kurve ist geschlossen, also $z(a) = z(b)$.

Damit ergibt sich:

$$h(\beta) = \int_{\gamma} \frac{1}{z - a} dz = 2\pi i n$$

□_{2.9.1}

2.9.2 Definition (Index)

Sei γ eine geschlossene Kurve, die $a \in \mathbb{C}$ nicht schneidet. Dann heißt

$$n(\gamma, a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{dz}{z - a}$$

der *Index* von γ bezüglich a (oder auch *Windungszahl*).

2.9.3 Theorem (Cauchyscher Integralsatz)

Sei $f : \Delta = B_R(0) \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph und γ eine geschlossene Kurve in Δ .

Dann ist für jedes $a \in \Delta$, das nicht auf γ liegt

$$n(\gamma, a) \cdot f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z - a} dz$$

Beweis

Setze

$$F(z) = \frac{f(z) - f(a)}{z - a}$$

ist auf $\Delta \setminus \{a\}$ holomorph.

$$\lim_{z \rightarrow a} (z - a) F(z) = \lim_{z \rightarrow a} (f(z) - f(a)) \stackrel{f \text{ stetig}}{=} 0$$

Also können wir Theorem 2.8.4 anwenden und erhalten:

$$\begin{aligned} 0 &= \oint_{\gamma} F(z) dz = \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z - a} dz - f(a) \cdot \oint_{\gamma} \frac{1}{z - a} dz = \\ &= \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z - a} dz - f(a) \cdot 2\pi i \cdot n(\gamma, a) \end{aligned}$$

Also folgt:

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z - a} dz = f(a) \cdot n(\gamma, a)$$

□_{2.9.3}

2.9.4 Korollar

Sind $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph, $a \in \Delta$ und $\gamma = \partial B_\varepsilon(a) \subseteq \Delta$, so gilt:

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{f(z)}{z-a} dz$$

Beweis

Der Index ist eins, weil gilt:

$$\oint_{\partial B_\varepsilon(0)} \frac{1}{z} dz = 2\pi i$$

□_{2.9.4}

Bemerkung und Definition (Zusammenhangskomponenten)

Also ist $f(a)$ eindeutig bestimmt durch $f|_{\partial B_\varepsilon(a)}$, das heißt f kann nicht in einer kleinen Umgebung um a abgeändert werden.

$$\begin{aligned} \nabla^2 \operatorname{Re}(f) &= 0 = \nabla^2 \operatorname{Im}(f) \\ \frac{\partial f}{\partial x} &= -i \frac{\partial f}{\partial y} \end{aligned}$$

Diese harmonische Differentialgleichung ist im Innern eindeutig durch die Randwerte bestimmt. Eigenschaften des Index:

$$n(\gamma, a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_\gamma \frac{dz}{z-a} = \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \frac{\gamma'(\tau)}{\gamma(\tau)} d\tau$$

Gehe Kurven rückwärts oder setze geschlossene Kurven aneinander:

$$\begin{aligned} n(-\gamma, a) &= -n(\gamma, a) \\ n(\gamma_1 + \gamma_2, a) &= n(\gamma_1, a) + n(\gamma_2, a) \end{aligned}$$

TODO: Abb1

Das Bild (engl. „image“) $\operatorname{im}(\gamma)$ (beziehungsweise engl. „the range“ $\operatorname{Rg}(\gamma)$)

$$\operatorname{im}(\gamma) := \gamma([a, b])$$

ist eine kompakte, also abgeschlossene und beschränkte Teilmenge von \mathbb{C} und

$$\mathbb{C} \setminus \operatorname{im}(\gamma)$$

ist eine offene Teilmenge von \mathbb{C} .

$$n(\gamma) : \mathbb{C} \setminus \operatorname{im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{Z} : a \mapsto n(\gamma, a)$$

Für offene Teilmengen von \mathbb{C} ist zusammenhängend \Leftrightarrow wegzusammenhängend (auch genannt bogenzusammenhängend).

$$\mathbb{C} \setminus \operatorname{Rg}(\gamma) = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} \Omega_\lambda$$

Ω_λ heißen *die Zusammenhangskomponenten* und für alle λ aus der Indexmenge Λ ist Ω_λ zusammenhängend.

Es könnte auch unendlich viele Zusammenhangskomponenten geben.

TODO: Abb2

Da $\text{im}(\gamma)$ beschränkt ist, gibt es einen Radius R , so dass gilt:

$$\text{im}(\gamma) \subseteq \Delta = B_R(0)$$

TODO: Abb3

2.9.5 Satz

- i) Falls $|a| > R$ ist, so gilt $n(\gamma, a) = 0$.
- ii) Auf jeder Zusammenhangskomponente ist $n(\gamma, \cdot) : \Omega_\lambda \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto n(\gamma, x)$ konstant.

Beweis

- i) $\frac{1}{z-a}$ ist auf ganz Δ holomorph. Nach Theorem ??2.10.3 folgt:

$$\oint \frac{dz}{z-a} = 0$$

□_{i)}

- ii) Seien $a_1, a_2 \in \Omega_\lambda$. Man kann dann a_1 und a_2 durch einen Polygonzug miteinander verbinden.

Es genügt zu zeigen, dass gilt:

$$n(\gamma, a) = n(\gamma, b)$$

Dabei ist die Verbindungslinie $v(a, b) := \{\tau a + (1-\tau)b \mid 0 \leq \tau \leq 1\}$ von a nach b eine Teilmenge von Ω_λ .

Es folgt

$$v(a, b) \cap \text{im}(\gamma) = \emptyset$$

und damit ist $\frac{z-a}{z-b}$ auf γ nicht Element von $\mathbb{R}_{\leq 0}$, denn wäre $\frac{z-a}{z-b} = -c$ für ein $c \in \mathbb{R}_{\geq 0}$, so wäre $z-a = -c(z-b)$, also würde $z \in v(a, b)$ folgen.

TODO: Abb4?

Folglich ist $\log\left(\frac{z-a}{z-b}\right)$ längs γ wohldefiniert, wobei bei $\log(z)$ wieder die komplexe Ebene auf der negativen reellen Achse „geschlitzt“ ist.

$$\left(\log\left(\frac{z-a}{z-b}\right)\right)' = \frac{1}{\frac{z-a}{z-b}} \left(\frac{1}{z-b} - \frac{z-a}{(z-b)^2}\right) = \frac{1}{z-a} - \frac{1}{z-b}$$

$$\oint_\gamma \left(\frac{1}{z-a} - \frac{1}{z-b}\right) dz = \log\left(\frac{z-a}{z-b}\right) \Big|_{z_0}^{z_0} = n(\gamma, a) = n(\gamma, b)$$

□_{2.9.5}

2.9.6 Lemma

Seien z_1, z_2 zwei Punkte auf einer geschlossenen Kurve γ , die nicht durch den Ursprung geht.

Es sei $\operatorname{Im}(z_1) < 0$ und $\operatorname{Im}(z_2) > 0$.

Bezeichne die Teilkurven von z_1 nach z_2 mit γ_1 und die von z_2 nach z_1 mit γ_2 .

Falls γ_1 die negative reelle Achse nicht schneidet und γ_2 die positive reelle Achse nicht schneidet, dann ist $n(\gamma, 0) = 1$.

TODO: Abb5

Beweis

Sei L_1 der Strahl durch 0 und z_1 und L_2 der Strahl durch 0 und z_2 .

Sei C ein Kreis um Ursprung, der γ nicht schneidet.

Wähle σ_1 und σ_2 wie in der Zeichnung.

TODO: Wie genau werden die σ gewählt?

$$\oint_{\sigma_1} \frac{dz}{z-a} = 0 = \oint_{\sigma_2} \frac{dz}{z-a}$$

Denn 0 ist in derselben Zusammenhangskomponente wie ein beliebiges $a \in \mathbb{C}$ mit $|a| > R$.

$$n(\sigma_1, a) = 0$$

Nach Satz 2.11.5 i).

Die Kurve C (siehe Zeichnung) schneidet nach Konstruktion σ_1 nicht.

Also liegen $a, 0$ in der gleichen Zusammenhangskomponente von $\mathbb{C} \setminus \operatorname{im}(\sigma_1)$, weswegen $n(\sigma_1, 0) = 0$.

Damit folgt:

$$0 = n(\sigma_1, 0) + n(\sigma_2, 0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\sigma_1} \frac{dz}{z} + \frac{1}{2\pi i} \oint_{\sigma_2} \frac{dz}{z} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{dz}{z} - \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{dz}{z}}_{=2\pi i} = n(\gamma, 0) - 1$$

Damit folgt:

$$n(\gamma, 0) = 1$$

□_{2.9.6}

2.10 Einfache Folgerungen aus dem Cauchyschen Integralsatz

TODO: Abb7

Seien $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ offen, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph und $a \in \Omega$.

Wähle $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ so, dass $B_{2\varepsilon}(a) \subseteq \Omega$ gilt und definiere $C := \partial B_{2\varepsilon}(a)$.

Für alle $z \in B_\varepsilon(a)$ gilt dann:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

Nehme an, dass man unter dem Integral nach z ableiten darf, was wir später rechtfertigen werden.

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta \\ &\vdots \\ f^{(n)}(z) &= \frac{n!}{2\pi i} \oint \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta \end{aligned}$$

Also sollte f beliebig oft komplex differenzierbar sein.

$$\begin{aligned} |f^{(n)}(z)| &\leq \frac{n!}{2\pi} \sup_C \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta - z|^{n+1}} \cdot \underbrace{2\pi \cdot 2\varepsilon}_{\text{Länge von } C} \leq \\ &\leq 2\varepsilon \cdot n! \cdot \frac{1}{\varepsilon^{n+1}} \cdot \sup_C |f| \leq \\ &\leq \underbrace{2 \sup_C |f|}_{=: C} \cdot \frac{n!}{\varepsilon^n} \end{aligned}$$

TODO: Stimmt diese Definition von \mathcal{C} ???

„Man hat unter Kontrolle wie rasch die Ableitungen in n ansteigen.“

Betrachte die Taylorreihe:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

$$\left| \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n \right| \leq C \cdot \left(\frac{|z - z_0|}{\varepsilon} \right)^n$$

Falls $|z - z_0| < \varepsilon$ ist die geometrische Reihe eine konvergente Majorante.

2.10.1 Lemma

TODO: Abb1

Sei $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ offen.

Sei $\varphi(\zeta)$ stetig auf der geschlossene Kontur $\gamma := \partial\Delta$, mit $\Delta := B_{2\varepsilon}(a) \subseteq \Omega$ das heißt $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$, $(f \circ \gamma) : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$ soll stetig sein.

TODO: „das Kontur“ ??

Dann sind die Funktionen

$$F_n(z) = \oint \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta - z)^n} d\zeta$$

mit $n \in \mathbb{N}$ auf $B_\varepsilon(a)$ holomorph und $F'_n(z) = n \cdot F_{n+1}(z)$.

Beweis

a) Zeige, dass $F_1(z)$ stetig ist:

Sei $z_0 \in B_\varepsilon(a)$. Wähle $\delta > 0$ so, dass $B_{2\delta}(z_0) \subseteq B_\varepsilon(a)$. Sei $z \in B_\delta(z_0)$.

$$F_1(z) - F_1(z_0) = \oint_\gamma \varphi(\zeta) \underbrace{\left(\frac{1}{\zeta - z} - \frac{1}{\zeta - z_0} \right)}_{= \frac{z - z_0}{(\zeta - z)(\zeta - z_0)}} d\zeta = (z - z_0) \oint_\gamma \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta - z)(\zeta - z_0)} d\zeta$$

Wir wissen, dass $|\zeta - z| \geq \varepsilon$ und $|\zeta - z_0| \geq \varepsilon$ ist.

Damit folgt:

$$\begin{aligned} |F(z) - F(z_0)| &\leq |z - z_0| \cdot \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot \oint_\gamma |\varphi(\zeta)| \underbrace{|d\zeta|}_{=|\gamma'(\tau)|d\tau} \leq \\ &\leq |z - z_0| \cdot \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot \sup_\gamma |\varphi| \cdot 2\pi \cdot 2\varepsilon \end{aligned}$$

Also ist F Lipschitz-stetig in z_0 .

b) F_1 ist komplex differenzierbar in $z = z_0$ und $F_1'(z_0) = F_2(z_0)$.

Betrachte die Abschätzung aus a) für $\varphi(\zeta)$ ersetzt durch $\frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z_0}$, also ist

$$G_1(z) = \oint \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta - z_0)(\zeta - z)} d\zeta = \frac{F_1(z) - F_1(z_0)}{z - z_0}$$

stetig in z_0 . Also existiert der Limes:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{F_1(z) - F_1(z_0)}{z - z_0}$$

Nochmals erklärt:

$$F_1(z) = \oint_\gamma \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

$$F_1(z) - F_1(z_0) = (z - z_0) \oint_\gamma \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta - z)(\zeta - z_0)} d\zeta$$

Daher gilt:

$$\frac{F_1(z) - F_1(z_0)}{z - z_0} = \oint_\gamma \frac{\psi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

Dabei ist:

$$\psi(\zeta) := \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z_0}$$

Da ψ stetig ist, ist das Konturintegral stetig und daher konvergiert der Differenzenquotient.

c) Der allgemeine Fall folgt durch Induktion:

$$F_n(z) - F_n(z_0) = \oint_{\gamma} \varphi(\zeta) \left(\frac{1}{(\zeta - z)^n} \cdot 1 - \frac{1}{(\zeta - z_0)^n} \right) d\zeta$$

Für die Stetigkeit verwende folgendes Ergebnis:

TODO: Differenzierbarkeit?

Behauptung

Für $p, q \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \oint_{\gamma} \varphi(\zeta) \frac{1}{(\zeta - z_0)^p (\zeta - z)^q} d\zeta = \oint_{\gamma} \varphi(\zeta) \frac{1}{(\zeta - z)^{p+q}} d\zeta$$

Beweis

$$\oint_{\gamma} \varphi(\zeta) \frac{1}{(\zeta - z_0)^p (\zeta - z)^q} d\zeta = \int_{\alpha}^{\beta} \underbrace{\frac{\varphi(\gamma(\tau))}{(\gamma(\tau) - z_0)^p (\gamma(\tau) - z)^q}}_{\rightarrow} \gamma'(\tau) d\tau \xrightarrow{z \rightarrow z_0} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{\varphi(\gamma(\tau))}{(\gamma(\tau) - z_0)^{p+q}} \gamma'(\tau) d\tau$$

Benutze folgende Identität:

$$1 = \frac{\zeta - z_0}{\zeta - z_0} = \frac{\zeta - z}{\zeta - z_0} + \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}$$

Damit ergibt sich:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(\zeta - z)^n} &= \frac{1}{(\zeta - z)^n} \cdot \frac{\zeta - z_0}{\zeta - z_0} = \frac{1}{(\zeta - z)^n} \cdot \left(\frac{\zeta - z}{\zeta - z_0} + \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right) = \frac{1}{(\zeta - z)^{n-1} (\zeta - z_0)} + \frac{z - z_0}{(\zeta - z)^n (\zeta - z_0)} \\ &= \frac{1}{(\zeta - z)^{n-1} (\zeta - z_0)} \frac{\zeta - z_0}{\zeta - z_0} + \frac{z - z_0}{(\zeta - z)^n (\zeta - z_0)} = \frac{1}{(\zeta - z)^{n-1} (\zeta - z_0)} \cdot \left(\frac{\zeta - z}{\zeta - z_0} + \frac{z - z_0}{\zeta - z_0} \right) \\ &= \frac{1}{(\zeta - z)^{n-2} (\zeta - z_0)^2} + \frac{z - z_0}{(\zeta - z)^{n-1} (\zeta - z_0)^2} + \frac{z - z_0}{(\zeta - z)^n (\zeta - z_0)} = \\ &\vdots \\ &= \frac{1}{(\zeta - z_0)^n} + \underbrace{\frac{z - z_0}{(\zeta - z) (\zeta - z_0)^n} + \frac{z - z_0}{(\zeta - z)^2 (\zeta - z_0)^{n-1}} + \dots + \frac{z - z_0}{(\zeta - z)^n (\zeta - z_0)}}_{n \text{ Terme}} \end{aligned}$$

Also gilt:

$$\begin{aligned} \frac{F_n(z) - F_n(z_0)}{z - z_0} &= \frac{1}{z - z_0} \oint_{\gamma} \varphi(\zeta) \left(\frac{1}{(\zeta - z)^n} - \frac{1}{(\zeta - z_0)^n} \right) d\zeta = \\ &= \oint_{\gamma} \varphi(\zeta) \left(\frac{1}{(\zeta - z) (\zeta - z_0)^n} + \frac{1}{(\zeta - z)^2 (\zeta - z_0)^{n-1}} + \dots + \frac{1}{(\zeta - z)^n (\zeta - z_0)} \right) d\zeta \end{aligned}$$

Damit folgt:

$$F'_n(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{F_n(z) - F_n(z_0)}{z - z_0} = \oint_{\gamma} \varphi(\zeta) \frac{n}{(\zeta - z_0)^{n+1}} = n \cdot F_{n+1}(z_0)$$

□ Behauptung

2.10.2 Theorem

Jede holomorphe Funktion $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ ist in Ω unendlich oft komplex differenzierbar und es gilt:

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} dz$$

Dabei ist γ eine Kurve in Ω , die z mit Index 1 umläuft.

2.10.3 Theorem (Moera)

TODO: Name???

Falls $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ stetig und für jede geschlossene Kurve in Ω schon $\oint_{\gamma} f(z) dz = 0$ gilt, ist f holomorph.

Beweis

Nach Theorem ??2.9.1 gibt es eine holomorphe Stammfunktion $F : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ und $F'(z) = f(z)$. Da F nach Theorem ??2.12.2 zweimal differenzierbar ist, folgt, dass f differenzierbar und damit holomorph ist.

□_{2.10.3}

2.10.4 Theorem (Liouville)

Eine beschränkte, auf ganz \mathbb{C} holomorphe Funktion ist konstant.

Beweis

TODO: Abb2

Für $R > 2|z|$ gilt:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial B_R(0)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

$$|\zeta - z| > \frac{R}{2}$$

Nach Theorem ??2.12.2 gilt:

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial B_R(0)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta$$

$$|f'(z)| \leq \frac{1}{2\pi i}$$

$$|f'(z)| \leq \frac{1}{2\pi} \left(\frac{2}{R} \right)^2 \cdot \sup_{\partial B_R(0)} |f| \cdot 2\pi R \leq \frac{4}{R} \cdot \underbrace{\sup_{\mathbb{C}} |f|}_{\leq C} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

Da R beliebig groß gewählt werden kann, folgt $f'(z) = 0$.

Wir sehen also, dass gilt:

TODO: Abb3

$$f'(z) = 0$$

$$f(z_1) - f(z_0) = \int_{\gamma} f'(z) dz = 0$$

Damit folgt:

$$f(z_1) = f(z_0)$$

Also ist f konstant.

□_{2.10.4}

2.10.5 Eleganter Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra

Nehme an, $P(z)$ sei ein Polynom vom Grade ≥ 1 ohne Nullstellen.

Damit folgt:

$$f(z) := \frac{1}{P(z)}$$

ist holomorph auf ganz \mathbb{C} , da $f'(z) = -\frac{P'(z)}{P(z)^2}$ ist.

$$P(z) = a_n z^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n} \frac{1}{z} + \dots \right)$$

Also ist $\lim_{z \rightarrow \infty} |P(z)| = \infty$ und somit:

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 0$$

Daher ist f auf ganz \mathbb{C} holomorph und beschränkt und damit nach dem Satz von Liouville ??? konstant.

Also ist $P(z)$ konstant, was ein Widerspruch ist.

□_{2.10.5}

Bedingung für „Ausnahmepunkte“:

$$\lim_{z \rightarrow \zeta} (z - \zeta) f(z) = 0$$

2.11 Hebbare Singularitäten, Taylorreihen

2.11.1 Satz

Sei $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ offen.

Sei $\Omega' = \Omega \setminus \{a\}$, $f : \Omega' \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph.

Es gelte:

$$\lim_{\substack{z \rightarrow a \\ z \neq a}} (z - a) f(z) = 0$$

Dann gibt es eine holomorphe Funktion

$$\tilde{f} : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$$

mit $\tilde{f}|_{\Omega'} = f$.

Die Umkehrung gilt auch.

Die Funktion \tilde{f} ist eindeutig bestimmt.

\tilde{f} heißt *holomorphe Fortsetzung* von f .

a heißt *hebbare Singularität*.

Beweis

„ \Leftarrow “: Sei \tilde{f} holomorphe Fortsetzung. Dann gilt

$$\lim_{\substack{z \rightarrow a \\ z \neq a}} (z - a) f(z) = \lim_{z \rightarrow a} (z - a) \tilde{f}(z) = 0$$

weil \tilde{f} stetig ist.

Die Eindeutigkeit ist wegen der Stetigkeit klar:

$$\tilde{f}(a) = \lim_{z \rightarrow a} \tilde{f}(z) = \lim_{\substack{z \rightarrow a \\ z \neq a}} f(z)$$

„ \Rightarrow “: Sei $C = \partial B_\varepsilon(a) \subseteq \Omega$.

Betrachte für $z \in B_\varepsilon(a) \setminus \{a\}$ die Funktion:

$$G(\xi) = \frac{f(\xi) - f(z)}{\xi - z}$$

Diese Funktion ist holomorph in $\Omega \setminus \{a, z\}$ und erfüllt die Bedingungen von Theorem 2.10.4, also für $\xi \in \{a, z\}$:

$$\lim_{\substack{z \rightarrow \xi \\ z \neq \xi}} (z - \xi) G(\xi) = 0$$

Also gilt

$$\oint_\gamma G(z) dz = 0$$

und folglich:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

Dies ist genau wie im Beweis des Cauchyschen-Integralsatzes ????

Da das Integral auch für $z = a$ wohldefiniert ist, können wir setzen

$$\tilde{f}(z) := \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

auf $B_\varepsilon(a)$, einschließlich $z = a$.

$\tilde{f} : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ und definiert durch

$$\tilde{f}(z) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi i} & \text{falls } z \in B_\varepsilon(a) \\ f(z) & \text{sonst} \end{cases}$$

□_{2.11.1}

TODO: Rest einfügen

2.11.2 Beispiel

Die Singularitäten sind im Allgemeinen nicht isoliert.

Beweis

Betrachte

$$f(z) = \frac{1}{\sin\left(\frac{1}{z}\right)}$$

auf $\Omega := \mathbb{C} \setminus (\{0\} \cup \{\frac{1}{n\pi} | n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}\})$.

f ist als Verkettung holomorpher Abbildungen auf Ω holomorph.

TODO: Abb2

0 ist ein Häufungspunkt der Singularitäten, also eine nicht isolierte Singularität.

2.11.3 Definition (isolierte, hebbare, wesentliche Singularität, Pol)

Sei $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ offen, $a \in \Omega$, $f : \Omega \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{C}$.

Dann heißt a *isolierte Singularität von f* , falls es ein $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ mit $B_\varepsilon(a) \subseteq \Omega$ – das als eine Teilmenge von Ω gewählt werden kann, da Ω offen ist – gibt, sodass

$$f : B_\varepsilon(a) \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{C}$$

holomorph ist, es also in $B_\varepsilon(a)$ keine weitere Singularität gibt.

- Sei a eine isolierte Singularität von f .
Falls $\lim_{a \neq z \rightarrow a} (z - a) f(z) = 0$ gilt, so heißt die Singularität *hebbbar*.
- Sei a eine isolierte Singularität von f .
Falls $\lim_{a \neq z \rightarrow a} f(z) = \infty$ gilt, so heißt a ein *Pol* von f .
(∞ ist auf der Riemannschen Zahlenkugel.)
- Ist a weder hebbbar noch ein Pol, so heißt a eine *wesentliche Singularität*.
TODO: Abb2

2.11.4 Satz und Definition (Ordnung eines Pols)

In einer Umgebung jeder Polstelle kann f in einer Umgebung $B_\varepsilon(a)$ dargestellt werden als

$$f(z) = (z - a)^{-n} f_n(z)$$

mit einer holomorphen Funktion f_n mit $f_n(a) \neq 0$.

$n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ heißt *die Ordnung* des Pols.

Beweis

Sei a ein Pol von f . Also gibt es ein $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$, sodass f auf $B_\varepsilon(a)$ keine Nullstelle hat.

Dann folgt mit den Konvergenzsätzen:

$$\begin{aligned} f : B_\varepsilon(a) \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{C} \text{ ist holomorph} & \quad \lim_{a \neq z \rightarrow a} f(z) = \infty \\ g := \frac{1}{f} : B_\varepsilon(a) \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{C} \text{ ist holomorph} & \quad \lim_{a \neq z \rightarrow a} g(z) = 0 \end{aligned}$$

Also ist $\lim_{a \neq z \rightarrow a} (z - a)g(z) = 0$ und daher ist a eine hebbare Singularität von g .

Also kann g holomorph fortgesetzt werden:

$$g : B_\varepsilon(a) \rightarrow \mathbb{C} \text{ ist holomorph}$$

Stelle g dar in der Form:

$$g(z) = (z - a)^n \cdot g_n(z)$$

mit $g_n(a) \neq 0$. Damit folgt:

$$f(z) = \frac{1}{(z - a)^n} f_n(z)$$

Dabei ist

$$f_n(z) = \frac{1}{g_n(z)}$$

holomorph.

TODO: Bracht man folgende Anmerkung?

(Eventuell ε verkleinern, um Nullstellen zu vermeiden.)

□_{2.11.4}

2.11.5 Definition (meromorphe Funktion)

Eine Funktion, die nur isolierte Singularitäten $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ besitzt, die alle Pole sind, und die auf $\mathbb{C} \setminus \{a_n | n \in \mathbb{N}\}$ holomorph sind, heißt *meromorphe Funktion*.

Beispiele

Rationale Funktionen $\frac{P(z)}{Q(z)}$.

e^x , $\sin(x)$, $\cos(x)$ und Quotienten von Polynomen von diesen, also zum Beispiel $\frac{\sin(x)}{e^x - 1}$.

2.11.6 Beispiel

Nun zu den wesentlichen Singularitäten:

$\frac{1}{\sin(\frac{1}{x})}$ oder $\sin(\frac{1}{x})$ an der Stelle 0.

$$f(z) = e^{\frac{1}{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \frac{1}{z^n} : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C} \text{ holomorph}$$

Also ist 0 eine isolierte Singularität.

$f(z)$ ist *nicht* in der Form

$$f(z) = \frac{1}{z^n} g(z)$$

darstellbar mit

$$g : B_\varepsilon(0) \rightarrow \mathbb{C}$$

holomorph, da in f beliebig hohe Polordnungen auftreten.

$$f(z) = e^{\frac{1}{z}} = e^{\frac{\bar{z}}{|z|^2}} = \exp\left(\frac{\operatorname{Re}(z) - \mathbf{i} \cdot \operatorname{Im}(z)}{|z|^2}\right) = \underbrace{\exp\left(\frac{\operatorname{Re}(z)}{|z|^2}\right)}_{>0} \cdot \underbrace{\exp\left(-\frac{\mathbf{i} \cdot \operatorname{Im}(z)}{|z|^2}\right)}_{\text{Phasenfaktor}}$$

TODO: Abb3

Auf der imaginären Achse ist $\operatorname{Re}(z) = 0$, also ist

$$f(z) = \exp\left(-\frac{\mathbf{i} \cdot \operatorname{Im}(z)}{|z|^2}\right)$$

und daher $|f(z)| = 1$, aber f „oszilliert immer schneller“.

Auf der reellen Achse ist $\operatorname{Im}(z) = 0$, also gilt:

$$f(z) = \exp\left(\frac{\operatorname{Re}(z)}{|z|^2}\right) \xrightarrow{z \rightarrow 0} \infty$$

Betrachtung

Für alle $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ gilt:

$$f(B_\varepsilon(0) \setminus \{0\}) = \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

Das Bild von $B_\varepsilon(0) \setminus \{0\}$ ist *dicht* in \mathbb{C} .

2.11.7 Satz

Eine holomorphe Funktion $f : B_{\varepsilon(a)} \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{C}$ kommt in jeder Umgebung einer isolierten wesentlichen Singularität a jeder komplexen Zahl beliebig nahe.

Beweis

Ansonsten gäbe es ein $A \in \mathbb{C}$ mit $\kappa, \delta \in \mathbb{R}_{>0}$, sodass gilt für $z \neq a$ gilt:

$$|z - a| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(z) - A| > \kappa$$

TODO: Abb4

Dann wäre

$$\lim_{a \neq z \rightarrow a} \left| \frac{1}{z - a} (f(z) - A) \right| = \lim_{a \neq z \rightarrow a} \underbrace{\frac{1}{|z - a|}}_{=\infty} \underbrace{|f(z) - A|}_{>\kappa} = \infty$$

Daher folgt:

$$\lim_{a \neq z \rightarrow a} \underbrace{\frac{1}{z - a} (f(z) - A)}_{=:g(z)} = \infty$$

(∞ in der Riemannschen Zahlenkugel.)

$$g(z) = \frac{1}{(z - a)^n} g_n(z) = \frac{1}{z - a} (f(z) - A)$$

$g_n(z)$ holomorph auf $B_\varepsilon(a)$.

Löse nach $f(z)$ auf:

$$f(z) = \frac{g_n(z)}{(z - a)^{n-1}} + A$$

Also ist a ein Pol von f der Ordnung $n - 1$.

Wir haben also eine hebbare Singularität ($n = 1$) oder einen Pol ($n > 1$), aber keine wesentliche Singularität.

□_{2.11.7}

2.12 Die Laurententwicklung

Sei $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ offen und $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph und $r, R \in \mathbb{R}_{>0}$.

$$\Omega \supseteq \mathcal{R} = \{z \in \mathbb{C} | r < |z| < R\}$$

TODO: Abb5

2.12.1 Definition (Laurent-Reihe)

Eine Reihe der Form

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n := \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n + \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} z^{-n}$$

heißt *Laurent-Reihe*. Die Laurent-Reihe heißt (absolut) konvergent, falls die Reihen

$$N(z) := \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$$

und

$$H(z) := \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} z^{-n}$$

beide (absolut) konvergieren.

$H(z)$ heißt *der Hauptteil* und $N(z)$ heißt *der Nebenteil* der Laurent-Reihe.

2.12.2 Theorem

Jede auf $\Omega \supseteq \mathcal{R}$ holomorphe Funktion f ist in \mathcal{R} in einer Laurent-Reihe darstellbar, also:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n$$

Das heißt es gibt $c_n \in \mathbb{C}$, sodass die Laurent-Reihe konvergiert und mit f übereinstimmt.

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial B_R(0)} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta$$

Falls $n \geq 0$.

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial B_r(0)} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta$$

Falls $n < 0$.

Beweis

TODO: Abb6

Nach dem Cauchyschen Integralsatz gilt:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \\ 0 &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \\ &\vdots \\ 0 &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_k} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \end{aligned}$$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial B_R(0)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial B_r(0)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

Bemerkung

Wir müssen die Kontur C_l so wählen, dass $C_l \subseteq \Delta := B_\zeta(a) \subseteq \Omega$.

TODO: Abb7

$f(\zeta)$ ist holomorph im Innern von C_2 .

$$f_1(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial B_R(0)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

$$f_2(z) = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial B_r(0)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

$f_1(z)$ ist für alle $z \in B_R(0)$ wohldefiniert und holomorph.

Beachte: Im Allgemeinen ist $f_1 \neq f$, denn f_1 ist holomorph auf $B_R(0)$, aber f ist nur holomorph auf \mathcal{R} und im Allgemeinen nicht holomorph fortsetzbar auf $B_R(0)$.

f_1 kann im Folgenden entwickelt werden, also:/

$$f_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$$

definiert den Nebenteil der Laurent-Reihe.

Betrachte $|\zeta| = R$, $|z| < R$, also $\left|\frac{z}{\zeta}\right| < 1$. Etwas expliziter und eleganter:

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta} \left(\frac{1}{1 - \frac{z}{\zeta}} \right) = \frac{1}{\zeta} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{\zeta} \right)^n$$

$$f_1(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint f(\zeta) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{\zeta} \right)^n \cdot \frac{1}{\zeta} \right) d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \underbrace{\left(\frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}} d\zeta \right)}_{=: c_n}$$

Für f_2 analog. $|\zeta| = r$, $|z| > r$, also $\left|\frac{z}{\zeta}\right| > 1$.

$$\frac{1}{\zeta - z} = -\frac{1}{z} \left(\frac{1}{1 - \frac{\zeta}{z}} \right) = -\frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\zeta}{z} \right)^n$$

Also folgt:

$$f_2(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial B_r(0)} f(\zeta) \frac{1}{z} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\zeta}{z} \right)^n \right) d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}} \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial B_r(0)} f(\zeta) \cdot \zeta^n d\zeta \right)}_{=: c_{-(n+1)}}$$

□_{2.12.2}

TODO: Rest einfügen

Wiederholung:

$S \subseteq \mathbb{C}$ habe keinen Häufungspunkt, aber S kann unendlich sein. Sei

$$f : \mathbb{C} \setminus \{S\} \rightarrow \mathbb{C}$$

holomorph. Die Punkte in S sind die Singularitäten und diese sind isoliert, aber wesentliche Singularitäten sind möglich.

Betrachte die geschlossene, stückweise stetig differenzierbare Kurve:

$$\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{S\}$$

Dann gilt nach dem Residuensatz:

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) \, dz = \sum_{a \in S} n(\gamma, a) \cdot \operatorname{Res}_a(f)$$

Dabei ist

$$n(\gamma, a) := \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{dz}{z - a} \in \mathbb{N}$$

die Windungszahl und

$$\operatorname{Res}_a(f) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial B_{\varepsilon}(a)} f(z) \, dz$$

das Residuum, wobei $B_{\varepsilon}(a) \cap S = \{a\}$.

Laurent-Entwicklung um $a \in S$:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - a)^n$$

Dann ist:

$$\operatorname{Res}_a(f) = c_{-1}$$

TODO: Abb1, Abb2

Beispiel: $\frac{1}{\sqrt{z}}$

$$\lim_{0 \neq z \rightarrow 0} z \cdot \frac{1}{\sqrt{z}} = 0$$

Dies ist eine hebbare Singularität. Aber:

$$\lim_{0 \neq z \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{z}} = \infty$$

Also ist $\frac{1}{\sqrt{z}}$ auch ein Pol!

Das Problem dabei ist, dass $\frac{1}{\sqrt{z}}$ nicht in $B_{\varepsilon}(0) \setminus \{0\}$ holomorph, also ist 0 keine isolierte Singularität.

$$\frac{1}{\sqrt{z}} = z^{-\frac{1}{2}} = e^{-\frac{1}{2} \log(z)}$$

Dies ist nur holomorph auf $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_0^-$.

Ende der Wiederholung

Betrachte Integrale über die ganze reelle Achse.

2.12.3 Proposition

Sei $K(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ eine rationale Funktion, die keine Pole auf der reellen Achse hat und im Unendlichen wenigstens quadratisch abfällt.

Dann ist

$$\int_{-\infty}^{\infty} K(x) dx = 2\pi i \sum_{\substack{a \text{ Pol} \\ \operatorname{Im}(a) > 0}} \operatorname{Res}_a(K)$$

Beweis

TODO: Abb3

Die Funktion K hat endlich viele Pole in \mathbb{C} , die alle Nullstellen von Q sind.

Wähle den Radius R so groß, dass alle Pole in $B_R(0)$ liegen, womit folgt:

$$\oint_{C_1 \cup C_2} K(z) dz = 2\pi i \sum_{\substack{a \text{ Pol} \\ \operatorname{Im}(a) > 0}} \underbrace{n(C_1 \cup C_2, a)}_{=1} \cdot \operatorname{Res}_a(f) = 2\pi i \sum_{\substack{a \text{ Pol} \\ \operatorname{Im}(a) > 0}} \operatorname{Res}_a(K)$$

||

$$\int_{-R}^R K(x) dx + \int_{C_2} K(z) dz \xrightarrow{R \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} K(x) dx$$

Denn es gilt:

$$\left| \int_{C_2} K(z) dz \right| \leq \underbrace{\sup_{z \in C_2} |K(z)|}_{\leq \frac{C}{R^2} \text{ da } K \text{ quadratisch abfällt}} \cdot \pi R \leq \frac{C\pi}{R} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

□_{2.12.3}

2.12.4 Beispiel

Berechne:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$$

Die Funktion

$$f(z) = \frac{1}{1+z^2}$$

hat einen Pol, falls $1+z^2=0$, also $z = \pm i$ ist.

Nach der Proposition 2.12.3 gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}_i \left(\frac{1}{1+x^2} \right)$$

Berechne das Residuum:

$$f(z) = \left(\frac{1}{z+i} - \frac{1}{z-i} \right) \cdot \frac{i}{2} = -\frac{i}{2} \frac{1}{z-i} + \underbrace{\frac{i}{2} \frac{1}{z+i}}_{\text{holomorph in } B_\varepsilon(i)}$$

Damit folgt:

$$\text{Res}_i \left(\frac{1}{1+x^2} \right) = -\frac{i}{2}$$

Also gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = 2\pi i \cdot \frac{-i}{2} = \pi$$

Eine andere Möglichkeit ist die Taylorentwicklung des Nenners:

$$\begin{aligned} g(z) &= 1 + z^2 = g(i) + g'(i)(z-i) + \mathcal{O}((z-i)^2) = \\ &= 0 + 2i(z-i) + \mathcal{O}((z-i)^2) \\ g'(z) &= 2z \end{aligned}$$

$$f(z) = \frac{1}{g(z)} = \frac{1}{2i(z-i) + \mathcal{O}((z-i)^2)} = \frac{1}{2i(z-i)} \underbrace{\left(\frac{1}{1 + \mathcal{O}(z-i)} \right)}_{=:h(z)}$$

Wegen

$$\lim_{z \rightarrow i} h(z) = 1$$

ist die Singularität bei $z = i$ hebbar und daher h holomorph fortsetzbar und daher als Taylorreihe darstellbar, womit folgt:

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{k=-1}^{\infty} c_k (z-i)^k \\ c_k &= \frac{1}{2i} \frac{h^{(k+1)}(i)}{(k+1)!} \\ c_{-1} &= \frac{1}{2i} \cdot \frac{h(i)}{1} = \frac{1}{2i} \end{aligned}$$

Damit ergibt sich:

$$\text{Res}_i(f) = \frac{1}{2i}$$

2.12.5 Proposition

Sei $K(x)$ rational, habe keine Pole auf der reellen Achse und falle wenigstens wie $\frac{1}{x}$ ab.

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{ix} K(x) dx = 2\pi i \sum_{\substack{a \text{ Pol} \\ \text{Im}(a) > 0}} \text{Res}_a \left(e^{iz} K(z) \right)$$

Beweis

TODO: Abb4

$$\int_{C_2} e^{iz} K(z) dz \leq \sup_{z \in C_2} |e^{iz} K(z)| \cdot \pi R$$

$$|e^{iz}| = e^{\operatorname{Re}(iz)} = e^{-\overbrace{\operatorname{Im}(z)}^{\geq 0}} \leq 1$$

2.12.6 Erinnerung (Hauptwertintegrale)

$$\int_{-\infty}^{\infty} \overbrace{\frac{1}{x}}^{\text{“principal part”}} \cdot f(x) dx := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{f(x)}{x} dx + \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{f(x)}{x} dx \right)$$

2.12.7 Proposition

Die rationale Funktion $f(x)$ habe einfache Pole bei $p_1 < \dots < p_n$ und besitze sonst keine weiteren Pole auf der reellen Achse.

Außerdem falle $f(x)$ im Unendlichen wenigstens quadratisch ab. Dann ist

$$\begin{aligned} \text{P-} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &:= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R} \setminus ([p_1 - \varepsilon, p_1 + \varepsilon] \cup \dots \cup [p_n - \varepsilon, p_n + \varepsilon])} f(x) dx = \\ &= 2\pi i \sum_{\substack{a \text{ Pol} \\ \operatorname{Im}(a) > 0}} \operatorname{Res}_a(f) + \pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}_{p_k}(f) \end{aligned}$$

Beweis

TODO: Abb5

$$\int_{C_1} f(z) dz = 2\pi i \sum_{\substack{a \text{ Pol} \\ \operatorname{Im}(a) > 0}} \operatorname{Res}_a(f)$$

$$\int_{C_2} f(z) dz = 2\pi i \sum_{\substack{a \text{ Pol} \\ \operatorname{Im}(a) \geq 0}} \operatorname{Res}_a(f)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left(\oint_{C_1} + \oint_{C_2} \right) f(z) dz &= 2\pi i \sum_{\substack{a \text{ Pol} \\ \operatorname{Im}(a) \geq 0}} \operatorname{Res}_a(f) + i\pi \sum_{\substack{a \text{ Pol} \\ \operatorname{Im}(a) \geq 0}} \operatorname{Res}_a(f) = \\ &= \underbrace{\int_{C_R} f(z) dz}_{\rightarrow 0 \text{ für } R \rightarrow \infty} + \underbrace{\int_{[-R, R] \setminus ([p_1 - \varepsilon, p_1 + \varepsilon] \cup \dots \cup [p_n - \varepsilon, p_n + \varepsilon])} f(z) dz}_{\rightarrow \text{P-} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx} + \sum_{k=1}^n \int_{D_k \cap D'_k} f(z) dz \end{aligned}$$

Im Limes $R \rightarrow \infty$ und dem anschließenden Limes $\varepsilon \rightarrow 0$ erhalten wir:

$$2\pi i \sum_{\substack{a \text{ Pol} \\ \operatorname{Im}(a) > 0}} \operatorname{Res}_a(f) + i\pi \sum_{\substack{a \text{ Pol} \\ \operatorname{Im}(a) \geq 0}} \operatorname{Res}_a(f) = P - \int_{-\infty}^{\infty} f(z) dz + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \int_{D_k \cup D'_k} f(z) dz$$

Es ist noch zu zeigen:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \int_{D_k \cup D'_k} f(z) dz = 0$$

Da f nur einen einfachen Pol hat, können wir f um p_k entwickeln

$$f(z) = \frac{C_{-1}}{z - p_k} + g(z)$$

mit einer holomorphen Funktion $g(z)$.

$$\left| \int_{D_k \cup D'_k} g(z) dz \right| \leq \underbrace{\sup_{\partial B_\varepsilon(p_k)} |g|}_{\leq C} \cdot 2\pi\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$$

TODO: Abb6

$$\begin{aligned} \int_{D_k \cup D'_k} \frac{dz}{z - p_k} &= \log(z - p_k) \Big|_{z=p_k-\varepsilon+i\cdot 0}^{z=p_k+\varepsilon} + \log(z - p_k) \Big|_{z=p_k-\varepsilon-i\cdot 0}^{z=p_k+\varepsilon} = \\ &= \log(\varepsilon) - (\log(\varepsilon) + i\pi) + \log(\varepsilon) - (\log(\varepsilon) - i\pi) = i\pi - i\pi = 0 \end{aligned}$$

□_{2.12.7}

2.12.8 Integrale über Intervalle

Dies geht typischerweise immer dann, wenn der Integrand periodisch ist und man über eine oder mehrere Perioden integriert.

Idee

Schreibe das Integral als Konturintegral mit Hilfe von e^{it} um.

2.12.9 Beispiel

Mit

$$\cos \varphi = \frac{1}{2} (e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}) = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$$

folgt:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{1}{\cos(\varphi + i)} d\varphi &= \left\{ \begin{array}{l} z = e^{i\varphi} \\ dz = e^{i\varphi} \cdot i d\varphi = i z d\varphi \end{array} \right\} = \\ &= \oint_{|z|=1} \frac{1}{\cos \varphi + i} \frac{dz}{i z} = \\ &= \oint_{|z|=1} \frac{1}{\frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) + i} \frac{dz}{i z} = -2i \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + 2iz + 1} \end{aligned}$$

Berechne die Pole:

$$z^2 + 2iz + 1 = 0$$

$$z = -i \pm \sqrt{(i)^2 - 1} = -i \pm \sqrt{-2} = -i \pm \sqrt{2}i$$

TODO: Abb7

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{\cos \varphi + i} d\varphi = (-2i) \cdot 2\pi i \operatorname{Res}_{-i-\sqrt{2}i} \frac{1}{z^2 + 2iz + 1} = \dots$$

TODO: Rest einfügen

2.13 Die Gamma- und Zetafunktion

Sei $s \in \mathbb{R}_{>0}$.

$$\Gamma(s) := \int_0^\infty x^{s-1} e^{-x} dx$$

Es gilt:

$$\begin{aligned} \Gamma(s+1) &= \int_0^\infty x^s e^{-x} dx = \int_0^\infty x^s \left(-\frac{d}{dx} e^{-x} \right) dx \stackrel{\text{part. Int.}}{=} \int_0^\infty \left(\frac{d}{dx} x^s \right) \cdot e^{-x} dx = \\ &= s \cdot \int_0^\infty x^{s-1} e^{-x} dx = s \cdot \Gamma(s) \end{aligned}$$

Vergleiche mit der Fakultät $n! = n \cdot (n-1)!$ für $n \in \mathbb{N}$.

Es gilt:

$$\Gamma(n+1) = n!$$

Also ist die Γ -Funktion eine Fortsetzung der Fakultät.

Schreibe das Integral als Konturintegral um:

$$x^{s-1} = e^{(s-1) \cdot \log(x)}$$

Bezeichne den auf der positiven reellen Achse geschlitzten Logarithmus mit $\ln(z)$.

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \ln(x + i\varepsilon) &= \log(x) \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \ln(x - i\varepsilon) &= \log(x) + 2\pi i \end{aligned}$$

TODO: Abb1

Betrachte das Konturintegral:

$$\begin{aligned} \int_C e^{(s-1) \cdot \ln(z)} e^{-z} dz &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_0^\infty \left[e^{(s-1) \ln(x-i\varepsilon)} \cdot e^{-x} - e^{(s-1) \ln(x+i\varepsilon)} \cdot e^{-x} \right] dx = \\ &= \left(e^{(s-1) \cdot 2\pi i} - 1 \right) \cdot \Gamma(s) = e^{i\pi(s-1)} \cdot 2i \sin(\pi(s-1)) \cdot \Gamma(s) \end{aligned}$$

2.13.1 Lemma

$$\Gamma(s) = \frac{e^{-i(s-1)\pi}}{2i \sin((s-1)\pi)} \underbrace{\int_C e^{(s-1)\ln(z)} e^{-z} dz}_{\text{ist holomorph in } s}$$

TODO: Abb2

Man sieht daran:

$\Gamma(s)$ ist eine meromorphe Funktion und holomorph auf $\mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$.

Untersuchung der Pole:

TODO: Abb3

$$\begin{aligned}\Gamma(z+1) &= z \cdot \Gamma(z) \\ \Gamma(z) &= \frac{1}{z} \cdot \Gamma(z+1) = \frac{1}{z(z+1) \cdots (z+n)} \Gamma(z+n+1)\end{aligned}$$

Man erhält:

$\Gamma(s)$ hat einfache Pole bei $s = 0, -1, -2, \dots$

Nun zur *Riemannschen Zetafunktion*:

Sei $s \in \mathbb{R}_{>1}$. Die Reihe

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$$

konvergiert absolut.

2.13.2 Lemma

Sei $(p_n)_{n \in \mathbb{N}} = (2, 3, 5, \dots)$ die aufsteigende Folge der Primzahlen in \mathbb{N} .

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - p_n^{-s})$$

Beweisskizze

$$(1 - 2^{-s}) \cdot \zeta(s) = (1 - 2^{-s}) \cdot \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} = \sum_{n=1}^{\infty} (n^{-s} - (2n)^{-s}) = \sum_{n \text{ ungerade}} n^{-s}$$

$$(1 - 3^{-s}) (1 - 2^{-s}) \zeta(s) = \sum_{n \text{ ist nicht durch 2 oder 3 teilbar}} n^{-s}$$

2.13.3 Komplexe Fortsetzung

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-s \cdot \log(n)}$$

Variablentransformation: $x = nx'$, $dx = n dx'$

$$\begin{aligned}\Gamma(s) &= \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx = n^s \cdot \int_0^{\infty} x'^{s-1} e^{-nx'} dx' \quad / \cdot n^{-s} \\ n^{-s} \cdot \Gamma(s) &= \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-nx} dx \quad / \sum_{n=1}^{\infty} \\ \zeta(s) \cdot \Gamma(s) &= \int_0^{\infty} x^{s-1} \sum_{n=1}^{\infty} (e^{-x})^n dx = \int_0^{\infty} x^{s-1} \frac{1}{e^x - 1} dx\end{aligned}$$

Also gilt:

$$\zeta(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \cdot \int_0^{\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx$$

Schreibe dies wieder als Konturintegral (C wie oben):

$$x^{s-1} \rightsquigarrow e^{(s-1) \ln(z)}$$

Dies ist analog wie bei der Γ -Funktion.

2.13.4 Theorem

$$\zeta(s) = \frac{e^{-i(s-1)\pi}}{\Gamma(s) \cdot 2i \sin((s-1)\pi)} \underbrace{\int_C e^{(s-1) \log(z)} \frac{1}{e^z - 1} dz}_{\text{ist holomorph auf } \mathbb{C}}$$

Dies liefert eine meromorphe Fortsetzung.

Mögliche Pole sind bei $s \in \mathbb{Z}$:

- $s < 0$: Da die Γ -Funktion einen Pol hat, hat ζ keinen Pol.
- $s > 1$: Die ζ -Funktion ist endlich, da die Reihe konvergiert.
- $s = 0$: Es gibt auch keine Probleme.
- $s = 1$: Einfacher Pol.

TODO: Abb4

Wo liegen die Nullstellen von $\zeta(s)$?

2.13.5 Riemannsche Vermutung

Alle Nullstellen der ζ -Funktion liegen auf der Geraden $\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}$.

(Dies ist ein noch unbewiesenes Millenium-Problem.)

2.14 Der Riemannsche Abbildungssatz

2.14.1 Definition (biholomorph)

Seien $U, V \subseteq \mathbb{C}$ offen.

Eine Abbildung $f : U \rightarrow V$ heißt biholomorph, falls f bijektiv ist und f, f^{-1} holomorph sind.

Frage

Sei $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ offen.

Gibt es eine biholomorphe Abbildung $f : \Omega \rightarrow B := B_1(0)$.

TODO: Abb5

a) Der Radius 1 ist keine Einschränkung und auch der Mittelpunkt 0 nicht.

b) Wähle $\Omega = \mathbb{C}$. Gesucht: $f : \mathbb{C} \rightarrow B_1(0) =: B$ biholomorph.

$|f(z)| \leq 1$. Nach Liouville folgt $f = \text{konst.}$, also nicht bijektiv und damit nicht biholomorph.

Also müssen wir $\Omega = \mathbb{C}$ ausschließen.

c) TODO: Abb6

Ω muss bogenzusammenhängend (TODO: weg-?) sein, denn:

Seien $z_1, z_2 \in \Omega$. Dann ist $\overline{f(z_1) f(z_2)} \subseteq B$. Also ist $f^{-1}(\overline{f(z_1) f(z_2)})$ ist eine Kurve in Ω , die z_1 und z_2 verbindet.

d) Ω muss einfach zusammenhängend sein, das heißt:

Sei γ eine geschlossene Kurve. Sei $s \in [0, 1]$.

$$\gamma_s := s \cdot \gamma$$

$s = 1$ gibt die ursprüngliche Kurve und $s = 0$ liefert den Ursprung.

Man sagt auch, die Kurve ist 0-homotop.

TODO: Abb8

γ ist nicht in einen Punkt „zusammenziehbar“.

Beweis:

Sei γ eine geschlossene Kurve in Ω . Also ist $\Gamma = f \circ \gamma$ eine geschlossene Kurve in B .

$$\Phi(\tau, s) := s \cdot \Gamma(\tau)$$

eine Nullhomotopie.

Also ist $f^{-1} \circ \Phi$ ist eine Nullhomotopie von γ , weswegen Ω einfach zusammenhängend ist.

2.14.2 Definition

Ein topologischer, zusammenhängender Raum X heißt *einfach zusammenhängend*, falls es für jede geschlossene Kurve $\gamma : [a,b] \rightarrow X$ eine stetige Funktion $\Phi : [a,b] \times [0,1] \rightarrow X$, sodass $\Phi(.,1) = \gamma(.)$ und $\Phi(.,0) = \text{konst.}$.

Falls $\Omega \subseteq \mathbb{C}$, so gilt:

- Ω ist einfach zusammenhängend $\Leftrightarrow \overline{\mathbb{C}} \setminus \Omega$.
- Ω ist einfach zusammenhängend $\Leftrightarrow n(\gamma, a) = 0$ für alle geschlossene Kurven γ in Ω und $a \notin \Omega$.

2.14.3 Theorem (Riemannscher Abbildungssatz für $\Omega \subseteq \mathbb{C}$)

Sei $\Omega \subseteq \mathbb{C}$, $\Omega \neq \mathbb{C}$ eine einfach zusammenhängende offene Teilmenge von \mathbb{C} und $z_0 \in \Omega$.

Dann gibt es eine eindeutige biholomorphe Abbildung $f : \Omega \rightarrow B_1(0)$ mit $f(z_0) = 0$ und $f'(z_0) > 0$.

Reimann hat dies vermutet. Koebe hat es bewiesen. siehe zum Beispiel Jänich, Ahlfors

Bisher oft: γ geschlossene Kurve, $\text{im}(\gamma) \subseteq \Delta \subseteq \Omega$.

Ab jetzt kann man stets $\Delta = B_R(a)$ durch eine einfache zusammenhängende Teilmengen von \mathbb{C} ersetzen.

zur Eindeutigkeit:

Seien f_1, f_2 zwei biholomorphe Abbildungen $\Omega \rightarrow B$.

Dann ist $g = f_1^{-1} \circ f_2$ eine biholomorphe Abbildung von $B \rightarrow B$ und $g(0) = 0$.

2.14.4 Satz

$g = c \cdot z$ mit $|c| = 1$.

Erstaunlich ist: g ist bis auf einen Phasenfaktor (eine Drehung) eindeutig durch die Biholomorphie festgelegt.

Beweisskizze

$$h(z) := \begin{cases} \frac{g(z)}{z} & \text{für } z \neq 0 \\ g'(z) & \text{für } z = 0 \end{cases}$$

$g(0) = 0$ ist eine einfache Nullstelle. Also ist h holomorph auf B .

Maximumprinzip

Ist $h : B_1(0) \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph und nicht konstant, dann nimmt $|h|$ im Inneren kein Maximum an.

Damit folgt:

$$|h(z)| = \frac{|g(z)|}{|z|} = |g(z)| \leq 1$$

auf ∂B_1 .

Aus dem Maximumprinzip folgt:

$$1 \geq |h(z)| = \frac{|g(z)|}{|z|}$$

in ganz B , also $|g(z)| \leq |z|$.

Analog folgt: $|z| = |g^{-1}(g(z))| \leq |g(z)|$. Also folgt $|g(z)| = |z|$.

Somit ist $|h(z)| = \frac{|g(z)|}{|z|} = \text{konst.}$.

Aus dem Maximumprinzip folgt $h = \text{konst.}$ und somit $g = \text{konst.} \cdot z$.

Beweis des Maximumprinzips

TODO: Abb9

Nehme an $|h|$ habe in $z_0 \in \Omega$ ein Maximum.

$$h(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial B_\varepsilon(z_0)} \frac{h(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

Also folgt:

$$|h(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi\varepsilon} \oint_{\partial B_\varepsilon(z_0)} |h(\zeta)| d\zeta \leq \int_0^1 |h(\tau)| d\tau$$

$$\zeta = z + \varepsilon e^{2\pi i \tau}$$

Da z_0 ein Maximum ist, folgt:

$$|h| = |h(z_0)|$$

auf ∂B_ε .

Anhang

GNU Free Documentation License

Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.

`<https://fsf.org/>`

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document “free” in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of “copyleft”, which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The “**Document**”, below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as “**you**”. You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A “**Modified Version**” of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A “**Secondary Section**” is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The “**Invariant Sections**” are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The “**Cover Texts**” are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A “**Transparent**” copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not “Transparent” is called “**Opaque**”.

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, L^AT_EX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The “**Title Page**” means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, “Title Page” means the text near the most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning of the body of the text.

The “**publisher**” means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.

A section “**Entitled XYZ**” means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as “**Acknowledgements**”, “**Dedications**”, “**Endorsements**”, or “**History**”.) To “**Preserve the Title**” of such a section when you modify the Document means that it remains a section “Entitled XYZ” according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that

these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution

and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- H. Include an unaltered copy of this License.
- I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
- N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
- O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an “aggregate” if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled “Acknowledgements”, “Dedications”, or “History”, the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does not give you any rights to use it.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <https://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document specifies that a proxy can decide which future versions of this License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Document.

11. RELICENSING

"Massive Multiauthor Collaboration Site" (or "MMC Site") means any World Wide Web server that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A "Massive Multiauthor Collaboration" (or "MMC") contained in the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

"CC-BY-SA" means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that license published by that same organization.

"Incorporate" means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another Document.

An MMC is "eligible for relicensing" if it is licensed under this License, and if all works that were first published under this License somewhere other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright © YEAR YOUR NAME.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation;

with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with ... Texts." line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.