

Descomposición LU de una matriz cuadrada

Matrices diagonales

Un matriz cuadrada se dice que es **diagonal** si todos los números que no estén en la diagonal principal son nulos, es decir, si $a_{ij} = 0$ siempre que $i \neq j$.

Ejemplos

❶ La matriz $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ es una matriz diagonal.

❷ La matriz identidad de orden n es una matriz diagonal, para cualquier n

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

❸ Cualquier matriz nula (con todos sus entradas igual a cero) es diagonal.

Matrices triangulares

Sea A una matriz cuadrada.

- A es **triangular superior** si $a_{ij} = 0$, para todo $i > j$ (es decir, por debajo de la diagonal principal hay ceros).
- A es **triangular inferior** si $a_{ij} = 0$, para todo $i < j$ (es decir, por encima de la diagonal principal hay ceros).

Ejemplos

❶ La matriz $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ es triangular superior.

❷ La matriz $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ es triangular inferior.

Nota: Las matrices diagonales son, en particular, matrices triangulares superiores y triangulares inferiores.

Matrices triangulares

Propiedades de las matrices triangulares

Sean A y B dos matrices cuadradas de orden n y α un número real. Si A y B son matrices triangulares superiores (triangulares inferiores (diagonales)) entonces:

- 1 $A + B$, $\alpha \cdot A$, y $A \cdot B$ son triangulares superiores (triangulares inferiores (diagonales)).
- 2 A es invertible si y sólo si $a_{ii} \neq 0$, para todo $1 \leq i \leq n$. Además, A^{-1} es también triangular superior (triangular inferior (diagonal)).

Propiedades de las matrices elementales

- 1 Las matrices elementales de **tipo 1**, $E_{i,j}$, **no son triangulares**,
- 2 Las matrices elementales de **tipo 2**, $E_i(\alpha)$, **son diagonales**,
- 3 Las matrices elementales de **tipo 3**, $E_{i,j}(\alpha)$, son
 - **triangulares superiores** cuando $i < j$ y
 - **triangulares inferiores** cuando $i > j$.

Ejemplos

$$E_2(3) = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}}_{\text{diagonal}}$$

$$E_{12}(3) = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{triangular superior}}$$

$$E_{21}(3) = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{triangular inferior}}$$

$$E_{12} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_{\text{no es triangular}}$$

Inversas de las matrices elementales

Todas las matrices elementales son invertibles y además sus inversas son del mismo tipo. Concretamente:

- 1 $(E_{ij})^{-1} = E_{ij}$
- 2 $(E_i(\alpha))^{-1} = E_i(\frac{1}{\alpha})$ (recordad que $\alpha \neq 0$)
- 3 $(E_{ij}(\alpha))^{-1} = E_{ij}(-\alpha)$

El resultado anterior es fácil de deducir si pensamos en términos de operaciones elementales: la inversa de una matriz elemental será otra matriz que multiplicada por ella a izquierda de la matriz identidad. Por tanto, estamos buscando realizar una operación elemental que “deshaga” la operación asociada a esa matriz.

Descomposición LU de una matriz cuadrada

Dada una matriz cuadrada A , podemos factorizarla como el producto $A = L \cdot U$ donde U es una matriz triangular superior y L es una matriz triangular inferior o bien la permutación de una triangular inferior.

Cálculo de las matrices L y U

$$A \xrightarrow{Op_1} E_1 \cdot A \xrightarrow{Op_2} E_2 \cdot E_1 \cdot A \rightarrow \dots \xrightarrow{Op_k} \underbrace{E_k \cdot E_{k-1} \cdots E_2 \cdot E_1}_{\text{invertible}} \cdot A = U$$

$$\text{Luego } A = (E_k \cdot E_{k-1} \cdots E_2 \cdot E_1)^{-1} \cdot U = \underbrace{E_1^{-1} \cdot E_2^{-1} \cdots E_k^{-1}}_L \cdot U$$

- Si sólo hacemos operaciones elementales de Tipo II y Tipo III (con $i > j$), esas matrices elementales (y también sus inversas) serán todas triangulares inferiores y por tanto la matriz L será triangular inferior.
- Si en algún momento del proceso utilizamos operaciones elementales de Tipo I, la matriz L será una permutación de una triangular inferior.

Descomposición LU de una matriz cuadrada

Notas

- Al aplicar el Algoritmo de Gauss para obtener una matriz triangular superior nunca se utilizan operaciones de Tipo III con $i < j$ (luego mediante este proceso podemos obtener una descomposición LU de la matriz).
- No es necesario que U sea escalonada, sólo triangular superior.
- Una vez aplicado el Algoritmo de Gauss, la matriz L se obtiene multiplicando las inversas de las matrices elementales asociadas a las operaciones utilizadas (en el mismo orden de actuación):
$$L = E_1^{-1} \cdot E_2^{-1} \cdot \dots \cdot E_k^{-1}.$$
 Como esas inversas son matrices elementales, también podemos calcular esas multiplicaciones a izquierda como operaciones sucesivas sobre la última matriz.
- Si sólo efectuamos operaciones elementales de Tipo III con $i > j$ para obtener U entonces L será triangular inferior con unos en la diagonal principal.

Ejemplo

Calcula una descomposición LU de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Primero hallamos una matriz triangular superior U a partir de la matriz A :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{E_{31}(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{E_{32}(-\frac{1}{2})} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{2} \end{pmatrix} = U$$

Este proceso puede interpretarse matricialmente como:

$$E_{32}\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot E_{31}(-1) \cdot A = U$$

Multiplicando por la inversa de ese producto de matrices obtenemos L :

$$L = (E_{32}\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot E_{31}(-1))^{-1} = (E_{31}(-1))^{-1} \cdot (E_{32}\left(-\frac{1}{2}\right))^{-1}$$

Ejemplo (continuación)

Calculamos las inversas de las matrices elementales:

$$(E_{31}(-1))^{-1} = E_{31}(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(E_{32}(-\frac{1}{2}))^{-1} = E_{32}(\frac{1}{2}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

$$L = E_{31}(1) \cdot E_{32}(\frac{1}{2}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

En este último paso podemos multiplicar las dos matrices elementales o simplemente realizar la operación asociada a la matriz $E_{31}(1)$ (Fila 3+Fila 1) sobre la matriz $E_{32}(\frac{1}{2})$.

Ejemplo (continuación)

Finalmente la descomposición LU de la matriz A es

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}}_A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}}_L \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{2} \end{pmatrix}}_U$$

Ejercicio: Calcula una descomposición LU de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Descomposición LU de una matriz cuadrada

Propiedad

Si A es una matriz cuadrada y $A = L \cdot U$ (donde L y U se han obtenido con el proceso descrito anteriormente) entonces A es invertible si y sólo si U es invertible.

Luego si tenemos una matriz cuadrada A factorizada como $L \cdot U$ es muy fácil saber si es invertible. Como U es triangular, bastará con comprobar si los elementos de la diagonal de U son todos no nulos (pues en ese caso, U será invertible) y, por la propiedad anterior, A también será invertible.

Aplicación de la descomposición LU a la resolución de sistemas

Si $A = L \cdot U$ es una descomposición de A , podemos resolver cualquier sistema de ecuaciones de la forma $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$, es decir cuya matriz de coeficientes sea A , transformándolo en dos sistemas más sencillos. Para ello sustituimos $A = L \cdot U$ en la expresión del sistema:

$$A \cdot \vec{x} = \vec{b} \Rightarrow (L \cdot U) \cdot \vec{x} = \vec{b} \Rightarrow L \cdot \underbrace{(U \cdot \vec{x})}_{\vec{y}} = \vec{b}.$$

Si llamamos \vec{y} al vector columna $U \cdot \vec{x}$, el sistema quedará de la forma

$$L \cdot \vec{y} = \vec{b}.$$

Este sistema es siempre COMPATIBLE DETERMINADO pues L es una matriz invertible. Una vez obtenido el vector solución \vec{y} , procederemos a resolver el segundo sistema:

$$U \cdot \vec{x} = \vec{y}.$$

Por tanto, la resolución del sistema $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$ (donde $A = L \cdot U$) se reduce a la resolución de dos sistemas triangulares:

$$\begin{cases} \text{1º)} & L \cdot \vec{y} = \vec{b} & \text{(por sustitución progresiva)} \\ \text{2º)} & U \cdot \vec{x} = \vec{y} & \text{(por sustitución regresiva)} \end{cases}$$