

PRÀCTICA 5: CÀLCUL D'INVERSES, DESCOMPOSICIÓ LU

(Resum)

INVERSES:

Disposem de dos mètodes para el càlcul d'inverses amb *Scilab*

Previament, podem comprovar si la matriu quadrada A ($n \times n$) és invertible si $rank(A)$ és màxim ($= n$).

1. Mitjançant $inv(A)$

Si la matriu no és invertible podriem trobar-nos missatges d'advertència.

Podem comprovar si $A * inv(A) = eye(A)$ per a major seguretat.

2. Mitjançant l'algorisme de Gauss-Jordan. Concretament, obtenint l'esglaonada reduïda per files de la parella $[A, eye(A)]$.

Si la matriu A té inversa i R és la matriu que la redueix, $R * A = eye(A)$, així que R és la inversa que volem:

$$rref([A, eye(A)]) = [R * A, R] = [eye(A), R] = [eye(A), inv(A)]$$

i les columnes de la $n + 1$ a la $2n$ del resultat anterior ens proporcionen la inversa demanada. Si no apareix $eye(A)$ en les primeres n columnes de $rref([A, eye(A)])$, la matriu A no tindrà inversa.

DESCOMPOSICIÓ LU

Es tracta d'escriure una matriu quadrada $A(n \times n)$ com a producte d'una triangular inferior, L , per una triangular superior, U .

UIII. no heu de confondre aquestes matrius amb les que apareixen en els algorismes de Jacobi i Gauss-Seidel de la Pràctica 2

El procés segueix al d'esglaonar la matriu. Si treballem a mà, no hi ha intercanvi de files i fem servir només operacions elementals de tipus 3,

$$R * A = U$$

on R és producte de matrius elementals (triangulars inferiors) i U l'esglaonada (triangular superior). Com les matrius elementals tenen inversa, R també, i la seua inversa també és triangular inferior, doncs

$$R * A = U \implies A = A = inv(R) * U = L * U$$

i ja tenim la descomposició. L té uns en la seua diagonal.

Fent ús de *Scilab*, la funció $lu(A)$ ens fa el treball. Escriurem:

$$[L, U] = lu(A)$$

que ens torna una L i una U , probablement diferents al resultat a mà. Hi ha infinites maneres de fer-ho.

UIII. *Scilab* quasi sempre intercanvia files així que la seua L pot aparèixer permutada. Més informació en el butlletí.

APLICACIONS DE LA DESCOMPOSICIÓ LU

1. *Resolució de sistemes:*

Siga

$$A * x = b$$

un SCD amb A quadrada, $(n \times n)$. Si tenim una descomposició LU de A , el sistema equival a

$$L * U * x = b$$

i açò ens porta a resoldre'l mitjançant dos sistemes triangulars (molt més simples que el primer). En primer lloc farem una mena de canvi de variable,

$$U * x = y$$

i resolem el sistema

$$L * y = b$$

amb Substitució Progressiva (a mà o amb *Scilab*) o, simplement, mitjançant

$$y = L \backslash b$$

Ara posem la y acabada d'obtenir en el canvi de variable y trobem

$$x = U \backslash y$$

que serà la solució del sistema inicial. Aquest darrer sistema es podria resoldre també (a mà o amb *Scilab*) per Substitució Regressiva.

2. *Càlcul de determinants:*

Si A és quadrada, $(n \times n)$, donat que

$$\det(A) = \det(L * U) = \det(L) * \det(U)$$

el càlcul del determinant de A resulta quasi trivial. Has de tenir en compte que el determinant de U es, simplement, el producte dels elements de la seua diagonal. El determinant de L serà 1 si la obtenim sense intercanvi de files i ± 1 si està permutada, segons el nombre de permutacions que la converteixen en la seua forma triangular inferior.

3. *Càlcul d'inverses:*

Si A és quadrada, $(n \times n)$, donat que

$$\text{inv}(A) = \text{inv}(U) * \text{inv}(L)$$

el càlcul de la inversa de A es redueix al producte de dues inverses molt més fàcils d'obtenir. Com L sempre és invertible, la matriu A ho serà si i només si ho és U , i això ocorre sempre que aquesta matriu (triangular superior) no tinga cap zero en la seua diagonal.