# MAE0514 - Introducão a Análise de Sobrevivência - Lista 4

## Bruno de Castro Paul Schultze<sup>1</sup> Rubens Santos Andrade Filho<sup>2</sup>

#### Julho de 2021

## Sumário

Questão	1																							2
Questão	2												 ٠											2
Questão	3												 ٠											2
Questão	4												 ٠											2
Questão	5																				 			2

 $<sup>^{1}</sup>$ Número USP: 10736862

 $<sup>^2</sup>$ Número USP: 10370336

### Questão 1

Breve resumo do artigo:

(ii) Fabiani, M., Ramigni, M., Gobbetto, V., Mateo-Urdiales, A., Pezzotti, P., Piovesan, C. (2021). Effectiveness of the Comirnaty (BNT162b2, BioNTech/Pfizer) vaccine in preventing SARS-CoV-2 infection among healthcare workers, Treviso province, Veneto region, Italy, 27 December 2020 to 24 March 2021, Euro Surveillance, 26(17).

O objetivo do artigo foi estimar a eficácia da vacina Comirnaty (BNT162b2, BioNTech/Pfizer) na prevenção de infecção por SARS-CoV-2. Para isso, foi realizado um estudo de coorte retrospectivo no qual foram utilizados dados demográficos, características profissionais e datas de vacinção de 6.423 trabalhadores da área de saúde empregados na unidade local de saúde da província de Treviso em Veneto na Itália.

Primeiro, foram realizadas curvas de Kaplan-Meier para o tempo desde o inicio da campanha de vacinação até a infecção pelo vírus ou o fim do estudo para indivíduos não vacinados, que tomaram a primeira dose e ambas as doses da vacina. As curvas mostram que os pacientes que tomaram ambas as doses, e depois os que tomaram a primeira dose, apresentaram consistentemente uma menor probabilidade acumulada de infecção.

Também foi feita uma análise para o número de dias desde a administração da vacina para medir a duração do acompanhamento. A eficácia da vacina em diferentes intervalos de tempo foi estimada usando um modelo multivariável de risco proporcional de Cox, incluindo sexo, faixa etária, categoria profissional, contexto de trabalho e semana inicial de exposição como covariáveis.

A análise sugeriu que a vacina Comirnaty teve uma alta eficácia na prevenção da infecção por SARS-CoV-2 em HCW durante os intervalos de tempo após a administração em que a proteção pode ser esperada.

Questão 2

Questão 3

Questão 4

Questão 5