

# **Analisi Matematica**

## **Insiemi e cenni di calcolo combinatorio**

Andrea Malvezzi

19 settembre 2024

# Contents

<b>1</b>	<b>Definizione di sottoinsieme proprio</b>	<b>3</b>
1.1	Esempi di sottoinsiemi propri e non propri . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Biunivocità e invertibilità di una funzione</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Definizione di insieme numerabile</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Elementi di calcolo combinatorio</b>	<b>4</b>
4.1	Fattoriale di un numero . . . . .	4
4.1.1	Esempio del fattoriale di un numero: . . . . .	4
4.2	Scomporre un numero fattoriale . . . . .	4
4.2.1	Esempio di scomposizione numero fattoriale . . . . .	4
4.3	Coefficiente binomiale . . . . .	4
4.3.1	Esempio di coefficiente binomiale: . . . . .	5
4.4	Prima proprietà del coefficiente binomiale . . . . .	5
4.4.1	Prova algebrica . . . . .	5
4.5	Seconda proprietà del coefficiente binomiale . . . . .	5
4.5.1	Prova algebrica . . . . .	5
4.6	Binomio di Newton . . . . .	7
4.6.1	Esempio di calcolo della $n$ -sima potenza di un binomio	7

## 1 Definizione di sottoinsieme proprio

Un insieme  $A$  si dice sottoinsieme proprio di  $B$  quando vale quanto segue:

$$\text{Se } \emptyset \neq A \subsetneq B \quad (1)$$

Dove il simbolo  $\subsetneq$  sta per "inclusione stretta", ovvero:

- $A \neq B$ ;
- $A \subseteq B$ ;

### 1.1 Esempi di sottoinsiemi propri e non propri

- $A = \{1, 4\}$ ;
- $B = \{1, 2, 3, 4\}$ ;
- $C = \{1, 2, 3, 4\}$ ;

Qui,  $A$  è un sottoinsieme proprio di  $B$  e di  $C$ . Tuttavia,  $B$  non è sottoinsieme proprio di  $C$ , e viceversa.

## 2 Biunivocità e invertibilità di una funzione

Una funzione si dice biunivoca quando è sia *1-1* che *sv*.

Una funzione biunivoca è inoltre **invertibile**.

## 3 Definizione di insieme numerabile

Un insieme  $\mathbb{X}$  si dice numerabile quando esiste una funzione della seguente specie:

$$g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{X}, g \text{ è sv} \quad (2)$$

## 4 Elementi di calcolo combinatorio

### 4.1 Fattoriale di un numero

Avendo  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$ , e un  $n \in \mathbb{N}$ , allora si dice **fattoriale di  $n$**  il valore  $n!$ , ovvero:

$$n! := \begin{cases} 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n & \text{se } n \geq 1, \\ 1 & \text{se } n = 0 \end{cases} \quad (3)$$

#### 4.1.1 Esempio del fattoriale di un numero:

Prendiamo come esempio il  $4!$  (anche detto **4-fattoriale**).

$$4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$$

Prendiamo ora invece lo  $0!$ . Ricordando quanto affermato in (3):

$$0! = 1$$

### 4.2 Scomporre un numero fattoriale

Avendo un fattoriale  $n!$ , allora si può abbassare di uno  $n$  e riscriverlo come  $(n-1)!(n)$ .

$$n! = (n)(n-1)! \quad (4)$$

#### 4.2.1 Esempio di scomposizione numero fattoriale

Avendo  $4!$ , allora potrò riscriverlo nella seguente maniera:

$$4! = 4 \cdot 3!$$

Questa "proprietà" (che è in realtà una conseguenza della definizione stessa di fattoriale) sarà molto utile nelle dimostrazioni seguenti.

### 4.3 Coefficiente binomiale

Avendo due numeri tali che  $n, m \in \mathbb{N} : m \leq n$ , allora si dice **Coefficiente binomiale**:

$$\binom{n}{m} := \frac{n!}{(n-m)!m!} \quad (5)$$

Dove  $\frac{n!}{(n-m)!m!}$  corrisponde a una **combinazione semplice**.

#### 4.3.1 Esempio di coefficiente binomiale:

Avendo  $n = 3$  e  $m = 2$ , allora:

$$\binom{3}{2} = \frac{3!}{2!(3-2)!} = \frac{6}{2} = 3$$

#### 4.4 Prima proprietà del coefficiente binomiale

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad (6)$$

Ovvero: ad ogni sottoinsieme di  $k$  elementi corrisponde un sottoinsieme di  $n - k$  elementi, per cui il loro numero è uguale.

##### 4.4.1 Prova algebrica

$$\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{[n-(n-k)]!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

Per fornire un esempio concreto:

$$\binom{7}{2} = \frac{7!}{[7-(7-2)]!(7-2)!} = \frac{7!}{5!2!} = \binom{7}{5} = \binom{7}{7-2}$$

#### 4.5 Seconda proprietà del coefficiente binomiale

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k} \quad (7)$$

##### 4.5.1 Prova algebrica

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-(k-1))!(k-1)!} + \frac{n!}{(n-k)!k!} = \dots$$

Ora risolviamo  $(n-(k-1))!$  e sfruttiamo (4) per scomporre  $(n-k+1)!$  in  $(n-k+1)(n-k)!$ . Inoltre, sempre applicando la medesima proprietà, scomponiamo  $k!$  in  $k(k-1)!$ .

$$\dots = \frac{n!}{(n-k+1)!(k-1)!} + \frac{n!}{(n-k)!k!} = \frac{n!}{(n-k+1)(n-k)!(k-1)!} + \frac{n!}{(n-k)!k(k-1)!} = \dots$$

Ora raccogliamo i termini che compaiono in entrambe le frazioni:

$$\dots = \frac{n!}{(n-k)!(k-1)!} \left( \frac{1}{n-k+1} + \frac{1}{k} \right) = \dots$$

Risoliamo le frazioni in parentesi:

$$\dots = \frac{n!}{(n-k)!(k-1)!} \cdot \frac{k+n-k+1}{(n-k+1)k} = \dots$$

Semplifichiamo la frazione di destra eliminando le due  $k$  di segno opposto e moltiplichiamo tra loro le due frazioni ottenute:

$$\dots = \frac{n!(n+1)}{(n-k)!(k-1)!(n-k+1)(k)} = \dots$$

E per finire, osserviamo come  $(n-k)!$ , se associato a  $(n-k+1)$ , permetta di ricongiungersi a una scrittura del tipo  $(n-k+1)!$ . La stessa cosa vale per  $(k-1)!$  e  $(k)$  (sempre grazie a (4)).

$$\dots = \frac{(n+1)!}{(n-k+1)!k!} = \binom{n+1}{k}$$

## 4.6 Binomio di Newton

Questa formula si usa per calcolare la  $n$ -sima potenza di un binomio in maniera semplice.

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot a^{n-k} \cdot b^k \quad (8)$$

Ma la vera comodità della formula presentata consiste nella validità delle proprietà del coefficiente binomiale precedentemente presentate.

(6) e (7) rimangono difatti valide anche per questa sommatoria, in quanto legata al triangolo di Tartaglia.

### 4.6.1 Esempio di calcolo della $n$ -sima potenza di un binomio

Per calcolare  $(a + b)^n$ , basterà far variare  $n$  nella sommatoria presentata:

$$\text{Per } n = 1, (a + b)^1 = \binom{1}{0}a + \binom{1}{1}b$$

$$\text{Per } n = 2, (a + b)^2 = \binom{2}{0}a^2 + \binom{2}{1}ab + \binom{2}{2}b^2$$

$$\text{Per } n = 3, (a + b)^3 = \binom{3}{0}a + \binom{3}{1}a^2b + \binom{3}{2}ab^2 + \binom{3}{3}b^3$$

etc...

Ora si può osservare come lo sviluppo della sommatoria presentata vada ad assumere la forma di un triangolo. Questo triangolo storicamente prende il nome di "Triangolo di Tartaglia" e permette di calcolare tutti i moltiplicatori di  $a$  e di  $b$  (vedi immagine sottostante).




Figure 1: Il triangolo di Tartaglia sviluppato fino ad  $n=5$ .