

02. Fiche d'auto-évaluation

June 23, 2026

1. Pour quelle raison, quand on a N caractéristiques, on représente l' i -me exemple avec un vecteur $\mathbf{x}^{(i)}$ de $N + 1$ éléments?
2. Le tableau suivant¹ montre les coefficients obtenus par la méthode des moindres carrés ordinaire (Ordinary Least Square) afin de prédire les prix des logements à partir des caractéristiques des logements et des quartiers.


Log(DensPop)	0.040 *
Unemployment rate	-0.005 °
Social diversity index	-0.469
log(dist_school)	-0.030 *
log(dist_park)	0.017
log(dist_shop)	0.017

Écrivez l'équation de tel modèle. Quelle est la signification de chaque coefficient? Est-ce que les coefficients ont tous le signe (positif/négatif) comme pourrait s'y attendre?

3. Pour évaluer la qualité d'un modèle, est-il plus important de regarder la valeur de la fonction de perte sur le jeu de données d'entraînement ou de test?
4. Imaginez de comparer deux modèles de régression. Le premier donne une erreur quadratique moyenne (root mean square error) de 55.8 sur les données d'entraînement et 20.4 sur les données de test. Le deuxième modèle donne une erreur de 73.2 sur les données d'entraînement et 15.9 sur les données de test. Lequel choisiriez-vous? Pourquoi?
5. Pourquoi est-il utile de fixer un *seed*, c'est-à-dire le paramètre `random_state`, quand on utilise la fonction `train_test_split` sur `scikit learn`?
6. Imaginez d'entraîner une régression linéaire pour inférer la taille du cerveau des animaux en fonction de leur taille. Le jeu de données est illustré dans la figure ci-dessous ²


¹From Bulteau, Julie, Thierry Feuillet, and Rémy Le Boennec. "Spatial Heterogeneity of Sustainable Transportation Offer Values: A Comparative Analysis of Nantes Urban and Periurban/Rural Areas (France)." *Urban Science* 2.1 (2018): 14.

²Source: <https://statweb.calpoly.edu/bchance/stat302/hw/hw5sols.html>



Y a-t-il des traitement de données qu'on peut appliquer, avant de commencer l'entraînement, afin de améliorer la précision de l'inférence?

7. Considérez le modèle de régression linéaire représenté par la ligne verte.³



Pouvez-vous l'améliorer en changeant seulement un paramètre? Si oui, comment?

8. Quel est l'avantage d'utiliser la racine de l'erreur quadratique moyenne (root mean squared error - RMSE) à la place de l'erreur quadratique moyenne (mean squared error - MSE)?
9. Est-ce que les coefficients obtenus par la méthode des moindres carrés ordinaire (ordinary least square - OLS) change à chaque fois qu'on change les données d'entraînement?
10. Imaginez que vous devez décider quelles caractéristiques il faut inclure dans un modèle obtenu par la méthode des moindres carrés ordinaire (ordinary least square - OLS). Supposons que l'erreur explose quand on inclut plus de caractéristiques. Quelle pourrait en être la cause?
11. Expliquez comment la cross-validation marche.⁷
12. Écrivez la formule de la méthode des moindres carrés ordinaires (ordinary least square - OLS)

³Picture from Vahid Mirjalili - <https://qr.ae/pN9G1S>