

1. Integrazione di funzioni razionali fratte

Si supponga di voler calcolare un integrale del tipo: $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$

(ove $P(x)$ e $Q(x)$ sono polinomi nell'indeterminata x di grado assegnato).

Supponiamo che:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

$$Q(x) = b_k x^k + b_{k-1} x^{k-1} + \dots + b_1 x + b_0$$

I coefficienti a_i e b_i appartengano al campo reale e a_n e b_k siano diversi da zero in modo da non abbassare il grado dei polinomi.

Si possono presentare tre casi:

- $\text{gr}(P(x)) > \text{gr}(Q(x))$;
- $\text{gr}(P(x)) = \text{gr}(Q(x))$;
- $\text{gr}(P(x)) < \text{gr}(Q(x))$.

1.1. I Caso: $\text{gr}(P(x)) > \text{gr}(Q(x))$

Per poter calcolare l'integrale si esegue la divisione tra i polinomi $P(x)$ e $Q(x)$ e si sostituisce il risultato nell'integrale stesso.

Esistono due metodi per eseguire la divisione tra polinomi:

- **I metodo:** si esegue l'usuale **divisione**.
- **II metodo:** si utilizza il **principio di identità dei polinomi**.

Esempio Sia $\int \frac{x^3 + 3x^2}{x^2 + 1} dx$

Si noti che

- $\text{gr}(P(x)) = 3$ (grado del polinomio al numeratore)
- $\text{gr}(Q(x)) = 2$ (grado del polinomio al denominatore).

Si può eseguire la divisione:

$x^3 + 3x^2$	$x^2 + 1$	
$-x^3$	$-x$	$x+3$ ↔ quoziente
$0 + 3x^2 - x$		
$-3x^2$	-3	
$-x - 3$		↔ resto

e risulta:

$$\frac{x^3 + 3x^2}{x^2 + 1} = x + 3 + \frac{-x - 3}{x^2 + 1}$$

e quindi :

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 + 3x^2}{x^2 + 1} dx &= \int (x + 3) dx + \int \frac{-x - 3}{x^2 + 1} dx = \frac{x^2}{2} + 3x - \frac{1}{2} \int \frac{2x dx}{x^2 + 1} - 3 \int \frac{dx}{x^2 + 1} = \\ &= \frac{x^2}{2} + 3x - \frac{1}{2} \log(x^2 + 1) - 3 \arctg x + c \end{aligned}$$

Si perviene al medesimo risultato utilizzando il **principio di identità dei polinomi**.

Osservando che :

$$gr\left(\frac{P(x)}{Q(x)}\right) = gr(P(x)) - gr(Q(x)) = gr(x^3 - 3x^2) - gr(x^2 - 1) = 3 - 2 = 1$$

il polinomio può essere riscritto nel modo seguente:

$$\frac{x^3 + 3x^2}{x^2 + 1} = ax + b + \frac{cx + d}{x^2 + 1}$$

ove: $ax + b$ è il polinomio quoziente e $cx + d$ è il resto della divisione.

Eguagliando ambo i membri, si ricava:

$$x^3 + 3x^2 = (ax + b)(x^2 + 1) + cx + d$$

Da cui si può determinare il valore di a , b , c , e d , imponendo l'eguaglianza tra il polinomio del I membro e quello del II membro.

Si ricava:

$$x^3 + 3x^2 = ax^3 + ax + bx^2 + b + cx + d \equiv ax^3 + bx^2 + (a + c)x + b + d$$

Da cui:

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = 3 \\ a + c = 0 \\ b + d = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 3 \\ c = -1 \\ d = -3 \end{cases}$$

Sostituendo i valori trovati si perviene allo stesso risultato ottenuto prima:

$$\frac{x^3 + 3x^2}{x^2 + 1} = x + 3 + \frac{-x - 3}{x^2 + 1}$$

1.2. II Caso: $gr(P(x)) = gr(Q(x))$

In questo caso non si segue una regola ben definita: le operazioni da eseguire dipendono dai polinomi in gioco; è comunque possibile eseguire ancora la divisione tra polinomi.

Esempio:

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{2x-1} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2x}{2x-1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x-1+1}{2x-1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x-1}{2x-1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{2x-1} = \\ &= \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \log|2x-1| + c \end{aligned}$$

1.3. III Caso: $gr(P(x)) < gr(Q(x))$

Va ricordato che il **Teorema Fondamentale dell'Algebra** afferma che un polinomio di grado n ammette esattamente n radici nel campo complesso; tale proprietà verrà sfruttata per decomporre il polinomio $Q(x)$ in fattori primi irriducibili.

Le radici di $Q(x)$ possono essere o reali o complesse coniugate (a due a due), con molteplicità maggiore o uguale a uno.

Supponiamo che il polinomio $Q(x)$ ammetta la seguente decomposizione:

$$Q(x) = k(x - \alpha_1)^{m_1} (x - \alpha_2)^{m_2} \dots (x - \alpha_k)^{m_k} (x^2 + p_1x + q_1)^{r_1} \dots (x^2 + p_jx + q_j)^{r_j}$$

dove $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ sono radici reali e i polinomi $x^2 + p_hx + q_h$ corrispondono alle coppie di radici complesse coniugate.

Gli “ordini di molteplicità” sono:

m_1, m_2, \dots, m_k per le radici reali,
 $2r_1, 2r_2, \dots, 2r_j$ per le radici complesse coniugate

e devono soddisfare alla seguente relazione:

$$m_1 + m_2 + \dots + m_k + 2r_1 + 2r_2 + \dots + 2r_j = n \quad (\text{grado di } Q(x)).$$

Per semplicità considereremo in modo differente i casi relativi a radici reali distinte, a radici complesse coniugate e i casi con radici reali o complesse coniugate con molteplicità maggiore di uno.

1.3.1. Radici reali distinte

Si cercano le radici di $Q(x)$. Il denominatore della frazione si può decomporre nel seguente modo:

$$Q(x) = m(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_k)$$

Le radici: $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ sono per ipotesi reali e distinte di molteplicità uno.

Si cerca di scrivere la funzione integranda nel seguente modo:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{1}{m} \frac{P(x)}{(x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_k)} = \frac{1}{m} \left[\frac{A_1}{x - \alpha_1} + \dots + \frac{A_k}{x - \alpha_k} \right]$$

ove A_1, A_2, \dots, A_k sono costanti reali da determinare in base ai polinomi assegnati.

Per determinare il valore delle costanti A_1, A_2, \dots, A_k ci si avvale di due metodi distinti e fra di loro equivalenti:

I Metodo: Passaggio al limite.

Moltiplicando di volta in volta ambo i membri per $x - \alpha_h$ ($h = 1, 2, \dots, k$), si ottiene:

$$\frac{(x - \alpha_h)P(x)}{m(x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_k)} = \frac{1}{m} \left[\frac{A_1(x - \alpha_h)}{x - \alpha_1} + \frac{A_2(x - \alpha_h)}{x - \alpha_2} + \dots + \frac{A_h(x - \alpha_h)}{x - \alpha_h} + \dots + \frac{A_k(x - \alpha_h)}{x - \alpha_k} \right]$$

Ripetendo questa operazione per tutte le radici si ottengono k limiti da calcolare separatamente:

$$\lim_{x \rightarrow \alpha_h} \frac{(x - \alpha_h)P(x)}{Q(x)} = A_h$$

Tale relazione deve valere per ogni scelta di $h = 1, 2, \dots, k$. Si osservi che di volta in volta al denominatore manca il termine $x - \alpha_h$.

Dal calcolo dei limiti così ottenuti, si ricava il valore delle costanti

$$A_1, A_2, \dots, A_k.$$

Esempio 1 Calcolare il seguente integrale: $\int \frac{x+3}{x^2-5x+6} dx$

Si cercano le radici del polinomio a denominatore

$$Q(x) = x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x_1 = 3 \text{ e } x_2 = 2 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$$

Quindi si identifica la funzione integranda con la seguente:

$$\frac{x+3}{x^2-5x+6} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x-2}$$

Moltiplicando ambo i membri per $(x-3)$ si ottiene:

$$\frac{(x-3)(x+3)}{x^2-5x+6} = \frac{A(x-3)}{x-3} + \frac{B(x-3)}{x-2} \Rightarrow \frac{x+3}{x-2} = A + \frac{B(x-3)}{x-2}$$

Eseguendo il passaggio al limite, si ricava:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+3}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 3} \left(A + \frac{B(x-3)}{x-2} \right)$$

ossia: $A = 6$.

Moltiplicando ora per $(x-2)$ ambo i membri si ricava:

$$\frac{(x-2)(x+3)}{x^2-5x+6} = \frac{A(x-2)}{x-3} + \frac{B(x-2)}{x-2} \Rightarrow \frac{x+3}{x-3} = \frac{A(x-2)}{x-3} + B$$

Eseguendo il passaggio al limite, si ottiene:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+3}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{A(x-2)}{x-3} + B \right)$$

ossia: $B = -5$.

Si può ora procedere al calcolo dell'integrale:

$$\int \frac{x+3}{x^2-5x+6} dx = \int \left(\frac{A}{x-3} + \frac{B}{x-2} \right) dx = \int \frac{6}{x-3} dx - \int \frac{5}{x-2} dx$$

Si ottengono così due integrali che ammettono come primitive delle funzioni di tipo logaritmico.

II Metodo: Mediante il principio di identità dei polinomi.

Questo metodo permette di calcolare tutte le costanti A_1, A_2, \dots, A_k in blocco, senza ricorrere al calcolo di k limiti separatamente, ma mediante la risoluzione di un sistema lineare di k equazioni in k incognite.

Supponiamo che la funzione integranda si possa scrivere nel seguente modo:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{1}{m} \left[\frac{A_1}{x-\alpha_1} + \frac{A_2}{x-\alpha_2} + \dots + \frac{A_k}{x-\alpha_k} \right]$$

Si esegue la somma dei termini a secondo membro e si ricava:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1 [(x-\alpha_2) \dots (x-\alpha_k)] + A_2 [(x-\alpha_1) \dots (x-\alpha_k)] + \dots}{m(x-\alpha_1) \dots (x-\alpha_k)}$$

È possibile eliminare i denominatori in quanto uguali. Si ottiene:

$$P(x) = A_1 [(x-\alpha_2) \dots (x-\alpha_k)] + A_2 [(x-\alpha_1)(x-\alpha_3) \dots (x-\alpha_k)] + \dots + A_k [(x-\alpha_1)(x-\alpha_2) \dots (x-\alpha_{k-1})]$$

Per il principio di identità dei polinomi, si ottiene un sistema di k equazioni nelle k incognite A_1, A_2, \dots, A_k .

Esempio 2: Metodo alternativo per calcolare il valore dell'integrale presentato nell'esempio 1. Si cercano le radici di $Q(x)$: (già calcolate nell'esempio 1)

$$x_1 = 3 \text{ e } x_2 = 2 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

Quindi si cerca di soddisfare alla relazione:

$$\frac{x+3}{x^2-5x+6} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x-2}$$

Svolgendo la somma al secondo membro, e eliminando i denominatori si ottiene:

$$x+3 = A(x-2) + B(x-3)$$

da cui, applicando il principio di identità dei polinomi, si costruisce il seguente sistema lineare di due equazioni nelle due incognite A e B :

$$\begin{cases} A+B=1 \\ -2A-3B=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=1-B \\ -2+2B-3B=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=1-B \\ B=-5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=6 \\ B=-5 \end{cases}$$

Come era da aspettarsi, si ottengono gli stessi valori per le costanti A e B .

Una volta calcolati A e B , si può procedere al calcolo dell'integrale come nell'esempio 1.

1.3.2. Radici complesse coniugate

Come nel caso precedente si decompone il denominatore $Q(x)$ in fattori primi irriducibili, andando a cercare le radici del polinomio.

Il denominatore della frazione si può decomporre nel seguente modo:

$$Q(x) = m(x^2 + p_1x + q_1) \dots (x^2 + p_jx + q_j)$$

Il polinomio $Q(x)$ ammette, in tal caso, j radici complesse e j radici complesse coniugate del tipo:

$$\begin{cases} x_1 = \alpha_1 + i\beta_1 \\ \bar{x}_1 = \alpha_1 - i\beta_1 \end{cases}; \dots; \begin{cases} x_j = \alpha_j + i\beta_j \\ \bar{x}_j = \alpha_j - i\beta_j \end{cases}$$

La funzione integranda diventa si può scrivere nella forma:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{1}{m} \left[\frac{A_1x + B_1}{(x^2 + p_1x + q_1)} + \dots + \frac{A_jx + B_j}{(x^2 + p_jx + q_j)} \right]$$

ove le A_h e B_h sono costanti reali da determinare utilizzando il principio di identità dei polinomi. Si osservi che a numeratore appaiono polinomi di I grado e non più delle costanti come nel caso precedente.

Esempio 3: Calcolare il valore del seguente integrale: $\int \frac{2+3x+x^2}{x(x^2+1)} dx$

Le radici del polinomio a denominatore sono:

$$x_1 = 0; x_{2,3} = \pm i;$$

Cerchiamo di scrivere il rapporto nella forma:

$$\frac{2+3x+x^2}{x(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

Utilizzando il principio di identità dei polinomi, si ottiene:

$$x^2 + 3x + 2 = A(x^2 + 1) + x(Bx + C)$$

da cui:

$$x^2 + 3x + 2 = Ax^2 + A + Bx^2 + Cx = (A+B)x^2 + Cx + A$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ C=3 \\ A=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=2 \\ B=-1 \\ C=3 \end{cases}$$

e quindi la funzione integranda si scrive:

$$\frac{2+3x+x^2}{x(x^2+1)} = \frac{2}{x} + \frac{-x+3}{x^2+1} = \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2+1} - \frac{x}{x^2+1}$$

Tornando all'integrale di partenza si ottiene:

$$\int \frac{2+3x+x^2}{x(x^2+1)} dx = \int \frac{2}{x} dx + \int \frac{3dx}{x^2+1} - \int \frac{xdx}{x^2+1}$$

Si ottengono così tre integrali facilmente calcolabili.

1.3.3. Radici dotate di molteplicità

Si decompone ancora in fattori primi il polinomio $Q(x)$ al denominatore. Si cercano le radici del polinomio:

$$Q(x) = m(x-\alpha_1)^{m_1}(x-\alpha_2)^{m_2} \dots (x-\alpha_k)^{m_k} (x^2+p_1x+q_1)^{r_1} \dots (x^2+p_jx+q_j)^{r_j}$$

dove

$$2r_1, 2r_2, \dots, 2r_j, m_1, m_2, \dots, m_k$$

rappresentano gli “ordini di molteplicità” delle radici trovate (reali o complesse coniugate).

La funzione integranda si può riscrivere nel seguente modo:

$$\begin{aligned} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{1}{m} & \left\{ \left[\frac{A_{11}}{(x-\alpha_1)} + \frac{A_{12}}{(x-\alpha_1)^2} + \dots + \frac{A_{1m_1}}{(x-\alpha_1)^{m_1}} \right] + \right. \\ & + \left[\frac{A_{21}}{(x-\alpha_2)} + \frac{A_{22}}{(x-\alpha_2)^2} + \dots + \frac{A_{2m_2}}{(x-\alpha_2)^{m_2}} \right] + \\ & + \dots + \left[\frac{B_{11}x+C_{11}}{x^2+p_1x+q_1} + \frac{B_{12}x+C_{12}}{(x^2+p_1x+q_1)^2} + \dots + \frac{B_{1r_1}x+C_{1r_1}}{(x^2+p_1x+q_1)^{r_1}} \right] + \dots \Big\} \end{aligned}$$

dove le varie costanti reali A_h, B_t, C_s vanno determinate mediante il principio di identità dei polinomi.

Esempio 4: Calcolare $\int \frac{dx}{x(x-1)^2}$

Le radici del polinomio al denominatore sono 3: $x=0$; e $x=1$ con molteplicità 2
Cerchiamo una forma equivalente della funzione integranda:

$$\frac{1}{x(x-1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2} = \frac{A(x-1)^2 + Bx(x-1) + Cx}{x(x-1)^2}$$

Le potenze del denominatore $(x-1)$ si ripetono fino a raggiungere l'ordine di molteplicità. Quindi:

$$1 = (A+B)x^2 + (-2A-B+C)x + A \Rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ C-2A-B=0 \\ A=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=1 \\ B=-1 \\ C=1 \end{cases}$$

quindi l'integrale si può riscrivere nel seguente modo

$$\int \frac{dx}{x(x^2-1)} = \int \frac{dx}{x} - \int \frac{dx}{x-1} + \int \frac{dx}{(x-1)^2}$$

Esempio 5: Calcolare $\int \frac{x^2+2}{4x^5+4x^3+x} dx$

È $\text{gr}(Q(x)) > \text{gr}(P(x))$

Per decomporre tale frazione bisogna determinare le radici del polinomio al denominatore

$$4x^5 + 4x^3 + x = 0 \Rightarrow x(4x^4 + 4x^2 + 1) = 0 \Rightarrow x(2x^2 + 1)^2 = 0$$

Le radici sono : $x = 0$; e $x = \pm \frac{i\sqrt{2}}{2}$ con ordine di molteplicità 2 \Rightarrow si hanno 4 radici complesse e 1

radice reale. Per il teorema di decomposizione dei polinomi la funzione integranda si può scrivere nel modo seguente:

$$\frac{x^2+2}{4x^5+4x^3+x} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{2x^2+1} + \frac{Dx+E}{(2x^2+1)^2}$$

\Downarrow

$$x^2 + 2 = A(2x^2 + 1)^2 + (Bx + C)x(2x^2 + 1) + (Dx + E)x$$

\Downarrow

$$x^2 + 2 = (4A + 2B)x^4 + 2Cx^3 + (4A + B + D)x^2 + (C + E)x + A$$

da cui si ricava il sistema lineare nelle incognite A, B, C, D, E :

$$\begin{cases} 4A + 2B = 0 \\ 2C = 0 \\ 4A + B + D = 1 \\ C + E = 0 \\ A = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 2 \\ B = -4 \\ C = 0 \\ D = -3 \\ E = 0 \end{cases}$$

Quindi la frazione si può scrivere come somma di frazioni, nel modo seguente:

$$\frac{x^2 + 2}{4x^5 + 4x^3 + x} = \frac{2}{x} - \frac{4x}{2x^2 + 1} - \frac{3x}{(2x^2 + 1)^2}$$

Esercizio. Calcolare $\int \frac{dx}{x^2(x^2+1)^2(x^2-1)}$

1.4. Teorema di decomposizione dei polinomi

N.B. La tecnica di decomposizione dei polinomi non è finalizzata all'integrazione, ma può essere usata ogni volta che si ha a che fare con il quoziente di due polinomi che rispettino le ipotesi esposte.

Siano $P(x)$ e $Q(x)$ polinomi reali con coefficienti reali e tali che $\text{gr}(P(x)) < \text{gr}(Q(x))$.

Se il polinomio $Q(x)$ si può fattorizzare nel seguente modo:

$$Q(x) = m(x - \alpha_1)^{m_1}(x - \alpha_2)^{m_2} \dots (x - \alpha_k)^{m_k} (x^2 + p_1x + q_1)^{r_1} \dots (x^2 + p_jx + q_j)^{r_j}$$

risulta che :

- $2r_1, 2r_2, \dots, 2r_j, m_1, m_2, \dots, m_k$ sono gli ordini di molteplicità delle radici del polinomio $Q(x)$.
- $m_1 + m_2 + \dots + m_k + 2(r_1 + r_2 + \dots + r_j) = \text{gr}(Q(x))$.
- $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_i$ sono le radici reali dell'equazione $Q(x)=0$
- $x^2 + p_1x + q_1, \dots, x^2 + p_jx + q_j$ sono polinomi di secondo grado irriducibili nel campo reale, ossia ammettono radici complesse coniugate.

Il rapporto $\frac{P(x)}{Q(x)}$ si può esprimere come somma di frazioni parziali nel seguente modo:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{1}{m} \left\{ \underbrace{\left[\frac{A_{h1}}{(x - \alpha_h)} + \frac{A_{h2}}{(x - \alpha_h)^2} + \dots + \frac{A_{hm_h}}{(x - \alpha_h)^{m_h}} \right]}_{\text{per ogni radice reale}} + \right. \\ \left. + \underbrace{\left[\frac{B_{k1}x + C_{k1}}{x^2 + p_kx + q_k} + \frac{B_{k2}x + C_{k2}}{(x^2 + p_kx + q_k)^2} + \dots + \frac{B_{kr_k}x + C_{kr_k}}{(x^2 + p_kx + q_k)^{r_k}} \right]}_{\text{per ogni coppia di radici complesse coniugate}} \right\}$$

ove le costanti reali A, B, C si determinano mediante il principio di identità dei polinomi.