

21/09/2024

**Paciente:** Fulano da silva

**Sexo:** masculino

**Idade:** 40

### RECEITUÁRIO

Não pode trocar o medicamento receitado (LEI 9787/99)  
(Poderá ser trocado somente pelo genérico, com faixa amarela e letra G)

#### Uso interno

**NOVALGINA 500 mg - Hoechst Marion Roussel (Dipirona sódica)- ANALGÉSICO.**

Tomar 01 comprimido de 500 mg ou 25 gotas de solução oral, de 04 em 04 horas nas primeiras 24 horas (01 dia). A partir do segundo dia tomar a dose de 06 em 06 horas (04 vezes ao dia), somente enquanto sentir dor. Se a dor cessar parar imediatamente com este analgésico.

#### Uso externo

**PERIOXIDIN - LACER (Digluconato de Clorexidina 0,12 %)- ENXAGUATÓRIO BUCAL.**

Fazer 03 bochechos suaves por dia (08/08 horas), sempre após as escovações e do fio dental. Bochechar durante 01 minuto usando 01 tampa do líquido puro. Ao bochechar não engolir o líquido. Após os bochechos permanecer por 30 minutos sem ingerir alimentos sólidos ou líquidos. Usar durante 10 dias.

**OBS.:QUALQUER DESCONFORTO COM A MEDICAÇÃO PRESCRITA DEVE SER COMUNICADO IMEDIATAMENTE AO CIRURGIÃO-DENTISTA RESPONSÁVEL.**

---

Fulano da silva

---

William Franco de Oliveira