

Rødliste status

VU



Artsfamilie Fringillidae (finkefamilien)

Utbredelse Utbredt i Sør-Norge, spesielt i lavlandet opp til 800–1000 moh. Mindre vanlig i Nord-Norge

Størrelse	14–16 cm lang, vingespenn 24–26 cm, vekt 20–32 g
Hannkjønn	Skinnende olivengrønn overside, gulgrønn underside og gule flekker på vingene og stjerten. Vingefjærene har svarte kanter, og nebbet er blekt rosa eller elfenbensfarget. Øynene er mørke, og beina grårosa.
Hunnkjønn	Mattere farger, mer gråbrungrønn med mindre intense gule flekker. Mindre kontrast enn hannene.

Foretrukne habitater

Grønnfinken trives i varierte habitater, inkludert løv- og blandingsskoger, parker, hager, jordbruksland, hekker og forsteder. Den foretrekker områder med trær og busker for hekking, men oppsøker også åpne områder for næringssøk. I Norge er den vanlig i kulturlandskap, hager og kystnære skoger.

Trenger tilgang til frørike planter (f.eks. løvetann, tistler) og trær for hekking. Tåler både urbane og rurale miljøer, men unngår tette barskoger og høyfjellet.

[illegible]

Plantebaserte næringskilder

Art/plantetype	Detaljer
Tistler	Frø
Løvetann	Frø
Solsikke	Frø
Korn	Frø

Habitatstøttende planter

Art/plantetype	Detaljer
Hasselbusk	Knopper/ nøtter og skjul
Rogn	Bær, skjul, hekking
Svarthyll	Bær, insekter, skjul, hekking
Bjørk	Frø, insekter, hekking
Kornellbusk	Bær, insekter, skjul, hekking

Dyrebaserte næringskilder

Art/dyretype	Detaljer
Bløthudede småinsekter	f.eks bladlus
Små biller	f.eks bladbiller
Sommerfugllarver (kålormer/larver)	Myke larver/ enkle å svelge
Små tovinger	Mygg/ Fluer
Andre små leddyr	f.eks edderkopper

Samspill med mennesker

Behagelig sang og fargerik fugl. Spiser insekter.

Trusler og predatorer

Unngår predatorer (f.eks. spurvehauk, katter) ved rask flukt eller gjemning i tett vegetasjon. Egg og unger er sårbare for kråker, skjærer og katter.

Nøkkelart



Art av høy økologisk verdi



Ansvarsart



Art av nasjonal forvaltningsinteresse



Lenke til bilde/lyd

<https://www.british-birdsongs.uk/greenfinch/>

Atferdsprofil

Parringsatferd, avl og oppvekst

Parring: Monogame for en sesong, men kan skifte partner mellom kull. Parring skjer i april-mai, med hannen som kurtiserer gjennom sang og oppvisning av gule vinger.

Hekking: Rede: Bygges av hunnen i trær eller busker (ofte 2–10 m over bakken), laget av kvister, gress, mose og fjær. Redet er kompakt og koppformet. Egg: 4–6 egg per kull, blekblå eller hvite med røde flekker. Legges i mai-juli, med 1–2 kull per sesong. Ruging: Hunnen ruger i 12–14 dager. Begge foreldre mater ungene. Grønnfinker flyr typisk innenfor 50–200 meter fra reiret for å hente mat til ungene (kan være mer, men de foretrekker nærhet. Sørg for at matkilder finnes innen 100 m av egnede hekkesteder.

Unger: Forlater redet etter 13–18 dager. Foreldrene fortsetter å mate ungene i opptil 2 uker etter at de er flygedyktige.

Voksen

Levetid: Gjennomsnittlig 2–3 år, men kan leve opptil 10 år i naturen.

Aktivitet: Dagaktiv, ofte observert i små grupper eller flokker, spesielt utenfor hekkesesongen. Flyr raskt med bølgende flukt og karakteristiske «chip-chip»-lyder. Sangen er en livlig, kvitrende serie med nasale toner, ofte fremført fra tretopper eller ledninger.

Føde: Primært frøspiser, med preferanse for frø fra tistler, løvetann, solsikke og korn. Spiser også bær, knopper og insekter (spesielt under hekkesesongen for å føre unger). Besøker ofte fuglebrett om vinteren for solsikkefrø og peanøtter.

Sosial atferd: Sosial utenfor hekkesesongen, danner flokker på 10–100 individer, ofte sammen med andre finker eller spurver. Under hekking er de territorielle, med hanner som synger for å forsvare revir. Aggressiv atferd ved matfat, der de kan jage bort mindre fugler.

Romlige forhold og overvintring

Trekkmonster: Delvis trekkfugl i Norden. Nordlige populasjoner (f.eks. i Norge) trekker til Sør-Europa (Frankrike, Spania) eller Nord-Afrika om vinteren, mens sørlige populasjoner ofte er standfugler. Trekket skjer i september–november, med retur i mars–mai. De trekker delvis, men mange blir igjen. Viktig med eviggrønne trær/busker for skjul og fuglebrett med solsikke-/hampfrø.

Størrelse på leveområder?

Kommentarer

Parasitter: Kan rammes av fjærparasitter og indre parasitter som Trichomonas. Trikomonose er en økende trussel i Europa. Sykdommen spres ofte ved fuglebrett.

Bevaring: Beskyttelse av hekker, varierte jordbrukslandskap og rene fuglebrett er viktig. Hygienetiltak ved foringsplasser (regelmessig rengjøring) reduserer risikoen for trikomonose.

Interaksjoner: Konkurrerer med andre frøspisere som spurver og finker om mat, spesielt vinterstid. Danner blandede flokker med gråsisk eller bjørkefink om vinteren.

Rolle i økosystemet: Viktig for frøspredning, spesielt av ugress som løvetann og tistler. Som insektspisere under hekkesesongen bidrar de til å kontrollere skadeinsekter. Grønnfinken er en vanlig art i kulturlandskap og hager, og dens nærvær indikerer sunne økosystemer med variert vegetasjon.

Praktiske designtiltak

- **Vegetasjonsstruktur:**
 - Tette hekker og buskfelt: min. **3–5 m bredde**, gjerne mosaikk av arter.
 - Bland løvtrær og busker med bær og frø.
- **Åpne plasser:**

De henter også frø fra bakken – små åpne flekker i nærheten er gunstig.
- **Fuglekasser:**

Halvåpne modeller: indre bunnflate ca. **12 × 12 cm**, åpning ca. 50 mm høy og 50–60 mm bred, inngang i front. Heng kassen 1,5–2,5 m opp, delvis skjult i vegetasjon.
- **Avstand mellom ressurser:**
 - Hekkelokalitet til mat: helst <100 m.
 - Vintermat (fôringsplasser) til skjul: <20 m.

Portrettdata

Produksjonsdato	28.08.2025
Produksjonsmåte	KI uten faglig kvalitetssikring
Kilder	Nordiske artsdatabanker, som for eksempel artsdatabanken.no, arter.dk og artfakta.se
Produsent	Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
Fagansvar	Utarbeidet av Håvard Bringa
Kontaktopplysninger	Tore Mauseh, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
Referanseprosjekt	Metodeutvikling