RG Urinveier

Endring siden forrige versjon
Revidert. Ingen endringer.

Indikasjon	Kontroll av avløp etter nyrestensanfall, samt etter urologisk inngrep	*Front AP, Blærebilde AP*
	Stentposisjon	*Front AP*

FRONT AP		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	Konferer med radiolog ved akutt undersøkelse da det kan være det skal tas CT i stedet.	
POSISJONERING	Pasienten liggende rett på ryggen uten rotasjon. Armene ut fra siden. Bildet tas etter endt ekspirasjon.	
SENTRERING	Crista Iliaca	
STRÅLERETNING	0°	
BILDEKRITERIER	Uten rotasjon med sidelik Os Ileum og sidelike Costa. Bildet dekker urinveiene fra toppen av nyrene og hele blæren.	
KOMMENTAR		
BLÆREBILDE AP		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON		
POSISJONERING	Pasienten liggende rett på ryggen uten rotasjon. Bildet tas etter endt ekspirasjon. Avgrens kollimering til blæren.	
SENTRERING	5cm over Symphysis Pubica i pasientens midtlinje	
STRÅLERETNING	15° cranio-caudal	
BILDEKRITERIER	Blæren og distale ureteres inkluderes, og blæren vises uten overprojisering av Os Pubis	
KOMMENTAR		

Referanser

Vedlegg

Slutt på Prosedyre