

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO

1. NOME DO MEDICAMENTO

Duraphat 5000, 500 mg/100 g Pasta dentífrica

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

1 g de pasta dentífrica contém 5 mg de fluoreto (sob a forma de fluoreto de sódio), correspondendo a 5000 ppm de fluoreto.

Excipientes com efeitos conhecidos: 1 g de pasta dentífrica contém 5 mg de benzoato de sódio (E211).

1 g de pasta de dente contém 10 mg de aroma de hortelã com alérgenos.

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3. FORMA FARMACÊUTICA

Pasta dentífrica.

Pasta azul.

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Indicações terapêuticas

Prevenção da cárie dentária em adolescentes e adultos, especialmente nos doentes em risco de cáries múltiplas (cáries coronárias e/ou radiculares).

Apenas para utilização em indivíduos de idade igual ou superior a 16 anos.

4.2 Posologia e modo de administração

Não engolir.

Escovar diariamente de uma forma cuidada:
aplique 2 cm de pasta na escova de dentes em cada escovagem.
2 cm fornecem entre 3 e 5 mg de fluoreto.
3 vezes por dia, após cada refeição,
verticalmente, desde a gengiva até à ponta do dente.

Uma escovagem cuidadosa demora aproximadamente 3 minutos.
Cuspa o excesso de espuma.

Modo de administração: Uso dental.

4.3 Contra-indicações

Este medicamento não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer dos excipientes.

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização

Duraphat 5000 500 mg/100 g Pasta dentífrica não se destina a ser utilizada por crianças e adolescentes com menos de 16 anos de idade, ver secção 4.2.

Esta pasta dentífrica apresenta um elevado teor em flúor.
Portanto, a opinião de um profissional qualificado profissional de saúde, como dentista, farmacêutico, higienista oral, deve especialista deve ser procurado antes do uso do produto.

O aumento de potenciais fontes de flúor pode originar fluorose. Antes de utilizar medicamentos fluoretados como o Duraphat, deverá ser feita uma avaliação do aporte global de flúor (ex.: água potável, sais fluoretados, outros medicamentos com flúor - comprimidos, gotas, pastilhas ou pasta dentífrica). Comprimidos de flúor, gotas, pastilhas elásticas, geles ou vernizes e água ou sais fluoretados deverão se evitados durante a utilização de Duraphat Pasta dentífrica.

Nos cálculos globais da quantidade recomendada de ião flúor, que é de 0,05 mg/Kg/dia, de qualquer origem, não excedendo 1 mg por dia, deve ser tida em conta a possível ingestão da pasta dentífrica (cada bisnaga de Duraphat 5000 500 mg/100 g Pasta dentífrica contém 255 mg de iões flúor).

Este medicamento contém benzoato de sódio (E211). O benzoato de sódio (E211) pode causar irritação local.

Este medicamento também contém um aroma de menta com alérgenos (limoneno, linalol, citral, geraniol e citronelol). Esses alérgenos podem causar reações alérgicas.

4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interacção

Nenhuma conhecida.

4.6 Gravidez e aleitamento

Não existem dados adequados sobre o uso de Duraphat 5000 500 mg/100 g Pasta dentífrica em mulheres grávidas. Estudos em animais revelaram toxicidade reprodutiva do fluoreto

de sódio apenas quando administrado em níveis muito elevados. Em consequência, esta pasta dentífrica não deverá ser utilizada durante a gravidez e aleitamento a não ser que tenha sido efectuada uma cuidadosa avaliação benefício-risco.

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

Não relevante.

4.8 Efeitos indesejáveis

Doenças gastrointestinais:

Frequência desconhecida (não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis): sensação de queimadura oral

Doenças do sistema imunitário

Raros ($\geq 1/10.000$ a $< 1/1.000$): Reacções de Hipersensibilidade

Notificação de suspeitas de reacções adversas

A notificação de suspeitas de reacções adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reacções adversas diretamente ao INFARMED, I.P.:

INFARMED, I.P.

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 71 40

Fax: + 351 21 798 73 97

Sítio da internet: <http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage>

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

4.9 Sobredosagem

- Intoxicação aguda: Flúor

A dose tóxica, i.e. a dose mais baixa capaz de induzir sintomas de intoxicação, é de 5 mg de fluoreto por Kg de peso corporal.

Esta intoxicação manifesta-se sob a forma de problemas digestivos: vómitos, diarreia, dor abdominal. Em casos extremamente raros, pode ser fatal. Caso se ingira acidentalmente uma quantidade substancial do medicamento, o tratamento imediato consiste numa lavagem gástrica ou indução do vómito; deve ser tomado cálcio (grandes quantidades de leite) e o doente deve ser sujeito a vigilância médica durante várias horas.

- Intoxicação aguda: Mentol

O Duraphat 5000, 500 mg/100g pasta dentífrica contém mentol que, se ingerido acidentalmente em quantidades excessivas, pode causar convulsões, particularmente em crianças.

- Intoxicação crónica: fluorose

O aspecto manchado ou mosqueado do esmalte dentário pode surgir a partir de uma absorção diária de uma dose de fluoreto superior a 1,5 mg/ dia, durante vários meses ou anos, dependendo da extensão da sobredosagem. Esta intoxicação, nas formas graves, será acompanhada por um aumento da fragilidade do esmalte. A fluorose óssea (osteosclerose) só será observada quando existir uma absorção crónica elevada de fluoreto (superior a 8 mg/ dia).

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propriedades farmacodinâmicas

Grupo farmacoterapêutico: 6.1.1. Aparelho digestivo. Medicamentos que actuam na boca e orofaringe. De aplicação tópica.

Código ATC: A01 AA01

O principal modo de acção do fluoreto na prevenção de cáries é exercido após erupção dos dentes, ou seja, é tópico. Julga-se que os suplementos de flúor sistémicos actuam também principalmente de forma tópica (por exemplo durante a ingestão, através da saliva).

Existem três tipos de efeitos associados ao flúor:

- um efeito inibidor da desmineralização (diminuição da solubilidade do esmalte em ambiente ácido);
- uma promoção da remineralização do esmalte durante o processo cariogénico;
- um efeito bactericida sobre os organismos da placa bacteriana. Este inibe a proliferação da placa bacteriana e previne a formação de ácidos cariogénicos.

O fluoreto por si só não é suficiente para eliminar a placa bacteriana, nem como tratamento completo da cárie.

5.2 Propriedades farmacocinéticas

Duraphat 5000 500 mg/100 g Pasta dentífrica exerce uma acção local, tópica nos dentes pelo que a via seguida no organismo não é aplicável. Contudo, a informação que se segue foi incluída para o caso de ingestão acidental de pasta dentífrica durante o tratamento.

Todo o flúor ingerido é convertido em ácido fluorídrico. As concentrações máximas são obtidas entre 30 a 60 minutos. O volume de distribuição é de 1l/Kg.

Os iões fluoreto são distribuídos para os dentes e ossos e não se ligam às proteínas plasmáticas. A semi-vida de eliminação é da ordem das 2 a 9 horas. Os iões fluoreto

são excretados sobretudo na urina, mas podem também ser excretadas pequenas quantidades nas fezes e no suor. Desconhece-se de que forma.

5.3 Dados de segurança pré-clínica

Os dados pré-clínicos não revelam riscos especiais para o ser humano, além da informação incluída em outras secções do RCM.

Após administração oral de fluoreto de sódio a ratinhos, ratos e coelhos, foram observados efeitos reprodutivos e feto-tóxicos apenas em doses elevadas.

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1 Lista dos excipientes

Sorbitol líquido (Não cristalizável), Sílica para uso dental, Sílica para uso dental (precipitada), Macrogol 600, Pirofosfato Tetrapotássico, Goma Xantana, Benzoato de sódio (E211), Laurilsulfato de sódio, Aroma de hortelã (contendo óleo de hortelã-pimenta, carvona, óleo de hortelã, mentol, anetol e óleo de limão), Sacarina sódica, Azul brilhante FCF (E133) e Água purificada.

6.2 Incompatibilidades

Não aplicável.

6.3 Prazo de validade

3 anos.

6.4 Precauções especiais de conservação

Não conservar acima de 25°C.

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente

51 g numa bisnaga (PE/PET/alumínio) com uma tampa de enroscar (polipropileno).

A bisnaga encontra-se inserida numa cartonagem exterior.

Apresentações: bisnaga de 1 x 51 g ou bisnagas de 3 x 51 g.

6.6 Precauções especiais de eliminação

Não existem requisitos especiais.

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Colgate Palmolive, Unipessoal, Lda.
Colgate Palmolive, Unipessoal, Lda.
Lagoas Park, Edifício 15, Piso 3
2740-262 Porto Salvo
Portugal
Portugal

8. NÚMERO (S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Nº de registo: 4781688 - 1 x 51 g, Pasta dentífrica, 500 mg/100 g, bisnaga de PE/PET/alumínio

Nº de registo: 5031380 - 3 x 51 g, Pasta dentífrica, 500 mg/100 g, bisnaga de PE/PET/alumínio

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Data da primeira autorização: 12 Setembro 2003

Data da última renovação: 23 Abril 2007

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO