

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO

1. NOME DO MEDICAMENTO

Hextril 1 mg/ml solução bucal

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Um mililitro de solução bucal contém um miligrama de hexetidina.

Excipientes com efeito conhecido:

Um mililitro de solução bucal contém:

Etanol 96% - 43,33 mg (equivalente a 40,5 mg de etanol)

Azorrubina (E122) - 0,023 mg

Sódio (sob a forma de sacarina sódica, edetato de cálcio e sódio, hidróxido de sódio e azorrubina) - até 0,253 mg

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3. FORMA FARMACÊUTICA

Solução bucal.

Solução clara, de cor vermelha.

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Indicações terapêuticas

Hextril está indicado para utilização em infeções menores da orofaringe e estados inflamatórios, incluindo candidíases, como adjuvante na prevenção e no tratamento de gengivites e no controlo de complicações faríngeas e úlceras aftosas recorrentes. Hextril está também indicado na halitose e em cirurgia dentária nos cuidados pré e pós-operatórios.

Está também indicado na higiene oral, incluindo na prevenção e controlo da placa dentária.

4.2 Posologia e modo de administração

Posologia

Adultos e crianças com mais de 12 anos

Bochechar ou gargarejar durante 30 segundos com, pelo menos, 15 ml de solução não diluída, duas a três vezes ao dia, não excedendo as três utilizações diárias.

Hextril não deve ser diluído antes de usar.

A utilização em crianças com menos de 12 anos não é recomendada.

Idosos

Tal como recomendado para os adultos.

Modo de administração

Via bucal. Administração tópica na cavidade bucal.

Agitar bem antes de usar.

Não engolir, mas sim cuspir após utilização.

4.3 Contraindicações

Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1.

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização

A solução bucal destina-se apenas a uso externo. A solução não deve ser ingerida.

Não é adequado para sintomas persistentes ou se estes piorarem. Nestes casos bem como se novos sintomas surgirem deve ser consultado um médico.

Não se recomenda a utilização por períodos superiores a 10 dias sem consultar um médico ou dentista relativamente à continuidade da utilização.

Hextril contém etanol, azorrubina (E122) e sódio

Este medicamento contém azorrubina (E122). Pode causar reações alérgicas.

Este medicamento contém 608 mg de etanol em cada 15 ml. A quantidade em 15 ml deste medicamento é equivalente a 15 ml de cerveja ou 6 ml de vinho. Deve ser utilizado com precaução em doentes dependentes de álcool.

Em caso de ingestão acidental: Etanol

Uma dose de 15 ml deste medicamento ingerida acidentalmente por uma criança com 12 anos de idade e que pese 40 kg iria resultar numa exposição de 15,2 mg/kg de etanol, o que pode causar um aumento na concentração de álcool no sangue de cerca de 2,5 mg/100 ml.

É pouco provável que a quantidade de álcool neste medicamento tenha efeitos em adultos e adolescentes, e é pouco provável que os seus efeitos em crianças sejam perceptíveis. Pode ter alguns efeitos em crianças mais pequenas, como por exemplo sonolência (ver secção 4.9).

O álcool presente neste medicamento pode alterar os efeitos de outros medicamentos.

Sódio

Este medicamento contém menos do que 1 mmol (23 mg) de sódio por dose, ou seja, é praticamente "isento de sódio".

4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação

Não são conhecidas quaisquer interações para a hexetidina.

4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento

Gravidez

Não foram conduzidos estudos adequados e bem controlados em mulheres grávidas a utilizar hexetidina. No entanto, com base nos estudos realizados em animais, e na teoria, dada a negligenciável absorção sistêmica, considera-se altamente improvável que o uso de Hextril durante a gravidez constitua um risco para o feto.

Amamentação

Não foram conduzidos estudos adequados e bem controlados em mulheres a amamentar, a utilizar hexetidina. Não se sabe se a hexetidina ou os seus metabolitos são ou não excretados no leite humano, no entanto, tendo em conta a quantidade desprezável de hexetidina que possa ser sistemicamente absorvida, considera-se que as concentrações de hexetidina no leite não apresentam qualquer risco para o lactente.

Como acontece para outros medicamentos, a hexetidina não deve ser utilizada durante a gravidez ou a lactação, a menos que o benefício potencial do tratamento para a mãe supere os possíveis riscos para o desenvolvimento do feto ou do lactente.

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

Os efeitos de Hextril sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são nulos ou desprezáveis.

4.8 Efeitos indesejáveis

Hextril é, de um modo geral, muito bem tolerado, apresentando um baixo potencial para originar irritação ou reações sensitivas. O uso prolongado de Hextril é igualmente bem tolerado.

Testes cutâneos realizados com unguento contendo hexetidina não revelaram reações de irritação ou potencial de sensibilização.

Na tabela 1, estão incluídas as reações adversas identificadas com hexetidina, durante o período pós-comercialização. A frequência das reações adversas é classificada de acordo com a seguinte convenção:

Muito frequentes	$\geq 1/10$
Frequentes	$\geq 1/100, < 1/10$
Pouco frequentes	$\geq 1/1000, < 1/100$
Raros	$\geq 1/10000, < 1/1000$
Muito raros	$< 1/10000$
Desconhecida	A frequência não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis

Tabela 1: Reações Adversas Identificadas Durante a Experiência Pós-Comercialização Com Hexetidina por frequência estimada com base na taxa de relatos espontâneos

Categorias de Frequência	Acontecimento Adverso	
Doenças do sistema imunitário		
Desconhecida	Reações de hipersensibilidade*	
Doenças do sistema nervoso		
Desconhecida	Ageusia, Disgeusia	
Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino		
Desconhecida	Tosse, Dispneia**	
Doenças gastrointestinais		
Desconhecida	Boca seca, Disfagia, Náuseas, Aumento das glândulas salivares, Vômitos	
Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos		
Desconhecida	Angioedema	
Perturbações gerais e alterações no local de administração		
Desconhecida	Reações no local de aplicação ***	

*A inclusão do termo reações de hipersensibilidade foi baseada em casos onde foram reportados: Hipersensibilidade e Urticária

** Observado no contexto de Hipersensibilidade

*** A inclusão do termo reações no local de aplicação foi baseada em vários casos reportados. Estes incluem irritação da boca e garganta, parestesia oral, descoloração da língua, descoloração dos dentes, inflamação, formação de vesículas e ulceração.

Notificação de suspeitas de reações adversas

A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas diretamente ao INFARMED, I.P.:

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>
(preferencialmente)

ou através dos seguintes contactos:

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

e-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

4.9 Sobredosagem

Sinais e sintomas da sobredosagem

É improvável que seja tóxica a concentração de hexetidina em Hextril quando o medicamento é utilizado de forma adequada.

Não foram registados casos de intoxicação alcoólica resultantes da sobredosagem com Hextril.

A ingestão de quantidades elevadas deste medicamento pode levar à ocorrência de sinais/sintomas de intoxicação alcoólica, devido ao seu teor em etanol (ver secção 4.4).

Não existe evidência que sugira que a administração repetida e excessiva de hexetidina conduza ao aparecimento de reações de hipersensibilidade.

Tratamento da Sobredosagem

O tratamento da sobredosagem é sintomático, no entanto, raramente é necessário. Em caso de ingestão accidental do conteúdo da embalagem por uma criança, deverá ser consultado um médico imediatamente. Deverá ser considerada a lavagem gástrica nas duas horas após a ingestão e o seu controlo deverá ser relacionado com o tratamento de uma intoxicação alcoólica.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propriedades farmacodinâmicas

Grupo farmacoterapêutico: 6.1.1. – Aparelho digestivo; Medicamentos que atuam na boca e orofaringe; de aplicação tópica, código ATC: A01AB12

A hexetidina é uma substância ativa que apresenta um efeito rápido e prolongado e que pertence ao grupo dos antissépticos de ação local para utilização a nível dentário, das gengivas e da orofaringe.

A hexetidina é um antimicrobiano e antifúngico de largo espectro apropriado contra os microrganismos patogénicos responsáveis por infeções orofaríngeas.

Além disso, a hexetidina apresenta propriedades cicatrizantes, hemostáticas e anestésicas a nível oral e da faringe.

Mecanismo de Ação

A hexetidina possui ação antibacteriana por interferência nos processos metabólicos vitais que são necessários ao desenvolvimento de microrganismos patogénicos.

Com efeito, a hexetidina apresenta analogia com a tiamina (presença de um núcleo pirimídico, mas sem dupla ligação). Demonstrou-se que um dos mecanismos que explicam a ação antibacteriana da hexetidina era essa analogia, ou seja, a hexetidina entra em competição com a tiamina, fator indispensável ao desenvolvimento de microrganismos.

5.2 Propriedades farmacocinéticas

Não há dados clínicos disponíveis sobre a farmacocinética da hexetidina em seres humanos. Esta substância atua localmente na mucosa oral, sendo esperado que apenas pequenas quantidades sejam absorvidas.

A elevada afinidade da hexetidina para proteínas e polímeros com locais eletronegativos explica a sua ligação às bactérias e contribui especificamente para a sua atividade, saturando determinados locais.

Esta afinidade também explica a ligação à placa dentária e, consequentemente, o efeito anti-placa.

Isto significa que o efeito antibacteriano pode ser detetado num período de 10 até 14 horas após a administração.

5.3 Dados de segurança pré-clínica

Os dados pré-clínicos, segundo estudos de toxicidade de dose única e dose repetida, incluindo estudos de toxicidade crónica, não revelaram riscos especiais da hexetidina para o ser humano, se utilizada de acordo com as instruções.

Toxicologia genética

A hexetidina não mostrou potencial mutagénico no teste de Ames (com bactérias).

Carcinogenicidade

Não são conhecidos estudos de carcinogenicidade.

Toxicidade reprodutiva

A hexetidina não foi teratogénica em ratos e coelhos. Não foram realizados outros estudos de toxicidade reprodutiva.

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1 Lista dos excipientes

Polissorbato 80

Sacarina sódica (E954)

Ácido cítrico mono-hidratado

Azorrubina (E122) (contém sódio)

Levomentol

Óleo essencial de eucalipto

Etanol 96%

Edetato de cálcio e sódio

Hidróxido de sódio (para ajuste do pH)

Água purificada

6.2 Incompatibilidades

Não aplicável.

6.3 Prazo de validade

2 anos.

6.4 Precauções especiais de conservação

Conservar a temperatura inferior a 30°C.

Proteger da luz.

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente

Hextril está disponível:

- em frascos de vidro tipo III fechados com cápsulas de alumínio ROPP ou de plástico HDPE com vedante PE-Alu-PET contendo 200 ml.
- em frascos PET fechados com cápsulas de alumínio ROPP ou de plástico HDPE com vedante PE-Alu-PET contendo 400 ml.

Cada frasco é acompanhado de um copo de medida de polipropileno transparente com uma graduação única de 15 ml.

6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento

Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências locais.

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Johnson & Johnson, Lda.
Lagoas Park, Edifício 9
2740-262 Porto Salvo
Portugal

8. NÚMEROS DE AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

N.º de registo: 9084202 - 200ml de solução bucal, 1mg/ml, frasco

N.º de registo: 9084210 - 400ml de solução bucal, 1mg/ml, frasco

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Data da primeira autorização:

Embalagem de 200ml: 25 de abril de 1963

Embalagem de 400ml: 13 de setembro de 1995

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO