

Erica terminalis

Salisb. 1796

SYNONIEM:

Erica stricta. Don ex Willd.

E. cornea DC.

BESCHRIJVING:

Bloemen nachtrase. in eindslandige krossen. Tamelyk ryk bloeiend.
loof frisgroen. Bladeren in kransen^{v. 4} soms 5 of 6.
stijf opgaande bossige groeiwijze.

BLOEITJD: Aug.-okt

HOOGTE: 125 cm.

in Ned. tot 80 cm.

Tamelyk winterhard. in Nederland.

BIJZONDERHEDEN: 1965

H.C.C. NO.

H 11

R.H.S. COLOUR CART: NO. 74D

IN NED. IN CULTUUR:

IN ST. WOLD. 1966

Verspreidingsgebied. Corsica, Sardinië. 2. Spruyt
Italië M. A. F. J. H. A.

ook in het wild gevonden in Downhill, Co. Derry,
(J. W. Porter 1962) Serlachy.

Nederl. naam: Corneaanse Doyphende
Engels Cornean Heath.

KEURING RESULTATEN:

C

Comm. Encult. msd 78

Ben V. Proudley Feathers in Colours 157
T. Underhill. Heaths and Feathers 179
H. J. v. d. Laar. Hereditumboek 117
" Lysen in Med. gekeelde cultuurs
P. G. Duyneburg Soortmeningskijken
G. Yates Pocket Guide 1970 p 29
D. Mc Clintock Pocket Guide 1970 p 36
A. F. Johnson. 1956. Hardy Heaths 16, 39, 40, 89.
A. F. Maxwell 1927. The Low Road p. 22, 20, 29, 92
W. Ingwersen 1947 The Genus Ruca p 11
J. W. Porter 1960 Water Garden Handbook p 45
O. M. J. Bolam 1984 Ericultura no 54 p 8