

Ook zelf gestekt. Waarschijnlijk afwijkend van 'Yvonne'
omdat deze wordt beschreven als 'kleur als 'C. G. Best'
M.i. waard om te benamen. Stel voor 'Anja Blum'.

B. 3975: Roodbloemige *Erica cinerea* met sporadisch aanweng-
gespleten bloemen (kleur C.D. Eason') zeer veel oep bruin
~~op~~ wale op knoppes lijkende knoppen welke niet
openkomen. Gevonden in 1975.

Op aandringen v. David McClimbich vermeerderd.
Bok de fa. huyneburg heeft enkele stekjes gehad welke
in 1977 voorstelde me te benamen. I.v.m. vondst van

B 3877 (hierboven) op mijn verzoek nog een jaar
gewacht omdat deze beter leek te gaan bloeien.

Men blykt dat de kleur beduidend anders is kan was
my betreft een naam gegeven worden aan deze leek
wel botanische byzonderheid. Voorstel 'Marion Blum'.

B 4177. Roodbloemige *Erica cinerea* kleur exact als
^{met} 'Plummers Seedling' Mogelyk derzelfde al lykt
de plant krachtiger de groeien.
Gevonden in 1977 tussen E. en 'Violetta' naailing-
Hereduin 'De Voorrengheid'.

Nog eens vergelyken met bestaande roodbloemige
*Erica cinerea*s.

B 4775 Geelgroene type van Call. vulgaris. Enkele jaren
vergeleken met C.v. terlei Aurea en C.v. Christina,
thervan studeelyk afwijkend door veel vroeger
bloeï, krachtige groeiwyse en sterke, geronde
mutterlyk. Groeit eerst beduidend sneller dan
genoemde varieteten maar blyft in sept in
hoogte achter. bloeit half aug tot half sept.
lykt in vorm en groeiwyse op 'Hammondie Aurea' folia
maar is m.i. beduidend geleer van kleur.

Tot daver resultaat in 1978.

Nog één jaar bekijken, lykt my waard om te
benamen. Voorstel C.v. ~~Hammondie~~ ^{Marion Blum} (leer voorloopig)

= ~~Marion Blum~~

Mogelijke nieuwigheden

B. 498. *Parablaemuge Eucra cinerea*. waarschijnlijk gelijk aan *E. cin.* 'Purple Beauty'. Leer lange blaemtroes.

Mogelyk verduwaelde stek of spontaan opgekomen zaailing tussen stekplanten van *E. cin.* 'Koranne Wateren'. Ontdekt Augustus 1978. by de leemning laad. Vergelyken met *E. cin.* 'Purple Beauty'.

B. 679 Stek van een in 1977 spontaan opgekomen zaailing van *Eucra cinerea* met geel loof waanover een studeelyt bronk leuning kind ligt. Afwykend v. l. verlaande gele dorkment staer loogte en opscallen de bronkullen. Blaemen als 'Pallas'. Nog een een jaer vergelyken.

B. 8777. By lage, min of meer kruipende geelblaagige ~~*Wittman*~~ *Calluna vulgaris*. lykt af de wyken van verlaande blaedecken als 'Gaeden Dapet', 'kambelade' en 'Elenloet'. Geveeleend nist in 1977 opgeplante gele zaailingen. Da 1979 vergelyken met borengevenende *Eucra cinerea*. colen als B. 8777. — (in *Wittman* *Eucra cinerea* *Wittman* *Wittman*)

B. 3177. laag begynende roodblaemuge *Eucra cinerea* gekregen in Aug 1977 van als v. d. Berg nist Edel om te vergelyken met verlaande dorkment. Resultaat lykt positief, staarom in 1978 nog een geveld om blaemen nist het gele roodblaemuge *Eucra cinerea* dorkment te beproeven.

B. 3377. spoot van *E. cin.* 'Domino', met naast witte ook enkele half paars, half witte blaemen. Gevoelen in 1977, twee keer de verla. laet. Resultaat in 1978 nist bemoeidgend. Voor twee blaemen geuen beproeft 2. leuning laet aeth. tot by nietige paarre streepro. Resultaat nist afgevaecht ofstad er oek van maest worden gemeten. Nog een jaer beproeven. Als resultaten goed byn naam 'Koranne'.

B. 3877. Roed blaemuge gespoelden *Eucra cinerea*, danelyk goed staend, gevoelen Aug 1977 tussen *E. cin.* 'Koranne' op 20 Aug 1978 staeken opgestuund naar de fa. huysentung om van de stekken.