

Erica vagans 'Viridiflora'

SYNONYMI:

BESCHRIJVING:

Bloemen lichtroze. Heldere bloeiend.

In de oksels v. d. bladeren worden massa's hangjes gevormd die op lichtgroene bloemen (*Viridifloras*) lijken

Randst.

BLOEITIJD: aug- okt

HOOGTE: 30 cm.

BIJZONDERHEDEN:

Gevonden door P.D. Williams in het koraalduin Cornwall ca 1905

H.C.C. NO.

R.H.S. COLOUR CART: NO.

IN NED. IN CULTUUR:

IN ST. WOLD. 1968

KEURING RESULTATEN:

0

Comm. Encult. met 10

Turpin 1903) ongeveer in 1909 ontdekte P.D. Williams een zeer afwijkende vorm v. *E. vagans*, in plaats van bloemen had deze groene traakvormige aangroeiels. Een zelfde afwijking in *E. vagans* was reeds gevonden in Frankrijk door H. Chevalier in sept. 1897 en stakken hiervan zijn in het herbarium van Parys.

Kempthorne (1934) berichtte dat hij in 1932 twee planten had gevonden die veel lieten op 'Viridiflora', welke hij beschreef als 'Flora. 8 lens'

- H. J. v. d. Laar Dendroflora no 7. 1970 p 31
" Lysden in Ned. geteelde cultuur.
Ja P. G. Auyneburg. Dorkenend Lysden
S. Underhill Heaths and Heather 194
F. J. Chapple. The Heather Garden 199
G. Gaden Pocket Guide 1973 p 25 1970 p 20
J. F. Betts 1966 Hardy Heaths 100
W. Ingwersen 1947. The genus Erica p 14
E. Knecht 1901 Den Heidegarden no 10 p 10/22
A. W. Jones 1964 Lysden Heathers from Cornwall p 80-86
G. Gaden 1905 Garden. b. p 132 - 159
P. G. Tarpin 1903 Cornish Studies 10 (1903) The Heather sp. of Cornwall p 6
M. M. J. Blum 1987 Eragrost, Entomologia no 64, p 22-29