

Ficha de Trabalho

Grupos Sanguíneos

1. A transfusão de sangue tipo AB para uma pessoa com sangue tipo B:

- a) pode ser realizada sem problema porque as hemácias AB não possuem antígenos que possam interagir com anticorpos anti-A presentes no sangue do receptor
- b) pode ser realizada sem problema porque as hemácias AB não possuem antígenos que possam interagir com anticorpos anti-B presentes no sangue do receptor
- c) pode ser realizada sem problema porque apesar de as hemácias AB possuírem antígeno A e antígeno B o sangue do receptor não possui anticorpos contra eles
- d) não deve ser realizada pois os anticorpos anti-B presentes no sangue do receptor podem reagir com os antígenos B presentes nas hemácias do dador
- e) não deve ser realizada pois os anticorpos anti-A presentes no sangue do receptor podem reagir com os antígenos presentes nas hemácias do dador

2. A tabela a apresentada foi elaborada a partir de testes para determinação dos grupos sanguíneos de seis pessoas de uma academia de ginástica. O sinal positivo (+) significa "aglutina" e o sinal negativo (-) significa "não aglutina". Após analisar a tabela, assinale a alternativa que indica os grupos sanguíneos de todas as pessoas quanto aos sistemas ABO e Rh, mantendo a sequência disposta na tabela.

NOME	soro anti-A	soro anti-B	soro anti-Rh
Amanda	+	+	+
Gustavo	-	-	-
Patrícia	+	-	+
Pedro Luís	-	+	-
Augusto	+	+	-
Cláudio	-	+	+

- a) O, Rh-/ AB, Rh+/ B, Rh-/ A, Rh+/ O, Rh+/ A, Rh-
- b) O, Rh+/ AB, Rh-/ B, Rh+/ A, Rh-/ O, Rh-/ A, Rh+
- c) AB, Rh-/ O, Rh+/ A, Rh-/ B, Rh+/ AB, Rh+/ B, Rh-
- d) AB, Rh+/ O, Rh-/ A, Rh+/ B, Rh-/ AB, Rh-/ B, Rh+
- e) AB, Rh+/ O, Rh-/ B, Rh+/ A, Rh-/ AB, Rh-/ A, Rh+

3. Um banco de sangue possui 5 litros de sangue tipo AB, 3 litros de tipo A, 8 litros B e 2 litros O. Para transfusões em indivíduos O, A, B e AB estão disponíveis, respectivamente:

- a) 2, 5, 10 e 18 litros.
- b) 2, 3, 5 e 8 litros.
- c) 18, 8, 13 e 5 litros.
- d) 2, 3, 8 e 16 litros.
- e) 2, 5, 18 e 10 litros.

4. Num banco de sangue foram seleccionados os seguintes dadores: grupo AB – 5; grupo A – 8; grupo B – 3; grupo O – 12. O primeiro pedido partiu de um hospital que tinha dois pacientes nas seguintes condições:

Paciente I – possui ambos os tipos de aglutininas no plasma Tipo 0

Paciente II – possui apenas um tipo de antígeno nas hemácias e aglutininas B no plasma. Tipo A

Quantos dadores estavam disponíveis para os pacientes I e II respectivamente?

- a) 5 e 11
 - b) 12 e 12
 - c) 8 e 3
 - d) 12 e 20
 - e) 28 e 11
- o 0 só recebe do 0 (12)
o A recebe do A e 0 (12+8)

5. A incompatibilidade materno-fetal ao antígeno Rh pode determinar uma doença denominada Eritroblastose Fetal. Se uma mulher foi orientada a usar a vacina anti-Rh logo após o nascimento do primeiro filho, podemos dizer que o seu factor Rh, o do seu marido e o da criança são respectivamente:

- a) negativo; negativo; negativo
 - b) negativo, negativo; positivo
 - c) negativo; positivo; positivo
 - d) positivo; negativo; positivo
 - e) positivo; positivo, negativo
- se a mulher é negativa e o filho é positivo, o pai tem de ser positivo (para o filho dar positivo)
- para haver doença ha duas condições:
1 - incompatibilidade (mae Rh- e Filho Rh+)
2 - mae ter anticorpos Rh

6. Uma mulher recebeu uma transfusão sanguínea. O primeiro filho nasceu com eritroblastose fetal. Classifique quanto ao grupo sanguíneo Rh a mulher, o marido, a criança e o sangue que a mulher recebeu na transfusão.

- a) Rh-, Rh+, Rh-, Rh+
- b) Rh-, Rh+, Rh+, Rh+
- c) Rh-, Rh+, Rh-, Rh+
- d) Rh-, Rh-, Rh+, Rh-
- e) Rh+, Rh-, Rh-, Rh+

transfusao Rh+ cria anticorpos -> incompatibilidade -> eritroblastose

transfusao nao muda de Rh- para Rh+, apenas cria anticorpos


7. Uma mulher Rh+, cujo pai é Rh-, é casada com um homem Rh+, cuja mãe é Rh-. A probabilidade desse casal vir a ter uma criança Rh- é de:

- a) 100%
- b) 75%
- c) 50%
- d) 25%
- e) 0%

8. O avô paterno de uma mulher pertence ao grupo sanguíneo AB e todos os outros avós são do grupo O. Qual a probabilidade desta mulher ser do grupo AB?

- a) nula
- b) 25%
- c) 50%
- d) 75%
- e) 100%

9. Observe o diagrama relativo ao sistema ABO.




- a) Refira, justificando o genótipo do indivíduo 8. AB
- b) Indique a probabilidade do casal 1 e 2 vir a ter um filho de sangue do grupo O. 0%

c) Indique das seguintes transfusões as que são contra-indicadas:

- i. $1 \rightarrow 2$
- ii. $4 \rightarrow 2$
- iii. $3 \rightarrow 6$
- iv. $3 \rightarrow 7$
- v. $9 \rightarrow 5$

10. Com base no heredograma a seguir, responda:



- a) Qual a probabilidade de o casal formado por 5 e 6 ter duas crianças com sangue AB Rh+? $0,125^2$
- b) Se o casal em questão já tiver uma criança com sangue AB Rh+, qual a probabilidade de ter outra com os mesmos tipos sanguíneos? 12,5%