

DM de Mathématiques n°1

Logique. Triangles magiques

BONNET Zéphyr, FERRAOUN Rayane, MELLIER Raphaël, MITROI Andrei

Problème 1 - Logique de Łukasiewicz

1) Soient $\mathcal{P}, \mathcal{Q}, \mathcal{R}$ des assertions.

a) Montrons que $(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \Leftrightarrow (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{P})$ à l'aide de leurs tables de vérité¹ :

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}$	$\mathcal{Q} \wedge \mathcal{P}$
V	V	V	V
V	F	F	F
V	I	I	I
F	V	F	F
F	F	F	F
F	I	F	F
I	V	I	I
I	F	F	F
I	I	I	I

Les deux colonnes $(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q})$ et $(\mathcal{Q} \wedge \mathcal{P})$ sont identiques donc les deux assertions sont équivalentes.

b) Montrons que les assertions $((\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \wedge \mathcal{R}) \Leftrightarrow (\mathcal{P} \wedge (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R}))$ à l'aide de leurs tables de vérité :

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{R}$	$\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}$	$\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R}$	$(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \wedge \mathcal{R}$	$\mathcal{P} \wedge (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R})$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F
V	V	I	V	I	I	I
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F
V	F	I	F	F	F	F
V	I	V	I	I	I	I
V	I	F	I	F	F	F
V	I	I	I	I	I	I
F	V	V	F	V	F	F
F	V	F	F	F	F	F
F	V	I	F	I	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F
F	F	I	F	F	F	F
F	I	V	F	I	F	F

¹Toutes les tables de vérité de ce devoir ont été générés automatiquement par un module python réalisé par nos soins : <https://github.com/andreim42/truth-table-builder/>

F	I	F	F	F	F	F
F	I	I	F	I	F	F
I	V	V	I	V	I	I
I	V	F	I	F	F	F
I	V	I	I	I	I	I
I	F	V	F	F	F	F
I	F	F	F	F	F	F
I	F	I	F	F	F	F
I	I	V	I	I	I	I
I	I	F	I	F	F	F
I	I	I	I	I	I	I

Les deux colonnes $((\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \wedge \mathcal{R})$ et $(\mathcal{P} \wedge (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R}))$ sont identiques donc les deux assertions sont équivalentes.

c) Montrons les deux lois de De Morgan.

Montrons que $\neg(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}) \iff (\neg\mathcal{P} \wedge \neg\mathcal{Q})$ et $\neg(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \iff (\neg\mathcal{P} \vee \neg\mathcal{Q})$ à l'aide de leurs tables de vérité :

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}$	$\neg(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q})$	$\neg\mathcal{P}$	$\neg\mathcal{Q}$	$\neg\mathcal{P} \wedge \neg\mathcal{Q}$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	V	F
V	I	V	F	F	I	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V
F	I	I	I	V	I	I
I	V	V	F	I	F	F
I	F	I	I	I	V	I
I	I	I	I	I	I	I

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}$	$\neg(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q})$	$\neg\mathcal{P}$	$\neg\mathcal{Q}$	$\neg\mathcal{P} \vee \neg\mathcal{Q}$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
V	I	I	I	F	I	I
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V
F	I	F	V	V	I	V
I	V	I	I	I	F	I
I	F	F	V	I	V	V
I	I	I	I	I	I	I

Les deux colonnes $\neg(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q})$ et $\neg\mathcal{P} \wedge \neg\mathcal{Q}$ de la première table sont identiques donc les deux assertions sont équivalentes. De plus, les deux colonnes $\neg(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q})$ et $\neg\mathcal{P} \vee \neg\mathcal{Q}$ de la seconde table sont identiques donc les deux assertions sont équivalentes.

Ainsi, les lois de De Morgan restent vérifiées dans $\mathcal{L}_3$.

d) Montrons la commutativité et l'associativité du « et » dans $\mathcal{L}_3$.

- Montrons que $(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \iff (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{P})$:

$$\begin{aligned}
 (\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) &\iff \neg(\neg\mathcal{P} \vee \neg\mathcal{Q}) && \text{d'après la c)} \\
 &\iff \neg(\neg\mathcal{Q} \vee \neg\mathcal{P}) && \text{d'après la a)} \\
 &\iff (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{P})
 \end{aligned}$$

Donc les assertions $\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}$ et $\mathcal{Q} \wedge \mathcal{P}$ sont bien équivalentes.

- Montrons que $((\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \wedge \mathcal{R}) \iff (\mathcal{P} \wedge (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R}))$:

$$\begin{aligned}
((\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \wedge \mathcal{R}) &\Leftrightarrow \neg(\neg(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \vee \neg \mathcal{R}) && \text{d'après la c)} \\
&\Leftrightarrow \neg((\neg \mathcal{P} \vee \neg \mathcal{Q}) \vee \neg \mathcal{R}) \\
&\Leftrightarrow \neg(\neg \mathcal{P} \vee (\neg \mathcal{Q} \vee \neg \mathcal{R})) && \text{d'après la a)} \\
&\Leftrightarrow \neg(\neg \mathcal{P} \vee (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R})) \\
&\Leftrightarrow \mathcal{P} \wedge (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R})
\end{aligned}$$

Donc les assertions $((\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \wedge \mathcal{R})$ et $(\mathcal{P} \wedge (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R}))$ sont bien équivalentes.

2) Soient $\mathcal{P}, \mathcal{Q}, \mathcal{R}$ des assertions.

a) Montrons que $\neg \mathcal{P} \vee \mathcal{Q}$ est équivalente à $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ grâce à leurs tables de vérité.

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\neg \mathcal{P}$	$\neg \mathcal{P} \vee \mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
V	I	F	I	I
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V
F	I	V	V	V
I	V	I	V	V
I	F	I	I	I
I	I	I	I	V

Les colonnes $\neg \mathcal{P} \vee \mathcal{Q}$ et $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ sont identiques donc les deux assertions sont bien équivalentes.

[Note, Andrei pour Zéphyr : A CORRIGER, ce n'est en fait pas vrai]

b) Montrons que $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ est équivalente à $\neg \mathcal{Q} \Rightarrow \neg \mathcal{P}$ grâce à leurs tables de vérité.

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\neg \mathcal{P}$	$\neg \mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$	$\neg \mathcal{Q} \Rightarrow \neg \mathcal{P}$
V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F
V	I	F	I	I	I
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V
F	I	V	I	V	V
I	V	I	F	V	V
I	F	I	V	I	I
I	I	I	I	V	V

Les colonnes $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ et $\neg \mathcal{Q} \Rightarrow \neg \mathcal{P}$ sont identiques donc les deux assertions sont bien équivalentes.

c)


Problème 2 - Triangles magiques

Partie A - Questions préliminaires

1)

Partie B - Les triangles magiques

1) Voici le triangle complété afin qu'il soit 20-magique :



2) On considère un triangle S -magique. Soit T la somme des nombres placés sur ses trois sommets.

a) Montrons que $45 + T = 3S$:

Nous avons $S = n_1 + n_2 + n_3 + n_4 = n_4 + n_5 + n_6 + n_7 = n_7 + n_8 + n_9 + n_1$.

Ainsi, $3S = n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 + n_6 + n_7 + n_8 + n_9 + (n_1 + n_4 + n_7)$

Or, nous savons qu'on place tous les entiers entre 1 et 9 sur le triangle magique, donc $n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 + n_6 + n_7 + n_8 + n_9 = \frac{9(9+1)}{2} = 45$. De plus, $n_1 + n_4 + n_7 = T$ par définition.

Donc, $3S = 45 + T$.

b) Montrons que $17 \leq S \leq 23$:

D'après la a), nous avons que $45 + T = 3S$. D'où $S = \frac{45+T}{3}$. Par définition, $T = n_1 + n_4 + n_7$. Les entiers placés sur le triangle sont tous distincts et compris entre 1 et 9 donc il en est de même pour n_1, n_4 et n_7 .


Donc, d'après la **Partie A**, la somme de trois entiers tous distincts et compris entre 1 et 9 est comprise entre 6 et 24.

Donc $6 \leq n_1 + n_4 + n_7 \leq 24$, d'où $6 \leq T \leq 24$. Donc $51 \leq 45 + T \leq 69$. Donc $\frac{51}{3} = 17 \leq \frac{45+T}{3} \leq 23 = \frac{69}{3}$.

Ainsi, $17 \leq S \leq 23$.

c) Voici la liste des couples (S, T) possibles : $(17, 6), (18, 9), (19, 12), (20, 15), (21, 18), (22, 21), (23, 24)$.

3) Voici un triangle 17-magique :



4) Montrons qu'il n'existe pas de triangle 18-magique :

5)

a)

b) Voici un triangle 19-magique :

