## 5. Übung zur Vorlesung

# Differential- und Integralrechnung für Informatiker

## (A 17)

Man untersuche das Konvergenzverhalten der folgenden Reihen und gebe jedes Mal an, welches Kriterium verwendet wird.

$$\text{a) } \sum_{n \geq 0} \frac{2^n}{7^n + 10^n}, \quad \text{b) } \sum_{n \geq 2} \frac{n}{(\ln n)^n}, \text{ c) } \sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n^p}, \text{ mit } x > 0 \text{ und } p \in \mathbb{R}, \quad \text{d) } \sum_{n \geq 1} \frac{\sqrt{2n-1}}{n^2 + 1},$$

e) 
$$\sum_{n\geq 1} \frac{3n}{(4+\frac{5}{n})^n}$$
, f)  $\sum_{n\geq 1} \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n^{\frac{3}{4}}}$ , g)  $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{2^{\alpha \cdot n}} C_{2n}^n$ , mit  $\alpha \in \mathbb{R}$  (es ist  $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ ),

$$\text{h) } \sum_{n \geq 1} \frac{n^2}{2^{n^2}}, \quad \text{i) } \sum_{n \geq 1} \frac{2^n n!}{n^n}, \quad \text{j) } \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(2n+1)^\alpha}, \text{ mit } \alpha \in \mathbb{R}, \quad \text{ k) } \sum_{n \geq 1} n^4 e^{-n^2}, \quad \text{l) } \sum_{n \geq 1} \sin \frac{1}{n}.$$

HINWEIS für l): Ist  $(x_n)_n$  eine gegen 0 konvergierende Folge von Null verschiedener Zahlen, dann ist  $\lim_{n\to\infty}\frac{\sin x_n}{x_n}=1.$ 

### (A 18)

Man untersuche die Konvergenz und die absolute Konvergenz der folgenden Reihen.

a) 
$$\sum_{n\geq 1} (-1)^n \frac{e^n}{n+3^n}$$
, b)  $\sum_{n\geq 0} (-1)^n (1-a_n)$ , wobei  $a_n = \frac{n^5}{n^5+1}$  für alle  $n \in \mathbb{N}$  ist,

c) 
$$\sum_{n>1} (-1)^n \left( e - \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n \right)$$
.

HINWEIS für c): Für die absolute Konvergenz verwende man die Gleichheit

(\*) 
$$\lim_{n \to \infty} n \left( e - \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n \right) = \frac{e}{2}.$$

#### (A 19)

Gegeben sei die Reihe  $\sum_{n\geq 1} n! \left(\frac{x}{n}\right)^n$ , mit x>0. Die als Hinweis für Aufgabe (A 18) c) gegebene Gleichheit (\*) berücksichtigend, bestimme man alle Zahlen x mit der Eigenschaft, dass die Reihe konvergent ist.