


AVIATOR

Состав: а.м. Dimethomorph 90 гр/кг
а.м. Mankozeb 600 гр/кг

Хемиска група: Dimethomorph - морфолини
Mankozeb - дитиокарбати

Формулација: Вододисперзни гранули - WG

**СИСТЕМИЧЕН ФУНГИЦИД ЗА СУЗБИВАЊЕ
НА ПРИЧИННИТЕЛите НА ИНФЕКТИВНИ
БОЛЕСТИ ВО ВИНОВА ЛОЗА,
ГРАДИНАРСКИ И ПОЛЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ**




БИОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ ЗА АКТИВНАТА МАТЕРИЈА DIMETHOMORPH
Dimethomorph инхибира процеси неопходни за градбата и функцијата на
клеточниот сид на габите од Oomicetes.

МАГАН-МАК ДОО Скопје
ул. Орце Николов бр. 71 Скопје, Р. Македонија
тел.: 02/3216-147; факс: 02/3216-158
www.maganmak.com.mk



Винова лоза



Причинители на инфективни болести:
-Пламеница на винова лоза (*Plasmopara viticola*)
-Екскориоза кај лоза, црна дамкавост (*Phomopsis viticola*)

Првото третирање се врши пред појавата на инфекцијата и не покасно од фазата 7-8 листа. Следните третирања се вршат на растојание од 12-14 дена, а особено чувствителни се фазите издолжување на ресите пред цушење, фазата прецутување и појава на бобици како и фазата зрна со големина на грашок.
По извршените 2 прскања со Aviator да се продолжи со други протективниfungициди како Shavit F 71,5 WP, Folpan 80 WDG и други.

Дозирање: 2 - 2,2 кг/ха

Домати



Причинители на инфективни болести:
-Пламеница (*Rhizoctonia infestans*)
-Црна дамкавост (*Alternaria solani*)

Пред расадување:

Третирање на 2-3 дена пред расадување.

Заштита во поле:

Третирање на секои 8-10 дена почнувајќи од моментот кога се создаваат услови за инфекција.

Кога растението ќе почне да старее, заштитата може да продолжи со други протективни fungициди како Shavit F 71,5 WP, Folpan 80 WDG и други.

Дозирање: 2 - 2,5 кг/ха

Тиквени култури



Причинители на инфективни болести:
-Пламеница на краставица (*Pseudoperonospora cubensis*)
-Пламеница (*Phitophthora capsici*)

Третирање на секои 8-10 дена пред да се создадат услови за инфекција.
Алтернативно после 2 третирања со Aviator, да се продолжи со некој протективен fungицид, Folpan 80 WDG, Shavit F 71,5 WP.

Дозирање: 2 - 2,5 кг/ха

Тутун

Причинители на инфективни болести:

Пламеница на тутун (*Peronospora tabacina*)

Гниење на тутун (*Phitophthora nicotianae*)

Во леи: Прскањето се врши на секои 12-14 дена, започнувајќи од стадиум на 4 листа. Третирањето на расадот кога е сеуште во леи, се до 1-3 дена пред пресадувањето, штити од габични инфекции во текот на овој критичен период.

Во поле после расадување: Прскање на растојание 12-14 дена откако растенијата ќе закрепнат од претрпениот шок при расадувањето.

Дозирање: 0,25%



Кромид

Причинители на инфективни болести:

-Пламеница на кромид (*Peronospora destructor*)

Третирање на секои 14 дена, започнувајќи од стадиум на 2 листа.

За да се спречи лизгањето на растворот и да се подобри влажнењето на лисната маса треба да се користи некој од постоечките адитиви во препорачани концентрации.

Дозирање: 0,25%



Компир

Причинители на инфективни болести:

-Пламеница (*Phytophthora infestans*)

Со третирање се започнува во фаза на интензивен пораст. Прскањата се вршат на растојание од 12-14 дена, зависно од јачината на нападот од причинителот на болеста. Направете 2-3 третирања, а потоа променете го со друг протективен несистемичен фунгицид на 10-12 дена после последното третирање со Aviator.

Дозирање: 0,25%



-Компабилност

Aviator е компатибilen со голем број пестициди

-Фитотоксичност

Применет во препорачаните количества или концентрации на правilen начин и во оптимално време, Aviator не е фитотоксичен за третираните култури- кај повеќе сорти винова лоза, компир, домати и краставици, не се забележани фитотоксични симптоми на листовите, стеблата и плодовите.

-Ограничувања

Максимален број на третирања во текот на една година:

-за винова лоза 2 третирања

-за компир 4 третирања

-за домат 5 третирања

-Предности

AVIATOR е фунгицид со тројно дејство: превентивно, куративно и антиспорулантно. DIMETHOMORPH се апсорбира брзо (1-2 часа) од листовите и се поместува на трансламинарен начин од една до друга страна на листот и од центарот кон рабовите, додека MANKOZEB има контактно-превентивно дејство.

ТОКСИКОЛОШКИ ПОДАТОЦИ

-Корисни организми

Нема негативно влијание на пчелите и другите корисни инсекти.

-Каренци

Винова лоза - 28 дена

Домат – 10 дена

Компир – 7 дена

-Резидуи

Грозје - 0,5 мг/кг

Домат – 0,2 мг/кг

Компир - 0,05 мг/кг

Пакувања: 1 кг, 0,2 кг

Напомена

-Податоците кои се содржат во овој проспект се базирани на експерименти и овластувања добиени од официјални институции, меѓутоа сепак се од информативен карактер.

За правилна употреба и постапки со производот задолжително да се прочита упатството за употреба.

ADAMA и застапникот за РМ, Маган-Мак немаат одговорност при погрешна употреба на препаратор, спротивно на дадените инструкции.

Производител: **ADAMA Makhteshim Ltd.**

Застапник и дистрибутер:

МАГАН-МАК ДОО Скопје

ул.Орце Николов бр.71 Скопје, Р.Македонија

тел.: 02/3216-147; www.maganmak.com.mk

®заштитно име на ADAMA Agriculture BV

