

Resumo de Inferência Estatística

Sumário

- Aula 1: O que é e para que serve Inferência Estatística?
- Aula 2: Distribuição a priori e a posteriori
- Aula 3: Prioris conjugadas e função de perda
- Aula 4: Estimadores de Bayes e EMV
- Aula 5: EMV
- Aula 6: Método dos momentos e suficiência
- Aula 7: Suficiência conjunta e mínima, teorema de Rao-Blackwell
- Aula 8: Admissibilidade e viés
- Aula 9: Eficiência
- Aula 10: Distribuição de uma estatística amostral e qui-quadrado
- Aula 11: Distribuição da média e variância amostrais
- Aula 12: Distribuição t de Student e intervalos de confiança
- Aula 13: Intervalos de confiança e Quantidades Pivotaes
- Aula 14: Testes de hipótese Part I
- Aula 15: Testes de hipótese Part II
- Aula 16: Testes de hipótese Part III
- Aula 17: Testes e conjuntos de confiança

Aula 1: O que é e para que serve Inferência Estatística?

Definição 1 (Modelo estatístico: informal) Um *modelo estatístico* consiste na identificação de variáveis aleatórias de interesse (observáveis e potencialmente observáveis), na especificação de uma distribuição conjunta para as variáveis aleatórias observáveis e na identificação dos parâmetros (θ) desta distribuição conjunta. Às vezes é conveniente assumir que os parâmetros são variáveis aleatórias também, mas para isso é preciso especificar uma distribuição conjunta para θ .

Definição 2 (Modelo estatístico: formal) Seja \mathcal{X} um espaço amostral qualquer, Θ um conjunto não-vazio arbitrário e $\mathcal{P}(\mathcal{X})$ o conjunto de todas as distribuições de probabilidade em \mathcal{X} . Um modelo estatístico **paramétrico** é uma função $P : \Theta \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{X})$ que associa a cada $\theta \in \Theta$ uma distribuição de probabilidade P_θ em \mathcal{X} .

Definição 3 (Afirmção probabilística) Dizemos que uma afirmação é **probabilística** quando ela utiliza conceitos da teoria de probabilidade para falar de um objeto.

Definição 4 (Inferência Estatística) Uma *inferência estatística* é uma **afirmação probabilística** sobre uma ou mais partes de um modelo estatístico.

Definição 5 (Estatística) Suponha que temos uma coleção de variáveis aleatórias $X_1, X_2, \dots, X_n \subseteq \mathbb{R}^n$ e uma função $r : \mathbf{X} \rightarrow \mathbb{R}^m$. Dizemos que a variável aleatória $T = r(X_1, X_2, \dots, X_n)$ é uma **estatística**.

Definição 6 (Permutabilidade) Uma coleção finita de variáveis aleatórias X_1, X_2, \dots, X_n com densidade conjunta f é dita **permutável** se

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_{\pi(1)}, x_{\pi(2)}, \dots, x_{\pi(n)}) \quad (1)$$

para qualquer permutação $\pi = \{\pi(1), \pi(2), \dots, \pi(n)\}$ dos seus elementos. Uma coleção finita é permutável se qualquer subconjunto finito é permutável.

Aula 2: Distribuição a priori e a posteriori

Definição 7 (Distribuição a priori) Se tratamos o parâmetro θ como uma variável aleatória, então a **distribuição a priori** é a distribuição que damos a θ antes de observarmos as outras variáveis aleatórias de interesse. Vamos denotar a função de densidade/massa de probabilidade da priori por $\xi(\theta)$.

Definição 8 (Distribuição a posteriori) Considere o problema estatístico com parâmetros θ e variáveis aleatórias observáveis X_1, X_2, \dots, X_n . A distribuição condicional de θ dados os valores observados das variáveis aleatórias, $\mathbf{x} := \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ é a **distribuição a posteriori** de θ , denotamos por $\xi(\theta | \mathbf{x})$ a f.d.p./f.m.p. condicional a $X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n$.

Teorema 1 (Distribuição a posteriori: derivação) Considere a amostra aleatória X_1, X_2, \dots, X_n de uma distribuição com f.d.p./f.m.p. $f(\mathbf{x} | \theta)$. Se a distribuição a priori é $\xi(\theta)$, temos

$$\xi(\theta | \mathbf{x}) = \frac{\xi(\theta) \prod_{i=1}^n f(x_i | \theta)}{g_n(\mathbf{x})}, \quad \theta \in \Omega \quad (2)$$

Chamamos $g_n(\mathbf{x})$ de distribuição marginal de X_1, X_2, \dots, X_n .

Definição 9 (Função de verossimilhança) Quando encaramos a f.d.p./f.m.p. $f(x_1, x_2, \dots, x_n | \theta)$ como uma função do parâmetro θ , chamamos esta função de **função de verossimilhança**, e podemos denotá-la como $L(\theta; \mathbf{x})$ ou, quando a notação não criar ambiguidade, simplesmente $L(\theta)$.

Aula 3: Prioris conjugadas e função de perda

Definição 10 (Hiper-parâmetros) Seja $\xi(\theta | \phi)$ a distribuição a priori para o parâmetro θ , indexada por $\phi \in \Phi$. Dizemos que ϕ é(são) o(s) **hiper-parâmetro(s)** da priori de θ .

Definição 11 (Priori conjugada) Suponha que X_1, X_2, \dots sejam condicionalmente independentes dado θ , com f.d.p./f.m.p. $f(x | \theta)$. Defina

$$\Psi = \left\{ f : \Omega \rightarrow (0, \infty), \int_{\Omega} f dx = 1 \right\} \quad (3)$$

onde Ω é o espaço de parâmetros. Dizemos que Ψ é uma **família de distribuições conjugadas** para $f(x | \theta)$ se $\forall f \in \Psi$ e toda realização \mathbf{x} de $X = X_1, X_2, \dots, X_n$

$$\frac{f(\mathbf{x} | \theta) f(\theta)}{\int_{\Omega} f(\mathbf{x} | \theta) f(\theta) d\theta} \in \Psi \quad (4)$$

Teorema 2 (Distribuição a posteriori da média de uma normal) Suponha que X_1, X_2, \dots, X_n formam uma amostra aleatória com distribuição normal e com média desconhecida θ e variância $\sigma^2 > 0$, conhecida e fixa. Suponha que $\theta \sim \text{Normal}(\mu_0, v_0^2)$ a priori. Então

$$\xi(\theta | x, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(\theta - \mu_1)^2}{2v_1^2}\right), \quad (5)$$

onde

$$\mu_1 := \frac{\sigma^2 \mu_0 + n v_0^2 \bar{x}_n}{\sigma^2 + n v_0^2} \text{ e } v_1^2 := \frac{\sigma^2 v_0^2}{\sigma^2 + n v_0^2} \quad (6)$$

Definição 12 (Priori imprópria) Seja $\xi : \Lambda \rightarrow (0, \infty), \Lambda \subseteq \Lambda$, uma função tal que $\int_{\Omega} \xi(\theta) d\theta = \infty$. Se utilizamos ξ como uma p.d.f.¹ para θ , dizemos que ξ é uma **priori imprópria** para θ .

Definição 13 (Estimador) Sejam X_1, X_2, \dots, X_n variáveis aleatórias com distribuição conjunta indexada por θ . Um **estimador** de θ é qualquer função real $\delta : X_1, X_2, \dots, X_n \rightarrow \mathbb{R}^d, d \geq 1$.

Definição 14 (Estimativa) Dizemos que o valor de δ avaliado nas realizações de X_1, X_2, \dots, X_n , $\mathbf{x} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $\delta(\mathbf{x})$ é uma **estimativa** de θ .

Definição 15 (Função de perda) Uma função de perda é uma função real em duas variáveis

$$L : \Omega \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}, \quad (7)$$

em que dizemos que o estatístico perde $L(\theta, a)$ se o parâmetro vale θ e a estimativa dada vale a .

Aula 4: Estimadores de Bayes e EMV

Definição 16 (Estimador de Bayes) Considere a perda esperada a posteriori:

$$E_{\theta|x}[L(\theta, a)] = E[L(\theta, a) | x] = \int_{\Omega} L(\theta, a) \xi(\theta | x) d\theta \quad (8)$$

Dizemos que δ^* é um **estimador de Bayes** se, para toda realização $X = x$,

$$E[L(\theta, \delta^*(x)) | x] = \min_{a \in A} E[L(\theta, a) | x]. \quad (9)$$

Em outras palavras, um estimador de Bayes é uma função real dos dados que minimiza a perda esperada com respeito à posteriori dos parâmetros.

¹p.d.f. - "probability density function" ou função de densidade de probabilidade

Teorema 3 (δ^* sob perda quadrática) *Seja θ um parâmetro tomando valores reais. Sob perda quadrática,*

$$\delta^*(x) = E[\theta | X = x] = \int_{\Omega} \theta \xi(\theta | x) d\theta \quad (10)$$

Teorema 4 (δ^* sob perda absoluta) *Suponha que a função de perda é dada por*

$$L(\theta, \delta^*) = |\theta - \delta^*|. \quad (11)$$

*Dizemos que a função de perda é **absoluta**. Seja θ um parâmetro tomando valores na reta. Sob perda absoluta, $\delta^*(x)$ é a **mediana a posteriori**, isto é,*

$$\int_{-\infty}^{\delta^*(x)} \xi(\theta | x) d\theta = \frac{1}{2} \quad (12)$$

Definição 17 (Estimador consistente) *Seja $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n$ uma sequência de estimadores de θ . Se quando $n \rightarrow \infty$ a sequência convergente para θ , dizemos que esta é uma **sequência consistente de estimadores**.*

Definição 18 (Estimador de máxima verossimilhança) *Para cada possível vetor (de observações) x , seja $\delta(x) \in \Omega$ um valor de $\theta \in \Omega$ de modo que a função de verossimilhança, $L(\theta) \propto f(x | \theta)$ ², atinge o máximo. Dizemos que $\hat{\theta} = \delta(\mathbf{X})$ é o **estimador de máxima verossimilhança** de θ (Fisher, 1922)³. Quando observamos $\mathbf{X} = x$, dizemos que $\delta(x)$ é uma estimativa de θ . Dito de outra forma:*

$$\max_{\theta \in \Omega} f(\mathbf{X} | \theta) = f(\mathbf{X} | \hat{\theta}). \quad (13)$$

Famílias Conjugadas

Se X_1, \dots, X_n são iid e seguem a distribuição da coluna “Dados” na tabela 1.

Notações: $\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$; $y = \sum_{i=1}^n x_i$

Dados	Priori	Posteriori
Bernoulli(θ)	Beta(α, β)	Beta($\alpha + y, \beta + n - y$)
Poisson(θ)	Gama(α, β)	Gama($\alpha + y, \beta + n$)
Normal(μ, σ^2)	Normal(μ_0, v_0^2)	Normal($\frac{\sigma^2 \mu_0 + n v_0^2 \bar{x}_n}{\sigma^2 + n v_0^2}, \frac{\sigma^2 v_0^2}{\sigma^2 + n v_0^2}$)
Exp(θ)	Gama(α, β)	Gama($\alpha + n, \beta + y$)

Table 1: Famílias Conjugadas

Aula 5: EMV

Teorema 5 (Invariância do EMV) *Considere uma função $\phi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Se $\hat{\theta}$ é um EMV para θ , então $\phi(\hat{\theta})$ é um EMV para $\omega = \phi(\theta)$.*

Teorema 6 (Consistência do EMV) *Defina $l(\theta) := \log f_n(x | \theta)$ e assumamos que $X_1, \dots, X_n \sim f(\theta_0)$, isto é, que θ_0 é o valor verdadeiro do parâmetro. Denote $E_{\theta_0}[g] := \int_{\mathcal{X}} g(x, \theta_0) f(x | \theta_0) dx$. Suponha que*

- $f(x_i | \theta)$ tem o mesmo suporte;
- θ_0 é o ponto inferior de Ω ;

² \propto - é um operador matemático binário que indica que o valor esquerdo é proporcional ao valor direito.

³Ronald Aylmer Fisher (1890-1962), biólogo e estatístico inglês.

- $I(\theta)$ é diferenciável;
- $\hat{\theta}_{EMV}$ é única solução de $I'(\theta) = 0$.

Então

$$\hat{\theta}_{EMV} \rightarrow \theta$$

Aula 6: Método dos momentos e suficiência

Definição 19 (Método dos momentos) Suponha que X_1, \dots, X_n formam uma sequência aleatória com distribuição conjunta $f_n(X_1, \dots, X_n | \theta), \theta \in \Omega \subseteq \mathbb{R}^k$ e que o k -ésimo momento existe. Defina $\mu_j(\theta) = E[X_1^j | \theta]$ e suponha que $\mu: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ é biunívoca, de modo que sua inversa é

$$\theta = M(\mu_1(\theta), \dots, \mu_k(\theta)).$$

Dados os momentos amostrais $m_j := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^j, j = 1, \dots, k$ o **estimador de momentos (EMM)** de θ é

$$\hat{\theta}_{EMM} = M(m_1, \dots, m_k).$$

Teorema 7 (Consistência do EMM) Suponha que X_1, \dots, X_n formam uma amostra aleatória com distribuição conjunta $f_n(X_1, \dots, X_n | \theta), \theta \in \Omega \subseteq \mathbb{R}^k$ e que o k -ésimo momento existe. Suponha que a inversa M existe e é contínua. Então o EMM é **consistente** para θ .

Definição 20 (Estatística suficiente) Seja X_1, \dots, X_n uma amostra aleatória de uma distribuição indexada pelo parâmetro θ . Seja $T = r(X_1, \dots, X_n)$ uma estatística. Dizemos que T é uma **estatística suficiente** para θ se e somente se

$$f(X_1, \dots, X_n | T = t, \theta) = f(X_1, \dots, X_n | T = t, \theta'), \forall \theta, \theta' \in \Omega, \quad (14)$$

isto é, se a distribuição condicional da amostra dado o valor da estatística não depende de θ .

Definição 21 (Aleatorização auxiliar) Suponha que T é suficiente para θ . O processo de simular X'_1, \dots, X'_n dado que $T = r(X_1, \dots, X_n)$ de modo que

$$f(X_1, \dots, X_n | \theta) = f(X'_1, \dots, X'_n | \theta), \forall \theta \in \Omega, \quad (15)$$

é chamado de **aleatorização auxiliar** (em inglês, *auxiliary randomisation*).

Teorema 8 (Teorema de fatorização) Suponha que X_1, \dots, X_n perfazem uma amostra aleatória com f.d.p./f.m.p.f. $f(x | \theta), \theta \in \Omega$. Uma estatística $T = r(X_1, \dots, X_n)$ é suficiente para θ se, e somente se, para todo $x \in \mathcal{X}$ e $\theta \in \Omega$ existem u e v não negativos tal que

$$f_n(x | \theta) = u(x)v[r(x), \theta]. \quad (16)$$

Definição 22 (Suficiência conjunta) Dizemos que um conjunto de estatísticas $T = \{T_1, \dots, T_n\}$ é **suficiente** (conjuntamente) se que a distribuição condicional conjunta de X_1, \dots, X_n dado $T_1 = t_1, \dots, T_n = t_n$ não dependentes de θ .

Aula 7: Suficiência conjunta e mínima, teorema de Rao-Blackwell

Definição 23 (Estatísticas de ordem) Seja $\mathbf{X} = X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória. Dizemos que Y_1, \dots, Y_n são **estatísticas de ordem** se Y_1 é o menor valor de \mathbf{X} , Y_2 é o segundo menor valor e assim sucessivamente.

Teorema 9 (Estatísticas de ordem são suficientes conjuntas) Seja X_1, \dots, X_n uma amostra aleatória com f.d.p./f.m.p. $f(x | \theta)$. As estatísticas de ordem Y_1, \dots, Y_n são suficientes conjuntas para θ .

Definição 24 (Suficiência mínima) Uma estatística \mathbf{T} é dita **mínima suficiente** se \mathbf{T} é suficiente e é função de qualquer outra estatística suficiente. Um vetor $\mathbf{T} = \{T_1, \dots, T_n\}$ é dito **minimamente suficiente conjunto** se é função de qualquer outro valor de estatísticas suficientes conjuntas.

Teorema 10 (EMV e Bayes são suficientes) Se a função de verossimilhança admite fatorização pelo Teorema 8, os estimadores de Bayes e de máxima verossimilhança são estatísticas minimamente suficientes.

Definição 25 (Notação conveniente) É conveniente definir que para $g : \mathcal{X}^n \rightarrow \mathbb{R}$, escrevemos

$$E_\theta[g] = \int_{\mathcal{X}} \cdots \int_{\mathcal{X}} g(\mathbf{x}) f_n(\mathbf{x} | \theta) d\mathbf{x}_1 \cdots d\mathbf{x}_n = \int_{\mathcal{X}} g(\mathbf{x}) f_n(\mathbf{x} | \theta) d\mathbf{x} \quad (17)$$

Definição 26 (Erro quadrático médio)

$$R(\theta, \delta) := E_\theta [\{\delta(\mathbf{X}) - \theta\}^2]. \quad (18)$$

Definição 27 (Estimador condicionado)

$$\delta_0(\mathbf{T}) := E_\theta [\delta(\mathbf{X}) | \mathbf{T}]. \quad (19)$$

Teorema 11 (Teorema de Rao-Blackwell) Seja $\delta(\mathbf{X})$ um estimador, \mathbf{T} uma estatística suficiente para θ e seja $\delta_0(\mathbf{T})$ como na Definição 27. Então vale que

$$R(\theta, \delta_0) \leq R(\theta, \delta)$$

Além disso, se $R(\theta, \delta) < \infty$ e $\delta(\mathbf{X})$ não é função de \mathbf{T} , vale a desigualdade estrita:

$$R(\theta, \delta_0) < R(\theta, \delta)$$

Aula 8: Admissibilidade e vies

Definição 28 (Admissibilidade) Um estimador δ é dito **inadmissível** se existe outro estimador δ_0 tal que $R(\theta, \delta_0) \leq R(\theta, \delta), \forall \theta \in \Omega$ e existe $\theta' \in \Omega$ tal que $R(\theta', \delta_0) < R(\theta', \delta)$. Nesse caso, dizemos que δ_0 domina δ . O estimador δ_0 é **admissível** se (e somente se) não há nenhum estimador que o domine.

Definição 29 (Estimador não-viesado) Um estimador $\delta(\mathbf{X})$ de uma função $g(\theta)$ é dito **não-viesado** se $E_\theta[\delta(\mathbf{X})] = g(\theta), \forall \theta \in \Omega$. Um estimador que não atende a essa condição é dito **viesado**. E o **vies** de δ é definido como $B_\delta(\theta) := E_\theta[\delta(\mathbf{X})] - g(\theta)$.

Teorema 12 (Estimador não-viesado da variância) Seja $\mathbf{X} = \{X_1, \dots, X_n\}$ uma amostra aleatória, com $E[X_1] = m$ e $\text{Var}(X_1) = v < \infty$. Então

$$\delta_1(\mathbf{X}) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$

é um estimador não-viesado de v .

Aula 9: Eficiência

Definição 30 (Informação de Fisher) Seja X uma variável aleatória com f.d.p./f.m.p. $f(x | \theta)$, $\theta \in \Omega \subseteq \mathbb{R}$. Suponha que $f(x | \theta)$ é duas vezes diferenciável com respeito a θ . Defina $\lambda(x | \theta) = \log f(x | \theta)$ e

$$\lambda'(x | \theta) = \frac{\partial \lambda(x | \theta)}{\partial \theta} \quad \text{e} \quad \lambda''(x | \theta) = \frac{\partial^2 \lambda(x | \theta)}{\partial \theta^2} \quad (20)$$

Definimos a **informação de Fisher** como

$$I(\theta) = E_{\theta} [\{\lambda'(x | \theta)\}^2] \stackrel{(1)}{=} -E_{\theta} [\lambda''(x | \theta)] = \text{Var}_{\theta} (\lambda'(x | \theta)). \quad (21)$$

Teorema 13 (Informação de Fisher em uma amostra aleatória) Seja $\mathbf{X} = \{X_1, \dots, X_n\}$ uma amostra aleatória e seja $I_n = E_{\theta}[-\lambda''_n(\mathbf{X} | \theta)]$ a **informação de Fisher** da amostra. Então

$$I_n(\theta) = nI(\theta)$$

Teorema 14 (Teorema de Cramér-Rao) Seja $\mathbf{X} = \{X_1, \dots, X_n\}$ uma amostra aleatória, onde f.d.p./f.m.p. tem as mesmas premissas da Definição 30. Supondo que $T = r(\mathbf{X})$ é uma estatística com variância finita. Seja $m(\theta) = E_{\theta}(T)$ uma função diferenciável de θ . Então,

$$\text{Var}_{\theta}(T) \geq \frac{[m'(\theta)]^2}{nI(\theta)}, \quad (22)$$

com igualdade apenas se existem u e v tal que

$$T = u(\theta)\lambda'_n(\mathbf{X} | \theta) + v(\theta).$$

Definição 31 (Estimador eficiente) Um estimador $\delta(\mathbf{X})$ é dito **eficiente** de (sua esperança) $m(\theta)$ se

$$\text{Var}_{\theta}(\delta) = \frac{[m'(\theta)]^2}{nI(\theta)}.$$

Aula 10: Distribuição de uma estatística amostral e qui-quadrado

Definição 32 (Distribuição qui-quadrado) Dizemos que uma variável aleatória Y tem distribuição **qui-quadrado** com m graus de liberdade quando

$$f_Y(y) = \frac{1}{2^{m/2}\Gamma(m/2)} y^{m/2-1} e^{-y/2}, y > 0 \quad (23)$$

Vemos que Y tem função geradora de momentos:

$$\psi(t) = \left(\frac{1}{1-2t} \right)^{m/2}, t < 1/2.$$

Teorema 15 (Soma de variáveis aleatórias qui-quadrado) Se X_1, \dots, X_n são variáveis aleatórias independentes com graus de liberdade m_i , então $W = \sum_{i=1}^n X_i$ tem distribuição qui-quadrado com graus de liberdade $m = \sum_{i=1}^n m_i$.

Teorema 16 (Distribuição do quadrado de uma variável aleatória Normal padrão) Se

$$X \sim \text{Normal}(0, 1), Y = X^2$$

então, tem distribuição qui-quadrado com $m = 1$.

Aula 11: Distribuição da média e variância amostrais

Teorema 17 (Independência da média e variância amostrais na Normal) Seja X_1, \dots, X_n uma amostra aleatória de uma distribuição Normal com parâmetros μ e σ^2 , \bar{X}_n e a variância amostral \bar{S}_n^2 , são independentes. Ademais, $\bar{X}_n \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ e $\bar{S}_n^2 \sim \text{Gama}(\frac{n-1}{2}, \frac{n}{2n^2})$

Aula 12: Distribuição t de Student e intervalos de confiança

Definição 33 (A distribuição t de Student) Tome, $Y \sim \text{Qui-quadrado}(m)$ e $Z \sim \text{Normal}(0, 1)$ e defina a variável aleatória

$$X = \frac{Z}{\sqrt{\frac{Y}{m}}}.$$

Dizemos que X tem distribuição **t de Student com m graus de liberdade**. E sabemos que

$$f_X = \frac{\Gamma(\frac{m+1}{2})}{\sqrt{m\pi}\Gamma(\frac{m}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{m}\right)^{-\frac{m+1}{2}}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

Teorema 18 (Distribuição amostral do estimador não-viesado da variância) Considere o estimador

$$\hat{\sigma}' = \sqrt{\frac{\Delta^2}{n-1}},$$

onde $\Delta^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$. Então, vale que

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\hat{\sigma}'} \sim \text{Student}(n-1)$$

Teorema 19 (Intervalo de confiança) Seja $\mathbf{X} = \{X_1, \dots, X_n\}$ uma amostra aleatória, onde cada uma tem p.d.f. $f(x | \theta)$, e considere uma função real $g(\theta)$. Sejam $A(\mathbf{X})$ e $B(\mathbf{X})$ duas estatísticas de modo de valha

$$P(A(\mathbf{X}) < g(\theta) < B(\mathbf{X})) \geq \gamma. \quad (24)$$

Dizemos que $I(\mathbf{X}) = (A(\mathbf{X}), B(\mathbf{X}))$ é um **intervalo de confiança** de $100\gamma\%$ para $g(\theta)$. Se a desigualdade for uma igualdade para todo $\theta \in \Omega$, dizemos que o intervalo é **exato**.

Aula 13: Intervalos de confiança e Quantidades Pivotalis

Definição 34 (Intervalo de confiança unilateral) Seja $\mathbf{X} = \{X_1, \dots, X_n\}$ uma amostra aleatória, onde cada uma tem p.d.f. $f(x | \theta)$, e considere uma função real $g(\theta)$. Seja $A(\mathbf{X})$ uma estatística que

$$P(A(\mathbf{X}) < g(\theta)) \geq \gamma, \quad \forall \theta \in \Omega$$

dizemos que o intervalo aleatório $(A(\mathbf{X}), \infty)$ é chamado de intervalo de confiança **unilateral** de $100\gamma\%$ para $g(\theta)$ (ou ainda, de intervalo de confiança **inferior** de $100\gamma\%$ para $g(\theta)$). O intervalo $(-\infty, B(\mathbf{X}))$, com

$$P(g(\theta) < B(\mathbf{X})) \geq \gamma, \quad \forall \theta \in \Omega$$

é definido de forma análoga, e é chamado de intervalo de confiança **superior** de $100\gamma\%$ para $g(\theta)$. Se a desigualdade é uma igualdade para todo $\theta \in \Omega$, os intervalos são chamados **exatos**.

Definição 35 (Quantidade pivotal) Seja $\mathbf{X} = \{X_1, \dots, X_n\}$ uma amostra aleatória com p.d.f. $f(x | \theta)$. Seja $V(\mathbf{X}, \theta)$ uma variável aleatória cuja distribuição é a mesma para todo $\theta \in \Omega$. Dizemos que $V(\mathbf{X}, \theta)$ é uma **quantidade pivotal**.

Teorema 20 (Intervalo de confiança unilateral) Seja $\mathbf{X} = \{X_1, \dots, X_n\}$ uma amostra aleatória com p.d.f. $f(x | \theta)$. Suponha que existe uma quantidade pivotal V , com c.d.f.⁴ continua G . Assuma que existe $r(v, \mathbf{x})$ estritamente crescente em $v \forall \mathbf{x}$. Finalmente, tome $0 < \gamma < 1$ e $\gamma_1 < \gamma_2$ de modo que $\gamma_2 - \gamma_1 = \gamma$. Então as estatísticas

$$A(\mathbf{X}) = r(G^{-1}(\gamma_1), \mathbf{X}),$$

$$B(\mathbf{X}) = r(G^{-1}(\gamma_2), \mathbf{X}),$$

são os limites de um intervalo de confiança de $100\gamma\%$ para $g(\theta)$.

Aula 14: Testes de hipótese Part I

Definição 36 (Hipótese nula e hipótese alternativa) Considere o espaço de parâmetros Ω e defina $\Omega_0, \Omega_1 \subset \Omega$ de modo que $\Omega_0 \cup \Omega_1 = \Omega$ e $\Omega_0 \cap \Omega_1 = \emptyset$. Definimos

$$H_0 := \theta \in \Omega_0$$

$$H_1 := \theta \in \Omega_1$$

E dizemos que H_0 é a **hipótese nula** e H_1 é a **hipótese alternativa**. Se $\theta \in \Omega_1$, então dizemos que rejeitamos a hipótese nula. Por outro lado, se $\theta \in \Omega_0$, então dizemos que não rejeitamos ou falhamos em rejeitar H_0 .

Definição 37 (Hipótese simples e hipótese composta) Dizemos que uma hipótese H_i , é **simples**, se $\Omega_i = \{\theta_i\}$, isto é, se a partição correspondente é um único ponto. Uma hipótese é dita **composta** se não é simples.

Definição 38 (Hipótese unilateral e hipótese bilateral) Uma hipótese da forma $H_0 : \theta \leq \theta_0$ é dita **unilateral** (“one-sided”), enquanto hipóteses da forma $H_0 : \theta \neq \theta_0$ são ditas **bilaterais** (“two-sided”).

Aula 15: Testes de hipótese Part II

Definição 39 (Região crítica) O conjunto

$$S_1 := \{\mathbf{x} : |\bar{X}_n - \mu_0| \geq c\}$$

é chamado de **região crítica** do teste.

Definição 40 (Região de rejeição) Se $R \subseteq \mathbb{R}$ é tal que “rejeitamos H_0 se $T \in R$ ”, então R é chamada uma **região de rejeição** para a estatística T e o teste associado.

Definição 41 (Função poder) Seja δ um procedimento de aceitação/rejeição como visto anteriormente. A **função poder** é definida como

$$\pi(\theta | \delta) := P(\mathbf{X} \in S_1 | \theta) = P(T \in R | \theta), \theta \in \Omega \quad (25)$$

⁴c.d.f. - cumulative distribution function

Definição 42 (Tipos de erros) *Tipos de erros que podem ser cometidos*

Nome	Erro cometido
Erro tipo I	Rejeitar H_0 quando ela é verdadeira .
Erro tipo II	Falhar em rejeitar H_0 quando ela é falsa .

Definição 43 (Tamanho/nível de um teste) *Dizemos que um teste, δ , tem **tamanho** ou **nível de significância** $\alpha(\delta)$, com*

$$\alpha(\delta) := \sup_{\theta \in \Omega_0} \pi(\theta \mid \delta).$$

Aula 16: Testes de hipótese Part III

Definição 44 (O p-valor) *Para cada t , seja δ_t o teste que rejeita H_0 se $T \geq t$. Então, quando $T = t$, o **p-valor** vale*

$$p(t) := \sup_{\theta \in \Omega_0} \pi(\theta \mid \delta_t) = \sup_{\theta \in \Omega_0} P(T \geq t \mid \theta) \quad (26)$$

*ou seja, o **p-valor** é o tamanho do teste δ_t .*

Aula 17: Testes e conjuntos de confiança

Definição 45 (Intervalos de confiança e testes são equivalentes) *Suponha que dispomos de dados $\mathbf{X} = \{X_1, \dots, X_n\}$ com f.d.p. comum $f(x \mid \theta)$, e estamos interessados em testar as hipóteses:*

$$H_0 : g(\theta) = g_0,$$

$$H_1 : g(\theta) \neq g_0,$$

de modo que existe um teste δ_{g_0} com nível α_0 destas hipóteses. Para cada $\mathbf{X} = \mathbf{x}$, defina

$$w(\mathbf{x}) = \{g_0 : \delta_{g_0} \text{ não rejeita } H_0 \text{ dado que } \mathbf{X} = \mathbf{x}\}.$$

Fazendo o nível de confiança do intervalo $\gamma = 1 - \alpha_0$, temos

$$P(g(\theta_0) \in w(\mathbf{X}) \mid \theta = \theta_0) \geq \gamma, \quad \forall \theta_0 \in \Omega.$$

Definição 46 (Conjunto de confiança) *Se um conjunto aleatório $w(\mathbf{X})$ satisfaz*

$$P(g(\theta_0) \in w(\mathbf{X}) \mid \theta = \theta_0) \geq \gamma,$$

*para todo $\theta_0 \in \Omega$, então chamamos $w(\mathbf{X})$ de um **conjunto de confiança** para $g(\theta)$.*

Teorema 21 (Testando hipóteses a partir de conjuntos de confiança) *Suponha que dispomos de dados $\mathbf{X} = \{X_1, \dots, X_n\}$ com f.d.p. comum $f(x \mid \theta)$ e que $w(\mathbf{X})$ é um conjunto de confiança para uma função de interesse $g(\theta)$. Então para todo valor g_0 existe um teste δ_{g_0} , de nível α_0 que rejeita $H_0 : g(\theta) = g_0$ se e somente se $g(\theta_0) = g_0 \notin w(\mathbf{X})$.*

Teorema 22 (Teste de razão de verossimilhanças) *A estatística*

$$\Lambda(\mathbf{x}) = \frac{\sup_{\theta \in \Omega_0} f_n(\mathbf{x} \mid \theta)}{\sup_{\theta \in \Omega} f_n(\mathbf{x} \mid \theta)}$$

*é chamada um **estatística de razão de verossimilhanças**. Um teste de razão de verossimilhanças, δ_k , é um teste que rejeita H_0 se $\Lambda(\mathbf{x}) \leq k$ para uma constante k .*

Teorema 23 (Teorema de Wilks) *Suponha que temos um espaço de parâmetros com k coordenadas, $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_n)$ e desejamos testar a hipótese (simples) da forma*

$$H_0 : \theta_j = \theta_0^j, \quad j = 1, \dots, k,$$

$$H_1 : \theta_j \neq \theta_0^j, \quad j = 1, \dots, k.$$

Então, sob condições de regularidade, temos que, à medida que $n \rightarrow \infty$,

$$-2 \log \Lambda(\mathbf{x}) \xrightarrow{d} X^2(k)$$