Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

La categoría de Conjuntos como subcategoría de la categoría de Espacios

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

Matemático

P R E S E N T A :

Andrés Esteban Escudero Robles

TUTOR

Grado y nombre

Facultad de Ciencias
UNAM

2026

Capítulo 1

Introducción

El objetivo del presente trabajo es examinar, explicar y unir los resultados de [McL87], [McL88] en donde Colin Mclarty muestra como puedes recuperar una categoría de conjuntos, entendida como un topos que satisface los axiomas de Lawvere [Law64], a partir de una categoría de espacios suaves y mapas diferenciables, de manera que los conjuntos quedan definidos como colecciones de puntos de los espacios. La categoria de espacios que describe Mclarty es también un topos, al cual llamaremos Espacios, que obedece los axiomas básicos de la geometría diferencial sintética (GDS). Aunque todo topos tiene una "teoría de conjuntos interna" [Joh14], lo interesante de Espacios es que tanto si nos restringimos a espacios donde la ley del tercero excluido (LTE) sea válida, como si forzamos LTE en todos los espacios pasando a las gavillas doble negación, en ambos casos obtenemos categorias de conjuntos, que resultan ser equivalentes. Con la formalización de Espacios podemos (1) Argumentar que la diferencia entre espacios y conjuntos depende enteramente de LTE (2) Considerar a la teoría de conjuntos como un caso degenerado o discreto de la geometría y (3) Explicar por qué la teoría de conjuntos surgió del cálculo, gracias a la insistencia de figuras como Cantor y Dedekind de adoptar la LTE como un principio fundamental de las matemáticas.

Con el propósito de entender mejor al topos Espacios presentaremos algunos de los resultados fundacionales del cálculo usando el lenguaje de la GDS. La idea detrás de la GDS es formalizar el uso de infinitesimales en cálculo, análisis y en geometría diferencial. Esta perspectiva es atractiva pues hace que las demostraciones sean más directas e intuitivas. Recordemos además que fue a través del uso de los infinitesimales que se descubrieron todos los resultados principales del cálculo [Dun18] e incluso hoy en día ingenieros y físicos siguen usando a los infinitesimales a un nivel intuitivo o pedagógico.

1.1. Infinitesimales y la ley del tercero excluido

Historicamente el uso de infinitesimales ha sido controversial, incluso en los orígenes del cálculo. Ciertamente, si uno ve los argumentos de Newton y Leibniz, pareciera haber una contradicción en que al principio del análisis se considera una cantidad d distinta de 0, pero en el último paso de repente se trata a d como si fuese 0 para poder llegar a la conclusión [Dun18]. Si $d = 0$, el argumento no puede empezar y si $d \neq 0$, el argumento no puede terminar. Para que esta observación sea realmente un problema necesitamos que, para todo número d, $(d = 0) \vee (d \neq 0)$, sea verdadero, pero dicha afirmación es una aplicación de la LTE. Por tanto, para intentar trabajar con infinitesimales una posibilidad es asumir una lógica constructivista.

Análisis no estandar.

1.2. Categorias Cartesianas Cerrrada y la Física Continua

Lawvere en múltiples publicaciones insiste que el lugar "correcto" para desarrollar a la física continua es una categoria cartesiana cerrada [Law79] [Law97] [LS06]. Para Lawvere, el lenguaje en el que se exprese la física continua debe incluir objetos T y E ha ser pensados como el tiempo y el espacio respectivamente, además cualquier cuerpo o colección de cuerpos debe de poderse pensar como un objeto B. Luego, quisieramos un morfismo $T \times B \to E$ que asocia cada momento y parte del cuerpo con su posición en el espacio en tal momento, para hablar del movimiento. También queremos un morfismo $B \to E^T$ que mande cada parte del cuerpo a su trayectoria a través del tiempo, de manera que E^T, el espacio de todas las trayectorias es independiente de cualquier cuerpo específico. Hay una tercera manera de considerar al moviento, $T \to E^B$ que en cada instante representa la colocación del cuerpo en el espacio y de nuevo, E^B, el espacio de todas las posibles colocaciones de B en el espacio, es independiente del tiempo. Introduciendo más objetos y morfismos uno puede definir distancias, velocidad, morfismos que le asignan a cada colocación la posición de su centro de masa y mucho más [Law80]. Con estas consideraciones parece razonable pensar que las categorias cartesianas cerradas dan una buena fundación para la física continua.

Lo interesante de las categorias cartesianas cerradas, al contantar con objetos exponenciales, en muchos contextos estan automáticamente lidiando y haciendo que espacios infinito-dimensionales formen parte de la misma teoría que espacios de dimension finita, situación deseable, por ejemplo, en cálculo de variaciones donde uno quiere aplicar los teoremas de optimización, pero en espacios de funciones. Sin embargo, ni en la categoria de espacios topológicos ni en la categoria de variedades, podemos afirmar que siempre exista el objeto exponencial de dos objetos. De algún modo, Espacios esta forzando que los espacios de funciones sean espacios suaves sin que nosotros nos preocupemos por darle una topología. [citas]

Capítulo 2

Geometría Diferencial Sintética

En esta sección usaremos los axiomas que expone Mclarty [McL88], empezando por (GDS_1): Existe un espacio, R, que cuenta con una estructura de anillo conmutativo con unidad. (GDS_2): El anillo R no es trivial $(1 \neq 0)$. (GDS_3): En la lógica interna de R, R es un campo. Y el axioma de Kock-Lawvere [Law79], (GDS_4): $(\forall f \in R^D)(\exists! b \in R)(\forall d \in D)(f(d) = f(0) + d \cdot b)$, donde $D = \{d \in R : d^2 = 0\}$ o el igualador del mapa constante 0 y el mapa $(-)^2$, un espacio de infinitesimales. Intuitivamente, (GDS_4) dice que toda función de D a R es lineal con pendiente única. Estos cuatro axiomas ya nos permiten hacer cálculo básico, pero primero:

2.1. Proprosición catastrófica

$(d \neq 0) \wedge \neg(d \neq 0)$
R puede ser un campo

2.2. Infinitesimales y Microcancelación

Si resulta que $(\forall d \in D)(d \cdot r = d \cdot s)$ con $r, s \in R$, podemos concluir $r = s$. Demostración: Definimos $f : D \to R$ como $f(d) = d \cdot r = d \cdot s$, luego, por (GDS_4), $f(d) = f(0) + d \cdot b$ donde $f(0) = 0 \cdot r = 0$, entonces $d \cdot b = d \cdot r = d \cdot s$ con b única. Por lo tanto, $r = b = s$.

Si $r \in R$ y $d \in D$, entonces $d \cdot r \in D$, porque $(d \cdot r)^2 = d^2 \cdot r^2 = 0 \cdot r^2 = 0$

2.3. La derivada y reglas básicas

Sea $f : R \to R$, consideramos a $g : D \to R$ tal que $g(d) = f(a + d)$ para alguna $a \in R$ fija. Por (GDS_4), $f(a+d) = g(d) = g(0)+d \cdot b$, pero $g(0) = f(a+0) = f(a)$, entonces $f(a+d) = f(a)+d \cdot b$ y definimos a b como la derivada de f en a, $f'(a)$. Dado que a era arbitrario, en realidad definimos a una función $f' : R \to R$, la derivada de f, que puede volver a ser diferenciada con el mismo procedimiento. Concluimos que todas las funciones de R en R son suaves.

Sean $f : R \to R, g : R \to R, a, c \in R$ y $d \in D$. $(f+g)(a+d) = f(a)+g(a)+d \cdot (f+g)'(a)$ por definición de derivada, pero también $(f+g)(a+d) = f(a+d)+g(a+d) = f(a)+d \cdot f'(a)+g(a)+d \cdot g'(a)$. Cancelando términos comunes obtenemos $d \cdot (f + g)'(a) = d \cdot [f'(a) + g'(a)]$ y por microcan-

celación, $(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a)$ con a cualquiera, entonces $(f+g)' = f' + g'$.

$$(c \cdot f)(a+d) = c \cdot f(a) + d \cdot (c \cdot f)'(a) \tag{2.1}$$
$$f(a+d) = f(a) + d \cdot f'(a) \tag{2.2}$$
$$c \cdot f(a+d) = c \cdot f(a) + c \cdot d \cdot f'(a) \tag{2.3}$$
$$d \cdot [c \cdot f'(a)] = d \cdot (c \cdot f)'(a) \tag{2.4}$$
$$(c \cdot f)'(a) = c \cdot f'(a) \tag{2.5}$$
$$(c \cdot f)' = c \cdot f' \tag{2.6}$$

$$\mathrm{id}(a+d) = \mathrm{id}(a) + d \cdot \mathrm{id}'(a) \tag{2.7}$$
$$a + d = a + d \cdot \mathrm{id}'(a) \tag{2.8}$$
$$d \cdot 1 = d \cdot \mathrm{id}'(a) \tag{2.9}$$
$$\mathrm{id}'(a) = 1 \tag{2.10}$$
$$\mathrm{id}' = 1 \tag{2.11}$$
$$\tag{2.12}$$

$$c(a+d) = c(a) + d \cdot c'(a) \tag{2.13}$$
$$c = c + d \cdot c'(a) \tag{2.14}$$
$$d \cdot 0 = d \cdot c'(a) \tag{2.15}$$
$$c'(a) = 0 \tag{2.16}$$
$$c' = 0 \tag{2.17}$$
$$\tag{2.18}$$

$$(f \circ g)(a+d) = f(g(a)) + d \cdot (f \circ g)'(a) \tag{2.19}$$
$$(f \circ g)(a+d) = f(g(a) + d \cdot g'(a)) \tag{2.20}$$
$$(f \circ g)(a+d) = f(g(a)) + [d \cdot g'(a)] \cdot f'(g(a)) \tag{2.21}$$
$$d \cdot (f \circ g)'(a) = d \cdot [f'(g(a)) \cdot g'(a)] \tag{2.22}$$
$$(f \circ g)' = (f' \circ g) \cdot g' \tag{2.23}$$
$$\tag{2.24}$$

$$(f \cdot g)(a+d) = f(a) \cdot g(a) + d \cdot (f \cdot g)'(a) \tag{2.25}$$
$$(f \cdot g)(a+d) = f(a+d) \cdot g(a+d) \tag{2.26}$$
$$(f \cdot g)(a+d) = [f(a) + d \cdot f'(a)] \cdot [g(a) + d \cdot g'(a)] \tag{2.27}$$
$$(f \cdot g)(a+d) = f(a) \cdot g(a) + d \cdot [f'(a) \cdot g(a) + g'(a) \cdot f(a)] + d^2 \cdot f'(a) \cdot g'(a) \tag{2.28}$$
$$d \cdot (f \cdot g)'(a) = d \cdot [f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a)] \tag{2.29}$$
$$(f \cdot g)' = f \cdot g + f \cdot g' \tag{2.30}$$

2.4. Ejemplos

Sea $f(x) = 5x^2 + 3$. En ese caso, $f(x+d) = 5(x^2 + 2xd + d^2) + 3 = 5x^2 + 3 + df'(x)$, entonces $d \cdot 10x = d \cdot f'(x)$. Por tanto, $f'(x) = 10x$.

Bibliografía

[Dun18] W. Dunham. *The calculus gallery: Masterpieces from Newton to Lebesgue*. Princeton University Press, 2018.

[Joh14] P. T. Johnstone. *Topos theory*. Courier Corporation, 2014.

[Koc06] A. Kock. *Synthetic differential geometry*. Vol. 333. Cambridge University Press, 2006.

[Lav13] R. Lavendhomme. *Basic concepts of synthetic differential geometry*. Vol. 13. Springer Science & Business Media, 2013.

[Law64] F. W. Lawvere. "An elementary theory of the category of sets". En: *Proceedings of the national academy of sciences* 52.6 (1964), págs. 1506-1511.

[Law79] F. W. Lawvere. "Categorical dynamics". En: *Topos theoretic methods in geometry* 30 (1979), págs. 1-28.

[Law80] F. W. Lawvere. "Toward the description in a smooth topos of the dynamically possible motions and deformations of a continuous body". En: *Cahiers de topologie et géométrie différentielle* 21.4 (1980), págs. 377-392.

[Law97] F. W. Lawvere. "Toposes of laws of motion". En: *American Mathematical Society, Transcript from video, Montreal-September* 27 (1997), pág. 1997.

[LS06] F. W. Lawvere y S. H. Schanuel. *Categories in continuum physics: Lectures given at a workshop held at SUNY, Buffalo 1982*. Springer, 2006.

[LS09] F. W. Lawvere y S. H. Schanuel. *Conceptual mathematics: a first introduction to categories*. Cambridge University Press, 2009.

[McL87] C. McLarty. "Elementary axioms for canonical points of toposes". En: *The Journal of Symbolic Logic* 52.1 (1987), págs. 202-204.

[McL88] C. McLarty. "Defining sets as sets of points of spaces". En: *Journal of Philosophical Logic* (1988), págs. 75-90.

[Rob74] A. Robinson. *Non-standard analysis*. Princeton University Press, 1974.

[Shu06] M. Shulman. "Synthetic Differential Geometry". En: *Chicago Pizza-Seminar*. 2006.