

a) Teniendo la ecuación diferencial ordinaria

$$\frac{d^2y}{dx^2} - R(x)y = S(x)$$

Expandiendo en series de Taylor se tiene que

$$y(x+h) = y(x) + hy'(x) + \frac{h^2}{2}y''(x) + \frac{h^3}{6}y'''(x) + \frac{h^4}{24}y^{IV}(x) + \frac{h^5}{5!}y^V(x) + \mathcal{O}(h^6)$$

$$y(x-h) = y(x) - hy'(x) + \frac{h^2}{2}y''(x) - \frac{h^3}{6}y'''(x) + \frac{h^4}{24}y^{IV}(x) - \frac{h^5}{5!}y^V(x) + \mathcal{O}(h^6)$$

$$y(x+h) + y(x-h) = 2y(x) + h^2y''(x) + \frac{h^4}{12}y^{IV}(x) + \mathcal{O}(h^6)$$

$$y(x+h) - 2y(x) + y(x-h) = \left[y''(x) + \frac{h^2}{12}y^{IV}(x) \right] h^2 + \mathcal{O}(h^6)$$

$$y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1} = \left[y_n'' + \frac{h^2}{12}y_n^{IV} \right] h^2 + \mathcal{O}(h^6)$$

Fijémonos que la ecuación diferencial original se puede discretizar de modo que quede de la forma

$$y_n'' = \frac{y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}}{h^2} = R_n y_n + S_n$$

$$y_n^{IV} = \frac{y_{n+1}'' - 2y_n'' + y_{n-1}''}{h^2} = \frac{R_{n+1}y_{n+1} + S_{n+1} - 2(R_n y_n + S_n) + R_{n-1}y_{n-1} + S_{n-1}}{h^2}$$

$$y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1} = \left[R_n y_n + S_n + \frac{h^2}{12}y_n^{IV} \right] h^2 + \mathcal{O}(h^6)$$

$$\begin{aligned} y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1} &= \left[R_n y_n + S_n \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{12}(R_{n+1}y_{n+1} + S_{n+1} - 2(R_n y_n + S_n) + R_{n-1}y_{n-1} + S_{n-1}) \right] h^2 + \mathcal{O}(h^6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1} &= \left[\left(\frac{R_{n+1}}{12} \right) y_{n+1} + \left(R_n - \frac{1}{6}R_n \right) y_n + \left(\frac{1}{12}R_{n-1} \right) y_{n-1} + \frac{S_{n+1}}{12} + S_n - \frac{1}{6}S_n \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{12}S_{n-1} \right] h^2 + \mathcal{O}(h^6) \end{aligned}$$

Despejando se llega finalmente a:

$$\begin{aligned}
& \left(1 - \frac{h^2 R_{n+1}}{12}\right) y_{n+1} + \left(-2 - \frac{5h^2}{6} R_n\right) y_n + \left(1 - \frac{h^2}{12} R_{n-1}\right) y_{n-1} \\
&= \frac{h^2}{12} (S_{n+1} + 10S_n + S_{n-1}) + \mathcal{O}(h^6) \\
& \left(1 - \frac{h^2}{12} R_{n+1}\right) y_{n+1} - 2 \left(1 + \frac{5h^2}{12} R_n\right) y_n + \left(1 - \frac{h^2}{12} R_{n-1}\right) y_{n-1} \\
&= \frac{h^2}{12} (S_{n+1} + 10S_n + S_{n-1}) + \mathcal{O}(h^6)
\end{aligned}$$

b) Teniendo la ecuación de Schrödinger para el oscilador armónico cuántico

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi = E\psi$$

Comparando con $\frac{d^2y}{dx^2} - R(x)y = S(x)$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2} V(x)\psi = -\frac{2m}{\hbar^2} E\psi$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2} (V(x) - E)\psi$$

Se puede afirmar que

$$-\frac{2m}{\hbar^2} (E - V(x)) = R(x)$$

$$\frac{2m}{\hbar^2} \left(\frac{1}{2} m \omega^2 x^2 - E \right) = R_n$$

$$S_n = 0$$