

Reporte de Fichas para el usuario: edith gómez

Ficha ID: 56d5cb523c16479905cba8fa

Fecha de creación: 2016-03-01T17:03:16.172Z

annualCycles

annualCycleUnstructured:

habitats

0

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataFormat:

identifier:

habitatUnstructured: Común en pantanos de agua dulce, tierras inundadas y orillas de ríos, especialmente en regiones abiertas (Hilty & Brown 1986). En La Guajira se puede encontrar en hábitats acuáticos como ríos, lagunas, cuerpos de agua estacionales y bahías ribereñas (Cerrejón 2009-2010).

[commonNamesAtomized](#)

[ancillaryData](#)

usedBy:

usedIn

distributionUnstructured:

endDate:

startDate:

[ancillaryData](#)

type:

language: Inglés

name: Yellow-hooded Blackbird

creation_date: 2016-03-01T17:03:16.172Z

usesManagementAndConservation

[ancillaryData](#)

managementAndConservationUnstructured:

[managementAndConservationAtomized](#)

identificationKeys

fullDescription

0

dataObject:
additionalInformation:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:
fullDescriptionUnstructured: Los machos miden unos 18 cm, las hembras 16,5 cm aproximadamente. Tienen el pico cónico y agudo. Los machos son de color negro con capucha amarilla y bridas negras. Las hembras son de color oliva pardusco opaco en las partes dorsales estriado difusamente de negruzco; la región superciliar y la garganta son de color amarillo; el área facial y la coronilla amarillo sucio; el resto de las parte ventrales amarillo oliva, más pardusco en el abdomen (Hilty & Brown 1986). Se reconocen dos subespecies:
Chrysomus icterocephalus bogotensis (Chapman, 1914)
Chrysomus icterocephalus icterocephalus (Linnaeus, 1766)
briefDescription:

references

taxonRecordName

ancillaryData

providerSpecificData

anyTwo:
providerLink:

publicationStatus

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

replacementNameFor

microReference:
source:
datatype:

identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

sanctioned

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

laterHomonymOf

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

[conservedAgainst](#)

basedOn

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

basionym

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

[spellingCorrentionOf](#)

typeNameEntity

source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:

typificacion

typeOfType:

[lectotypeMicroReferenceVoucher](#)

[lectotypePublicationVoucher](#)

[voucherReference](#)

simple:
microReference:
year:

publishedIn

simple:
source:
datatype:
identifier:

specialAuthorship

[authors](#)

[year](#)

simple:
canonicalAuthorship

[authors](#)

[year](#)

simple:
simple: (Linnaeus, 1766)

canonicalName

infraspecificEpithet:
specificEpithet:
infragenericEpithet:
linkType:
ref:
uninomial:

simple: Chrysomus icterocephalus
rank: SPECIES
simple: Chrysomus icterocephalus (Linnaeus, 1766)

attributes

nomenclaturalCode:
isAnamorphic:
id:

[synonymsAtomized](#)

[ancillaryData](#)

synonymStatus:
synonymName
anyTwo:

[anyOne](#)

providerLink:
microReference:

publishedIn

source:
datatype:
identifier:

reletedName

source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:
microReference:

publishedIn

source:
datatype:
identifier:

reletedName

source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:
microReference:

publishedIn

source:
datatype:
identifier:

reletedName

source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:
microReference:

publishedIn

source:
datatype:
identifier:

reletedName

source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:
microReference:

publishedIn

source:
datatype:
identifier:

reletedName

source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:
microReference:

publishedIn

source:
datatype:
identifier:

reletedName

source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

typeNameEntity

source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:

identifier:

typeVoucherEntity

typeOfType:

simple:

microReference:

year:

source:

datatype:

identifier:

[combinationAuthorship](#)

basionymAuthorship

simple:

authorship

simple:

simple: (Linnaeus, 1766)

epithet

infraspecificEpithet:

specificEpithet:

infragenericEpithet:

genus

linkType:

ref:

uninomial:

simple: Agelaius icterocephalus

rank: SPECIES

simple: Agelaius icterocephalus (Linnaeus, 1766)

nomenclaturalCode:

isAnamorphic:

id:

[hierarchy](#)

[ancillaryData](#)

dataObject:

additionalInformation:

[reference](#)

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

[mediaURL](#)

description:

[subject](#)

source: The Catalogue of Life, 3rd January 2011

audience

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights:

license:

title:

modified: 2016-03-01T17:02:56.171Z

created: 2016-03-01T17:02:56.171Z

agent

homepage:

role:

email:

phone:

address:

position:

organisation:

lastName:

firstName:

contentType:

dataFormat:

identifier:

parentTaxon: Chrysomus

higherClassification:

infraspecificEpithet:

specificEpithet:

taxonRank: SPECIES

subGenus:

genus: Chrysomus

family: Icteridae

order: Passeriformes

classHierarchy: Aves

phylum: Chordata

kingdom: Animalia

recommended:

classification:

invasiveness

invasivenessUnstructured:

reproduction

reproductionUnstructured:

molecularData

molecularDataUnstructured:

migratory

migratoryUnstructured:

lifeForm

lifeFormUnstructured:

lifeCycle

lifeCycleUnstructured:

interactions

interactionsUnstructured:

feeding

0

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

data Type:

identifier:

feedingUnstructured: En La Guajira su dieta se compone de invertebrados (Cerrejón 2009-2010).

environmentalEnvelope

environmentalEnvelopeUnstructured:

ecologicalSignificance

ecologicalSignificanceUnstructured:

dispersal

dispersalUnstructured:

distance:

structureDispersed:

type:

purpose:

behavior

0

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:
mimeType:
dataType:
identifier:
behaviorUnstructured: Notablemente gregario aun en la época de reproducción y usualmente en pequeñas bandadas (Hilty & Brown 1986). El canto es elaborado (como gozne oxidado) tuc, TUUIIIIZ, la primera nota débil, la segunda fuerte y raspante o a veces seguida por ti-tidel-di-di-du-dii, primero descendente y luego ascendente (Hilty & Brown 1986).

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights:
license:
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:

measurementOrFact

relatedTo:
measurementRemarks:
measurementMethod:
measurementDeterminedDate:
measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementValue:
measurementType:
measurementID:

endemicAtomized

distribution

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation:

reference

geoPoint:
location:
thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source:

audience

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

agent

mimeType:

dataType:

identifier:

distributionUnstructured: En bases de datos se encontró que:š

Esta especie se distribuye en: Guyana, Venezuela (Collections MNH SI 2012)

Las siguientes subespecies se distribuyen en:

Chrysomus icterocephalus bogotensis Colombia (Arctos 2012; Collections MNH SI 2012)

Chrysomus icterocephalus icterocephalus Brasil, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago, Venezuela (Collections MNH SI 2012). En bases de datos y monitoreos de fauna se encontró que:

Esta especie se distribuye en: La Guajira (Arctos 2012; Cerrejón 2009-2010)

Para las siguientes subespecies la distribución en Colombia es:

Chrysomus icterocephalus bogotensis Bogotá, Cundinamarca (ICN 2004); Cundinamarca (Collections MNH SI 2012); Boyacá (Arctos 2012)

Chrysomus icterocephalus icterocephalus Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Norte de Santander, Tolima, Valle del Cauca (ICN 2004); Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Valle del Cauca (Collections MNH SI 2012); Huila, Valle del Cauca (Arctos 2012). En las regiones Andina, Caribe, Orinoquía y Pacífica de Colombia hasta 2600 m (Hilty & Brown 1986).

distributionAtomized

stateProvince: Córdoba

ancillaryData

locality:

municipality:

country: Colombia

temporalCoverage

endDate:

startDate:

distributionScope

type:

threatStatus

ancillaryData

threatStatusUnstructured:

threatStatusAtomized

apendiceCITES:

locality:
municipality:
county:
stateProvince:
country: Global
0: IUCN
measurementValue: Preocupación menor (LC)
relatedTo:
measurementRemarks:
measurementMethod:

measurementDeterminedBy

measurementDeterminedDate:
measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementType: IUCN
measurementID:

territory

territoryUnstructured:
areaOfOccupancy:
extentOfOccurrence:

populationBiology

0

dataObject:
additionalInformation:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:

populationBiologyUnstructured: No se ha cuantificado el tamaño de la población global pero esta especie se describe como común (Stotz et al. 1996 en BirdLife International 2012). La población tiende permanecer estable y no se cree que alcance el umbral de vulnerabilidad bajo el criterio del tamaño de población (BirdLife International 2012).

legislation

legislationUnstructured:

directThreats

directThreatsUnstructured:

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights:
license:
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:

measurementOrFact

relatedTo:
measurementRemarks:
measurementMethod:
measurementDeterminedDate:
measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementValue:
measurementType:
measurementID:

abstract: Los machos miden unos 18 cm, las hembras 16,5 cm aproximadamente. Tienen el pico cónico y agudo. Los machos son de color negro con capucha amarilla y bridas negras. Las hembras son de color oliva pardusco opaco en las partes dorsales estriado difusamente de negruzco; la región superciliar y la garganta son de color amarillo; el área facial y la coronilla amarillo sucio; el resto de las parte ventrales amarillo oliva, más pardusco en el abdomen (Hilty & Brown 1986).

associatedParty

role:
personnelIdentifier:
personnelDirectory:
homepage:
email: enataliagomezm@gmail.com
phone:
postalCode:
country: Colombia
state: Bogotá Distrito Capital
city: Bogotá D.C.
address:
organisation:
position:
lastName: Gómez Melendro
firstName: Edith Natalia

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation: Registros biológicos: Portal de datos GBIF
Metadatos: Portal de datos GBIF
Créditos específicos: Ficha elaborada con el apoyo de Carbones del Cerrejón Limited.

Otros recursos en Internet: Arctos, Avibase, Colecciones en Línea, EoL, iSpecies, IUCN Red List, SI NMNH, xeno-

reference

geoPoint:
location:
thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source:

audience

bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:

agent

mimeType:
dataType:
identifier:

_id
_bsontype: ObjectID
id: VÖÉR< G™\°•