

Reporte de Fichas para el usuario: Edgar Herrera

Ficha ID: 56e7999a83c45700544e41f6

Fecha de creación: 2016-03-15T05:12:26.928Z

creation_date: 2016-03-15T05:12:26.928Z

usesManagementAndConservation

[ancillaryData](#)

managementAndConservationUnstructured:

[managementAndConservationAtomized](#)

identificationKeys

fullDescription

0

dataObject:

additionalInformation:

0

link: <http://darnis.inbio.ac.cr/ubis/FMPro?-DB=ubipub.fp3{\&}-lay=WebAll{\&}-error=norec.html{\&}-Format=detail.htm>

keywords: Bubo virginianus

institution:

address:

publisher:

accessed:

websites:

chapter:

series:

issue:

year: 2000

0: Elizondo L. H.

title: Bubo virginianus. Especies de Costa Rica

source:

type: miscellany

tags: Bubo virginianus

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

fullDescriptionUnstructured: 53 cm.; 1 kg. Es una ave muy grande, fuerte, con "orejas" conspicuas, la región inferior es barreteada y las patas son totalmente emplumadas. El disco facial es de color canela opáco con el borde negro, la región superior es negruzca, con barras y vermiculaciones grises, bases de las plumas color leonado; la barbilla y la lista que atraviesa la parte de adelante del cuello, son blancas; la garganta tiene una mezcla de fusco y ante; la región inferior es entre blancuzca y leonada, con vermiculaciones fuscas y un barreteado negro denso; las plumas de las patas y los dedos son color ante. El iris es amarillo; el pico y las garras son negruzcas (Elizondo 2000). Se reconocen 16 subespecies:

Bubo virginianus algistus (Oberholser, 1904)

Bubo virginianus elachistus Brewster, 1902

Bubo virginianus heterocnemis (Oberholser, 1904)

Bubo virginianus lagophonus (Oberholser, 1904)

Bubo virginianus mayensis Nelson, 1901

Bubo virginianus mesembrinus (Oberholser, 1904)

Bubo virginianus nacurutu (Vieillot, 1817)

Bubo virginianus nigrescens Berlepsch, 1884

Bubo virginianus occidentalis

Bubo virginianus pacificus Cassin, 1854

Bubo virginianus pallescens Stone, 1897

Bubo virginianus pinorum

Bubo virginianus saturatus Ridgway, 1877

Bubo virginianus subarcticus Hoy, 1853

Bubo virginianus virginianus (Gmelin, 1788)

Bubo virginianus wapacuthu

briefDescription:

references

link: <http://arctos.database.museum> <http://arctos.database.museum/>

keywords: Amazona ochrocephala, Ameiva festiva, Anas discors, Anhinga anhinga (Linnaeus 1766), Aramides cajanea, Aramus guarauna, Aratinga acuticaudata, Ardea herodias, Arremonops conirostris, Atalotriccus pilaris, Attila spadiceus, Basileuterus flaveolus, Bubo virginianus, Burhinus bistriatus (Wagler 1829), Butorides virescens, Campylorhynchus trochilirostris (Lichtenstein 1820, Campylorhynchus griseus (Swainson 1838), Campylorhynchus nuchalis (Cabanis 1847), Cardinalis phoeniceus Bonaparte 1838, Carduelis psaltria (Say 1823), Carollia brevicauda (Schinz 1821), Centurio senex Gray 1842, Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin 1788), Chlorostilbon gibsoni (Fraser 1840), Chordeiles acutipennis (Hermann 1783), Chrysolampis mosquitos (Linnaeus 1758), Chrysomus icterocephalus, Coccyzus pumila, Colibri coruscans, Columbina minuta (Linnaeus 1766), Columbina passerina (Linnaeus 1758), Conirostrum leucogenys (Lafresnaye 1852), Coryphospingus pileatus (Wied-Neuwied 1821), Crotophaga major, Crotophaga sulcirostris Swainson 1827, Cyanocorax affinis (Pelzeln 1856), Cyclarhis gujanensis (J. F. Gmelin 1789), Dendrocygna autumnalis, Egretta thula, Egretta tricolor (Statius Muller 1776), Engystomops pustulosus, Eumops glaucinus (Wagner 1843), Forpus passerinus (Linnaeus 1758), Forpus xanthopterygius (Spix 1824), Furnarius leucopus Swainson 1838, Galbula ruficauda Cuvier 1816, Gallinula chloropus (Linnaeus 1758), Glaucidium brasilianum (Gmelin 1788), Gonatodes vittatus, Heliodoxa leadbeateri (Bourcier 1843), Hemitriccus margaritaceiventer (Orbigny & Lafresna, Himantopus mexicanus (Statius Muller 1776), Hylophilus flavipes Lafresnaye 1845, Hypnelus ruficollis (Wagler 1829), Icterus auricapillus Cassin 1848, Icterus galbula (Linnaeus 1758), Icterus nigrogularis (Hahn 1819), Inezia subflava (P. L. Sclater & Salvin 1873), Inezia tenuirostris (Cory 1913), Lasiurus ega (Gervais 1856), Lepidoblepharis sanctaemartae Ruthven 1916, Lepidopyga goudoti (Bourcier 1843), Leptotila verreauxi (Bonaparte 1855), Leucippus fallax (Bourcier 1843), Machetornis rixosa, Macrophyllum macrophyllum (Schinz 1821), Megaceryle alcyon (Linnaeus 1758), Megaceryle torquata (Linnaeus 1766), Megarynchus pitangua (Linnaeus 1766), Megascops choliba, Melanerpes rubricapillus, Molothrus bonariensis, Mormoops megalophylla (Peters 1864), Mycteria americana Linnaeus 1758, Myiarchus crinitus, Myiozetetes similis (Spix 1825), Myospiza humeralis (Bosc 1792), Nemosia pileata (Boddaert 1783), Noctilio albigentris (Desmarest 1818), Noctilio leporinus (Linnaeus 1758), Nycticorax nycticorax, Pachyramphus rufus (Boddaert 1783), Phaeomyias murina (Spix 1825), Pheucticus ludovicianus, Pilherodius pileatus (Boddaert 1783), Pionus sordidus (Linnaeus 1758), Piranga flava (Vieillot 1822), Pitangus lictor (Lichtenstein 1823), Platalea ajaja

Linnaeus 1758, *Polioptila plumbea* (J. F. Gmelin 1788), *Pteronotus davyi* (Gray 1838), *Pteronotus gymnonotus* (Natterer 1843), *Pteronotus parnellii* (Gray 1843), *Pteronotus personatus* (Wagner 1843), *Pulsatrix perspicillata* (Latham 1790), *Pyrocephalus rubinus*, *Quiscalus lugubris*, *Quiscalus mexicanus* (Gmelin 1788), *Sakesphorus canadensis* (Linnaeus 1766), *Saltator coerulescens* Vieillot 1817, *Sarkidiornis melanotos* (Pennant 1769), *Spiza americana*, *Sporophila intermedia* Cabanis 1851, *Sporophila nigricollis* (Vieillot 1823), *Stelgidopteryx ruficollis* (Vieillot 1817), *Streptoprocne zonaris* (Shaw 1796), *Sturnella magna*, *Sublegatus arenarum* (Salvin 1863), *Synallaxis candei* Orbigny & Lafresnaye 1838, *Tachycineta albiventer* (Boddaert 1783), *Tachycineta bicolor* (Vieillot 1808), *Tapera naevia* (Linnaeus 1766), *Thamnophilus doliatus* (Linnaeus 1764), *Thraupis palmarum*, *Thryothorus leucotis* (Lafresnaye 1845), *Tiaris obscurus* (Orbigny & Lafresnaye 1837), *Tityra inquisitor* (Lichtenstein 1823), *Tolmomyias sulphurescens* (Spix 1825), *Tyrannus dominicensis* (Gmelin 1788), *Tyto alba*, *Vireo flavoviridis* (Cassin 1851), *Zenaida auriculata*

editors

institution:
address:
publisher:
accessed:
websites:
chapter:
series:
issue:
year: 2012

authors

authors: Arctos Collection Management Information System
title: Specimen Search
source: Arctos Collection Management Information System
type: miscellany

tags: *Amazona ochrocephala*, *Ameiva festiva*, *Anas discors*, *Anhinga anhinga* (Linnaeus 1766), *Aramides cajanea*, *Aramus guarauna*, *Aratinga acuticaudata*, *Ardea herodias*, *Arremonops conirostris*, *Atalotriccus pilaris*, *Attila spadiceus*, *Basileuterus flaveolus*, *Bubo virginianus*, *Burhinus bistriatus* (Wagler 1829), *Butorides virescens*, *Campylorhamphus trochilirostris* (Lichtenstein 1820), *Campylorhynchus griseus* (Swainson 1838), *Campylorhynchus nuchalis* (Cabanis 1847), *Cardinalis phoeniceus* Bonaparte 1838, *Carduelis psaltria* (Say 1823), *Carollia brevicauda* (Schinz 1821), *Centurio senex* Gray 1842, *Certhiaxis cinnamomeus* (Gmelin 1788), *Chlorostilbon gibsoni* (Fraser 1840), *Chordeiles acutipennis* (Hermann 1783), *Chrysolampis mosquitos* (Linnaeus 1758), *Chrysomus icterocephalus*, *Coccyzus pumila*, *Colibri coruscans*, *Columbina minuta* (Linnaeus 1766), *Columbina passerina* (Linnaeus 1758), *Conirostrum leucogenys* (Lafresnaye 1852), *Coryphospingus pileatus* (Wied-Neuwied 1821), *Crotophaga major*, *Crotophaga sulcirostris* Swainson 1827, *Cyanocorax affinis* (Pelzeln 1856), *Cyclarhis gujanensis* (J. F. Gmelin 1789), *Dendrocycyna autumnalis*, *Egretta thula*, *Egretta tricolor* (Statius Muller 1776), *Engystomops pustulosus*, *Eumops glaucinus* (Wagner 1843), *Forpus passerinus* (Linnaeus 1758), *Forpus xanthopterygius* (Spix 1824), *Furnarius leucopus* Swainson 1838, *Galbula ruficauda* Cuvier 1816, *Gallinula chloropus* (Linnaeus 1758), *Glaucidium brasilianum* (Gmelin 1788), *Gonatodes vittatus*, *Heliodoxa leadbeateri* (Bourcier 1843), *Hemitriccus margaritaceiventer* (Orbigny & Lafresna), *Himantopus mexicanus* (Statius Muller 1776), *Hylophilus flavipes* Lafresnaye 1845, *Hypnelus ruficollis* (Wagler 1829), *Icterus auricapillus* Cassin 1848, *Icterus galbula* (Linnaeus 1758), *Icterus nigrogularis* (Hahn 1819), *Inezia subflava* (P. L. Sclater & Salvin 1873), *Inezia tenuirostris* (Cory 1913), *Lasiurus ega* (Gervais 1856), *Lepidoblepharis sanctaemartae* Ruthven 1916, *Lepidopyga goudoti* (Bourcier 1843), *Leptotila verreauxi* (Bonaparte 1855), *Leucippus fallax* (Bourcier 1843), *Machetornis rixosa*, *Macrophyllum macrophyllum* (Schinz 1821), *Megaceryle alcyon* (Linnaeus 1758), *Megaceryle torquata* (Linnaeus 1766), *Megarynchus pitangua* (Linnaeus 1766), *Megascops choliba*, *Melanerpes rubricapillus*, *Molothrus bonariensis*, *Mormoops megalophylla* (Peters 1864), *Mycteria americana* Linnaeus 1758, *Myiarchus crinitus*, *Myiozetetes similis* (Spix 1825), *Myospiza humeralis* (Bosc 1792), *Nemosia pileata* (Boddaert 1783), *Noctilio albiventris* (Desmarest 1818), *Noctilio leporinus* (Linnaeus 1758), *Nycticorax nycticorax*, *Pachyramphus rufus* (Boddaert 1783), *Phaeomyias murina* (Spix 1825), *Pheucticus ludovicianus*, *Pilherodius pileatus* (Boddaert 1783), *Pionus sordidus* (Linnaeus 1758), *Piranga flava* (Vieillot 1822), *Pitangus lictor* (Lichtenstein 1823), *Platalea ajaja* Linnaeus 1758, *Polioptila plumbea* (J. F. Gmelin 1788), *Pteronotus davyi* (Gray 1838), *Pteronotus gymnonotus*

(Natterer 1843),Pteronotus parnellii (Gray 1843),Pteronotus personatus (Wagner 1843),Pulsatrix perspicillata (Latham 1790),Pyrocephalus rubinus,Quiscalus lugubris,Quiscalus mexicanus (Gmelin 1788),Sakesphorus canadensis (Linnaeus 1766),Saltator coerulescens Vieillot 1817,Sarkidiornis melanotos (Pennant 1769),Spiza americana,Sporophila intermedia Cabanis 1851,Sporophila nigricollis (Vieillot 1823),Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot 1817),Streptoprocne zonaris (Shaw 1796),Sturnella magna,Sublegatus arenarum (Salvin 1863),Synallaxis candei Orbigny \& Lafresnaye 1838,Tachycineta albiventer (Boddaert 1783),Tachycineta bicolor (Vieillot 1808),Tapera naevia (Linnaeus 1766),Thamnophilus doliatus (Linnaeus 1764),Thraupis palmarum,Thryothorus leucotis (Lafresnaye 1845),Tiaris obscurus (Orbigny \& Lafresnaye 1837),Tityra inquisitor (Lichtenstein 1823),Tolmomyias sulphureus (Spix 1825),Tyrannus dominicensis (Gmelin 1788),Tyto alba,Vireo flavoviridis (Cassin 1851),Zenaida auriculata

abstract:

identifiers

last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:

taxonRecordName

ancillaryData

providerSpecificData

anyTwo:
providerLink:

publicationStatus

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

replacementNameFor

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

sanctioned

microReference:
source:
datatype:
identifier:

source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

laterHomonymOf

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

conservedAgainst

basedOn

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

basionym

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

spellingCorrentionOf

typeNameEntity

source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:

typificacion

typeOfType:

[lectotypeMicroReferenceVoucher](#)

[lectotypePublicationVoucher](#)

[voucherReference](#)

simple:
microReference:
year:

publishedIn

simple:
source:
datatype:
identifier:
specialAuthorship

[authors](#)

[year](#)

simple:
canonicalAuthorship

[authors](#)

[year](#)

simple:
simple: (Gmelin, 1788)
canonicalName
infraspecificEpithet:
specificEpithet:
infragenericEpithet:
linkType:
ref:
uninomial:
simple: Bubo virginianus
rank: SPECIES
simple: Bubo virginianus (Gmelin, 1788)

attributes

nomenclaturalCode:
isAnamorphic:
id:

[synonymsAtomized](#)

hierarchy

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation:

reference

geoPoint:
location:
thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source: The Catalogue of Life, 3rd January 2011

audience

bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights:
license:
title:
modified: 2016-03-15T05:12:07.995Z
created: 2016-03-15T05:12:07.995Z

agent

homepage:
role:
email:
phone:
address:
position:
organisation:
lastName:
firstName:
mimeType:
dataType:
identifier:
parentTaxon: Bubo
higherClassification:
infraspecificEpithet:
specificEpithet:
taxonRank: SPECIES
subGenus:
genus: Bubo
family: Strigidae
order: Strigiformes
classHierarchy: Aves
phylum: Chordata
kingdom: Animalia
recommended:

classification:

commonNameAtomized

ancillaryData

usedBy:

usedIn

distributionUnstructured:

endDate:

startDate:

ancillaryData

type:

language: Español

name: BÃºho cornudo

invasiveness

invasivenessUnstructured:

reproduction

reproductionUnstructured:

molecularData

molecularDataUnstructured:

migratory

migratoryUnstructured:

lifeForm

lifeFormUnstructured:

lifeCycle

lifeCycleUnstructured:

interactions

interactionsUnstructured:

feeding

0

dataObject:

additionalInformation:

0

keywords: Acacia glomerosa,Acacia tamarindifolia,Acacia tortuosa,Alternanthera halimifolia,Amazona ochrocephala,Ameiva festiva,Anas discors,Anemopaegma orbiculatum,Anhinga anhinga (Linnaeus 1766),Anoda crenatiflora,Aphelandra pulcherrima,Aramides cajanea,Aramus guarauna,Aratinga acuticaudata,Ardea herodias,Aristolochia anguicida,Arremonops conirostris,Arremonops tocuyensis,Artemisia vulgaris,Aspidosperma cuspa,Atalotriccus pilaris,Ayenia magna,Basileuterus flaveolus,Bastardia viscosa,Batis maritima,Bauhinia pauletia,Boerhavia scandens,Bonellia frutescens,Bourreria cumanaensis,Bouteloua aristidoides,Bromelia chrysantha,Bubo virginianus,Burhinus bistriatus (Wagler 1829),Butorides virescens,Caesalpinia bonduc,Caesalpinia

mollis, *Calotropis gigantea*, *Campylorhynchus griseus* (Swainson 1838), *Campylorhynchus nuchalis* (Cabanis 1847), *Canavalia brasiliensis*, *Canavalia rosea*, *Capparis frondosa*, *Capparis linearis*, *Capparis pulcherrima*, *Caprimulgus cayennensis* (Gmelin 1789), *Capsicum baccatum*, *Cardinalis phoeniceus* Bonaparte 1838, *Cardiospermum corindum*, *Carduelis psaltria* (Say 1823), *Castela erecta*, *Celtis iguanaea*, *Cenchrus brownii*, *Cenchrus ciliaris*, *Cenchrus echinatus*, *Certhiaxis cinnamomeus* (Gmelin 1788), *Chlorostilbon gibsoni* (Fraser 1840), *Chordeiles acutipennis* (Hermann 1783), *Chrysolampis mosquitus* (Linnaeus 1758), *Chrysomus icterocephalus*, *Cissus trifoliata*, *Citrullus lanatus*, *Cleome spinosa*, *Cnidioscolus urens*, *Coccoloba microstachya*, *Columbina minuta* (Linnaeus 1766), *Columbina passerina* (Linnaeus 1758), *Combretum fruticosum*, *Conirostrum leucogenys* (Lafresnaye 1852), *Conyza canadensis*, *Conyza perijaensis*, *Cordia macuirensis*, *Coryphospingus pileatus* (Wied-Neuwied 1821), *Craniolaria annua*, *Crotalaria purdiana*, *Crotalaria retusa*, *Croton ferrugineus*, *Croton malambo*, *Croton niveus*, *Croton ovalifolius*, *Croton punctatus*, *Crotophaga major*, *Crotophaga sulcirostris* Swainson 1827, *Cyanocorax affinis* (Pelzelin 1856), *Cyclarhis gujanensis* (J. F. Gmelin 1789), *Cyperus articulatus*, *Datura innoxia*, *Dendrocygna autumnalis*, *Desmodium incanum*, *Diphysa carthagenensis*, *Ditaxis argothamnoides*, *Dolichandra unguis-cati*, *Dryocopus lineatus* (Linnaeus 1766), *Dysphania ambrosioides*, *Egletes prostrata*, *Egretta thula*, *Egretta tricolor* (Statius Muller 1776), *Elaenia chiriquensis* Lawrence 1865, *Eleocharis elegans*, *Eleocharis interstincta*, *Engystomops pustulosus*, *Eragrostis ciliaris*, *Erythrina berteriana*, *Euphorbia hirta*, *Evolvulus convolvuloides*, *Evolvulus sericeus*, *Exostema caribaeum*, *Fluvicola pica* (Boddaert 1783), *Forpus passerinus* (Linnaeus 1758), *Forpus xanthopterygius* (Spix 1824), *Fridericia chica*, *Fridericia dichotoma*, *Fridericia mollissima*, *Funastrum clausum*, *Furnarius leucopus* Swainson 1838, *Galactia striata*, *Galbula ruficauda* Cuvier 1816, *Glaucidium brasilianum* (Gmelin 1788), *Glossophaga longirostris* Miller 1898, *Gonatodes vittatus*, *Handroanthus serratifolius*, *Heliotropium angiospermum*, *Heliotropium indicum*, *Heliotropium procumbens*, *Hemitriccus margaritaceiventer* (Orbigny & Lafresnae), *Hibiscus phoeniceus*, *Hillia costanensis*, *Himantopus mexicanus* (Statius Muller 1776), *Hippomane mancinella*, *Hylophilus flavipes* Lafresnaye 1845, *Hymenocallis caribaea*, *Hypnelus ruficollis* (Wagler 1829), *Icterus auricapillus* Cassin 1848, *Icterus galbula* (Linnaeus 1758), *Icterus nigrogularis* (Hahn 1819), *Inezia subflava* (P. L. Sclater & Salvin 1873), *Inezia tenuirostris* (Cory 1913), *Ipomoea incarnata*, *Jacquinia armillaris*, *Laguncularia racemosa*, *Lantana fucata*, *Lepidoblepharis sanctaemartae* Ruthven 1916, *Leptodactylus poecilochilus*, *Leptonycteris curasoae* Miller 1900, *Leptotila verreauxi* (Bonaparte 1855), *Licania cuspidata*, *Lonchocarpus atropurpureus*, *Lonchocarpus sanctae-marthae*, *Ludwigia octovalvis*, *Luffa operculata*, *Machetornis rixosa*, *Mallotus rhamnifolius*, *Manihot carthaginensis*, *Matelea maritima*, *Megaceryle alcyon* (Linnaeus 1758), *Megaceryle torquata* (Linnaeus 1766), *Megarynchus pitangua* (Linnaeus 1766), *Megascops choliba*, *Melanerpes rubricapillus*, *Melocactus intortus*, *Melochia parvifolia*, *Melochia tomentosa*, *Mentzelia aspera*, *Merremia aegyptia*, *Merremia umbellata*, *Micronycteris hirsuta* (Peters 1869), *Mimosa arenosa*, *Mimosa leiocarpa*, *Mimosa pellita*, *Mollugo verticillata*, *Molothrus bonariensis*, *Morisonia americana*, *Mormoops megalophylla* (Peters 1864), *Musa paradisiaca*, *Myiarchus crinitus*, *Myiarchus venezuelensis* Lawrence 1865, *Myiopagis gaimardii* (Orbigny 1840), *Myiozetetes similis* (Spix 1825), *Myospiza humeralis* (Bosc 1792), *Nemosia pileata* (Boddaert 1783), *Neurolaena lobata*, *Noctilio leporinus* (Linnaeus 1758), *Nycticorax nycticorax*, *Pachyrhamphus rufus* (Boddaert 1783), *Parkia velutina*, *Parkinsonia praecox*, *Passiflora foetida*, *Patagioenas corensis* (Jacquin 1784), *Paullinia cururu*, *Phaeomyias murina* (Spix 1825), *Phaseolus lunatus*, *Pheucticus ludovicianus*, *Phoradendron mucronatum*, *Phthirusa stelis*, *Phyla nodiflora*, *Picus chrysochloros* (Vieillot 1818), *Picumnus cinnamomeus* Wagler 1829, *Pilherodius pileatus* (Boddaert 1783), *Pilosocereus lanuginosus*, *Pionus sordidus* (Linnaeus 1758), *Piptadenia viridiflora*, *Piranga flava* (Vieillot 1822), *Pitangus lictor* (Lichtenstein 1823), *Platalea ajaja* Linnaeus 1758, *Pleurodema brachyops*, *Polioptila plumbea* (J. F. Gmelin 1788), *Porophyllum ruderales*, *Pseudopaludicola pusilla*, *Pteronotus gymnonotus* (Natterer 1843), *Pteronotus parnellii* (Gray 1843), *Pteronotus personatus* (Wagner 1843), *Pulsatrix perspicillata* (Latham 1790), *Pyrocephalus rubinus*, *Quiscalus lugubris*, *Rhizophora mangle*, *Rivina humilis*, *Rosenbergiodendron formosum*, *Ruellia paniculata*, *Ruprechtia ramiflora*, *Sakesphorus canadensis* (Linnaeus 1766), *Saltator coerulescens* Vieillot 1817, *Sarcostemma glaucum*, *Scoparia dulcis*, *Senna atomaria*, *Senna bicapsularis*, *Senna candolleana*, *Senna italica*, *Senna occidentalis*, *Senna tora*, *Serjania mexicana*, *Sesuvium portulacastrum*, *Sida ciliaris*, *Solandra grandiflora*, *Solanum bicolor*, *Spiza americana*, *Sporobolus coromandelianus*, *Sporobolus pyramidalis*, *Sporophila bouvronides* (Lesson 1831), *Sporophila intermedia* Cabanis 1851, *Sporophila nigricollis* (Vieillot 1823), *Stelgidopteryx ruficollis* (Vieillot 1817), *Stemodia maritima*, *Streptoprocne zonaris* (Shaw 1796), *Sturnella magna*, *Sublegatus arenarum* (Salvin 1863), *Synallaxis candei* Orbigny & Lafresnaye 1838, *Tabernaemontana amygdalifolia*, *Tachycineta albiventer* (Boddaert 1783), *Tachycineta bicolor* (Vieillot 1808), *Talinum paniculatum*, *Tapera naevia* (Linnaeus 1766), *Tephrosia cinerea*, *Thamnophilus doliatus* (Linnaeus 1764), *Thraupis glaucocolpa* Cabanis 1850, *Thraupis palmarum*, *Thryothorus leucotis* (Lafresnaye 1845), *Tiaris bicolor* (Linnaeus 1766), *Tiaris obscurus* (Orbigny & Lafresnaye 1837), *Tillandsia flexuosa*, *Tityra inquisitor* (Lichtenstein 1823), *Tolmomyias sulphureus* (Spix 1825), *Tournefortia hirsutissima*, *Trianthema portulacastrum*, *Tribulus*

cistoides, Tyrannus dominicensis (Gmelin 1788), Tyto alba, Vireo flavoviridis (Cassin 1851), Vitex compressa, Wissadula periplocifolia, Zenaida auriculata

institution:

address:

publisher:

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 417

issue:

year: 2010

0: Cerrejón

title: Monitoreo de Fauna en el Valle del Cerrejón

source:

type: report

tags: Acacia glomerosa, Acacia tamarindifolia, Acacia tortuosa, Alternanthera halimifolia, Amazona ochrocephala, Ameiva festiva, Anas discors, Anemopaegma orbiculatum, Anhinga anhinga (Linnaeus 1766), Anoda crenatiflora, Aphelandra pulcherrima, Aramides cajanea, Aramus guarauna, Aratinga acuticaudata, Ardea herodias, Aristolochia anguicida, Arremonops conirostris, Arremonops tocuyensis, Artemisia vulgaris, Aspidosperma cuspa, Atalotriccus pilaris, Ayenia magna, Basileuterus flaveolus, Bastardia viscosa, Batis maritima, Bauhinia pauletia, Boerhavia scandens, Bonellia frutescens, Bourreria cumanaensis, Bouteloua aristidoides, Bromelia chrysantha, Bubo virginianus, Burhinus bistriatus (Wagler 1829), Butorides virescens, Caesalpinia bonduc, Caesalpinia mollis, Calotropis gigantea, Campylorhynchus griseus (Swainson 1838), Campylorhynchus nuchalis (Cabanis 1847), Canavalia brasiliensis, Canavalia rosea, Capparis frondosa, Capparis linearis, Capparis pulcherrima, Caprimulgus cayennensis (Gmelin 1789), Capsicum baccatum, Cardinalis phoeniceus Bonaparte 1838, Cardiospermum corindum, Carduelis psaltria (Say 1823), Castela erecta, Celtis iguanaea, Cenchrus brownii, Cenchrus ciliaris, Cenchrus echinatus, Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin 1788), Chlorostilbon gibsoni (Fraser 1840), Chordeiles acutipennis (Hermann 1783), Chrysolampis mosquitus (Linnaeus 1758), Chrysomus icterocephalus, Cissus trifoliata, Citrullus lanatus, Cleome spinosa, Cnidoscolus urens, Coccoloba microstachya, Columbina minuta (Linnaeus 1766), Columbina passerina (Linnaeus 1758), Combretum fruticosum, Conirostrum leucogenys (Lafresnaye 1852), Conyza canadensis, Conyza perijaensis, Cordia macuirensis, Coryphospingus pileatus (Wied-Neuwied 1821), Craniolaria annua, Crotalaria purdiana, Crotalaria retusa, Croton ferrugineus, Croton malambo, Croton niveus, Croton ovalifolius, Croton punctatus, Crotophaga major, Crotophaga sulcirostris Swainson 1827, Cyanocorax affinis (Pelzelin 1856), Cyclarhis gujanensis (J. F. Gmelin 1789), Cyperus articulatus, Datura innoxia, Dendrocygna autumnalis, Desmodium incanum, Diphysa carthagenensis, Ditaxis argothamnoides, Dolichandra unguis-cati, Dryocopus lineatus (Linnaeus 1766), Dysphania ambrosioides, Egletes prostrata, Egretta thula, Egretta tricolor (Statius Muller 1776), Elaenia chiriquensis Lawrence 1865, Eleocharis elegans, Eleocharis interstincta, Engystomops pustulosus, Eragrostis ciliaris, Erythrina berteriana, Euphorbia hirta, Evolvulus convolvuloides, Evolvulus sericeus, Exostema caribaeum, Fluvicola pica (Boddaert 1783), Forpus passerinus (Linnaeus 1758), Forpus xanthopterygius (Spix 1824), Fridericia chica, Fridericia dichotoma, Fridericia mollissima, Funistrum clausum, Furnarius leucopus Swainson 1838, Galactia striata, Galbula ruficauda Cuvier 1816, Glaucidium brasilianum (Gmelin 1788), Glossophaga longirostris Miller 1898, Gonatodes vittatus, Handroanthus serratifolius, Heliotropium angiospermum, Heliotropium indicum, Heliotropium procumbens, Hemitriccus margaritaceiventer (Orbigny & Lafresna, Hibiscus phoeniceus, Hillia costanensis, Himantopus mexicanus (Statius Muller 1776), Hippomane mancinella, Hylophilus flavipes Lafresnaye 1845, Hymenocallis caribaea, Hypnelus ruficollis (Wagler 1829), Icterus auricapillus Cassin 1848, Icterus galbula (Linnaeus 1758), Icterus nigrogularis (Hahn 1819), Inezia subflava (P. L. Sclater & Salvin 1873), Inezia tenuirostris (Cory 1913), Ipomoea incarnata, Jacquinia armillaris, Laguncularia racemosa, Lantana fucata, Lepidoblepharis sanctaemartae Ruthven 1916, Leptodactylus poecilochilus, Leptonycteris curasoae Miller 1900, Leptotila verreauxi (Bonaparte 1855), Licania cuspidata, Lonchocarpus atropurpureus, Lonchocarpus sanctae-marthae, Ludwigia octovalvis, Luffa operculata, Machetornis rixosa, Mallotus rhamnifolius, Manihot carthaginensis, Matelea maritima, Megaceryle alcyon (Linnaeus 1758), Megaceryle torquata (Linnaeus 1766), Megarynchus pitangua (Linnaeus 1766), Megascops choliba, Melanerpes rubricapillus, Melocactus intortus, Melochia parvifolia, Melochia tomentosa, Mentzelia aspera, Merremia aegyptia, Merremia umbellata, Micronycteris hirsuta (Peters 1869), Mimosa arenosa, Mimosa leiocarpa, Mimosa pellita, Mollugo verticillata, Molothrus bonariensis, Morisonia americana, Mormoops

megalophylla (Peters 1864),Musa paradisiaca,Myiarchus crinitus,Myiarchus venezuelensis Lawrence 1865,Myiopagis gaimardii (Orbigny 1840),Myiozetetes similis (Spix 1825),Myospiza humeralis (Bosc 1792),Nemosia pileata (Boddaert 1783),Neurolaena lobata,Noctilio leporinus (Linnaeus 1758),Nycticorax nycticorax,Pachyramphus rufus (Boddaert 1783),Parkia velutina,Parkinsonia praecox,Passiflora foetida,Patagioenas corensis (Jacquin 1784),Paullinia cururu,Phaeomyias murina (Spix 1825),Phaseolus lunatus,Pheucticus ludovicianus,Phoradendron mucronatum,Phthirusa stelis,Phyla nodiflora,Piculus chrysochloros (Vieillot 1818),Picumnus cinnamomeus Wagler 1829,Pilherodius pileatus (Boddaert 1783),Pilosocereus lanuginosus,Pionus sordidus (Linnaeus 1758),Piptadenia viridiflora,Piranga flava (Vieillot 1822),Pitangus lictor (Lichtenstein 1823),Platalea ajaja Linnaeus 1758,Pleurodema brachyops,Polioptila plumbea (J. F. Gmelin 1788),Porophyllum ruderae,Pseudopaludicola pusilla,Pteronotus gymnotus (Natterer 1843),Pteronotus parnellii (Gray 1843),Pteronotus personatus (Wagner 1843),Pulsatrix perspicillata (Latham 1790),Pyrocephalus rubinus,Quiscalus lugubris,Rhizophora mangle,Rivina humilis,Rosenbergiodendron formosum,Ruellia paniculata,Ruprechtia ramiflora,Sakesphorus canadensis (Linnaeus 1766),Saltator coerulescens Vieillot 1817,Sarcostemma glaucum,Scoparia dulcis,Senna atomaria,Senna bicapsularis,Senna candolleana,Senna italica,Senna occidentalis,Senna tora,Serjania mexicana,Sesuvium portulacastrum,Sida ciliaris,Solandra grandiflora,Solanum bicolor,Spiza americana,Sporobolus coromandelianus,Sporobolus pyramidalis,Sporophila bouvronides (Lesson 1831),Sporophila intermedia Cabanis 1851,Sporophila nigricollis (Vieillot 1823),Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot 1817),Stemodia maritima,Streptoprocne zonaris (Shaw 1796),Sturnella magna,Sublegatus arenarum (Salvin 1863),Synallaxis candei Orbigny & Lafresnaye 1838,Tabernaemontana amygdalifolia,Tachycineta albiventer (Boddaert 1783),Tachycineta bicolor (Vieillot 1808),Talinum paniculatum,Tapera naevia (Linnaeus 1766),Tephrosia cinerea,Thamnophilus doliatus (Linnaeus 1764),Thraupis glaucocolpa Cabanis 1850,Thraupis palmarum,Thryothorus leucotis (Lafresnaye 1845),Tiaris bicolor (Linnaeus 1766),Tiaris obscurus (Orbigny & Lafresnaye 1837),Tillandsia flexuosa,Tityra inquisitor (Lichtenstein 1823),Tolmomyias sulphureus (Spix 1825),Tournefortia hirsutissima,Trianthema portulacastrum,Tribulus cistoides,Tyrannus dominicensis (Gmelin 1788),Tyto alba,Vireo flavoviridis (Cassin 1851),Vitex compressa,Wissadula periplocifolia,Zenaida auriculata

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

feedingUnstructured: Depreda diferentes animales de talla pequeña como coatíes y conejos (Hilty & Brown 1986). En La Guajira se observó que los individuos forrajeaban en el dosel y su dieta es carnívora (Cerrejón 2010).

environmentalEnvelope

environmentalEnvelopeUnstructured:

ecologicalSignificance

ecologicalSignificanceUnstructured:

dispersal

dispersalUnstructured:

distance:

structureDispersed:

type:

purpose:

behavior

0

dataObject:

additionalInformation:

0

keywords: Accipiter collaris, Accipiter cooperii, Accipiter poliogaster, Accipiter superciliosus, Amazona ochrocephala, Andigena hypoglaucha, Aramus guarauna, Aratinga pertinax, Ardea alba, Ardea cocoi, Ardea herodias, Arremonops conirostris, Arremonops tocuyensis, Atalotriccus pilaris, Attila spadiceus, Basileuterus flaveolus, Bubo virginianus, Busarellus nigricollis, Buteogallus anthracinus, Buteogallus meridionalis, Buteogallus schistaceus, Buteogallus solitarius, Buteogallus urubitinga, Cacicus cela, Cairina moschata, Campylorhynchus trochilirostris (Lichtenstein 1820, Campylorhynchus griseus (Swainson 1838), Campylorhynchus nuchalis (Cabanis 1847), Caprimulgus cayennensis (Gmelin 1789), Cardinalis phoeniceus Bonaparte 1838, Carduelis psaltria (Say 1823), Cathartes aura, Cathartes burrovianus, Cathartes melambrotus, Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin 1788), Ceryle torquata, Chlorostilbon gibsoni (Fraser 1840), Chondrohierax uncinatus, Chordeiles acutipennis (Hermann 1783), Chrysomus icterocephalus, Circus buffoni, Circus cinereus, Circus cyaneus, Coccyzus pumila, Columbina minuta (Linnaeus 1766), Conirostrum leucogenys (Lafresnaye 1852), Coragyps atratus, Coryphospingus pileatus (Wied-Neuwied 1821), Crax alector, Crotophaga major, Crotophaga sulcirostris Swainson 1827, Cryptoleucopteryx plumbea, Cyanocorax affinis (Pelzelin 1856), Cyclarhis gujanensis (J. F. Gmelin 1789), Dryocopus lineatus (Linnaeus 1766), Elaenia chiriquensis Lawrence 1865, Elanoides forficatus, Elanus leucurus, Falco deiroleucus, Fluvicola pica (Boddaert 1783), Forpus passerinus (Linnaeus 1758), Forpus xanthopterygius (Spix 1824), Furnarius leucopus Swainson 1838, Galbula ruficauda Cuvier 1816, Gallinula chloropus (Linnaeus 1758), Gampsonyx swainsonii, Geranospiza caerulescens, Glaucidium brasilianum (Gmelin 1788), Harpagus bidentatus, Harpia harpyja, Helicolestes hamatus, Hemitriccus margaritaceiventer (Orbigny & Lafresna, Himantopus mexicanus (Statius Muller 1776), Hylophilus flavipes Lafresnaye 1845, Hypnelus ruficollis (Wagler 1829), Icterus auricapillus Cassin 1848, Icterus galbula (Linnaeus 1758), Icterus nigrogularis (Hahn 1819), Ictinia mississippiensis, Ictinia plumbea, Inezia subflava (P. L. Sclater & Salvin 1873), Inezia tenuirostris (Cory 1913), Jabiru mycteria, Jacana jacana, Lepidopyga goudoti (Bourcier 1843), Leptotila verreauxi (Bonaparte 1855), Leucopternis melanops, Leucopternis semiplumbea, Mactornis rixosa, Megaceryle alcyon (Linnaeus 1758), Megaceryle torquata (Linnaeus 1766), Megarynchus pitangua (Linnaeus 1766), Megascops choliba, Melanerpes rubricapillus, Micrastur plumbeus, Mitu tomentosa, Molothrus bonariensis, Morphnarchus princeps, Morphnus guianensis, Myiarchus crinitus, Myiarchus venezuelensis Lawrence 1865, Myiopagis gaimardii (Orbigny 1840), Myiozetetes similis (Spix 1825), Myospiza humeralis (Bosc 1792), Nemosia pileata (Boddaert 1783), Neechen jubata, Opisthocomus hoazin, Oroaetus isidori, Ortalis ruficauda Jardine 1847, Pandion haliaetus, Parabuteo unicinctus, Patagioenas corensis (Jacquin 1784), Phaeomyias murina (Spix 1825), Pheucticus ludovicianus, Piculus chrysochloros (Vieillot 1818), Picumnus cinnamomeus Wagler 1829, Pilherodius pileatus (Boddaert 1783), Pionus sordidus (Linnaeus 1758), Pitangus lictor (Lichtenstein 1823), Pitangus sulphuratus, Polioptila plumbea (J. F. Gmelin 1788), Pseudastur albicollis, Pulsatrix perspicillata (Latham 1790), Pyrocephalus rubinus, Quiscalus lugubris, Quiscalus mexicanus (Gmelin 1788), Rostrhamus sociabilis, Sakesphorus canadensis (Linnaeus 1766), Saltator coerulescens Vieillot 1817, Sarcoramphus papa, Sarkidiornis melanotos (Pennant 1769), Spiza americana, Spizaetus tyrannus, Sporophila bouvronides (Lesson 1831), Sporophila intermedia Cabanis 1851, Sporophila nigricollis (Vieillot 1823), Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot 1817), Sterna supercilialis, Sturnella magna, Sublegatus arenarum (Salvin 1863), Synallaxis candei Orbigny & Lafresnaye 1838, Tachycineta bicolor (Vieillot 1808), Tapera naevia (Linnaeus 1766), Thamnophilus doliatus (Linnaeus 1764), Thraupis glaucocolpa Cabanis 1850, Thraupis palmarum, Thryothorus leucotis (Lafresnaye 1845), Tyrannus dominicensis (Gmelin 1788), Tyto alba, Vireo flavoviridis (Cassin 1851), Zenaida auriculata

institution:

address:

publisher: Princeton University Press

accessed:

websites:

chapter:

series:

issue:

year: 1986

0: Hilty, S

1: Brown, W. L.

title: A Guide to the Birds of Colombia

source:

type: book

tags: Accipiter collaris, Accipiter cooperii, Accipiter poliogaster, Accipiter superciliosus, Amazona ochrocephala, Andigena hypoglaucha, Aramus guarauna, Aratinga pertinax, Ardea alba, Ardea cocoi, Ardea herodias, Arremonops conirostris, Arremonops tocuyensis, Atalotriccus pilaris, Attila spadiceus, Basileuterus flaveolus, Bubo virginianus, Busarellus nigricollis, Buteogallus anthracinus, Buteogallus meridionalis, Buteogallus schistaceus, Buteogallus solitarius, Buteogallus urubitinga, Cacicus cela, Cairina moschata, Campylorhynchus trochilirostris (Lichtenstein 1820, Campylorhynchus griseus (Swainson 1838), Campylorhynchus nuchalis (Cabanis 1847), Caprimulgus cayennensis (Gmelin 1789), Cardinalis phoeniceus Bonaparte 1838, Carduelis psaltria (Say 1823), Cathartes aura, Cathartes burrovianus, Cathartes melambrotus, Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin 1788), Ceryle torquata, Chlorostilbon gibsoni (Fraser 1840), Chondrohierax uncinatus, Chordeiles acutipennis (Hermann 1783), Chrysomus icterocephalus, Circus buffoni, Circus cinereus, Circus cyaneus, Coccyzus pumila, Columbina minuta (Linnaeus 1766), Conirostrum leucogenys (Lafresnaye 1852), Coragyps atratus, Coryphospingus pileatus (Wied-Neuwied 1821), Crax alector, Crotophaga major, Crotophaga sulcirostris Swainson 1827, Cryptoleucopteryx plumbea, Cyanocorax affinis (Pelzelin 1856), Cyclarhis gujanensis (J. F. Gmelin 1789), Dryocopus lineatus (Linnaeus 1766), Elaenia chiriquensis Lawrence 1865, Elanoides forficatus, Elanus leucurus, Falco deiroleucus, Fluviicola pica (Boddaert 1783), Forpus passerinus (Linnaeus 1758), Forpus xanthopterygius (Spix 1824), Furnarius leucopus Swainson 1838, Galbula ruficauda Cuvier 1816, Gallinula chloropus (Linnaeus 1758), Gampsonyx swainsonii, Geranospiza caerulescens, Glaucidium brasilianum (Gmelin 1788), Harpagus bidentatus, Harpia harpyja, Helicolestes hamatus, Hemitriccus margaritaceiventer (Orbigny & Lafresna, Himantopus mexicanus (Statius Muller 1776), Hylophilus flavipes Lafresnaye 1845, Hypnelus ruficollis (Wagler 1829), Icterus auricapillus Cassin 1848, Icterus galbula (Linnaeus 1758), Icterus nigrogularis (Hahn 1819), Ictinia mississippiensis, Ictinia plumbea, Inezia subflava (P. L. Sclater & Salvin 1873), Inezia tenuirostris (Cory 1913), Jabiru mycteria, Jacana jacana, Lepidopyga goudoti (Bourcier 1843), Leptotila verreauxi (Bonaparte 1855), Leucopternis melanops, Leucopternis semiplumbea, Machetornis rixosa, Megaceryle alcyon (Linnaeus 1758), Megaceryle torquata (Linnaeus 1766), Megarynchus pitangua (Linnaeus 1766), Megascops choliba, Melanerpes rubricapillus, Micrastur plumbeus, Mitu tomentosa, Molothrus bonariensis, Morphnarchus princeps, Morphnus guianensis, Myiarchus crinitus, Myiarchus venezuelensis Lawrence 1865, Myiopagis gaimardii (Orbigny 1840), Myiozetetes similis (Spix 1825), Myospiza humeralis (Bosc 1792), Nemosia pileata (Boddaert 1783), Neochen jubata, Opisthocomus hoazin, Oroaetus isidori, Ortalis ruficauda Jardine 1847, Pandion haliaetus, Parabuteo unicinctus, Patagioenas corensis (Jacquin 1784), Phaeomyias murina (Spix 1825), Pheucticus ludovicianus, Piculus chrysochloros (Vieillot 1818), Picumnus cinnamomeus Wagler 1829, Pilherodius pileatus (Boddaert 1783), Pionus sordidus (Linnaeus 1758), Pitangus lictor (Lichtenstein 1823), Pitangus sulphuratus, Polioptila plumbea (J. F. Gmelin 1788), Pseudastur albicollis, Pulsatrix perspicillata (Latham 1790), Pyrocephalus rubinus, Quiscalus lugubris, Quiscalus mexicanus (Gmelin 1788), Rostrhamus sociabilis, Sakesphorus canadensis (Linnaeus 1766), Saltator coerulescens Vieillot 1817, Sarcoramphus papa, Sarkidiornis melanotos (Pennant 1769), Spiza americana, Spizaetus tyrannus, Sporophila bouvronides (Lesson 1831), Sporophila intermedia Cabanis 1851, Sporophila nigricollis (Vieillot 1823), Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot 1817), Sterna superciliaris, Sturnella magna, Sublegatus arenarum (Salvin 1863), Synallaxis candei Orbigny & Lafresnaye 1838, Tachycineta bicolor (Vieillot 1808), Tapera naevia (Linnaeus 1766), Thamnophilus doliatus (Linnaeus 1764), Thraupis glaucocolpa Cabanis 1850, Thraupis palmarum, Thryothorus leucotis (Lafresnaye 1845), Tyrannus dominicensis (Gmelin 1788), Tyto alba, Vireo flavoviridis (Cassin 1851), Zenaida auriculata

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:
behaviorUnstructured: Bubo virginianus tiene hábitos nocturnos (Hilty & Brown 1986). La llamada usual consiste en 4 a 7 notas profundas y melodiosas que pueden escucharse a distancias considerables (Hilty & Brown 1986).

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights:
license:
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:

measurementOrFact

relatedTo:
measurementRemarks:
measurementMethod:
measurementDeterminedDate:
measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementValue:
measurementType:
measurementID:

annualCycle

annualCycleUnstructured:

habitat

0

dataObject:
additionalInformation:

keywords: *Acacia glomerosa*, *Acacia tamarindifolia*, *Acacia tortuosa*, *Alternanthera halimifolia*, *Amazona ochrocephala*, *Ameiva festiva*, *Anas discors*, *Anemopaegma orbiculatum*, *Anhinga anhinga* (Linnaeus 1766), *Anoda crenatiflora*, *Aphelandra pulcherrima*, *Aramides cajanea*, *Aramus guarauna*, *Aratinga acuticaudata*, *Ardea herodias*, *Aristolochia anguicida*, *Arremonops conirostris*, *Arremonops tocuyensis*, *Artemisia vulgaris*, *Aspidosperma cuspa*, *Atalotriccus pilaris*, *Ayenia magna*, *Basileuterus flaveolus*, *Bastardia viscosa*, *Batis maritima*, *Bauhinia pauletia*, *Boerhavia scandens*, *Bonellia frutescens*, *Bourreria cumanaensis*, *Bouteloua aristidoides*, *Bromelia chrysantha*, *Bubo virginianus*, *Burhinus bistriatus* (Wagler 1829), *Butorides virescens*, *Caesalpinia bonduc*, *Caesalpinia mollis*, *Calotropis gigantea*, *Campylorhynchus griseus* (Swainson 1838), *Campylorhynchus nuchalis* (Cabanis 1847), *Canavalia brasiliensis*, *Canavalia rosea*, *Capparis frondosa*, *Capparis linearis*, *Capparis pulcherrima*, *Caprimulgus cayennensis* (Gmelin 1789), *Capsicum baccatum*, *Cardinalis phoeniceus* Bonaparte 1838, *Cardiospermum corindum*, *Carduelis psaltria* (Say 1823), *Castela erecta*, *Celtis iguanaea*, *Cenchrus brownii*, *Cenchrus ciliaris*, *Cenchrus echinatus*, *Certhiaxis cinnamomeus* (Gmelin 1788), *Chlorostilbon gibsoni* (Fraser 1840), *Chordeiles acutipennis* (Hermann 1783), *Chrysolampis mosquitos* (Linnaeus 1758), *Chrysomus icterocephalus*, *Cissus trifoliata*, *Citrullus lanatus*, *Cleome spinosa*, *Cnidioscolus urens*, *Coccoloba microstachya*, *Columbina minuta* (Linnaeus 1766), *Columbina passerina* (Linnaeus 1758), *Combretum fruticosum*, *Conirostrum leucogenys* (Lafresnaye 1852), *Conyza canadensis*, *Conyza perijaensis*, *Cordia macuirensis*, *Coryphospingus pileatus* (Wied-Neuwied 1821), *Craniolaria annua*, *Crotalaria purdiana*, *Crotalaria retusa*, *Croton ferrugineus*, *Croton malambo*, *Croton niveus*, *Croton ovalifolius*, *Croton punctatus*, *Crotophaga major*, *Crotophaga sulcirostris* Swainson 1827, *Cyanocorax affinis* (Pelzelin 1856), *Cyclarhis gujanensis* (J. F. Gmelin 1789), *Cyperus articulatus*, *Datura innoxia*, *Dendrocycna autumnalis*, *Desmodium incanum*, *Diphysa carthagenensis*, *Ditaxis argothamnoides*, *Dolichandra unguis-cati*, *Dryocopus lineatus* (Linnaeus 1766), *Dysphania ambrosioides*, *Egletes prostrata*, *Egretta thula*, *Egretta tricolor* (Statius Muller 1776), *Elaenia chiriquensis* Lawrence 1865, *Eleocharis elegans*, *Eleocharis interstincta*, *Engystomops pustulosus*, *Eragrostis ciliaris*, *Erythrina berteriana*, *Euphorbia hirta*, *Evolvulus convolvuloides*, *Evolvulus sericeus*, *Exostema caribaeum*, *Fluvicola pica* (Boddaert 1783), *Forpus passerinus* (Linnaeus 1758), *Forpus xanthopterygius* (Spix 1824), *Fridericia chica*, *Fridericia dichotoma*, *Fridericia mollissima*, *Funastrum clausum*, *Furnarius leucopus* Swainson 1838, *Galactia striata*, *Galbula ruficauda* Cuvier 1816, *Glaucidium brasilianum* (Gmelin 1788), *Glossophaga longirostris* Miller 1898, *Gonatodes vittatus*, *Handroanthus serratifolius*, *Heliotropium angiospermum*, *Heliotropium indicum*, *Heliotropium procumbens*, *Hemitriccus margaritaceiventer* (Orbigny & Lafresna), *Hibiscus phoeniceus*, *Hillia costanensis*, *Himantopus mexicanus* (Statius Muller 1776), *Hippomane mancinella*, *Hylophilus flavipes* Lafresnaye 1845, *Hymenocallis caribaea*, *Hypnelus ruficollis* (Wagler 1829), *Icterus auricapillus* Cassin 1848, *Icterus galbula* (Linnaeus 1758), *Icterus nigrogularis* (Hahn 1819), *Inezia subflava* (P. L. Sclater & Salvin 1873), *Inezia tenuirostris* (Cory 1913), *Ipomoea incarnata*, *Jacquinia armillaris*, *Laguncularia racemosa*, *Lantana fucata*, *Lepidoblepharis sanctaemartae* Ruthven 1916, *Leptodactylus poecilochilus*, *Leptonycteris curasoae* Miller 1900, *Leptotila verreauxi* (Bonaparte 1855), *Licania cuspidata*, *Lonchocarpus atropurpureus*, *Lonchocarpus sanctae-marthae*, *Ludwigia octovalvis*, *Luffa operculata*, *Machetornis rixosa*, *Mallotus rhamnifolius*, *Manihot carthagenensis*, *Matelea maritima*, *Megaceryle alcyon* (Linnaeus 1758), *Megaceryle torquata* (Linnaeus 1766), *Megarynchus pitangua* (Linnaeus 1766), *Megascops choliba*, *Melanerpes rubricapillus*, *Melocactus intortus*, *Melochia parvifolia*, *Melochia tomentosa*, *Mentzelia aspera*, *Merremia aegyptia*, *Merremia umbellata*, *Micronycteris hirsuta* (Peters 1869), *Mimosa arenosa*, *Mimosa leiocarpa*, *Mimosa peltata*, *Mollugo verticillata*, *Molothrus bonariensis*, *Morisonia americana*, *Mormoops megalophylla* (Peters 1864), *Musa paradisiaca*, *Myiarchus crinitus*, *Myiarchus venezuelensis* Lawrence 1865, *Myiopagis gaimardii* (Orbigny 1840), *Myiozetetes similis* (Spix 1825), *Myospiza humeralis* (Bosc 1792), *Nemosia pileata* (Boddaert 1783), *Neurolaena lobata*, *Noctilio leporinus* (Linnaeus 1758), *Nycticorax nycticorax*, *Pachyramphus rufus* (Boddaert 1783), *Parkia velutina*, *Parkinsonia praecox*, *Passiflora foetida*, *Patagioenas corensis* (Jacquin 1784), *Paullinia cururu*, *Phaeomyias murina* (Spix 1825), *Phaseolus lunatus*, *Pheucticus ludovicianus*, *Phoradendron mucronatum*, *Phthirusa stelis*, *Phyla nodiflora*, *Piculus chrysochloros* (Vieillot 1818), *Picumnus cinnamomeus* Wagler 1829, *Pilherodius pileatus* (Boddaert 1783), *Pilosocereus lanuginosus*, *Pionus sordidus* (Linnaeus 1758), *Piptadenia viridiflora*, *Piranga flava* (Vieillot 1822), *Pitangus lictor* (Lichtenstein 1823), *Platalea ajaja* Linnaeus 1758, *Pleurodema brachyops*, *Poliophtila plumbea* (J. F. Gmelin 1788), *Porophyllum ruderae*, *Pseudopaludicola pusilla*, *Pteronotus gymnotus* (Natterer 1843), *Pteronotus parnellii* (Gray 1843), *Pteronotus personatus* (Wagner 1843), *Pulsatrix perspicillata* (Latham 1790), *Pyrocephalus rubinus*, *Quiscalus lugubris*, *Rhizophora mangle*, *Rivina humilis*, *Rosenbergiodendron formosum*, *Ruellia paniculata*, *Ruprechtia ramiflora*, *Sakesphorus canadensis* (Linnaeus 1766), *Saltator coerulescens* Vieillot 1817, *Sarcostemma glaucum*, *Scoparia dulcis*, *Senna atomaria*, *Senna bicapsularis*, *Senna candolleana*, *Senna italica*, *Senna occidentalis*, *Senna tora*, *Serjania mexicana*, *Sesuvium*

portulacastrum, Sida ciliaris, Solandra grandiflora, Solanum bicolor, Spiza americana, Sporobolus
coromandelianus, Sporobolus pyramidalis, Sporophila bouvronides (Lesson 1831), Sporophila intermedia Cabanis
1851, Sporophila nigricollis (Vieillot 1823), Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot 1817), Stemodia maritima, Streptoprocne
zonaris (Shaw 1796), Sturnella magna, Sublegatus arenarum (Salvin 1863), Synallaxis candei Orbigny \& Lafresnaye
1838, Tabernaemontana amygdalifolia, Tachycineta albiventer (Boddaert 1783), Tachycineta bicolor (Vieillot
1808), Talinum paniculatum, Tapera naevia (Linnaeus 1766), Tephrosia cinerea, Thamnophilus doliatus (Linnaeus
1764), Thraupis glaucocolpa Cabanis 1850, Thraupis palmarum, Thryothorus leucotis (Lafresnaye 1845), Tiaris bicolor
(Linnaeus 1766), Tiaris obscurus (Orbigny \& Lafresnaye 1837), Tillandsia flexuosa, Tityra inquisitor (Lichtenstein
1823), Tolmomyias sulphurescens (Spix 1825), Tournefortia hirsutissima, Trianthes portulacastrum, Tribulus
cistoides, Tyrannus dominicensis (Gmelin 1788), Tyto alba, Vireo flavoviridis (Cassin 1851), Vitex
compressa, Wissadula periplocifolia, Zenaida auriculata

institution:

address:

publisher:

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 417

issue:

year: 2010

0: Cerrejón

title: Monitoreo de Fauna en el Valle del Cerrejón

source:

type: report

tags: Acacia glomerosa, Acacia tamarindifolia, Acacia tortuosa, Alternanthera halimifolia, Amazona
ochrocephala, Ameiva festiva, Anas discors, Anemopaegma orbiculatum, Anhinga anhinga (Linnaeus 1766), Anoda
crenatiflora, Aphelandra pulcherrima, Aramides cajanea, Aramus guarauna, Aratinga acuticaudata, Ardea
herodias, Aristolochia anguicida, Arremonops conirostris, Arremonops tocuyensis, Artemisia vulgaris, Aspidosperma
cuspa, Atalotriccus pilaris, Ayenia magna, Basileuterus flaveolus, Bastardia viscosa, Batis maritima, Bauhinia
pauletia, Boerhavia scandens, Bonellia frutescens, Bourreria cumanaensis, Bouteloua aristidoides, Bromelia
chrysantha, Bubo virginianus, Burhinus bistriatus (Wagler 1829), Butorides virescens, Caesalpinia bonduc, Caesalpinia
mollis, Calotropis gigantea, Campylorhynchus griseus (Swainson 1838), Campylorhynchus nuchalis (Cabanis
1847), Canavalia brasiliensis, Canavalia rosea, Capparis frondosa, Capparis linearis, Capparis
pulcherrima, Caprimulgus cayennensis (Gmelin 1789), Capsicum baccatum, Cardinalis phoeniceus Bonaparte
1838, Cardiospermum corindum, Carduelis psaltria (Say 1823), Castela erecta, Celtis iguanaea, Cenchrus
brownii, Cenchrus ciliaris, Cenchrus echinatus, Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin 1788), Chlorostilbon gibsoni (Fraser
1840), Chordeiles acutipennis (Hermann 1783), Chrysolampis mosquitus (Linnaeus 1758), Chrysomus
icterocephalus, Cissus trifoliata, Citrullus lanatus, Cleome spinosa, Cnidioscolus urens, Coccoloba
microstachya, Columbina minuta (Linnaeus 1766), Columbina passerina (Linnaeus 1758), Combretum
fruticosum, Conirostrum leucogenys (Lafresnaye 1852), Conyza canadensis, Conyza perijaensis, Cordia
macuirensis, Coryphospingus pileatus (Wied-Neuwied 1821), Craniolaria annua, Crotalaria purdiana, Crotalaria
retusa, Croton ferrugineus, Croton malambo, Croton niveus, Croton ovalifolius, Croton punctatus, Crotophaga
major, Crotophaga sulcirostris Swainson 1827, Cyanocorax affinis (Pelzelin 1856), Cyclarhis gujanensis (J. F. Gmelin
1789), Cyperus articulatus, Datura innoxia, Dendrocygna autumnalis, Desmodium incanum, Diphysa
carthagenensis, Ditaxis argothamnoides, Dolichandra unguis-cati, Dryocopus lineatus (Linnaeus 1766), Dysphania
ambrosioides, Egletes prostrata, Egretta thula, Egretta tricolor (Statius Muller 1776), Elaenia chiriquensis Lawrence
1865, Eleocharis elegans, Eleocharis interstincta, Engystomops pustulosus, Eragrostis ciliaris, Erythrina
berteroana, Euphorbia hirta, Evolvulus convolvuloides, Evolvulus sericeus, Exostema caribaeum, Fluvicola pica
(Boddaert 1783), Forpus passerinus (Linnaeus 1758), Forpus xanthopterygius (Spix 1824), Fridericia chica, Fridericia
dichotoma, Fridericia mollissima, Funastrum clausum, Furnarius leucopus Swainson 1838, Galactia striata, Galbula
ruficauda Cuvier 1816, Glaucidium brasilianum (Gmelin 1788), Glossophaga longirostris Miller 1898, Gonatodes
vittatus, Handroanthus serratifolius, Heliotropium angiospermum, Heliotropium indicum, Heliotropium
procumbens, Hemitriccus margaritaceiventer (Orbigny \& Lafresna, Hibiscus phoeniceus, Hillia
costanensis, Himantopus mexicanus (Statius Muller 1776), Hippomane mancinella, Hylophilus flavipes Lafresnaye
1845, Hymenocallis caribaea, Hypnelus ruficollis (Wagler 1829), Icterus auricapillus Cassin 1848, Icterus galbula

(Linnaeus 1758), *Icterus nigrogularis* (Hahn 1819), *Inezia subflava* (P. L. Sclater & Salvin 1873), *Inezia tenuirostris* (Cory 1913), *Ipomoea incarnata*, *Jacquinia armillaris*, *Laguncularia racemosa*, *Lantana fucata*, *Lepidoblepharis sanctaemartae* Ruthven 1916, *Leptodactylus poecilochilus*, *Leptonycteris curasoae* Miller 1900, *Leptotila verreauxi* (Bonaparte 1855), *Licania cuspidata*, *Lonchocarpus atropurpureus*, *Lonchocarpus sanctae-marthae*, *Ludwigia octovalvis*, *Luffa operculata*, *Machetornis rixosa*, *Mallotus rhamnifolius*, *Manihot carthaginensis*, *Matelea maritima*, *Megaceryle alcyon* (Linnaeus 1758), *Megaceryle torquata* (Linnaeus 1766), *Megarynychus pitangua* (Linnaeus 1766), *Megascops choliba*, *Melanerpes rubricapillus*, *Melocactus intortus*, *Melochia parvifolia*, *Melochia tomentosa*, *Mentzelia aspera*, *Merremia aegyptia*, *Merremia umbellata*, *Micronycteris hirsuta* (Peters 1869), *Mimosa arenosa*, *Mimosa leiocarpa*, *Mimosa pellita*, *Mollugo verticillata*, *Molothrus bonariensis*, *Morisonia americana*, *Mormoops megalophylla* (Peters 1864), *Musa paradisiaca*, *Myiarchus crinitus*, *Myiarchus venezuelensis* Lawrence 1865, *Myiopagis gaimardii* (Orbigny 1840), *Myiozetetes similis* (Spix 1825), *Myospiza humeralis* (Bosc 1792), *Nemosia pileata* (Boddaert 1783), *Neurolaena lobata*, *Noctilio leporinus* (Linnaeus 1758), *Nycticorax nycticorax*, *Pachyrhamphus rufus* (Boddaert 1783), *Parkia velutina*, *Parkinsonia praecox*, *Passiflora foetida*, *Patagioenas corensis* (Jacquin 1784), *Paullinia cururu*, *Phaeomyias murina* (Spix 1825), *Phaseolus lunatus*, *Pheucticus ludovicianus*, *Phoradendron mucronatum*, *Phthirusa stelis*, *Phyla nodiflora*, *Piculus chrysocloros* (Vieillot 1818), *Picumnus cinnamomeus* Wagler 1829, *Pilherodius pileatus* (Boddaert 1783), *Pilosocereus lanuginosus*, *Pionus sordidus* (Linnaeus 1758), *Piptadenia viridiflora*, *Piranga flava* (Vieillot 1822), *Pitangus lictor* (Lichtenstein 1823), *Platalea ajaja* Linnaeus 1758, *Pleurodema brachyops*, *Polioptila plumbea* (J. F. Gmelin 1788), *Porophyllum ruderae*, *Pseudopaludicola pusilla*, *Pteronotus gymnonotus* (Natterer 1843), *Pteronotus parnellii* (Gray 1843), *Pteronotus personatus* (Wagner 1843), *Pulsatrix perspicillata* (Latham 1790), *Pyrocephalus rubinus*, *Quiscalus lugubris*, *Rhizophora mangle*, *Rivina humilis*, *Rosenbergiodendron formosum*, *Ruellia paniculata*, *Ruprechtia ramiflora*, *Sakesphorus canadensis* (Linnaeus 1766), *Saltator coerulescens* Vieillot 1817, *Sarcostemma glaucum*, *Scoparia dulcis*, *Senna atomaria*, *Senna bicapsularis*, *Senna candolleana*, *Senna italica*, *Senna occidentalis*, *Senna tora*, *Serjania mexicana*, *Sesuvium portulacastrum*, *Sida ciliaris*, *Solandra grandiflora*, *Solanum bicolor*, *Spiza americana*, *Sporobolus coromandelianus*, *Sporobolus pyramidalis*, *Sporophila bouvronides* (Lesson 1831), *Sporophila intermedia* Cabanis 1851, *Sporophila nigricollis* (Vieillot 1823), *Stelgidopteryx ruficollis* (Vieillot 1817), *Stemodia maritima*, *Streptoprocne zonaris* (Shaw 1796), *Sturnella magna*, *Sublegatus arenarum* (Salvin 1863), *Synallaxis candei* Orbigny & Lafresnaye 1838, *Tabernaemontana amygdalifolia*, *Tachycineta albiventer* (Boddaert 1783), *Tachycineta bicolor* (Vieillot 1808), *Talinum paniculatum*, *Tapera naevia* (Linnaeus 1766), *Tephrosia cinerea*, *Thamnophilus doliatus* (Linnaeus 1764), *Thraupis glaucocolpa* Cabanis 1850, *Thraupis palmarum*, *Thryothorus leucotis* (Lafresnaye 1845), *Tiaris bicolor* (Linnaeus 1766), *Tiaris obscurus* (Orbigny & Lafresnaye 1837), *Tillandsia flexuosa*, *Tityra inquisitor* (Lichtenstein 1823), *Tolmomyias sulphurescens* (Spix 1825), *Tournefortia hirsutissima*, *Trianthema portulacastrum*, *Tribulus cistoides*, *Tyrannus dominicensis* (Gmelin 1788), *Tyto alba*, *Vireo flavoviridis* (Cassin 1851), *Vitex compressa*, *Wissadula periplocifolia*, *Zenaida auriculata*

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

mimeType:

dataType:

identifier:

habitatUnstructured: En La Guajira habita en matorral o rastrojo y bosque deciduo tropical, de galería y secundario (Cerrejón 2010).

endemicAtomized

distribution

ancillaryData

dataObject:

additionalInformation:

reference

keywords: Accipiter collaris, Accipiter cooperii, Accipiter poliogaster, Accipiter superciliosus, Amazona ochrocephala, Andigena hypoglaucha, Aramus guarauna, Aratinga pertinax, Ardea alba, Ardea cocoi, Ardea herodias, Arremonops conirostris, Arremonops tocuyensis, Atalotriccus pilaris, Attila spadiceus, Basileuterus flaveolus, Bubo virginianus, Busarellus nigricollis, Buteogallus anthracinus, Buteogallus meridionalis, Buteogallus schistaceus, Buteogallus solitarius, Buteogallus urubitinga, Cacicus cela, Cairina moschata, Campylorhynchus trochilirostris (Lichtenstein 1820, Campylorhynchus griseus (Swainson 1838), Campylorhynchus nuchalis (Cabanis 1847), Caprimulgus cayennensis (Gmelin 1789), Cardinalis phoeniceus Bonaparte 1838, Carduelis psaltria (Say 1823), Cathartes aura, Cathartes burrovianus, Cathartes melambrotus, Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin 1788), Ceryle torquata, Chlorostilbon gibsoni (Fraser 1840), Chondrohierax uncinatus, Chordeiles acutipennis (Hermann 1783), Chrysomus icterocephalus, Circus buffoni, Circus cinereus, Circus cyaneus, Coccyzus pumila, Columbina minuta (Linnaeus 1766), Conirostrum leucogenys (Lafresnaye 1852), Coragyps atratus, Coryphospingus pileatus (Wied-Neuwied 1821), Crax alector, Crotophaga major, Crotophaga sulcirostris Swainson 1827, Cryptoleucopteryx plumbea, Cyanocorax affinis (Pelzeln 1856), Cyclarhis gujanensis (J. F. Gmelin 1789), Dryocopus lineatus (Linnaeus 1766), Elaenia chiriquensis Lawrence 1865, Elanoides forficatus, Elanus leucurus, Falco deiroleucus, Fluviicola pica (Boddaert 1783), Forpus passerinus (Linnaeus 1758), Forpus xanthopterygius (Spix 1824), Furnarius leucopus Swainson 1838, Galbula ruficauda Cuvier 1816, Gallinula chloropus (Linnaeus 1758), Gampsonyx swainsonii, Geranospiza caerulescens, Glaucidium brasilianum (Gmelin 1788), Harpagus bidentatus, Harpia harpyja, Helicolestes hamatus, Hemitriccus margaritaceiventer (Orbigny & Lafresnaye, Himantopus mexicanus (Statius Muller 1776), Hylophilus flavipes Lafresnaye 1845, Hypnelus ruficollis (Wagler 1829), Icterus auricapillus Cassin 1848, Icterus galbula (Linnaeus 1758), Icterus nigrogularis (Hahn 1819), Ictinia mississippiensis, Ictinia plumbea, Inezia subflava (P. L. Sclater & Salvin 1873), Inezia tenuirostris (Cory 1913), Jabiru mycteria, Jacana jacana, Lepidopyga goudoti (Bourcier 1843), Leptotila verreauxi (Bonaparte 1855), Leucopternis melanops, Leucopternis semiplumbea, Machetornis rixosa, Megaceryle alcyon (Linnaeus 1758), Megaceryle torquata (Linnaeus 1766), Megarynchus pitangua (Linnaeus 1766), Megascops choliba, Melanerpes rubricapillus, Micrastur plumbeus, Mitu tomentosa, Molothrus bonariensis, Morphnarchus princeps, Morphnus guianensis, Myiarchus crinitus, Myiarchus venezuelensis Lawrence 1865, Myiopagis gaimardii (Orbigny 1840), Myiozetetes similis (Spix 1825), Myospiza humeralis (Bosc 1792), Nemosia pileata (Boddaert 1783), Neochen jubata, Opisthocomus hoazin, Oroaetus isidori, Ortalis ruficauda Jardine 1847, Pandion haliaetus, Parabuteo unicinctus, Patagioenas corensis (Jacquin 1784), Phaeomyias murina (Spix 1825), Pheucticus ludovicianus, Piculus chrysochloros (Vieillot 1818), Picumnus cinnamomeus Wagler 1829, Pilherodius pileatus (Boddaert 1783), Pionus sordidus (Linnaeus 1758), Pitangus lictor (Lichtenstein 1823), Pitangus sulphuratus, Polioptila plumbea (J. F. Gmelin 1788), Pseudastur albicollis, Pulsatrix perspicillata (Latham 1790), Pyrocephalus rubinus, Quiscalus lugubris, Quiscalus mexicanus (Gmelin 1788), Rostrhamus sociabilis, Sakesphorus canadensis (Linnaeus 1766), Saltator coerulescens Vieillot 1817, Sarcoramphus papa, Sarkidiornis melanotos (Pennant 1769), Spiza americana, Spizaetus tyrannus, Sporophila bouvronides (Lesson 1831), Sporophila intermedia Cabanis 1851, Sporophila nigricollis (Vieillot 1823), Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot 1817), Sterna superciliaris, Sturnella magna, Sublegatus arenarum (Salvin 1863), Synallaxis candei Orbigny & Lafresnaye 1838, Tachycineta bicolor (Vieillot 1808), Tapera naevia (Linnaeus 1766), Thamnophilus doliatus (Linnaeus 1764), Thraupis glaucocolpa Cabanis 1850, Thraupis palmarum, Thryothorus leucotis (Lafresnaye 1845), Tyrannus dominicensis (Gmelin 1788), Tyto alba, Vireo flavoviridis (Cassin 1851), Zenaida auriculata

editors

institution:

address:

publisher: Princeton University Press

accessed:
websites:
chapter:
series:
issue:
year: 1986

authors

authors: Hilty, S
authors: Brown, W. L.

title: A Guide to the Birds of Colombia

source:

type: book

tags: Accipiter collaris, Accipiter cooperii, Accipiter poliogaster, Accipiter superciliosus, Amazona ochrocephala, Andigena hypoglaucha, Aramus guarauna, Aratinga pertinax, Ardea alba, Ardea cocoi, Ardea herodias, Arremonops conirostris, Arremonops tocuyensis, Atalotriccus pilaris, Attila spadiceus, Basileuterus flaveolus, Bubo virginianus, Busarellus nigricollis, Buteogallus anthracinus, Buteogallus meridionalis, Buteogallus schistaceus, Buteogallus solitarius, Buteogallus urubitinga, Cacicus cela, Cairina moschata, Campylorhynchus trochilirostris (Lichtenstein 1820, Campylorhynchus griseus (Swainson 1838), Campylorhynchus nuchalis (Cabanis 1847), Caprimulgus cayennensis (Gmelin 1789), Cardinalis phoeniceus Bonaparte 1838, Carduelis psaltria (Say 1823), Cathartes aura, Cathartes burrovianus, Cathartes melambrotus, Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin 1788), Ceryle torquata, Chlorostilbon gibsoni (Fraser 1840), Chondrohierax uncinatus, Chordeiles acutipennis (Hermann 1783), Chrysomus icterocephalus, Circus buffoni, Circus cinereus, Circus cyaneus, Coccyzus pumila, Columbina minuta (Linnaeus 1766), Conirostrum leucogenys (Lafresnaye 1852), Coragyps atratus, Coryphospingus pileatus (Wied-Neuwied 1821), Crax alector, Crotophaga major, Crotophaga sulcirostris Swainson 1827, Cryptoleucopteryx plumbea, Cyanocorax affinis (Pelzelin 1856), Cyclarhis gujanensis (J. F. Gmelin 1789), Dryocopus lineatus (Linnaeus 1766), Elaenia chiriquensis Lawrence 1865, Elanoides forficatus, Elanus leucurus, Falco deiroleucus, Fluvicola pica (Boddaert 1783), Forpus passerinus (Linnaeus 1758), Forpus xanthopterygius (Spix 1824), Furnarius leucopus Swainson 1838, Galbula ruficauda Cuvier 1816, Gallinula chloropus (Linnaeus 1758), Gampsonyx swainsonii, Geranospiza caerulescens, Glaucidium brasilianum (Gmelin 1788), Harpagus bidentatus, Harpia harpyja, Helicolestes hamatus, Hemitriccus margaritaceiventer (Orbigny & Lafresna, Himantopus mexicanus (Statius Muller 1776), Hylophilus flavipes Lafresnaye 1845, Hypnelus ruficollis (Wagler 1829), Icterus auricapillus Cassin 1848, Icterus galbula (Linnaeus 1758), Icterus nigrogularis (Hahn 1819), Ictinia mississippiensis, Ictinia plumbea, Inezia subflava (P. L. Sclater & Salvin 1873), Inezia tenuirostris (Cory 1913), Jabiru mycteria, Jacana jacana, Lepidopyga goudoti (Bourcier 1843), Leptotila verreauxi (Bonaparte 1855), Leucopternis melanops, Leucopternis semiplumbea, Machetornis rixosa, Megaceryle alcyon (Linnaeus 1758), Megaceryle torquata (Linnaeus 1766), Megarynchus pitangua (Linnaeus 1766), Megascops choliba, Melanerpes rubricapillus, Micrastur plumbeus, Mitu tomentosa, Molothrus bonariensis, Morphnarchus princeps, Morphnus guianensis, Myiarchus crinitus, Myiarchus venezuelensis Lawrence 1865, Myiopagis gaimardii (Orbigny 1840), Myiozetetes similis (Spix 1825), Myospiza humeralis (Bosc 1792), Nemosia pileata (Boddaert 1783), Nechoen jubata, Opisthocomus hoazin, Oroaetus isidori, Ortalis ruficauda Jardine 1847, Pandion haliaetus, Parabuteo unicinctus, Patagioenas corensis (Jacquin 1784), Phaeomyias murina (Spix 1825), Pheucticus ludovicianus, Piculus chrysochloros (Vieillot 1818), Picumnus cinnamomeus Wagler 1829, Pilherodius pileatus (Boddaert 1783), Pionus sordidus (Linnaeus 1758), Pitangus lictor (Lichtenstein 1823), Pitangus sulphuratus, Polioptila plumbea (J. F. Gmelin 1788), Pseudastur albicollis, Pulsatrix perspicillata (Latham 1790), Pyrocephalus rubinus, Quiscalus lugubris, Quiscalus mexicanus (Gmelin 1788), Rostrhamus sociabilis, Sakesphorus canadensis (Linnaeus 1766), Saltator coerulescens Vieillot 1817, Sarcoramphus papa, Sarkidiornis melanotos (Pennant 1769), Spiza americana, Spizaetus tyrannus, Sporophila bouvronides (Lesson 1831), Sporophila intermedia Cabanis 1851, Sporophila nigricollis (Vieillot 1823), Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot 1817), Sterna supercilialis, Sturnella magna, Sublegatus arenarum (Salvin 1863), Synallaxis candei Orbigny & Lafresnaye 1838, Tachycineta bicolor (Vieillot 1808), Tapera naevia (Linnaeus 1766), Thamnophilus doliatus (Linnaeus 1764), Thraupis glaucocolpa Cabanis 1850, Thraupis palmarum, Thryothorus leucotis (Lafresnaye 1845), Tyrannus dominicensis (Gmelin 1788), Tyto alba, Vireo flavoviridis (Cassin 1851), Zenaida auriculata

abstract:

identifiers

last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:

[mediaURL](#)

description:

[subject](#)

source:

[audience](#)

bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:

[agent](#)

contentType:
dataType:
identifier:

distributionUnstructured: Se encuentra en alturas hasta 4000 m (Hilty & Brown 1986). En bases de datos y monitoreos de fauna se encontró que: Esta especie se distribuye en: La Guajira (Cerrejón 2010). Para las siguientes subespecies la distribución en Colombia es:
Bubo virginianus nacurutu Bolívar, Huila, La Guajira, Santander (ICN 2004)
Bubo virginianus nigrescens Bolívar, Cesar, La Guajira (Collections MNH 2012). Su regiones naturales son la Andina y Caribe de Colombia. A nivel mundial en las bases de datos se encontró que:š
Esta especie se distribuye en: Canadá, Ecuador, Estados Unidos, México (Arctos 2012)
Las siguientes subespecies se distribuyen en:
Bubo virginianus nigrescens Colombia (Collections MNH 2012)
Bubo virginianus algistus Estados Unidos (Arctos 2012)
Bubo virginianus elachistus México (Arctos 2012)
Bubo virginianus lagophonus Canadá, Estados Unidos (Arctos 2012)
Bubo virginianus mayensis México (Arctos 2012)
Bubo virginianus melancerus El Salvador (Arctos 2012)
Bubo virginianus nacurutu Argentina, Perú (Arctos 2012)
Bubo virginianus occidentalis Canadá, Estados Unidos (Arctos 2012)
Bubo virginianus pacificus Estados Unidos, México (Arctos 2012)
Bubo virginianus pallescens Estados Unidos, México (Arctos 2012)
Bubo virginianus pinorum Estados Unidos (Arctos 2012)
Bubo virginianus saturatus Canadá, Estados Unidos (Arctos 2012)
Bubo virginianus subarcticus Estados Unidos (Arctos 2012)
Bubo virginianus virginianus Canadá, Estados Unidos (Arctos 2012)
Bubo virginianus wapacuthu Canadá, Estados Unidos (Arctos 2012)

[distributionAtomized](#)

stateProvince: La Guajira

ancillaryData

locality:
municipality:
country: Colombia

temporalCoverage

endDate:
startDate:

distributionScope

type:

threatStatus

ancillaryData

threatStatusUnstructured:

threatStatusAtomized

apendiceCITES:
locality:
municipality:
county:
stateProvince:
country: Global
0: IUCN
measurementValue: Preocupación menor (LC)
relatedTo:
measurementRemarks:
measurementMethod:

measurementDeterminedBy

measurementDeterminedDate:
measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementType: IUCN
measurementID:

territory

territoryUnstructured:
areaOfOccupancy:
extentOfOccurrence:

populationBiology

populationBiologyUnstructured:

legislation

legislationUnstructured:

directThreats

directThreatsUnstructured:

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights:
license:
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:

measurementOrFact

relatedTo:
measurementRemarks:
measurementMethod:
measurementDeterminedDate:
measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementValue:
measurementType:
measurementID:

abstract: Mide entre 48 y 56 cm. Tiene ojos amarillos. Por encima de color pardo oscuro moteado con colores ante y gris, disco facial blanco anteado bordeado de negro; la garganta blanca y el resto de las partes inferiores con barras estrechas pardo oscuro y blanquecino; en el pecho tiene unas pocas estrías anchas de color negro (Hilty & Brown 1986).

associatedParty

role:
personnelIdentifier:
personnelDirectory:
homepage:
email: edgarestebanhc@gmail.com
phone:
postalCode:
country:
state:
city:
address:
organisation:
position:
lastName: Herrera Collazos
firstName: Edgar Esteban

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation: Registros biológicos:
Portal de datos GBIF

reference

geoPoint:
location:
thumbnailURL:
mediaURL: <http://data.gbif.org/species/5959118/>
description:

subject

source: <http://data.gbif.org>

audience

bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:

agent

contentType:
dataType:
identifier:

_id
_bsontype: ObjectID
id: Vç™šfÄW Dä `