

Reporte de Fichas para el usuario: edith gómez

Ficha ID: 56c6909bf0106c67230e73cf

Fecha de creación: undefined

annualCycles

annualCycleUnstructured:

habitats

0

dataObject:

additionalInformation:

0

link: <http://www.hbw.com/species/white-tailed-kite-elanus-leucurus>

keywords: Elanus leucurus

0: del Hoyo, J

1: Elliott, A

2: Sargatal, J

3: Christie, D A

4: de Juana, E

institution:

address:

publisher: Lynx Edicions

accessed:

websites:

chapter:

series:

issue:

year: 2014

0: Bierregaard, R O

1: Marks, J S

2: Boesman, P

title: White-tailed Kite (Elanus leucurus)

source: Handbook of the Birds of the World Alive

type: book_section

tags: Elanus leucurus

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

1

keywords: Accipiter bicolor,Accipiter striatus,Buteo platypterus,Cathartes aura,Coragyps atratus,Elanus leucurus,Falco peregrinus,Vultur gryphus

0: Rodri0 wVWç 2âÂ Æ-Æ- æ

1: Villa G., Claudia Mari0

2: Gaita0 â RâÂ Ö &“ a Margarita

institution:

address:

publisher: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

accessed:

websites:

chapter:

series:
issue:
year: 2005
0: Márquez, C
1: Bechard, M
2: Gast, F
3: Vanegas, V
title: Aves rapaces diurnas de Colombia
source:
type: book
tags: Accipiter bicolor,Accipiter striatus,Buteo platypterus,Cathartes aura,Coragyps atratus,Elanus leucurus,Falco peregrinus,Vultur gryphus
abstract:
last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Asociación Bogotana de Ornitología
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:
habitatUnstructured: El Milano Blanco habita en terrenos despejados, abiertos, agrícolas; en matorrales y pastizales naturales, sabanas, pantanos y humedales con vegetación baja. Vive bien en áreas perturbadas y se beneficia de la apertura de claros y la deforestación, también, en campos de soja y tierras de pastoreo en Argentina y Chile, incluso en espacios urbanos y suburbanos. Prefiere campos ligeramente pastoreados o sin actividad de pastoreo, dado que esto reduce el número de presas. En California, Estados Unidos, a menudo utiliza las zonas de riberas adyacentes a espacios abiertos. En ocasiones se posan en grupos en árboles y rara vez forman dormideros comunales (Bierregaard et al., 2014; Márquez et al., 2005).

[commonNamesAtomized](#)

[ancillaryData](#)

usedBy:
usedIn
distributionUnstructured:
endDate:
startDate:

[ancillaryData](#)

type:
language: Español
name: Milano cola blanca

usesManagementAndConservation

[ancillaryData](#)

managementAndConservationUnstructured:

[managementAndConservationAtomized](#)

identificationKeys

fullDescription

0

dataObject:

additionalInformation:

0

keywords: Accipiter bicolor,Accipiter striatus,Buteo platypterus,Cathartes aura,Coragyps atratus,Elanus leucurus,Falco peregrinus,Vultur gryphus

0: Rodri0 wVWç 2âÄ Æ-Æ- æ

1: Villa G., Claudia Mari0

2: Gaita0 â RâÄ Ö &" a Margarita

institution:

address:

publisher: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

accessed:

websites:

chapter:

series:

issue:

year: 2005

0: Márquez, C

1: Bechard, M

2: Gast, F

3: Vanegas, V

title: Aves rapaces diurnas de Colombia

source:

type: book

tags: Accipiter bicolor,Accipiter striatus,Buteo platypterus,Cathartes aura,Coragyps atratus,Elanus leucurus,Falco peregrinus,Vultur gryphus

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

1

link: <http://www.hbw.com/species/white-tailed-kite-elanus-leucurus>

keywords: Elanus leucurus

0: del Hoyo, J

1: Elliott, A

2: Sargatal, J

3: Christie, D A

4: de Juana, E
institution:
address:
publisher: Lynx Edicions
accessed:
websites:
chapter:
series:
issue:
year: 2014
0: Bierregaard, R O
1: Marks, J S
2: Boesman, P
title: White-tailed Kite (*Elanus leucurus*)
source: Handbook of the Birds of the World Alive
type: book_section
tags: *Elanus leucurus*
abstract:
last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Asociación Bogotana de Ornitología
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:

fullDescriptionUnstructured: Ambos sexos son similares. Su longitud esta entre 35 y 43 cm y su peso oscila entre 174 y 186 g. El Milano blanco no presenta otras fases de coloración o morfos. Los adultos tienen la parte dorsal gris-azul pálido; la cabeza, coberteras alares medianas, los hombros y las coberteras alares menores son negras conformando un parche conspicuo en el ala. Tiene un antifaz negro formado en la región loreal y por encima del ojo. La frente, lados de la cabeza y partes inferiores son blancas, las coberteras inferiores blancas y gris pálido. Iris naranja rojizo, pico negro, tarsos y dedos amarillos crema. El juvenil tiene la parte trasera de la coronilla y nuca salpicados de marrón y blanco, el dorso y los escapulares color café oscuro con plumas finamente terminadas en blanco. Garganta y pecho salpicados de canela (Márquez et al., 2005). Conforman una superespecie con *Elanus caeruleus* y con *Elanus axillaris*, las cuales a veces son consideradas como una sola especie, pero las diferencias morfológicas y de comportamiento ameritan el tratamiento independiente de *Elanus leucurus* (Bierregaard et al., 2014).

briefDescription:

references

link: Neotropical Birds Online http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p{_}p{_}spp=120156
keywords: *Elanus leucurus*

editors

editors: Schulenberg, Thomas S
institution:
address:
publisher:
accessed:
websites:
chapter:
series:
issue:
year: 2010

authors

authors: The Cornell Lab of Ornithology
title: White-tailed Kite (*Elanus leucurus*)
source:
type: miscellany
tags: *Elanus leucurus*
abstract:

identifiers

last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:

taxonRecordName

ancillaryData

providerSpecificData

anyTwo:
providerLink:

publicationStatus

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

replacementNameFor

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:

ruleConsidered:

sanctioned

microReference:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

laterHomonymOf

microReference:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

conservedAgainst

basedOn

microReference:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

basionym

microReference:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

spellingCorrentionOf

typeNameEntity

source:

datatype:

identifier:

source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:

typificacion

typeOfType:

[lectotypeMicroReferenceVoucher](#)

[lectotypePublicationVoucher](#)

[voucherReference](#)

simple:
microReference:
year:

publishedIn

simple:
source:
datatype:
identifier:

specialAuthorship

[authors](#)

[year](#)

simple:

canonicalAuthorship

[authors](#)

[year](#)

simple:
simple: (Vieillot, 1818)

canonicalName

infraspecificEpithet:
specificEpithet:
infragenericEpithet:
linkType:
ref:
uninomial:
simple: Elanus leucurus
rank: SPECIES
simple: Elanus leucurus (Vieillot, 1818)

attributes

nomenclaturalCode:
isAnamorphic:
id:

[synonymsAtomized](#)

[hierarchy](#)

[ancillaryData](#)

dataObject:
additionalInformation:

[reference](#)

geoPoint:
location:
thumbnailURL:

[mediaURL](#)

description:

[subject](#)

source: The Catalogue of Life, 3rd January 2011

[audience](#)

bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights:
license:
title:
modified: 2016-02-19T03:38:44.837Z
created: 2016-02-19T03:38:44.837Z

[agent](#)

homepage:
role:
email:
phone:
address:
position:
organisation:
lastName:
firstName:
mimeType:
dataType:
identifier:
parentTaxon: Elanus
higherClassification:
infraspecificEpithet:
specificEpithet:
taxonRank: SPECIES
subGenus:
genus: Elanus

family: Accipitridae
order: Accipitriformes
classHierarchy: Aves
phylum: Chordata
kingdom: Animalia
recommended:
classification:

invasiveness

invasivenessUnstructured:

reproduction

0

dataObject:
additionalInformation:

0

link: <http://www.hbw.com/species/white-tailed-kite-elanus-leucurus>

keywords: Elanus leucurus

0: del Hoyo, J

1: Elliott, A

2: Sargatal, J

3: Christie, D A

4: de Juana, E

institution:

address:

publisher: Lynx Edicions

accessed:

websites:

chapter:

series:

issue:

year: 2014

0: Bierregaard, R O

1: Marks, J S

2: Boesman, P

title: White-tailed Kite (Elanus leucurus)

source: Handbook of the Birds of the World Alive

type: book_section

tags: Elanus leucurus

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

1

keywords: Accipiter bicolor,Accipiter striatus,Buteo platypterus,Cathartes aura,Coragyps atratus,Elanus leucurus,Falco peregrinus,Vultur gryphus

0: Rodri0 wVWç 2âÄ Æ–Æ– æ

1: Villa G., Claudia Mari0

2: Gaita0 â RâÄ Ö &“ a Margarita

institution:

address:
publisher: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
accessed:
websites:
chapter:
series:
issue:
year: 2005
0: Márquez, C
1: Bechard, M
2: Gast, F
3: Vanegas, V
title: Aves rapaces diurnas de Colombia
source:
type: book
tags: Accipiter bicolor,Accipiter striatus,Buteo platypterus,Cathartes aura,Coragyps atratus,Elanus leucurus,Falco peregrinus,Vultur gryphus
abstract:
last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Asociación Bogotana de Ornitología
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:
reproductionUnstructured: En el norte de Sudamérica la época reproductiva ha sido descrita para los meses de febrero a mayo. En enero forman parejas en Estados Unidos, en diciembre se observaron huevos en Panamá y en junio volantones; entre septiembre y noviembre se ha observado actividad reproductiva en Argentina y Chile (Bierregaard et al., 2014). El nido es construido con chamizas secas, hierbas y paja; en lo alto de los árboles. En ocasiones utiliza nidos abandonados de otras especies y los reconstruye. Ambos sexos construyen el nido, pero una vez que comienza la cópula, el macho proporciona casi todo el alimento hasta que sea próximo el nacimiento del polluelo. Normalmente pone de 3 a 5 huevos, muy raramente 6, con dimensiones de 43 x 33 mm; el período de incubación dura de 30 a 32 días; los pichones están emplumados y listos para volar entre los 35 y 40 días de nacidos. Es muy posible que el Milano Blanco en años de abundancia de presas pueda tener hasta dos nidadas por año (Bierregaard et al., 2014; Márquez et al., 2005).

molecularData
molecularDataUnstructured:
migratory
migratoryUnstructured:
lifeForm

lifeFormUnstructured:

lifeCycle

lifeCycleUnstructured:

interactions

0

dataObject:

additionalInformation:

0

keywords: Accipiter bicolor,Accipiter striatus,Buteo platypterus,Cathartes aura,Coragyps atratus,Elanus leucurus,Falco peregrinus,Vultur gryphus

0: Rodri0 wVWç 2âÄ Æ-Æ- æ

1: Villa G., Claudia Mari0

2: Gaita0 â RâÄ Ö &“ a Margarita

institution:

address:

publisher: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

accessed:

websites:

chapter:

series:

issue:

year: 2005

0: Márquez, C

1: Bechard, M

2: Gast, F

3: Vanegas, V

title: Aves rapaces diurnas de Colombia

source:

type: book

tags: Accipiter bicolor,Accipiter striatus,Buteo platypterus,Cathartes aura,Coragyps atratus,Elanus leucurus,Falco peregrinus,Vultur gryphus

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

1

isbn: 1444341936

keywords: Elanus leucurus

institution:

edition: Second

address:

publisher: Department of Ecology, Evolution, and Natural Resources Rutgers University

accessed:

websites:

chapter:

series:

issue:

year: 2011

0: Morin, Peter J
title: Community ecology
source:
type: book
tags: Elanus leucurus
abstract:
last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Asociación Bogotana de Ornitología
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:

interactionsUnstructured: El Milano Blanco representa un ejemplo clásico del estudio de las dinámicas poblacionales entre predadores y presas que en ecología se conoce como “Respuesta numérica”; indica que la densidad de los depredadores se incrementa con el incremento de la densidad de presas (Morin, 2011). En términos prácticos para este caso, hay mayor abundancia del Milano Blanco en áreas urbanas o su periferia y en áreas de agricultura donde hay una mayor cantidad de ratas y ratones (Márquez et al., 2005).

feeding

0

dataObject:
additionalInformation:

0

link: <http://www.hbw.com/species/white-tailed-kite-elanus-leucurus>

keywords: Elanus leucurus

0: del Hoyo, J

1: Elliott, A

2: Sargatal, J

3: Christie, D A

4: de Juana, E

institution:

address:

publisher: Lynx Edicions

accessed:

websites:

chapter:

series:

issue:

year: 2014

0: Bierregaard, R O

1: Marks, J S
2: Boesman, P
title: White-tailed Kite (*Elanus leucurus*)
source: Handbook of the Birds of the World Alive
type: book_section
tags: *Elanus leucurus*
abstract:
last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:

1

keywords: *Accipiter bicolor*, *Accipiter striatus*, *Buteo platypterus*, *Cathartes aura*, *Coragyps atratus*, *Elanus leucurus*, *Falco peregrinus*, *Vultur gryphus*

0: Rodri0 wVWç 2âÄ Æ–Æ– æ

1: Villa G., Claudia Mari0

2: Gaita0 â RâÄ Ö &“ a Margarita

institution:

address:

publisher: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

accessed:

websites:

chapter:

series:

issue:

year: 2005

0: Márquez, C

1: Bechard, M

2: Gast, F

3: Vanegas, V

title: Aves rapaces diurnas de Colombia

source:

type: book

tags: *Accipiter bicolor*, *Accipiter striatus*, *Buteo platypterus*, *Cathartes aura*, *Coragyps atratus*, *Elanus leucurus*, *Falco peregrinus*, *Vultur gryphus*

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

2

keywords: *Actitis macularius*, *Ampelion rubrocristatus*, *Anas discors*, *Anisognathus igniventris*, *Ardea alba*, *Arremon assimilis*, *Asio flammeus*, *Asio stygius*, *Astragalinus psaltria*, *Atlapetes pallidinucha*, *Atlapetes schistaceus*, *Bartramia longicauda*, *Bubulcus ibis*, *Buteo platypterus*, *Buteo swainsoni*, *Butorides striata*, *Calidris melanotos*, *Cardellina canadensis*, *Catamenia analis*, *Catamenia inornata*, *Catharus fuscescens*, *Catharus ustulatus*, *Chaetocercus mulsant*, *Chrysomus icterocephalus*, *Cinnycerthia unirufa*, *Cistothorus apolinari*, *Coccyzus americanus*, *Coeligena bonapartei*, *Colibri coruscans*, *Columba livia*, *Conirostrum rufum*, *Conirostrum sitticolor*, *Contopus cooperi*, *Contopus fumigatus*, *Contopus sordidulus*, *Contopus virens*, *Coragyps atratus*, *Crotophaga ani*, *Crotophaga major*, *Diglossa albilatera*, *Diglossa cyanea*, *Diglossa humeralis*, *Diglossa lafresnayii*, *Diglossa sittoides*, *Dubusia taeniata*, *Egretta caerulea*, *Elaenia flavogaster*, *Elaenia frantzii*, *Elanus leucurus*

0: Stiles, F G

1: Bohórquez, C I

2: Cadena, C D

3: De la Zerda, S

4: Hernández, M

5: Roselli, L

6: Kelsey, M

7: Valencia, I D

8: Knapp, D

institution:

edition: Primera Ed

address:

publisher: Asociación Bogotana de Ornitología; Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 276

issue:

year: 2000

0: Asociación Bogotana de Ornitología

title: Aves de la Sabana de Bogotá: guía de campo

source:

type: book

tags: Actitis macularius, Ampelion rubrocristatus, Anas discors, Anisognathus igniventris, Ardea alba, Arremon assimilis, Asio flammeus, Asio stygius, Astragalinus psaltria, Atlapetes pallidinucha, Atlapetes schistaceus, Bartramia longicauda, Bubulcus ibis, Buteo platypterus, Buteo swainsoni, Butorides striata, Calidris melanotos, Cardellina canadensis, Catamenia analis, Catamenia inornata, Catharus fuscescens, Catharus ustulatus, Chaetocercus mulsant, Chrysomus icterocephalus, Cinnycerthia unirufa, Cistothorus apolinari, Coccyzus americanus, Coeligena bonapartei, Colibri coruscans, Columba livia, Conirostrum rufum, Conirostrum sitticolor, Contopus cooperi, Contopus fumigatus, Contopus sordidulus, Contopus virens, Coragyps atratus, Crotophaga ani, Crotophaga major, Diglossa albilatera, Diglossa cyanea, Diglossa humeralis, Diglossa lafresnayii, Diglossa sittoides, Dubusia taeniata, Egretta caerulea, Elaenia flavogaster, Elaenia frantzii, Elanus leucurus

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Asociación Bogotana de Ornitología

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

mimeType:

dataType:

identifier:

feedingUnstructured: El Milano Blanco se alimenta principalmente de ratas y ratones de campo, de pequeños mamíferos, a veces de otras aves, anfibios y reptiles. Consume roedores de un peso inferior a 60 g, estos comprenden entre un 95 y 98% de su dieta, aunque se ha registrado con presas de hasta 500 g. Dentro de un área a menudo se especializa en cazar ciertas especies, por ejemplo, Mus musculus o Microtus californicus en California,

Akodon olivaceus en Chile y Calomys sp. en Argentina; pero en general es un cazador generalista de pequeños mamíferos (Bierregaard et al., 2014). El tamaño de su territorio de caza es inversamente proporcional a la abundancia de su presa (Bierregaard et al., 2014) por eso esta ave se hace visible en lugares donde sean más abundante cierto tipo de roedores. Tiene una gran capacidad de abrir la boca, la cual le permite ingerir casi entero a un ratón pequeño. Sus egagrópilas son parecidas a las de los búhos: compactas con huesos y pelos sin digerir (Márquez et al., 2005). Durante el vuelo, cuando observa una presa, se para estático en el aire batiendo lentamente las alas, para caer suavemente sobre su presa si ésta no huye (Asociación Bogotana de Ornitología, 2000), también se ha observado cazando pequeñas aves en vuelo (Bierregaard et al., 2014). Frecuentemente se alimenta en praderas incendiadas, en grupos de hasta 20 individuos, remontándose y planeando a través del humo o perchado cerca de la línea de fuego. Se ha registrado a Buteo albicaudatus robando comida al Milano Blanco (Márquez et al., 2005). Caza todo el día, pero el pico de actividad se registra en horas crepusculares, generalmente entre las cuatro primeras horas del día y las cuatro últimas horas de luz (Bierregaard et al., 2014).

environmentalEnvelope

environmentalEnvelopeUnstructured:

ecologicalSignificance

ecologicalSignificanceUnstructured:

dispersal

dispersalUnstructured:

distance:

structureDispersed:

type:

purpose:

behavior

0

dataObject:

additionalInformation:

0

keywords: Accipiter bicolor,Accipiter striatus,Buteo platypterus,Cathartes aura,Coragyps atratus,Elanus leucurus,Falco peregrinus,Vultur gryphus

0: Rodri0 wVWç 2âÂ Æ–Æ– æ

1: Villa G., Claudia Mari0

2: Gaita0 â RâÂ Ö &“ a Margarita

institution:

address:

publisher: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

accessed:

websites:

chapter:

series:

issue:

year: 2005

0: Márquez, C

1: Bechard, M

2: Gast, F

3: Vanegas, V

title: Aves rapaces diurnas de Colombia

source:

type: book

tags: Accipiter bicolor,Accipiter striatus,Buteo platypterus,Cathartes aura,Coragyps atratus,Elanus leucurus,Falco peregrinus,Vultur gryphus

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

1

link: <http://www.hbw.com/species/white-tailed-kite-elanus-leucurus>

keywords: Elanus leucurus

0: del Hoyo, J

1: Elliott, A

2: Sargatal, J

3: Christie, D A

4: de Juana, E

institution:

address:

publisher: Lynx Edicions

accessed:

websites:

chapter:

series:

issue:

year: 2014

0: Bierregaard, R O

1: Marks, J S

2: Boesman, P

title: White-tailed Kite (Elanus leucurus)

source: Handbook of the Birds of the World Alive

type: book_section

tags: Elanus leucurus

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

2

keywords: Actitis macularius,Ampelion rubrocristatus,Anas discors,Anisognathus igniventris,Ardea alba,Arremon assimilis,Asio flammeus,Asio stygius,Astragalinus psaltria,Atlapetes pallidinucha,Atlapetes schistaceus,Bartramia longicauda,Bubulcus ibis,Buteo platypterus,Buteo swainsoni,Butorides striata,Calidris melanotos,Cardellina canadensis,Catamenia analis,Catamenia inornata,Catharus fuscescens,Catharus ustulatus,Chaetocercus mulsant,Chrysomus icterocephalus,Cinnycerthia unirufa,Cistothorus apolinari,Coccyzus americanus,Coeligena bonapartei,Colibri coruscans,Columba livia,Conirostrum rufum,Conirostrum sitticolor,Contopus cooperi,Contopus fumigatus,Contopus sordidulus,Contopus virens,Coragyps atratus,Crotophaga ani,Crotophaga major,Diglossa albilatera,Diglossa cyanea,Diglossa humeralis,Diglossa lafresnayii,Diglossa sittoides,Dubusia taeniata,Egretta caerulea,Elaenia flavogaster,Elaenia frantzii,Elanus leucurus

0: Stiles, F G

1: Bohórquez, C I

2: Cadena, C D

3: De la Zerda, S

4: Hernández, M

5: Roselli, L
6: Kelsey, M
7: Valencia, I D
8: Knapp, D
institution:
edition: Primera Ed
address:
publisher: Asociación Bogotana de Ornitología; Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
accessed:
websites:
chapter:
series:
pages: 276
issue:
year: 2000

0: Asociación Bogotana de Ornitología
title: Aves de la Sabana de Bogotá: guía de campo

source:
type: book
tags: Actitis macularius, Ampelion rubrocristatus, Anas discors, Anisognathus igniventris, Ardea alba, Arremon assimilis, Asio flammeus, Asio stygius, Astragalinus psaltria, Atlapetes pallidinucha, Atlapetes schistaceus, Bartramia longicauda, Bubulcus ibis, Buteo platypterus, Buteo swainsoni, Butorides striata, Calidris melanotos, Cardellina canadensis, Catamenia analis, Catamenia inornata, Catharus fuscescens, Catharus ustulatus, Chaetocercus mulsant, Chrysomus icterocephalus, Cinnycerthia unirufa, Cistothorus apolinari, Coccyzus americanus, Coeligena bonapartei, Colibri coruscans, Columba livia, Conirostrum rufum, Conirostrum sitticolor, Contopus cooperi, Contopus fumigatus, Contopus sordidulus, Contopus virens, Coragyps atratus, Crotophaga ani, Crotophaga major, Diglossa albilatera, Diglossa cyanea, Diglossa humeralis, Diglossa lafresnayii, Diglossa sittoides, Dubusia taeniata, Egretta caerulea, Elaenia flavogaster, Elaenia frantzii, Elanus leucurus

abstract:
last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:

rightsHolder:
rights: Asociación Bogotana de Ornitología
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:

behaviorUnstructured: El Milano Blanco es un ave de vuelo armonioso que suele cernirse a una altura de 30-35 m para escudriñar el paisaje, coloca sus alas en una posición de “V” con aleteos regulares permaneciendo estático en un mismo sitio. En otras ocasiones se puede observar en una combinación de vuelo “rutero” o de “patrullaje” combinado con “paradas” en el aire para cernirse por algunos segundos y para eventualmente descender o clavarse en forma relativamente lenta sobre su presa. El Milano Blanco también puede ser observado posado en perchas altas como árboles secos, en medio de zonas abiertas (Márquez et al., 2005). Son migratorias o nómadas cuando disminuye la abundancia de presas; la transición entre poblaciones migratorias y residentes es desconocida, sobre todo en Sudamérica. A menudo se congregan en dormideros comunales durante el invierno (Bierregaard et al.,

2014).

Generalmente silencioso, los llamados de contacto son silbidos altos y finos kiuup o kiiip kiiip (Aves de la Sabana de Bogotá: guía de campo, 2000) emitidos por ambos sexos. También un distintivo disilábico Whee krrrr, la primera nota es un silbido y la segunda un sonido áspero; lo emiten en alarma, en la transferencia de alimentos a polluelos, durante la copula, etc., el llamado áspero también es emitido en vuelo (Bierregaard et al., 2014). En el norte de Sudamérica la época reproductiva ha sido descrita para los meses de febrero a mayo. En enero forman parejas en Estados Unidos, en diciembre se observaron huevos en Panamá y en junio volantones; entre septiembre y noviembre se ha observado actividad reproductiva en Argentina y Chile (Bierregaard et al., 2014). El nido es construido con chamizas secas, hierbas y paja; en lo alto de los árboles. En ocasiones utiliza nidos abandonados de otras especies y los reconstruye. Ambos sexos construyen el nido, pero una vez que comienza la cópula, el macho proporciona casi todo el alimento hasta que sea próximo el nacimiento del polluelo. Normalmente pone de 3 a 5 huevos, muy raramente 6, con dimensiones de 43 x 33 mm; el período de incubación dura de 30 a 32 días; los pichones están emplumados y listos para volar entre los 35 y 40 días de nacidos. Es muy posible que el Milano Blanco en años de abundancia de presas pueda tener hasta dos nidadas por año (Bierregaard et al., 2014; Márquez et al., 2005).

ancillaryData

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights:

license:

modified:

created:

contentType:

dataFormat:

identifier:

measurementOrFact

relatedTo:

measurementRemarks:

measurementMethod:

measurementDeterminedDate:

measurementUnit:

measurementAccuracy:

measurementValue:

measurementType:

measurementID:

endemicAtomized

distribution

ancillaryData

dataObject:

additionalInformation:

reference

keywords: Accipiter bicolor, Accipiter striatus, Buteo platypterus, Cathartes aura, Coragyps atratus, Elanus leucurus, Falco peregrinus, Vultur gryphus

editors

editors: Rodri0 wVWç 2âÂ Æ–Æ– æ
editors: Villa G., Claudia Mari0
editors: Gaita0 â RâÂ Ö &“ a Margarita
institution:
address:
publisher: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
accessed:
websites:
chapter:
series:
issue:
year: 2005

authors

authors: Márquez, C
authors: Bechard, M
authors: Gast, F
authors: Vanegas, V
title: Aves rapaces diurnas de Colombia
source:
type: book
tags: Accipiter bicolor, Accipiter striatus, Buteo platypterus, Cathartes aura, Coragyps atratus, Elanus leucurus, Falco peregrinus, Vultur gryphus
abstract:

identifiers

last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source:

audience

bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Asociación Bogotana de Ornitología
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:

agent

mimeType:
dataType:
identifier:
distributionUnstructured: El Milano Blanco se distribuye desde el sur y occidente de Estados Unidos, hasta Argentina y Chile (Márquez et al., 2005). Se reconocen dos subespecies, Elanus leucurus majusculus (Bangs & T. E. Penard, 1920) en el occidente y sur de Estados Unidos, desde Washington hasta California y Arizona, Texas, Florida y en ocasiones, sur de Carolina; esta misma subespecie está en el norte de México y en Centroamérica en Costa Rica. Elanus leucurus leucurus (Vieillot, 1818) se encuentra en Panamá, Colombia, Guyanas, Brasil, y desde la Amazonía hasta Argentina y Chile (Bierregaard et al., 2014). En Colombia se encuentra en el Golfo de Urabá al oriente de la costa Caribe, alto Cauca, en partes secas del valle del Magdalena, Tolima, Cundinamarca, desde el Norte de Santander hasta río Guaviare y Caquetá (Hilty & Brown, 1986; Márquez et al., 2005). En el país normalmente se encuentra hasta 1000 msnm, ocasionalmente hasta 1800 (cerca de Popayán) y 2600 msnm (Bogotá) (Hilty & Brown, 1986; Márquez et al., 2005), aunque en los últimos años ha aumentado su rango altitudinal hasta 2800 msnm en los alrededores de la sabana de Bogotá (Márquez et al., 2005) y se conoce un registro a 4200 msnm en Perú (Bierregaard et al., 2014).

distributionAtomized

stateProvince: Córdoba

ancillaryData

locality:
municipality:
country: Colombia
temporalCoverage
endDate:
startDate:
distributionScope
type:

threatStatus

ancillaryData

threatStatusUnstructured:
threatStatusAtomized
apendiceCITES: Apéndice II
locality:
municipality:
county:
stateProvince:
country: Global
0: IUCN
measurementValue: Preocupación menor (LC)
relatedTo:
measurementRemarks:
measurementMethod:

measurementDeterminedBy

measurementDeterminedDate:

measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementType: IUCN
measurementID:

territory

territoryUnstructured:
areaOfOccupancy:
extentOfOccurrence:

populationBiology

0

dataObject:
additionalInformation:

0

link: <http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22695036>

keywords: Elanus leucurus

institution:

address:

publisher:

accessed:

websites:

chapter:

series:

issue:

year: 2014

0: BirdLife International

title: Species factsheet: Elanus leucurus

source:

type: miscellany

tags: Elanus leucurus

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Asociación Bogotana de Ornitología

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

populationBiologyUnstructured: La población se ha estimado en un número total entre 500,000 y 4,999,999 individuos. La tendencia de la población ha ido aumentando en Norteamérica (BirdLife International, 2014).

legislation

legislationUnstructured:

directThreats

directThreatsUnstructured:

ancillaryData

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights:

license:

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

measurementOrFact

relatedTo:

measurementRemarks:

measurementMethod:

measurementDeterminedDate:

measurementUnit:

measurementAccuracy:

measurementValue:

measurementType:

measurementID:

abstract: El Milano Blanco es una elegante rapaz de hábitats abiertos, se le observa en pastizales y sabanas. Se distribuye desde Estados Unidos, pasando por varias regiones al sur, Centroamérica y Sudamérica llegando hasta Argentina y Chile. Al parecer tiene migraciones latitudinales durante el invierno y también se mueven de acuerdo a la abundancia de presas. Es un ave visible y fácilmente identificable por su plumaje brillante. Los adultos son blanco por debajo y por encima de gris pálido, con las coberteras alares contrastando de negro, un parche del mismo color alrededor de los ojos y con iris rojo. Se puede observar en su vuelo cernido y muy característico durante la búsqueda de presas. Se alimenta de pequeños vertebrados, principalmente ratones, anfibios, lagartos y aves; que caza de forma relativamente lenta. Construyen sus nidos en parejas en árboles altos. Durante la temporada no reproductiva, ocasionalmente se refugian en dormideros comunitarios donde se han contado más de 100 individuos. El territorio de poblaciones no reproductivas se limita principalmente por la disponibilidad de alimento, mientras que las poblaciones de cría parecen limitadas tanto por el alimento como por la disponibilidad de sitios de anidamiento (Bierregaard et al., 2014; The Cornell Lab of Ornithology, 2010; Dunk, 1995).

[associatedParty](#)

role:

personnelIdentifier:

personnelDirectory:

homepage:

email: enataliagomez@gmail.com

phone:

postalCode:
country: Colombia
state: Bogotá Distrito Capital
city: Bogotá D.C.
address:
organisation:
position:
lastName: Gómez Melendro
firstName: Edith Natalia

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation:

reference

geoPoint:
location:
thumbnailURL:
mediaURL: <https://www.youtube.com/watch?v=txuOsmS319o>
description:

subject

source: <https://www.youtube.com>

audience

bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights:
license:
modified:
created:

agent

contentType:
dataType:
identifier:

_id

_bsontype: ObjectId

id: VÆ•ð lg#ç<ð