

Reporte de Fichas para el usuario: edith gómez

Ficha ID: 56d5c7bc3c16479905cba8f9

Fecha de creación: 2016-03-01T16:47:58.884Z

annualCycles

annualCycleUnstructured:

habitats

0

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

mimeType:

dataType:

identifier:

habitatUnstructured: Esta especie habita en manglares, pantanos, y bordes de arroyos y lagunas de tierras bajas principalmente (Reid B. 1977). En La Guajira se reportó que esta especie se encuentra en hábitats acuáticos como ríos, lagunas, cuerpos de agua estacionales y bahías ribereñas (Cerrejón 2009-2010). En Isla Fuerte, Córdoba Butorides virescens ha sido encontrada en los manglares de la zona norte (Estela 2006). En Cuba se ha reportado su presencia en los arrozales durante todo el año (Mugica Valdes 1993). En el sur de México se han observado individuos en aguas sulfurosas (Riesch et al. 2010).

[commonNamesAtomized](#)

[ancillaryData](#)

usedBy:

usedIn

distributionUnstructured:

endDate:

startDate:

[ancillaryData](#)

type:

language: Español

name: Garceta verde

creation_date: 2016-03-01T16:47:58.884Z

usesManagementAndConservation

[ancillaryData](#)

managementAndConservationUnstructured:

[managementAndConservationAtomized](#)

identificationKeys

fullDescription

0

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

fullDescriptionUnstructured: Mide 43 cm. y pesa 210 gr. Es pequeño, de cuello despelucado; las patas son amarillo brillante y contrastan con el plumaje oscuro al volar. En los adultos la coronilla y cresta son despelucadas y negras.

El cuello es castaño rojizo, y la garganta y raya en medio del abdomen son blancas. Por encima es de color verde metálico y presenta las coberteras de las alas escamadas con ante. El abdomen es gris. El iris es amarillo y la maxila es negruzca, con su parte inferior amarillenta. La piel de la cara es amarilla con una línea café oscuro que se extiende del ojo al pico (Elizondo, 2000). Los ejemplares inmaduros son más oscuros, de colores más apagados y con más rayas que los adultos. Los individuos juveniles son mucho más café y de abdomen oscuro. La cabeza, el cuello y la región inferior se encuentran profusamente rayados con ante y negruzco. Las coberteras de la alas están salpicadas de blanco, y las puntas de las remeras también son blancas. La hembra del "mirasol" (*Ixobrychus exilis*) es más pequeña y presenta un parche ante en el ala (Elizondo, 2000).

briefDescription:

[references](#)

taxonRecordName

[ancillaryData](#)

providerSpecificData

anyTwo:

providerLink:

publicationStatus

microReference:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

replacementNameFor

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

sanctioned

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

laterHomonymOf

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

conservedAgainst

basedOn

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

basionym

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:

note:
ruleConsidered:

spellingCorrentionOf

typeNameEntity

source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:

typificacion
typeOfType:

lectotypeMicroReferenceVoucher

lectotypePublicationVoucher

voucherReference

simple:
microReference:
year:

publishedIn

simple:
source:
datatype:
identifier:

specialAuthorship

authors

year

simple:
canonicalAuthorship

authors

year

simple:
simple: (Linnaeus, 1758)

canonicalName

infraspecificEpithet:

specificEpithet:
infragenericEpithet:
linkType:
ref:
uninominal:
simple: Butorides virescens
rank: SPECIES
simple: Butorides virescens (Linnaeus, 1758)

attributes

nomenclaturalCode:
isAnamorphic:
id:

synonymsAtomized

ancillaryData

synonymStatus:
synonymName
anyTwo:

anyOne

providerLink:
microReference:

publishedIn

source:
datatype:
identifier:

reletedName

source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:
microReference:

publishedIn

source:
datatype:
identifier:

reletedName

source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:
microReference:

publishedIn

source:
datatype:
identifier:

reletedName

source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:
microReference:

publishedIn

source:
datatype:
identifier:

reletedName

source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:
microReference:

publishedIn

source:
datatype:
identifier:

reletedName

source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:
microReference:

publishedIn

source:
datatype:
identifier:

reletedName

source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

typeNameEntity

source:
datatype:
identifier:

source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:

typeVoucherEntity

typeOfType:
simple:
microReference:
year:
source:
datatype:
identifier:

combinationAuthorship

basionymAuthorship

simple:
authorship
simple:
simple: Linnaeus, 1758

epithet
infraspecificEpithet:
specificEpithet:
infragenericEpithet:

genus
linkType:
ref:
uninomial:
simple: Ardea virescens
rank: SPECIES
simple: Ardea virescens Linnaeus, 1758
nomenclaturalCode:
isAnamorphic:
id:

hierarchy

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation:

reference

geoPoint:
location:
thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source: The Catalogue of Life, 3rd January 2011

audience

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights:

license:

title:

modified: 2016-03-01T16:47:38.884Z

created: 2016-03-01T16:47:38.884Z

agent

homepage:

role:

email:

phone:

address:

position:

organisation:

lastName:

firstName:

contentType:

dataType:

identifier:

parentTaxon: Butorides

higherClassification:

infraspecificEpithet:

specificEpithet:

taxonRank: SPECIES

subGenus:

genus: Butorides

family: Ardeidae

order: Pelecaniformes

classHierarchy: Aves

phylum: Chordata

kingdom: Animalia

recommended:

classification:

invasiveness

invasivenessUnstructured:

reproduction

0

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:
reproductionUnstructured: Se considera un nidificante solitario. En un estudio conducido en Cuba se encontró que los nidos son construidos 1-2 m por encima del agua en los bosques de mangle negro y tenían un diámetro medio de 26,1 cm. El tamaño de la nidada fue de 2 a 3 huevos que midieron 38.11 * 28.2 cm en promedio. El peso de los polluelos recién nacidos fue 8% de la masa corporal del adulto (Denis 1999).

molecularData

molecularDataUnstructured:

migratory

migratoryUnstructured:

lifeForm

lifeFormUnstructured:

lifeCycle

lifeCycleUnstructured:

interactions

0

dataObject:
additionalInformation:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:
interactionsUnstructured: En Estados Unidos se encontró que *Hymenolepis ardeae* y *Dilepis unilateralis* son céstodos que parasitan a esta especie (Linton 1927). También el ácaro *Neonyssus belopolski* y los piojos *Ardeicola florida nigra* y *Ciconiphilus decimfasciatus* (Mitchell 1961; Tuff 1963 en Mayberry et al. 2000). En ese mismo país se ha registrado que *Butorides virescens* ha sido afectada fatalmente por el virus del Nilo occidental (Komar 2003).

feeding

0

dataObject:
additionalInformation:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:

feedingUnstructured: La mayor parte de la dieta de Butorides virescens está constituida por coleópteros acuáticos y peces (61%) (Denis 1999). En La Guajira se observó que forrajea en ambientes acuáticos y que se alimenta de peces (Cerrejón 2009-2010). En Puerto Rico la dieta de esta especie se compone principalmente de invertebrados y peces, ocasionalmente se alimenta de lagartijas y anfibios (Wetmore 1916 en Wiley 2001). En el noreste de República Dominicana, Wiley (2001) observó en dos oportunidades que individuos de Butorides virescens atacaron las nidadas y se alimentaron de poyuelos de Ploceus cucullatus (Wiley 2001).

environmentalEnvelope

environmentalEnvelopeUnstructured:

ecologicalSignificance

ecologicalSignificanceUnstructured:

dispersal

dispersalUnstructured:

distance:

structureDispersed:

type:

purpose:

behavior

0

dataObject:
additionalInformation:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:

behaviorUnstructured: Durante el forrajeo en el agua o en tierra, Butorides virescens permanece agazapado e inmóvil, con el cuerpo en posición horizontal, las extremidades posteriores flexionadas y la cabeza y el cuello parcialmente retraídos, esperando a que una presa se aproxime. Esta estrategia se conoce como “stand and wait” (Meyerriecks 1960 en Kushlan 1976).

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights:
license:
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:

measurementOrFact

relatedTo:
measurementRemarks:
measurementMethod:
measurementDeterminedDate:
measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementValue:
measurementType:
measurementID:

endemicAtomized

distribution

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation:

reference

geoPoint:
location:
thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source:

audience

bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:

agent

mimeType:
dataType:
identifier:
distributionUnstructured: En bases de datos se encontró que:š
Esta especie se distribuye en: Estados Unidos (Collections MNH SI 2012); Chile, Estados Unidos, Honduras, México (Arctos 2012); Costa Rica (Obando-Calderón 2009); Cuba (Mugica Valdes 1993; Shaffer 2000). En bases de datos y monitoreos de fauna se encontró que:
La subespecie Butorides virescens virescens se distribuye en: Antioquia, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Bogotá, Bolívar, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre (ICN 2004), en las regiones Andina, Caribe y Orinoquia.

distriutionAtomized

stateProvince: San Andrés, Providencia y Santa Catalina

ancillaryData

locality:
municipality:
country: Colombia

temporalCoverage

endDate:
startDate:

distributionScope

type:

threatStatus

ancillaryData

threatStatusUnstructured:

threatStatusAtomized

apendiceCITES:
locality:
municipality:
county:
stateProvince:
country: Global
0: IUCN
measurementValue: Preocupación menor (LC)
relatedTo:
measurementRemarks:
measurementMethod:

measurementDeterminedBy

measurementDeterminedDate:
measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementType: IUCN
measurementID:

territory

territoryUnstructured:
areaOfOccupancy:
extentOfOccurrence:

populationBiology

populationBiologyUnstructured:

legislation

legislationUnstructured:

directThreats

directThreatsUnstructured:

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights:
license:
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:

measurementOrFact

relatedTo:
measurementRemarks:
measurementMethod:
measurementDeterminedDate:
measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementValue:
measurementType:
measurementID:

abstract: Butorides virescens mide entre 40-50 cm; los individuos de ambos sexos son similares en apariencia. Tienen la corona de color negro grisáceo, los lados de la cabeza y el cuello marrón herrumbre o púrpura castaño, la garganta y línea media del cuerpo son blancas con rayas prominentes. Las coberteras y plumas de vuelo internas de color verde con un borde estrecho de color ante, los bordes de las alas son de color pizarra; las plumas de la espalda son angostas y largas, de color mate azulado; las coberteras inferiores de la cola y las rectrices de color

verde brillante profundo; la superficie ventral del cuerpo y las alas son grises. El iris es amarillo brillante; el pico es negruzco por encima y amarillo por debajo; las extremidades posteriores son de color amarillo verdoso (Reid B. 1977). El dimorfismo sexual sólo es evidente en el tamaño del pico, que es mayor en los machos (Denis 1999).

associatedParty

role:
personnelIdentifier:
personnelDirectory:
homepage:
email: enataliagomezm@gmail.com
phone:
postalCode:
country: Colombia
state: Bogotá Distrito Capital
city: Bogotá D.C.
address:
organisation:
position:
lastName: Gómez Melendro
firstName: Edith Natalia

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation: Metadatos: Portal de datos GBIF
Otros recursos en Internet: Arctos, Avibase, SI NMNH, EoL, iSpecies, AVoCet, Colecciones en Línea, IUCN Red List,
Life Histories of North American Marsh Birds, Manual of Neotropical Birds, Volume 1, Nestling development of Green herons at San Blas, Nayarit, México, xeno-canto š
Créditos específicos: Ficha elaborada con el apoyo de Carbones del Cerrejón Limited.
Registros biológicos: Portal de datos GBIF

reference

geoPoint:
location:
thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source:

audience

bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:

agent

contentType:
dataType:

identifier:

_id

_bsontype: ObjectId

id: VÖÇ¼< G™\0●●