

## Reporte de Fichas para el usuario: edith gómez

Ficha ID: 56c66eb8f0106c67230e73c4

Fecha de creación: undefined

annualCycles

annualCycleUnstructured:

habitats

0

dataObject:

additionalInformation:

0

keywords: Accipiter striatus, Actitis macularius, Adelomyia melanogenys, Aglaiocercus kingii, Amblycercus holosericeus, Ampelion rubrocristatus, Anas andium, Anas clypeata, Anas discors, Andigena nigrirostris, Anisognathus igniventris, Ardea alba, Ardea herodias, Arremon assimilis, Asio flammeus, Asio stygius, Asthenes flammulata, Asthenes fuliginosa, Astragalinus psaltria, Atlapetes pallidinucha, Atlapetes schistaceus, Bubulcus ibis, Buteo platypterus, Buteo swainsoni, Butorides striata, Butorides virescens, Cairina moschata, Calidris bairdii, Calidris melanotos, Cardellina canadensis, Catamenia analis, Catamenia inornata, Cathartes aura, Catharus minimus, Catharus ustulatus, Chaetocercus mulsant, Chaetura pelagica, Chalcostigma heteropogon, Chordeiles minor, Chrysomus icterocephalus, Cinclodes albidiventris, Cinclus leucocephalus, Cinnycerthia unirufa, Cistothorus apolinari, Cistothorus platensis, Coccyzus pumila, Coccyzus americanus, Coccyzus melacoryphus, Coeligena bonapartei, Colibri coruscans, Colibri thalassinus, Columba livia, Columbina talpacoti, Conirostrum rufum, Conirostrum sitticolor, Contopus cinereus, Contopus fumigatus, Contopus sordidulus, Contopus virens, Coragyps atratus, Crotophaga ani, Crotophaga major, Dendrocygna autumnalis, Dendrocygna viduata, Diglossa albilatera, Diglossa cyanea, Diglossa humeralis, Diglossa lafresnayii, Diglossa sittoides, Dolichonyx oryzivorus, Dubusia taeniata, Egretta thula, Elaenia flavogaster, Elaenia frantzii, Elanus leucurus, Empidonax alnorum, Empidonax traillii, Ensifera ensifera, Eriocnemis cupreovertris, Eriocnemis vestita, Eupsittula pertinax, Falco columbarius, Falco peregrinus, Falco sparverius, Forpus conspicillatus, Fulica americana, Gallinago nobilis, Gallinula galeata, Geothlypis philadelphia, Geranoaetus melanoleucus, Glaucidium jardinii, Grallaria quitesis, Grallaria ruficapilla, Grallaria squamigera, Haplospiza rustica, Heliangelus amethysticollis, Heliangelus exortis, Hellmayrea gularis, Hemispingus superciliaris, Hemispingus verticalis, Henicorhina leucophrys, Hirundo rustica, Icterus chrysater, Icterus icterus, Icterus nigrogularis, Ixobrychus exilis, Jacana jacana, Lafresnaya lafresnayi, Leiothlypis peregrina, Leptasthenura andicola, Lesbia nuna, Lesbia victoriae, Mactornis rixosa, Margarornis squamiger, Mecocerculus leucophrys, Megascops choliba, Melanerpes rubricapillus, Merganetta armata, Metallura tyrianthina, Milvago chimachima, Mimus gilvus, Mniotilta varia, Molothrus bonariensis, Muscisaxicola alpinus, Myiarchus crinitus, Myiodynastes luteiventris, Myiotheretes fumigatus, Myiotheretes striaticollis, Myiothlypis nigrocristata, Nomonyx dominicus, Nycticorax nycticorax, Ochthoeca cinnamomeiventris, Ochthoeca diadema, Ochthoeca fumicolor, Ochthoeca rufipectoralis, Orochelidon murina, Oxypogon guerini, Oxyura jamaicensis, Pachyrhamphus versicolor, Pandion haliaetus, Pardirallus maculatus, Parkesia noveboracensis, Patagioenas fasciata, Petrochelidon pyrrhonota, Phaetusa simplex, Phalacrocorax brasilianus, Pheucticus aureoventris, Pheucticus ludovicianus, Phimosus infuscatus, Phrygilus unicolor, Phyllomyias uropygialis, Piaya cayana, Picoides fumigatus, Pipraeidea melanonota, Pipreola riefferii, Piranga olivacea, Piranga rubra, Pitangus sulphuratus, Pluvialis dominica, Podilymbus podiceps, Porphyrio martinicus, Porzana carolina, Progne tapera, Protonotaria citrea, Pseudocolopteryx acutipennis, Pseudoscops clamator, Pterophanes cyanopterus, Pygochelidon cyanoleuca, Pyrocephalus rubinus, Pyrrhomyias cinnamomeus, Quiscalus lugubris, Rallus semiplumbeus, Ramphocelus dimidiatus, Ramphomicron microrhynchum, Riparia riparia, Rupornis magnirostris, Sayornis nigricans, Serpophaga cinerea, Setophaga castanea, Setophaga cerulea, Setophaga petechia, Setophaga ruticilla, Setophaga striata, Sicalis flaveola, Sicalis luteola, Spiza americana, Sporagra spinescens, Sturnella magna, Synallaxis subpudica, Systellura longirostris, Tangara vitriolina, Thraupis episcopus, Thraupis palmarum, Tringa flavipes, Tringa melanoleuca, Tringa solitaria, Troglodytes aedon, Troglodytes solstitialis, Turdus fuscater, Turdus ignobilis, Tyrannus melancholicus, Tyrannus savana, Tyrannus tyrannus, Tyto alba, Vanellus chilensis, Vireo olivaceus, Vultur gryphus, Zenaida auriculata, Zonotrichia capensis

institution:

address:

publisher: Princeton University Press

profile\_id:

id:

1

link: [http://awsassets.panda.org/downloads/migratorias{\\\_}aves{\\\_}42{\\\_}final.pdf](http://awsassets.panda.org/downloads/migratorias{\_}aves{\_}42{\_}final.pdf)

keywords: Dolichonyx oryzivorus

0: Naranjo, L G

1: Amaya, J D

2: Eusse-González, D

3: Cifuentes-Sarmiento, Y

institution:

address:

publisher: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible / WWF Colombia

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 708

issue:

volume: 1

year: 2012

0: Johnston-González, Richard

1: Millán-Ocampo, C

title: Dolichonyx oryzivorus

source: Guía de las Especies Migratorias de la Biodiversidad en Colombia Aves

type: book\_section

tags: Dolichonyx oryzivorus

abstract:

last\_modified:

created:

group\_id:

profile\_id:

id:

2

isbn: 0-618-57424-7

keywords: Anas clypeata, Anas platyrhynchos, Ardea herodias, Bartramia longicauda, Buteo swainsoni, Cairina moschata, Calidris melanotos, Columbina talpacoti, Contopus cooperi, Contopus virens, Crotophaga ani, Dendrocygna autumnalis, Dolichonyx oryzivorus, Egretta caerulea, Egretta thula, Empidonax alnorum, Empidonax traillii, Falco columbarius, Falco sparverius, Geothlypis philadelphia, Hirundo rustica, Leiothlypis peregrina, Myiarchus crinitus, Myiodynastes luteiventris, Nomonyx dominicus, Nycticorax nycticorax, Pandion haliaetus, Parkesia noveboracensis, Petrochelidon pyrrhonota, Podilymbus podiceps, Protonotaria citrea, Sayornis nigricans

institution:

edition: Hillstar E

address:

publisher:

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 391

issue:

year: 2005

0: Kaufman, K

title: Guía de campo a las aves de Norteamérica

source:

type: book

tags: Anas clypeata,Anas platyrhynchos,Ardea herodias,Bartramia longicauda,Buteo swainsoni,Cairina moschata,Calidris melanotos,Columbina talpacoti,Contopus cooperi,Contopus virens,Crotophaga ani,Dendrocygna autumnalis,Dolichonyx oryzivorus,Egretta caerulea,Egretta thula,Empidonax alnorum,Empidonax traillii,Falco columbarius,Falco sparverius,Geothlypis philadelphia,Hirundo rustica,Leiothlypis peregrina,Myiarchus crinitus,Myiodynastes luteiventris,Nomonyx dominicus,Nycticorax nycticorax,Pandion haliaetus,Parkesia noveboracensis,Petrochelidon pyrrhonota,Podilymbus podiceps,Protonotaria citrea,Sayornis nigricans

abstract:

last\_modified:

created:

group\_id:

profile\_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Asociación Bogotana de Ornitología

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

habitatUnstructured: Esta especie habita en lagunas, arrozales de riego en el piedemonte llanero y en los bordes del cultivo (Johnston-González & Millán-Ocampo, 2012). También se ha observado en humedales costeros y campos enmalezados cerca de la Ciénaga Grande y Magdalena (Hilty & Brown, 1986). También es común verlo en praderas húmedas (pastizales) (Kaufman, 2005).

[commonNamesAtomized](#)

[ancillaryData](#)

usedBy:

usedIn

distributionUnstructured:

endDate:

startDate:

[ancillaryData](#)

type:

language: Alemán

name: Bobolink

usesManagementAndConservation

[ancillaryData](#)

dataObject:

additionalInformation:

[reference](#)

link: [http://awsassets.panda.org/downloads/migratorias{\\\_}aves{\\\_}42{\\\_}final.pdf](http://awsassets.panda.org/downloads/migratorias{\_}aves{\_}42{\_}final.pdf)

keywords: Dolichonyx oryzivorus

## editors

editors: Naranjo, L G

editors: Amaya, J D

editors: Eusse-González, D

editors: Cifuentes-Sarmiento, Y

institution:

address:

publisher: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible / WWF Colombia

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 708

issue:

volume: 1

year: 2012

## authors

authors: Johnston-González, Richard

authors: Millán-Ocampo, C

title: Dolichonyx oryzivorus

source: Guía de las Especies Migratorias de la Biodiversidad en Colombia Aves

type: book\_section

tags: Dolichonyx oryzivorus

abstract:

## identifiers

last\_modified:

created:

group\_id:

profile\_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

## mediaURL

description:

## subject

source:

## audience

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Asociación Bogotana de Ornitología

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

## agent

mimeType:

dataType:

identifier:

managementAndConservationUnstructured: Se están realizando monitoreos sistemáticos en el marco del proyecto “Aves asociadas a arrozceras del Piedemonte de los Llanos Orientales” y se ha producido material divulgativo para sensibilizar a los agricultores de la importancia de conservar ésta y otras especies migratorias (Johnston-González & Millán-Ocampo, 2012).

## managementAndConservationAtomized

identificationKeys

fullDescription

0

dataObject:

additionalInformation:

0

link: [http://awsassets.panda.org/downloads/migratorias{\\\_}aves{\\\_}42{\\\_}final.pdf](http://awsassets.panda.org/downloads/migratorias{\_}aves{\_}42{\_}final.pdf)

keywords: Dolichonyx oryzivorus

0: Naranjo, L G

1: Amaya, J D

2: Eusse-González, D

3: Cifuentes-Sarmiento, Y

institution:

address:

publisher: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible / WWF Colombia

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 708

issue:

volume: 1

year: 2012

0: Johnston-González, Richard

1: Millán-Ocampo, C

title: Dolichonyx oryzivorus

source: Guía de las Especies Migratorias de la Biodiversidad en Colombia Aves

type: book\_section

tags: Dolichonyx oryzivorus

abstract:

last\_modified:

created:

group\_id:

profile\_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Asociación Bogotana de Ornitología

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

fullDescriptionUnstructured: El Tordo Arrocero tiene pico cónico y corto; cola graduada con plumas aguzadas; las hembras suelen ser más grandes que los machos. El macho en plumaje reproductivo es completamente negro por debajo, nuca y parte posterior de la coronilla ante, escapulares y rabadilla blancas y pico negro brillante. Al comienzo de la migración de primavera el plumaje negro muestra bordes pálidos dando apariencia escamada. En plumaje básico las partes superiores son café anteaado estriado de negruzco, coronilla ampliamente estriada de café oscuro y ante, partes inferiores amarillentas con unas pocas estrías negruzcas finas en pecho alto y flancos. Los inmaduros son similares a las hembras, pero en general son más amarillentos (Johnston-González & Millán-Ocampo, 2012).

briefDescription:

## references

link: <http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=22724367>

keywords: Dolichonyx oryzivorus

## editors

institution:

address:

publisher:

accessed:

websites:

chapter:

series:

issue:

year: 2014

## authors

authors: BirdLife International

authors: NatureServe

title: Bird Species Distribution Maps of the World. 2012. Dolichonyx oryzivorus. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3

source:

type: miscellany

tags: Dolichonyx oryzivorus

abstract:

## identifiers

last\_modified:

created:

group\_id:

profile\_id:

id:

taxonRecordName

## ancillaryData

providerSpecificData

anyTwo:

providerLink:

publicationStatus

microReference:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

replacementNameFor

microReference:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

sanctioned

microReference:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

laterHomonymOf

microReference:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

conservedAgainst

basedOn

microReference:

source:

datatype:



identifier:  
source:  
datatype:  
identifier:  
note:  
ruleConsidered:

basionym

microReference:  
source:  
datatype:  
identifier:  
source:  
datatype:  
identifier:  
note:  
ruleConsidered:

spellingCorrentionOf

typeNameEntity

source:  
datatype:  
identifier:  
source:  
datatype:  
identifier:  
source:  
datatype:  
identifier:

typificacion

typeOfType:

lectotypeMicroReferenceVoucher

lectotypePublicationVoucher

voucherReference

simple:  
microReference:  
year:

publishedIn

simple:  
source:  
datatype:  
identifier:

specialAuthorship

authors

year

simple:  
canonicalAuthorship

authors

year

simple:  
simple: (Linnaeus, 1758)  
canonicalName  
infraspecificEpithet:  
specificEpithet:  
infragenericEpithet:  
linkType:  
ref:  
uninomial:  
simple: Dolichonyx oryzivorus  
rank: SPECIES  
simple: Dolichonyx oryzivorus (Linnaeus, 1758)

attributes

nomenclaturalCode:  
isAnamorphic:  
id:

synonymsAtomized

ancillaryData

synonymStatus:  
synonymName  
anyTwo:

anyOne

providerLink:  
microReference:  
publishedIn  
source:  
datatype:  
identifier:

reletedName

source:  
datatype:  
identifier:  
note:  
ruleConsidered:  
microReference:

publishedIn

source:  
datatype:  
identifier:

reletedName

source:  
datatype:  
identifier:  
note:  
ruleConsidered:  
microReference:

publishedIn

source:  
datatype:  
identifier:

reletedName

source:  
datatype:  
identifier:  
note:  
ruleConsidered:  
microReference:

publishedIn

source:  
datatype:  
identifier:

reletedName

source:  
datatype:  
identifier:  
note:  
ruleConsidered:  
microReference:

publishedIn

source:  
datatype:  
identifier:

reletedName

source:  
datatype:  
identifier:  
note:  
ruleConsidered:  
microReference:

publishedIn

source:  
datatype:  
identifier:

reletedName

source:  
datatype:  
identifier:  
note:  
ruleConsidered:

typeNameEntity

source:  
datatype:  
identifier:

source:  
datatype:  
identifier:

source:  
datatype:  
identifier:

typeVoucherEntity

typeOfType:  
simple:  
microReference:  
year:  
source:  
datatype:  
identifier:

combinationAuthorship

basionymAuthorship

simple:

authorship

simple:  
simple: Linnaeus, 1758

epithet

infraspecificEpithet:  
specificEpithet:  
infragenericEpithet:

genus

linkType:  
ref:  
uninomial:  
simple: Fringilla oryzivorus  
rank: SPECIES  
simple: Fringilla oryzivorus Linnaeus, 1758  
nomenclaturalCode:  
isAnamorphic:

id:

[hierarchy](#)

[ancillaryData](#)

dataObject:

additionalInformation:

[reference](#)

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

[mediaURL](#)

description:

[subject](#)

source: The Catalogue of Life, 3rd January 2011

[audience](#)

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights:

license:

title:

modified: 2016-02-19T01:20:15.316Z

created: 2016-02-19T01:20:15.316Z

[agent](#)

homepage:

role:

email:

phone:

address:

position:

organisation:

lastName:

firstName:

contentType:

dataType:

identifier:

parentTaxon: Dolichonyx

higherClassification:

infraspecificEpithet:

specificEpithet:

taxonRank: SPECIES

subGenus:

genus: Dolichonyx

family: Icteridae

order: Passeriformes

classHierarchy: Aves

phylum: Chordata

kingdom: Animalia

recommended:

classification:

invasiveness

invasivenessUnstructured:

reproduction

0

dataObject:

additionalInformation:

0

link: <http://eol.org/pages/1051993/overview>

keywords: Dolichonyx oryzivorus

0: Jacinto, Valter

1: Martinez, Deniz

institution:

address:

publisher:

accessed:

websites:

chapter:

series:

issue:

0: EOL

title: Dolichonyx oryzivorus

source: Encyclopedia of life

type: miscellany

tags: Dolichonyx oryzivorus

abstract:

last\_modified:

created:

group\_id:

profile\_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Asociación Bogotana de Ornitología

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

mimeType:

dataType:

identifier:

reproductionUnstructured: El tamaño de la nidada es entre cuatro a seis huevos; la incubación es realizada por la hembra y dura aproximadamente trece días. Los juveniles son cuidados por ambos parentales. Luego de 14 días de nacidos los polluelos (incapaces de volar) abandonan el nido (EOL, n.d.).

molecularData

molecularDataUnstructured:

migratory

migratoryUnstructured:

lifeForm

lifeFormUnstructured:

lifeCycle

lifeCycleUnstructured:

interactions

interactionsUnstructured:

feeding

0

dataObject:

additionalInformation:

0

link: <http://eol.org/pages/1051993/overview>

keywords: Dolichonyx oryzivorus

0: Jacinto, Valter

1: Martinez, Deniz

institution:

address:

publisher:

accessed:

websites:

chapter:

series:

issue:

0: EOL

title: Dolichonyx oryzivorus

source: Encyclopedia of life

type: miscellany

tags: Dolichonyx oryzivorus

abstract:

last\_modified:

created:

group\_id:

profile\_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Asociación Bogotana de Ornitología

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:  
mimeType:  
dataType:  
identifier:  
feedingUnstructured: Se alimenta principalmente de semillas, pero también consume insectos y granos (EOL, n.d.).

environmentalEnvelope

environmentalEnvelopeUnstructured:

ecologicalSignificance

ecologicalSignificanceUnstructured:

dispersal

dispersalUnstructured:

distance:  
structureDispersed:  
type:  
purpose:

behavior

0

dataObject:  
additionalInformation:

0

keywords: Accipiter striatus,Actitis macularius,Adelomyia melanogenys,Agelaiocercus kingii,Amblycercus holosericeus,Ampelion rubrocristatus,Anas andium,Anas clypeata,Anas discors,Andigena nigrirostris,Anisognathus igniventris,Ardea alba,Ardea herodias,Arremon assimilis,Asio flammeus,Asio stygius,Asthenes flammulata,Asthenes fuliginosa,Astragalinus psaltria,Atlapetes pallidinucha,Atlapetes schistaceus,Bubulcus ibis,Buteo platypterus,Buteo swainsoni,Butorides striata,Butorides virescens,Cairina moschata,Calidris bairdii,Calidris melanotos,Cardellina canadensis,Catamenia analis,Catamenia inornata,Cathartes aura,Catharus minimus,Catharus ustulatus,Chaetocercus mulsant,Chaetura pelagica,Chalcostigma heteropogon,Chordeiles minor,Chrysomus icterocephalus,Cinclodes albidiventris,Cinclus leucocephalus,Cinnycerthia unirufa,Cistothorus apolinari,Cistothorus platensis,Coccyzus pumila,Coccyzus americanus,Coccyzus melacoryphus,Coeligena bonapartei,Colibri coruscans,Colibri thalassinus,Columba livia,Columbina talpacoti,Conirostrum rufum,Conirostrum sitticolor,Contopus cinereus,Contopus fumigatus,Contopus sordidulus,Contopus virens,Coragyps atratus,Crotophaga ani,Crotophaga major,Dendrocygna autumnalis,Dendrocygna viduata,Diglossa albilatera,Diglossa cyanea,Diglossa humeralis,Diglossa lafresnayii,Diglossa sittoides,Dolichonyx oryzivorus,Dubusia taeniata,Egretta thula,Elaenia flavogaster,Elaenia frantzii,Elanus leucurus,Empidonax alnorum,Empidonax traillii,Ensifera ensifera,Eriocnemis cupreiventris,Eriocnemis vestita,Eupsittula pertinax,Falco columbarius,Falco peregrinus,Falco sparverius,Forpus conspicillatus,Fulica americana,Gallinago nobilis,Gallinula galeata,Geothlypis philadelphia,Geranoaetus melanoleucus,Glaucidium jardinii,Grallaria quitesis,Grallaria ruficapilla,Grallaria squamigera,Haplospiza rustica,Heliangelus amethysticollis,Heliangelus exortis,Hellmayrea gularis,Hemispingus superciliaris,Hemispingus verticalis,Henicorhina leucophrys,Hirundo rustica,Icterus chrysater,Icterus icterus,Icterus nigrogularis,Ixobrychus exilis,Jacana jacana,Lafresnaya lafresnayi,Leiothlypis peregrina,Leptasthenura andicola,Lesbia nuna,Lesbia victoriae,Machetornis rixosa,Margarornis squamiger,Mecocerculus leucophrys,Megascops choliba,Melanerpes rubricapillus,Merganetta armata,Metallura tyrianthina,Milvago chimachima,Mimus gilvus,Mniotilta varia,Molothrus bonariensis,Muscisaxicola alpinus,Myiarchus crinitus,Myiodynastes luteiventris,Myiotheretes fumigatus,Myiotheretes striaticollis,Myiothlypis nigrocristata,Nomonyx dominicus,Nycticorax nycticorax,Ochthoeca cinnamomeiventris,Ochthoeca diadema,Ochthoeca fumicolor,Ochthoeca rufipectoralis,Orochelidon murina,Oxypogon guerinii,Oxyura jamaicensis,Pachyrhamphus versicolor,Pandion haliaetus,Pardirallus maculatus,Parkesia noveboracensis,Patagioenas fasciata,Petrochelidon pyrrhonota,Phaetusa simplex,Phalacrocorax brasilianus,Pheucticus aureoventris,Pheucticus ludovicianus,Phimosus infuscatus,Phrygilus



tags: *Accipiter striatus*, *Actitis macularia*, *Adelomyia melanogenys*, *Agelaiocercus kingii*, *Amblycercus holosericeus*, *Ampelion rubrocristatus*, *Anas andium*, *Anas clypeata*, *Anas discors*, *Andigena nigrirostris*, *Anisognathus igniventris*, *Ardea alba*, *Ardea herodias*, *Arremon assimilis*, *Asio flammeus*, *Asio stygius*, *Asthenes flammulata*, *Asthenes fuliginosa*, *Astragalinus psaltria*, *Atlapetes pallidinucha*, *Atlapetes schistaceus*, *Bubulcus ibis*, *Buteo platypterus*, *Buteo swainsoni*, *Butorides striata*, *Butorides virescens*, *Cairina moschata*, *Calidris bairdii*, *Calidris melanotos*, *Cardellina canadensis*, *Catamenia analis*, *Catamenia inornata*, *Cathartes aura*, *Catharus minimus*, *Catharus ustulatus*, *Chaetocercus mulsant*, *Chaetura pelagica*, *Chalcostigma heteropogon*, *Chordeiles minor*, *Chrysomus icterocephalus*, *Cinclodes albidiventris*, *Cinclus leucocephalus*, *Cinnycerthia unirufa*, *Cistothorus apolinari*, *Cistothorus platensis*, *Coccyzus pumila*, *Coccyzus americanus*, *Coccyzus melacoryphus*, *Coeligena bonapartei*, *Colibri coruscans*, *Colibri thalassinus*, *Columba livia*, *Columbina talpacoti*, *Conirostrum rufum*, *Conirostrum sitticolor*, *Contopus cinereus*, *Contopus fumigatus*, *Contopus sordidulus*, *Contopus virens*, *Coragyps atratus*, *Crotophaga ani*, *Crotophaga major*, *Dendrocygna autumnalis*, *Dendrocygna viduata*, *Diglossa albilatera*, *Diglossa cyanea*, *Diglossa humeralis*, *Diglossa lafresnayii*, *Diglossa sittoides*, *Dolichonyx oryzivorus*, *Dubusia taeniata*, *Egretta thula*, *Elaenia flavogaster*, *Elaenia frantzii*, *Elanus leucurus*, *Empidonax alnorum*, *Empidonax traillii*, *Ensifera ensifera*, *Eriocnemis cupreiventris*, *Eriocnemis vestita*, *Eupsittula pertinax*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Falco sparverius*, *Forpus conspicillatus*, *Fulica americana*, *Gallinago nobilis*, *Gallinula galeata*, *Geothlypis philadelphia*, *Geranoaetus melanoleucus*, *Glaucidium jardinii*, *Grallaria quitesis*, *Grallaria ruficapilla*, *Grallaria squamigera*, *Haplospiza rustica*, *Heliangelus amethysticollis*, *Heliangelus exortis*, *Hellmayrea gularis*, *Hemispingus supercilialis*, *Hemispingus verticalis*, *Henicorhina leucophrys*, *Hirundo rustica*, *Icterus chrysater*, *Icterus icterus*, *Icterus nigrogularis*, *Ixobrychus exilis*, *Jacana jacana*, *Lafresnaya lafresnayi*, *Leiothlypis peregrina*, *Leptasthenura andicola*, *Lesbia nuna*, *Lesbia victoriae*, *Machetornis rixosa*, *Margarornis squamiger*, *Mecocerculus leucophrys*, *Megascops choliba*, *Melanerpes rubricapillus*, *Merganetta armata*, *Metallura tyrianthina*, *Milvago chimachima*, *Mimus gilvus*, *Mniotilta varia*, *Molothrus bonariensis*, *Muscisaxicola alpinus*, *Myiarchus crinitus*, *Myiodynastes luteiventris*, *Myiotheretes fumigatus*, *Myiotheretes striaticollis*, *Myiothlypis nigrocristata*, *Nomonyx dominicus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ochthoeca cinnamomeiventris*, *Ochthoeca diadema*, *Ochthoeca fumicolor*, *Ochthoeca rufipectoralis*, *Orochelidon murina*, *Oxypogon guerinii*, *Oxyura jamaicensis*, *Pachyramphus versicolor*, *Pandion haliaetus*, *Pardirallus maculatus*, *Parkesia noveboracensis*, *Patagioenas fasciata*, *Petrochelidon pyrrhonota*, *Phaetusa simplex*, *Phalacrocorax brasilianus*, *Pheucticus aureoventris*, *Pheucticus ludovicianus*, *Phimosus infuscatus*, *Phrygilus unicolor*, *Phyllomyias uropygialis*, *Piaya cayana*, *Picoides fumigatus*, *Pipraeidea melanonota*, *Pipreola riefferii*, *Piranga olivacea*, *Piranga rubra*, *Pitanqus sulphuratus*, *Pluvialis dominica*, *Podilymbus podiceps*, *Porphyrio martinicus*, *Porzana*

carolina, Progne tapera, Protonotaria citrea, Pseudocolopteryx acutipennis, Pseudoscops clamator, Pterophanes cyanopterus, Pygochelidon cyanoleuca, Pyrocephalus rubinus, Pyrrhomyias cinnamomeus, Quiscalus lugubris, Rallus semiplumbeus, Ramphocelus dimidiatus, Ramphomicron microrhynchum, Riparia riparia, Rupornis magnirostris, Sayornis nigricans, Serpophaga cinerea, Setophaga castanea, Setophaga cerulea, Setophaga petechia, Setophaga ruticilla, Setophaga striata, Sicalis flaveola, Sicalis luteola, Spiza americana, Sporagra spinescens, Sturnella magna, Synallaxis subpudica, Systellura longirostris, Tangara vitriolina, Thraupis episcopus, Thraupis palmarum, Tringa flavipes, Tringa melanoleuca, Tringa solitaria, Troglodytes aedon, Troglodytes solstitialis, Turdus fuscater, Turdus ignobilis, Tyrannus melancholicus, Tyrannus savana, Tyrannus tyrannus, Tyto alba, Vanellus chilensis, Vireo olivaceus, Vultur gryphus, Zenaida auriculata, Zonotrichia capensis

abstract:

last\_modified:

created:

group\_id:

profile\_id:

id:

1

link: [http://awsassets.panda.org/downloads/migratorias{\\\_}aves{\\\_}42{\\\_}final.pdf](http://awsassets.panda.org/downloads/migratorias{\_}aves{\_}42{\_}final.pdf)

keywords: Dolichonyx oryzivorus

0: Naranjo, L G

1: Amaya, J D

2: Eusse-González, D

3: Cifuentes-Sarmiento, Y

institution:

address:

publisher: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible / WWF Colombia

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 708

issue:

volume: 1

year: 2012

0: Johnston-González, Richard

1: Millán-Ocampo, C

title: Dolichonyx oryzivorus

source: Guía de las Especies Migratorias de la Biodiversidad en Colombia Aves

type: book\_section

tags: Dolichonyx oryzivorus

abstract:

last\_modified:

created:

group\_id:

profile\_id:

id:

2

isbn: 0-618-57424-7

keywords: Anas clypeata, Anas platyrhynchos, Ardea herodias, Bartramia longicauda, Buteo swainsoni, Cairina moschata, Calidris melanotos, Columbina talpacoti, Contopus cooperi, Contopus virens, Crotophaga ani, Dendrocygna autumnalis, Dolichonyx oryzivorus, Egretta caerulea, Egretta thula, Empidonax alnorum, Empidonax traillii, Falco columbarius, Falco sparverius, Geothlypis philadelphia, Hirundo rustica, Leiothlypis peregrina, Myiarchus crinitus, Myiodynastes luteiventris, Nomonyx dominicus, Nycticorax nycticorax, Pandion haliaetus, Parkesia noveboracensis, Petrochelidon pyrrhonota, Podilymbus podiceps, Protonotaria citrea, Sayornis nigricans

institution:  
edition: Hillstar E  
address:  
publisher:  
accessed:  
websites:  
chapter:  
series:  
pages: 391  
issue:  
year: 2005  
0: Kaufman, K  
title: Guía de campo a las aves de Norteamérica  
source:  
type: book  
tags: Anas clypeata,Anas platyrhynchos,Ardea herodias,Bartramia longicauda,Buteo swainsoni,Cairina moschata,Calidris melanotos,Columbina talpacoti,Contopus cooperi,Contopus virens,Crotophaga ani,Dendrocygna autumnalis,Dolichonyx oryzivorus,Egretta caerulea,Egretta thula,Empidonax alnorum,Empidonax traillii,Falco columbarius,Falco sparverius,Geothlypis philadelphia,Hirundo rustica,Leiothlypis peregrina,Myiarchus crinitus,Myiodynastes luteiventris,Nomonyx dominicus,Nycticorax nycticorax,Pandion haliaetus,Parkesia noveboracensis,Petrochelidon pyrrhonota,Podilymbus podiceps,Protonotaria citrea,Sayornis nigricans  
abstract:  
last\_modified:  
created:  
group\_id:  
profile\_id:  
id:

3

link: <http://eol.org/pages/1051993/overview>  
keywords: Dolichonyx oryzivorus  
0: Jacinto, Valter  
1: Martinez, Deniz  
institution:  
address:  
publisher:  
accessed:  
websites:  
chapter:  
series:  
issue:  
0: EOL  
title: Dolichonyx oryzivorus  
source: Encyclopedia of life  
type: miscellany  
tags: Dolichonyx oryzivorus  
abstract:  
last\_modified:  
created:  
group\_id:  
profile\_id:  
id:  
geoPoint:  
location:  
thumbnailURL:

description:  
source:  
bibliographicCitation:  
rightsHolder:  
rights: Asociación Bogotana de Ornitología  
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)  
modified:  
created:  
mimeType:  
dataType:  
identifier:

behaviorUnstructured: Es una especie gregaria; es posible verla en grandes bandadas durante migración de primavera y ocasionalmente en migración de otoño (hacia el sur) (Hilty & Brown, 1986). Migra a través de la costa este de Centroamérica, las islas del Caribe y el norte de Sudamérica, hasta las principales zonas de concentración no reproductiva en el sur de Brasil, Paraguay, Bolivia y norte de Argentina (Johnston-González & Millán-Ocampo, 2012). Es común verlo en zonas donde se reproduce revoloteando sobre el pasto mientras canta (macho) (Kaufman, 2005).

Vocaliza un gorgoreo melodioso y un canto nasal enk (Kaufman, 2005). También se le conoce una vocalización que realiza en vuelo un pink de sonido claro (Hilty & Brown, 1986). Los machos emiten cantos sonoros burbujeantes y brillantes mientras vuelan (EOL, n.d.).

#### ancillaryData

dataObject:  
additionalInformation:  
geoPoint:  
location:  
thumbnailURL:  
description:  
source:  
bibliographicCitation:  
rightsHolder:  
rights:  
license:  
modified:  
created:  
mimeType:  
dataType:  
identifier:

#### measurementOrFact

relatedTo:  
measurementRemarks:  
measurementMethod:  
measurementDeterminedDate:  
measurementUnit:  
measurementAccuracy:  
measurementValue:  
measurementType:  
measurementID:

#### endemicAtomized

#### distribution

#### ancillaryData

dataObject:  
additionalInformation:

## reference

link: [http://awsassets.panda.org/downloads/migratorias{\\\_}aves{\\\_}42{\\\_}final.pdf](http://awsassets.panda.org/downloads/migratorias{\_}aves{\_}42{\_}final.pdf)  
keywords: Dolichonyx oryzivorus

## editors

editors: Naranjo, L G  
editors: Amaya, J D  
editors: Eusse-González, D  
editors: Cifuentes-Sarmiento, Y  
institution:  
address:  
publisher: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible / WWF Colombia  
accessed:  
websites:  
chapter:  
series:  
pages: 708  
issue:  
volume: 1  
year: 2012

## authors

authors: Johnston-González, Richard  
authors: Millán-Ocampo, C  
title: Dolichonyx oryzivorus  
source: Guía de las Especies Migratorias de la Biodiversidad en Colombia Aves  
type: book\_section  
tags: Dolichonyx oryzivorus  
abstract:

## identifiers

last\_modified:  
created:  
group\_id:  
profile\_id:  
id:  
geoPoint:  
location:  
thumbnailURL:

## mediaURL

description:

## subject

source:

## audience

bibliographicCitation:  
rightsHolder:  
rights: Asociación Bogotana de Ornitología

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

## agent

contentType:

dataType:

identifier:

distributionUnstructured: El Tordo Arrocero se distribuye desde el sur de Canadá (sureste de Columbia Británica, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario) hasta el centro – norte de Estados Unidos (noreste de California, Washington, Nevada, Kansas, Ohio, Pensilvania, New Jersey). Migra a través de México, Guatemala, Belice, Honduras, Costa Rica, Panamá, islas Bahamas, Puerto Rico, Antillas Menores, Trinidad y Tobago y norte de Sudamérica (incluyendo islas Galápagos). El área de invernada se concentra al este de los Andes desde el oriente de Bolivia hasta el suroeste de Brasil, Paraguay y el noreste de Argentina hasta Buenos Aires (Johnston-González & Millán-Ocampo, 2012). En Colombia se ha registrado desde Santa Marta al sur por el valle del Magdalena hasta el norte de Huila. Al oriente de los Andes desde el oriente de Arauca, el sur de Meta (Sierra de la Macarena) y el oriente de Vichada (PNN el Tuparro) y al sur hasta oriente de Nariño y Vaupés (caño Cubiyú, río Apaporis). En la migración de otoño principalmente en costa Caribe (Ciénaga Grande de Santa Marta). En la migración de primavera principalmente en el piedemonte de los Llanos Orientales de Colombia en los departamentos de Meta y Casanare. Otras localidades incluyen la desembocadura del río Iscuandé en Nariño y la bahía de Buenaventura (Johnston-González & Millán-Ocampo, 2012).

Se distribuye desde el nivel del mar hasta los 2600 msnm (Sabana de Bogotá) (Hilty & Brown, 1986).

## distributionAtomized

stateProvince: Guaviare

## ancillaryData

locality:

municipality:

country: Colombia

## temporalCoverage

endDate:

startDate:

## distributionScope

type:

## threatStatus

## ancillaryData

threatStatusUnstructured:

## threatStatusAtomized

appendixCITES:

locality:

municipality:

county:

stateProvince:

country: Global

0: IUCN

measurementValue: Preocupación menor (LC)

relatedTo:

measurementRemarks:  
measurementMethod:

## measurementDeterminedBy

measurementDeterminedDate:  
measurementUnit:  
measurementAccuracy:  
measurementType: IUCN  
measurementID:

## territory

territoryUnstructured:  
areaOfOccupancy:  
extentOfOccurrence:

## populationBiology

0

dataObject:  
additionalInformation:

0

link: <http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=9753>

keywords: Dolichonyx oryzivorus

institution:

address:

publisher:

accessed:

websites:

chapter:

series:

issue:

year: 2014

0: BirdLife International

title: Species factsheet: Dolichonyx oryzivorus

source:

type: miscellany

tags: Dolichonyx oryzivorus

abstract:

last\_modified:

created:

group\_id:

profile\_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Asociación Bogotana de Ornitología

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:  
mimeType:  
dataType:  
identifier:  
populationBiologyUnstructured: Esta especie tiene un amplio rango de distribución y a pesar que el tamaño de la población, es fluctuante; esta especie está en categoría de preocupación menor (LC) (BirdLife International, 2014).

legislation

legislationUnstructured:

directThreats

0

dataObject:  
additionalInformation:

0

link: [http://awsassets.panda.org/downloads/migratorias{\\\_}aves{\\\_}42{\\\_}final.pdf](http://awsassets.panda.org/downloads/migratorias{\_}aves{\_}42{\_}final.pdf)

keywords: Dolichonyx oryzivorus

0: Naranjo, L G

1: Amaya, J D

2: Eusse-González, D

3: Cifuentes-Sarmiento, Y

institution:

address:

publisher: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible / WWF Colombia

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 708

issue:

volume: 1

year: 2012

0: Johnston-González, Richard

1: Millán-Ocampo, C

title: Dolichonyx oryzivorus

source: Guía de las Especies Migratorias de la Biodiversidad en Colombia Aves

type: book\_section

tags: Dolichonyx oryzivorus

abstract:

last\_modified:

created:

group\_id:

profile\_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Asociación Bogotana de Ornitología

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)



modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

directThreatsUnstructured: Considerada de Preocupación Menor a nivel global, pero prioritaria para conservación en Estados Unidos (Johnston-González & Millán-Ocampo, 2012). En Colombia los agricultores utilizan métodos no letales para su control por lo que sus poblaciones no son afectadas directamente. Sin embargo, el efecto de la aplicación de pesticidas debe estudiarse en detalle ya que es una de las principales amenazas en el sur del continente (Johnston-González & Millán-Ocampo, 2012).

## ancillaryData

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights:

license:

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

## measurementOrFact

relatedTo:

measurementRemarks:

measurementMethod:

measurementDeterminedDate:

measurementUnit:

measurementAccuracy:

measurementValue:

measurementType:

measurementID:

abstract: El Tordo Arrocero es una especie migratoria boreal en su tránsito hacia y desde Sudamérica; puede encontrarse en solitario, parejas o bandadas de diferentes tamaños (McNish, 2007); mide aproximadamente 18 cm y tiene pico cónico. El plumaje reproductivo del macho es completamente negro por debajo, nuca y parte posterior de la coronilla ante, escapulares y rabadilla blancas y pico negro brillante. En plumaje básico las partes superiores son café anteadado estriado de negruzco, coronilla ampliamente estriada de café oscuro y ante, partes inferiores amarillentas con unas pocas estrías negruzcas finas en pecho alto y flancos. Los inmaduros son similares a las hembras, pero en general son más amarillentos (Johnston-González & Millán-Ocampo, 2012). Habita en lagunas, arrozales de riego en el piedemonte llanero y en los bordes del cultivo (Johnston-González & Millán-Ocampo, 2012). También se ha observado en humedales costeros y campos enmalezados cerca de la Ciénaga Grande y Magdalena. Es una especie gregaria, aunque solo ocasionalmente en grandes bandadas durante migración de otoño (hacia el sur). A menudo en grandes bandadas durante migración de primavera (Hilty & Brown, 1986). Se alimenta principalmente de semillas, pero también consume insectos y granos (EOL, n.d.). Esta especie tiene un amplio rango de distribución y a pesar que el tamaño de la población, es fluctuante; esta especie está en categoría de preocupación menor (LC) (BirdLife International, 2014).

## associatedParty

role:  
personnelIdentifier:  
personnelDirectory:  
homepage:  
email: enataliagomezm@gmail.com  
phone:  
postalCode:  
country: Colombia  
state: Bogotá Distrito Capital  
city: Bogotá D.C.  
address:  
organisation:  
position:  
lastName: Gómez Melendro  
firstName: Edith Natalia

## ancillaryData

dataObject:  
additionalInformation:

## reference

geoPoint:  
location:  
thumbnailURL:  
mediaURL: http://youtu.be/JGqQWVQeqDk  
description:

## subject

source: http://www.youtube.com

## audience

bibliographicCitation:  
rightsHolder:  
rights:  
license:  
modified:  
created:

## agent

mimeType:  
dataType:  
identifier:

\_id

\_bsontype: ObjectID  
id: VÆn,ð lg#ç<@