

## Reporte de Fichas para el usuario: edith gómez

Ficha ID: 56d5d31a3c16479905cba8fd

Fecha de creación: 2016-03-01T17:36:28.297Z

annualCycles

annualCycleUnstructured:

habitats

0

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataObject:

identifier:

habitatUnstructured: En general, los individuos del género *Dendrocygna* son muy abundantes en sabanas inundables y en campos de arroz irrigados, también se encuentran en humedales, estuarios, lagunas salobres y en las orillas de los ríos (Ojasti 1996). En La Guajira se ha documentado que se puede encontrar en hábitats acuáticos como ríos, lagunas, cuerpos de agua estacionales y bahías ribereñas (Cerrejón 2009-2010). Esta especie habita en los manglares de Isla Fuerte, Córdoba, una pequeña isla del Pacífico Colombiano (Estela 2006). En Ibagué, Tolima se puede encontrar en lagos y lagunas y en zonas agrícolas de arrozceras (McCamant & Bolen 1979 en Zammuto 1986).

commonNamesAtomized

ancillaryData

usedBy:

usedIn

distributionUnstructured:

endDate:

startDate:

ancillaryData

type:

language: Inglés

name: Black-bellied Whistling Duck

creation\_date: 2016-03-01T17:36:28.297Z

usesManagementAndConservation

ancillaryData

managementAndConservationUnstructured:

## managementAndConservationAtomized

identificationKeys

fullDescription

fullDescriptionUnstructured:

briefDescription:

## references

taxonRecordName

## ancillaryData

providerSpecificData

anyTwo:

providerLink:

publicationStatus

microReference:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

replacementNameFor

microReference:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

sanctioned

microReference:

source:

datatype:

identifier:

source:

datatype:

identifier:

note:

ruleConsidered:

laterHomonymOf

microReference:  
source:  
datatype:  
identifier:  
source:  
datatype:  
identifier:  
note:  
ruleConsidered:

[conservedAgainst](#)

basedOn

microReference:  
source:  
datatype:  
identifier:  
source:  
datatype:  
identifier:  
note:  
ruleConsidered:

basionym

microReference:  
source:  
datatype:  
identifier:  
source:  
datatype:  
identifier:  
note:  
ruleConsidered:

[spellingCorrentionOf](#)

typeNameEntity

source:  
datatype:  
identifier:  
source:  
datatype:  
identifier:  
source:  
datatype:  
identifier:

typificacion

typeOfType:

[lectotypeMicroReferenceVoucher](#)

[lectotypePublicationVoucher](#)

[voucherReference](#)

simple:  
microReference:  
year:  
  
publishedIn  
  
simple:  
source:  
datatype:  
identifier:  
  
specialAuthorship

[authors](#)

[year](#)

simple:  
  
canonicalAuthorship

[authors](#)

[year](#)

simple:  
simple: (Linnaeus, 1758)  
  
canonicalName  
  
infraspecificEpithet:  
specificEpithet:  
infragenericEpithet:  
linkType:  
ref:  
uninomial:  
simple: Dendrocygna autumnalis  
rank: SPECIES  
simple: Dendrocygna autumnalis (Linnaeus, 1758)  
  
attributes  
  
nomenclaturalCode:  
isAnamorphic:  
id:

[synonymsAtomized](#)

[hierarchy](#)

[ancillaryData](#)

dataObject:  
additionalInformation:

[reference](#)

geoPoint:  
location:  
thumbnailURL:

[mediaURL](#)

description:

[subject](#)

source: The Catalogue of Life, 3rd January 2011

[audience](#)

bibliographicCitation:  
rightsHolder:  
rights:  
license:  
title:  
modified: 2016-03-01T17:36:08.295Z  
created: 2016-03-01T17:36:08.295Z

[agent](#)

homepage:  
role:  
email:  
phone:  
address:  
position:  
organisation:  
lastName:  
firstName:  
mimeType:  
dataType:  
identifier:  
parentTaxon: Dendrocygna  
higherClassification:  
infraspecificEpithet:  
specificEpithet:  
taxonRank: SPECIES  
subGenus:  
genus: Dendrocygna  
family: Anatidae  
order: Anseriformes  
classHierarchy: Aves  
phylum: Chordata  
kingdom: Animalia  
recommended:  
classification:

invasiveness

invasivenessUnstructured:

reproduction

reproductionUnstructured:

molecularData

molecularDataUnstructured:

migratory

migratoryUnstructured:

lifeForm

lifeFormUnstructured:

lifeCycle

lifeCycleUnstructured:

interactions

0

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

interactionsUnstructured: En el sur de Texas, Estados Unidos, George & Bolen (1975) Hallaron 15 especies de endoparásitos en 94 individuos de *Dendrocygna autumnalis*: *Rhinonyssus rhinolethrum*, un ácaro nasal; *Cloacotaenia megalops*, *Anomotaenia* sp. y *Dicranotaenia* sp., céstodos de los intestinos y la cloaca; *Corynosoma peposacae* y *Corynosoma* sp., acantocéfalos del intestino delgado; *Echinuria uncinata* y *Tropisurus crami*, nemátodos del proventrículo; *Parhadjelia neglecta*, nemátodo del ventrículo; *Porrocaecum* sp., nematodo del intestino delgado; *Apatemon gracilis* y *Zygocotyle lunata*, tremátodos del intestino delgado; y *Echinostoma revolutum* en el intestino grueso y el intestino grueso; dos formas de *Sobolevicanthus* spp. en el intestino delgado (George & Bolen 1975). En 1995 Mabie y colaboradores reportaron que el águila *Haliaeetus leucocephalus* se alimenta entre otras, de esta especie en Texas, Estados Unidos (Mabie et al. 1995).

feeding

0

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

feedingUnstructured: Dendrocygna autumnalis es un herbívoro terrestre que con su pico tira y arranca la vegetación (Rylander & Bolen 1974). En La Guajira se evidenció que forrajea tanto en la tierra como en el agua y que se alimentan de invertebrados y semillas (Asesorías y Estudios Ambientales J.D.B. S.A.S. 201) y que es una especie filtradora (Cerrejón 2009-2010).

environmentalEnvelope

environmentalEnvelopeUnstructured:

ecologicalSignificance

ecologicalSignificanceUnstructured:

dispersal

dispersalUnstructured:

distance:

structureDispersed:

type:

purpose:

behavior

0

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

behaviorUnstructured: Dendrocygna autumnalis es una especie altamente gregaria; por fuera de la temporada de reproducción suelen formar bandadas de cientos o miles de individuos. Pasan la mayoría del día descansando y se alimentan principalmente en la noche (Ojasti 1996).

ancillaryData

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:  
rightsHolder:  
rights:  
license:  
modified:  
created:  
mimeType:  
dataType:  
identifier:

measurementOrFact

relatedTo:  
measurementRemarks:  
measurementMethod:  
measurementDeterminedDate:  
measurementUnit:  
measurementAccuracy:  
measurementValue:  
measurementType:  
measurementID:

endemicAtomized

distribution

ancillaryData

dataObject:  
additionalInformation:

reference

geoPoint:  
location:  
thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source:

audience

bibliographicCitation:  
rightsHolder:  
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia  
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)  
modified:  
created:

agent

mimeType:  
dataType:  
identifier:



distributionUnstructured: En bases de datos se encontró que:š

Esta especie se distribuye en: Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay, puerto Rico, Venezuela (Collections MNH SI 2012); Argentina (Coconier & Aves Argentinas 2006).

Las siguientes subespecies se distribuyen en:

Dendrocygna autumnalis autumnalis: Colombia, Brasil, México (Collections MNH SI 2012)

Dendrocygna autumnalis fulgens: Estados Unidos (Collections MNH SI 2012)

Dendrocygna autumnalis fulgens: Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Mexico, (Arctos 2012). En bases de datos y monitoreos de fauna se encontró que:

Esta especie se distribuye en: Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Meta, Valle del Cauca (ICN 2004); La Guajira (Cerrejón 2009-2010); Sucre (Galán-Guevara et al. 2009); Tolima (Parra Hernández et al. 2007).

La subespecie Dendrocygna autumnalis autumnalis se distribuye en: Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, Sucre (Collections MNH SI 2012). En Ibagué, Tolima se distribuye entre los 630-950 msnm (Parra Hernández et al. 2007).

## distributionAtomized

stateProvince: Tolima

## ancillaryData

locality:

municipality:

country: Colombia

temporalCoverage

endDate:

startDate:

distributionScope

type:

## threatStatus

## ancillaryData

threatStatusUnstructured:

threatStatusAtomized

apendiceCITES:

locality:

municipality:

county:

stateProvince:

country: Global

0: IUCN

measurementValue: Preocupación menor (LC)

relatedTo:

measurementRemarks:

measurementMethod:

## measurementDeterminedBy

measurementDeterminedDate:

measurementUnit:

measurementAccuracy:

measurementType: IUCN

measurementID:

## territory

territoryUnstructured:

areaOfOccupancy:

extentOfOccurrence:

## populationBiology

populationBiologyUnstructured:

## legislation

legislationUnstructured:

## directThreats

directThreatsUnstructured:

## ancillaryData

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights:

license:

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

## measurementOrFact

relatedTo:

measurementRemarks:

measurementMethod:

measurementDeterminedDate:

measurementUnit:

measurementAccuracy:

measurementValue:

measurementType:

measurementID:

abstract: *Dendrocygna autumnalis* es un ave de tamaño medio (43-47 cm). Los machos y las hembras tienen el mismo aspecto. Los adultos tienen la coronilla de color marrón oliváceo o rojiza; los lados de la cabeza y la porción superior del cuello de color gris; tienen la garganta blancuzca; el área inferior del cuello, el dorso, y el pecho son de color castaño vinoso brillante; la parte posterior de la espalda y la cola de color negro; las coberteras menores son marrones pasando a gris en las coberteras medias y las coberteras mayores son blancas; el abdomen, los flancos y toda la porción ventral de las alas son de color negro; en ocasiones tienen en el abdomen un patrón de franjas; las plumas ventrales de la cola son de color blanco con manchas o rayas negras. Tienen el iris de color marrón, el pico rojo brillante o rojo naranja, las patas son color rosa (Reid Blake 1977). Se sabe que llegan a vivir 8,2 años (McCamant & Bolen 1979 en Zammuto 1986).

## associatedParty

role:

personnelIdentifier:  
personnelDirectory:  
homepage:  
email: enataliagomezm@gmail.com  
phone:  
postalCode:  
country: Colombia  
state: Bogotá Distrito Capital  
city: Bogotá D.C.  
address:  
organisation:  
position:  
lastName: Gómez Melendro  
firstName: Edith Natalia

## ancillaryData

dataObject:  
additionalInformation: Registros biológicos: En el portal de Global Biodiversity Information Facility se reporta que para Colombia hay 598 registros. GBIF  
Metadatos: GBIF  
Otros recursos en Internet: Arctos, Avibase, BirdLife International, SI NMNH, EoL, iSpecies, AVoCet, Colecciones en Línea, IUCN Red List, Manual of Neotropical Birds, Volume 1,  
Wildlife Utilization in Latin America: Current Situation and Prospects, xeno-canto  
Créditos específicos: Ficha elaborada con el apoyo de Carbones del Cerrejón Limited.

## reference

geoPoint:  
location:  
thumbnailURL:

## mediaURL

description:

## subject

source:

## audience

bibliographicCitation:  
rightsHolder:  
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia  
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)  
modified:  
created:

## agent

contentType:  
dataType:  
identifier:

\_id

\_bsontype: ObjectID  
id: VÖÖ < G™\º•Đ