

Reporte de Fichas para el usuario: Edgar Herrera

Ficha ID: 56e7974b83c45700544e41ce

Fecha de creación: 2016-03-15T05:02:35.738Z

creation_date: 2016-03-15T05:02:35.738Z

usesManagementAndConservation

[ancillaryData](#)

managementAndConservationUnstructured:

[managementAndConservationAtomized](#)

identificationKeys

fullDescription

0

dataObject:

additionalInformation:

0

link: <http://darnis.inbio.ac.cr/ubis/FMPro?-DB=ubipub.fp3{\&}-lay=WebAll{\&}-error=norec.html{\&}-Format=detail.htm>

keywords: Aramides cajanea

institution:

address:

publisher:

accessed:

websites:

chapter:

series:

issue:

year: 2000

0: Elizondo L. H.

title: Aramides cajaneus. Especies de Costa Rica

source:

type: miscellany

tags: Aramides cajanea

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

fullDescriptionUnstructured: Mide 38 cm. y pesa 460 grs. Es de cuello y patas largas; el pico y la cola son relativamente cortos (Elizondo, 2000). Los adultos muestran la cabeza y el cuello grises con un tinte café oscuro en la nuca y la parte posterior de la coronilla. La garganta es blanca y el manto es oliva parduzco. El pecho y el costado son rufo acanelado y el abdomen, la rabadilla, las coberteras caudales y la cola son negras. El iris es rojo, el pico es amarillo verdoso brillante y las patas son rojo coral (Elizondo 2000). Los ejemplares inmaduros son similares, aunque presentan el abdomen negro tiznado con salpicaduras de color ante (Elizondo 2000).

briefDescription:

references

keywords: *Accipiter collaris*, *Accipiter cooperii*, *Accipiter poliogaster*, *Accipiter superciliosus*, *Amazona ochrocephala*, *Andigena hypoglaucha*, *Aramides cajanea*, *Aramus guarauna* (Linnaeus 1766), *Aratinga pertinax*, *Ardea alba*, *Ardea cocoi*, *Ardea herodias*, *Arremonops conirostris* (Bonaparte 1850), *Arremonops tocuyensis* (Todd 1912), *Atalotriccus pilaris*, *Attila spadiceus* (Gmelin 1789), *Basileuterus flaveolus* (S. F. Baird 1865), *Bubo virginianus* (Gmelin 1788), *Busarellus nigricollis*, *Buteogallus anthracinus*, *Buteogallus meridionalis*, *Buteogallus schistaceus*, *Buteogallus solitarius*, *Buteogallus urubitinga*, *Cacicus cela*, *Cairina moschata*, *Campylorhamphus trochilirostris* (Lichtenstein 1820), *Campylorhynchus griseus* (Swainson 1838), *Campylorhynchus nuchalis* (Cabanis 1847), *Caprimulgus cayennensis* (Gmelin 1789), *Cardinalis phoeniceus* Bonaparte 1838, *Carduelis psaltria* (Say 1823), *Cathartes aura*, *Cathartes burrovianus*, *Cathartes melambrotus*, *Certhiaxis cinnamomeus* (Gmelin 1788), *Ceryle torquata*, *Chlorostilbon gibsoni* (Fraser 1840), *Chondrohierax uncinatus*, *Chordeiles acutipennis* (Hermann 1783), *Chrysomus icterocephalus*, *Circus buffoni*, *Circus cinereus*, *Circus cyaneus*, *Coccyzus pumila*, *Columbina minuta* (Linnaeus 1766), *Conirostrum leucogenys* (Lafresnaye 1852), *Coragyps atratus*, *Coryphospingus pileatus* (Wied-Neuwied 1821), *Crax alector*, *Crotophaga major*, *Crotophaga sulcirostris* Swainson 1827, *Cryptoleucopteryx plumbea*, *Cyanocorax affinis* (Pelzelin 1856), *Cyclarhis gujanensis* (J. F. Gmelin 1789), *Dryocopus lineatus* (Linnaeus 1766), *Elaenia chiriquensis* Lawrence 1865, *Elanoides forficatus*, *Elanus leucurus*, *Falco deiroleucus*, *Fluvicola pica* (Boddaert 1783), *Forpus passerinus* (Linnaeus 1758), *Forpus xanthopterygius* (Spix 1824), *Furnarius leucopus* Swainson 1838, *Galbula ruficauda* Cuvier 1816, *Gallinula chloropus* (Linnaeus 1758), *Gampsonyx swainsonii*, *Geranospiza caerulescens*, *Glaucidium brasilianum* (Gmelin 1788), *Harpagus bidentatus*, *Harpia harpyja*, *Helicolestes hamatus*, *Hemitriccus margaritaceiventer* (Orbigny & Lafresnaye), *Himantopus mexicanus* (Statius Muller 1776), *Hylophilus flavipes* Lafresnaye 1845, *Hypnelus ruficollis* (Wagler 1829), *Icterus auricapillus* Cassin 1848, *Icterus galbula* (Linnaeus 1758), *Icterus nigrogularis* (Hahn 1819), *Ictinia mississippiensis*, *Ictinia plumbea*, *Inezia subflava* (P. L. Sclater & Salvin 1873), *Inezia tenuirostris* (Cory 1913), *Jabiru mycteria*, *Jacana jacana*, *Lepidopyga goudoti* (Bourcier 1843), *Leptotila verreauxi* (Bonaparte 1855), *Leucopternis melanops*, *Leucopternis semiplumbea*, *Machetornis rixosa*, *Megaceryle alcyon* (Linnaeus 1758), *Megaceryle torquata* (Linnaeus 1766), *Megarynchus pitangua* (Linnaeus 1766), *Megascops choliba*, *Melanerpes rubricapillus*, *Micrastur plumbeus*, *Mitu tomentosa*, *Molothrus bonariensis*, *Morphnarchus princeps*, *Morphnus guianensis*, *Myiarchus crinitus*, *Myiarchus venezuelensis* Lawrence 1865, *Myiopagis gaimardii* (Orbigny 1840), *Myiozetetes similis* (Spix 1825), *Myospiza humeralis* (Bosc 1792), *Nemosia pileata* (Boddaert 1783), *Neochen jubata*, *Opisthocomus hoazin*, *Oroaetus isidori*, *Ortalis ruficauda* Jardine 1847, *Pandion haliaetus*, *Parabuteo unicinctus*, *Patagioenas corensis* (Jacquin 1784), *Phaeomyias murina* (Spix 1825), *Pheucticus ludovicianus*, *Piculus chrysochloros* (Vieillot 1818), *Picumnus cinnamomeus* Wagler 1829, *Pilherodius pileatus* (Boddaert 1783), *Pionus sordidus* (Linnaeus 1758), *Pitangus lictor* (Lichtenstein 1823), *Pitangus sulphuratus*, *Polioptila plumbea* (J. F. Gmelin 1788), *Pseudastur albicollis*, *Pulsatrix perspicillata* (Latham 1790), *Pyrocephalus rubinus*, *Quiscalus lugubris*, *Quiscalus mexicanus* (Gmelin 1788), *Rostrhamus sociabilis*, *Sakesphorus canadensis* (Linnaeus 1766), *Saltator coerulescens* Vieillot 1817, *Sarcoramphus papa*, *Sarkidiornis melanotos* (Pennant 1769), *Spiza americana*, *Spizaetus tyrannus*, *Sporophila bouvronides* (Lesson 1831), *Sporophila intermedia* Cabanis 1851, *Sporophila nigricollis* (Vieillot 1823), *Stelgidopteryx ruficollis* (Vieillot 1817), *Sterna supercilialis*, *Sturnella magna*, *Sublegatus arenarum* (Salvin 1863), *Synallaxis candei* Orbigny & Lafresnaye 1838, *Tachycineta bicolor* (Vieillot 1808), *Tapera naevia* (Linnaeus 1766), *Thamnophilus doliatus* (Linnaeus 1764), *Thraupis glaucocolpa* Cabanis 1850, *Thraupis palmarum*, *Thryothorus leucotis* (Lafresnaye 1845), *Tyrannus dominicensis* (Gmelin 1788), *Tyto alba*, *Vireo flavoviridis* (Cassin 1851), *Zenaida auriculata*

editors

institution:

address:

publisher: Princeton University Press

accessed:

websites:

chapter:

series:

issue:

year: 1986

authors

authors: Hilty, S

authors: Brown, W. L.

title: A Guide to the Birds of Colombia

source:

type: book

tags: Accipiter collaris, Accipiter cooperii, Accipiter poliogaster, Accipiter superciliosus, Amazona ochrocephala, Andigena hypoglaucha, Aramides cajanea, Aramus guarauna (Linnaeus 1766), Aratinga pertinax, Ardea alba, Ardea cocoi, Ardea herodias, Arremonops conirostris (Bonaparte 1850), Arremonops tocuyensis (Todd 1912), Atalotriccus pilaris, Attila spadiceus (Gmelin 1789), Basileuterus flaveolus (S. F. Baird 1865), Bubo virginianus (Gmelin 1788), Busarellus nigricollis, Buteogallus anthracinus, Buteogallus meridionalis, Buteogallus schistaceus, Buteogallus solitarius, Buteogallus urubitinga, Cacicus cela, Cairina moschata, Campylorhamphus trochilirostris (Lichtenstein 1820), Campylorhynchus griseus (Swainson 1838), Campylorhynchus nuchalis (Cabanis 1847), Caprimulgus cayennensis (Gmelin 1789), Cardinalis phoeniceus Bonaparte 1838, Carduelis psaltria (Say 1823), Cathartes aura, Cathartes burrovianus, Cathartes melambrotus, Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin 1788), Ceryle torquata, Chlorostilbon gibsoni (Fraser 1840), Chondrohierax uncinatus, Chordeiles acutipennis (Hermann 1783), Chrysomus icterocephalus, Circus buffoni, Circus cinereus, Circus cyaneus, Coccyzus pumila, Columbina minuta (Linnaeus 1766), Conirostrum leucogenys (Lafresnaye 1852), Coragyps atratus, Coryphospingus pileatus (Wied-Neuwied 1821), Crax alector, Crotophaga major, Crotophaga sulcirostris Swainson 1827, Cryptoleucopteryx plumbea, Cyanocorax affinis (Pelzelin 1856), Cyclarhis gujanensis (J. F. Gmelin 1789), Dryocopus lineatus (Linnaeus 1766), Elaenia chiriquensis Lawrence 1865, Elanoides forficatus, Elanus leucurus, Falco deiroleucus, Fluvicola pica (Boddaert 1783), Forpus passerinus (Linnaeus 1758), Forpus xanthopterygius (Spix 1824), Furnarius leucopus Swainson 1838, Galbula ruficauda Cuvier 1816, Gallinula chloropus (Linnaeus 1758), Gampsonyx swainsonii, Geranospiza caerulescens, Glaucidium brasilianum (Gmelin 1788), Harpagus bidentatus, Harpia harpyja, Helicolestes hamatus, Hemitriccus margaritaceiventer (Orbigny & Lafresna, Himantopus mexicanus (Statius Muller 1776), Hylophilus flavipes Lafresnaye 1845, Hypnelus ruficollis (Wagler 1829), Icterus auricapillus Cassin 1848, Icterus galbula (Linnaeus 1758), Icterus nigrogularis (Hahn 1819), Ictinia mississippiensis, Ictinia plumbea, Inezia subflava (P. L. Sclater & Salvin 1873), Inezia tenuirostris (Cory 1913), Jabiru mycteria, Jacana jacana, Lepidopyga goudoti (Bourcier 1843), Leptotila verreauxi (Bonaparte 1855), Leucopternis melanops, Leucopternis semiplumbea, Machetornis rixosa, Megaceryle alcyon (Linnaeus 1758), Megaceryle torquata (Linnaeus 1766), Megarynchus pitangua (Linnaeus 1766), Megascops choliba, Melanerpes rubricapillus, Micrastur plumbeus, Mitu tomentosa, Molothrus bonariensis, Morphnarchus princeps, Morphnus guianensis, Myiarchus crinitus, Myiarchus venezuelensis Lawrence 1865, Myiopagis gaimardii (Orbigny 1840), Myiozetetes similis (Spix 1825), Myospiza humeralis (Bosc 1792), Nemosia pileata (Boddaert 1783), Neechen jubata, Opisthocomus hoazin, Oroaetus isidori, Ortalis ruficauda Jardine 1847, Pandion haliaetus, Parabuteo unicinctus, Patagioenas corensis (Jacquin 1784), Phaeomyias murina (Spix 1825), Pheucticus ludovicianus, Piculus chrysochloros (Vieillot 1818), Picumnus cinnamomeus Wagler 1829, Pilherodius pileatus (Boddaert 1783), Pionus sordidus (Linnaeus 1758), Pitangus lictor (Lichtenstein 1823), Pitangus sulphuratus, Polioptila plumbea (J. F. Gmelin 1788), Pseudastur albicollis, Pulsatrix perspicillata (Latham 1790), Pyrocephalus rubinus, Quiscalus lugubris, Quiscalus mexicanus (Gmelin 1788), Rostrhamus sociabilis, Sakesphorus canadensis (Linnaeus 1766), Saltator coerulescens Vieillot 1817, Sarcoramphus papa, Sarkidiornis melanotos (Pennant 1769), Spiza americana, Spizaetus tyrannus, Sporophila bouvronides (Lesson 1831), Sporophila intermedia Cabanis 1851, Sporophila nigricollis (Vieillot 1823), Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot 1817), Sterna supercilialis, Sturnella magna, Sublegatus arenarum (Salvin 1863), Synallaxis candei Orbigny & Lafresnaye 1838, Tachycineta bicolor (Vieillot 1808), Tapera naevia (Linnaeus 1766), Thamnophilus doliatus (Linnaeus 1764), Thraupis glaucocolpa Cabanis 1850, Thraupis palmarum, Thryothorus leucotis (Lafresnaye 1845), Tyrannus dominicensis (Gmelin 1788), Tyto alba, Vireo flavoviridis (Cassin 1851), Zenaida auriculata

abstract:

identifiers

last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:

taxonRecordName

ancillaryData

providerSpecificData

anyTwo:
providerLink:

publicationStatus

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

replacementNameFor

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

sanctioned

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

laterHomonymOf

microReference:
source:
datatype:
identifier:

source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

[conservedAgainst](#)

basedOn

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

basionym

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

[spellingCorrentionOf](#)

typeNameEntity

source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:

typificacion

typeOfType:

[lectotypeMicroReferenceVoucher](#)

[lectotypePublicationVoucher](#)

[voucherReference](#)

simple:
microReference:

year:
publishedIn
simple:
source:
datatype:
identifier:
specialAuthorship

authors

year
simple:
canonicalAuthorship

authors

year
simple:
simple: (Statius Muller, 1776)
canonicalName
infraspecificEpithet:
specificEpithet:
infragenericEpithet:
linkType:
ref:
uninomial:
simple: Aramides cajanea
rank: SPECIES
simple: Aramides cajanea (Statius Muller, 1776)
attributes
nomenclaturalCode:
isAnamorphic:
id:

synonymsAtomized

hierarchy

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation:

reference

geoPoint:
location:
thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source: The Catalogue of Life, 3rd January 2011

audience

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights:

license:

title:

modified: 2016-03-15T05:02:15.738Z

created: 2016-03-15T05:02:15.738Z

agent

homepage:

role:

email:

phone:

address:

position:

organisation:

lastName:

firstName:

contentType:

dataType:

identifier:

parentTaxon: Aramides

higherClassification:

infraspecificEpithet:

specificEpithet:

taxonRank: SPECIES

subGenus:

genus: Aramides

family: Rallidae

order: Gruiformes

classHierarchy: Aves

phylum: Chordata

kingdom: Animalia

recommended:

classification:

commonNameAtomized

ancillaryData

usedBy:

usedIn

distributionUnstructured:

endDate:

startDate:

ancillaryData

type:
language: Alemán
name: Cayenne-Ralle

invasiveness

invasivenessUnstructured:

reproduction

reproductionUnstructured:

molecularData

molecularDataUnstructured:

migratory

migratoryUnstructured:

lifeForm

lifeFormUnstructured:

lifeCycle

lifeCycleUnstructured:

interactions

interactionsUnstructured:

feeding

0

dataObject:
additionalInformation:

0

keywords: Acacia glomerosa, Acacia tamarindifolia, Acacia tortuosa, Alternanthera halimifolia, Amazona ochrocephala, Ameiva festiva, Anas discors, Anemopaegma orbiculatum, Anhinga anhinga (Linnaeus 1766), Anoda crenatiflora, Aphelandra pulcherrima, Aramides cajanea, Aramus guarauna (Linnaeus 1766), Aratinga acuticaudata (Vieillot 1818), Ardea herodias, Aristolochia anguicida, Arremonops conirostris (Bonaparte 1850), Arremonops tocuyensis (Todd 1912), Artemisia vulgaris, Aspidosperma cuspa, Atalotriccus pilaris, Ayenia magna, Basileuterus flaveolus (S. F. Baird 1865), Bastardia viscosa, Batis maritima, Bauhinia pauletia, Boerhavia scandens, Bonellia frutescens, Bourreria cumanensis, Bouteloua aristidoides, Bromelia chrysantha, Bubo virginianus (Gmelin 1788), Burhinus bistriatus (Wagler 1829), Butorides virescens, Caesalpinia bonduc, Caesalpinia mollis, Calotropis gigantea, Campylorhynchus griseus (Swainson 1838), Campylorhynchus nuchalis (Cabanis 1847), Canavalia brasiliensis, Canavalia rosea, Capparis frondosa, Capparis linearis, Capparis pulcherrima, Caprimulgus cayennensis (Gmelin 1789), Capsicum baccatum, Cardinalis phoeniceus Bonaparte 1838, Cardiospermum corindum, Carduelis psaltria (Say 1823), Castela erecta, Celtis iguanaea, Cenchrus brownii, Cenchrus ciliaris, Cenchrus echinatus, Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin 1788), Chlorostilbon gibsoni (Fraser 1840), Chordeiles acutipennis (Hermann 1783), Chrysolampis mosquitus (Linnaeus 1758), Chrysomus icterocephalus, Cissus trifoliata, Citrullus lanatus, Cleome spinosa, Cnidoscolus urens, Coccoloba microstachya, Columbina minuta (Linnaeus 1766), Columbina passerina (Linnaeus 1758), Combretum fruticosum, Conirostrum leucogenys (Lafresnaye 1852), Conyza canadensis, Conyza perijaensis, Cordia macuirensis, Coryphospingus pileatus (Wied-Neuwied 1821), Craniolaria annua, Crotalaria purdiana, Crotalaria retusa, Croton ferrugineus, Croton malambo, Croton niveus, Croton ovalifolius, Croton punctatus, Crotophaga major, Crotophaga sulcirostris Swainson 1827, Cyanocorax affinis (Pelzelin 1856), Cyclarhis gujanensis (J. F. Gmelin 1789), Cyperus articulatus, Datura innoxia, Dendrocygna

autumnalis, *Desmodium incanum*, *Diphysa carthagenensis*, *Ditaxis argothamnoides*, *Dolichandra unguis-*
cati, *Dryocopus lineatus* (Linnaeus 1766), *Dysphania ambrosioides*, *Egletes prostrata*, *Egretta thula*, *Egretta tricolor*
 (Statius Muller 1776), *Elaenia chiriquensis* Lawrence 1865, *Eleocharis elegans*, *Eleocharis interstincta*, *Engystomops*
pustulosus, *Eragrostis ciliaris*, *Erythrina berteroaana*, *Euphorbia hirta*, *Evolvulus convolvuloides*, *Evolvulus*
sericeus, *Exostema caribaeum*, *Fluvicola pica* (Boddaert 1783), *Forpus passerinus* (Linnaeus 1758), *Forpus*
xanthopterygius (Spix 1824), *Fridericia chica*, *Fridericia dichotoma*, *Fridericia mollissima*, *Funastrum clausum*, *Furnarius*
leucopus Swainson 1838, *Galactia striata*, *Galbula ruficauda* Cuvier 1816, *Glaucidium brasilianum* (Gmelin
 1788), *Glossophaga longirostris* Miller 1898, *Gonatodes vittatus*, *Handroanthus serratifolius*, *Heliotropium*
angiospermum, *Heliotropium indicum*, *Heliotropium procumbens*, *Hemitriccus margaritaceiventer* (Orbigny \&
 Lafresna, *Hibiscus phoeniceus*, *Hillia costanensis*, *Himantopus mexicanus* (Statius Muller 1776), *Hippomane*
mancinella, *Hylophilus flavipes* Lafresnaye 1845, *Hymenocallis caribaea*, *Hypnelus ruficollis* (Wagler 1829), *Icterus*
auricapillus Cassin 1848, *Icterus galbula* (Linnaeus 1758), *Icterus nigrogularis* (Hahn 1819), *Inezia subflava* (P. L.
 Sclater \& Salvin 1873), *Inezia tenuirostris* (Cory 1913), *Ipomoea incarnata*, *Jacquinia armillaris*, *Laguncularia*
racemosa, *Lantana fucata*, *Lepidoblepharis sanctaemartae* Ruthven 1916, *Leptodactylus poecilochilus*, *Leptonycteris*
curasoae Miller 1900, *Leptotila verreauxi* (Bonaparte 1855), *Licania cuspidata*, *Lonchocarpus*
atropurpureus, *Lonchocarpus sanctae-marthae*, *Ludwigia octovalvis*, *Luffa operculata*, *Machetornis rixosa*, *Mallotus*
rhamnifolius, *Manihot carthaginensis*, *Matelea maritima*, *Megaceryle alcyon* (Linnaeus 1758), *Megaceryle torquata*
 (Linnaeus 1766), *Megarynychus pitangua* (Linnaeus 1766), *Megascops choliba*, *Melanerpes rubricapillus*, *Melocactus*
intortus, *Melochia parvifolia*, *Melochia tomentosa*, *Mentzelia aspera*, *Merremia aegyptia*, *Merremia*
umbellata, *Micronycteris hirsuta* (Peters 1869), *Mimosa arenosa*, *Mimosa leiocarpa*, *Mimosa pellita*, *Mollugo*
verticillata, *Molothrus bonariensis*, *Morisonia americana*, *Mormoops megalophylla* (Peters 1864), *Musa*
paradisiaca, *Myiarchus crinitus*, *Myiarchus venezuelensis* Lawrence 1865, *Myiopagis gaimardii* (Orbigny
 1840), *Myiozetetes similis* (Spix 1825), *Myospiza humeralis* (Bosc 1792), *Nemosia pileata* (Boddaert
 1783), *Neurolaena lobata*, *Noctilio leporinus* (Linnaeus 1758), *Nycticorax nycticorax*, *Pachyramphus rufus* (Boddaert
 1783), *Parkia velutina*, *Parkinsonia praecox*, *Passiflora foetida*, *Patagioenas corensis* (Jacquin 1784), *Paullinia*
cururu, *Phaeomyias murina* (Spix 1825), *Phaseolus lunatus*, *Pheucticus ludovicianus*, *Phoradendron*
mucronatum, *Phthirusa stelis*, *Phyla nodiflora*, *Piculus chrysochloros* (Vieillot 1818), *Picumnus cinnamomeus* Wagler
 1829, *Pilherodius pileatus* (Boddaert 1783), *Pilosocereus lanuginosus*, *Pionus sordidus* (Linnaeus 1758), *Piptadenia*
viridiflora, *Piranga flava* (Vieillot 1822), *Pitangus lictor* (Lichtenstein 1823), *Platalea ajaja* Linnaeus 1758, *Pleurodema*
brachyops, *Polioptila plumbea* (J. F. Gmelin 1788), *Porophyllum ruderales*, *Pseudopaludicola pusilla*, *Pteronotus*
gymnonotus (Natterer 1843), *Pteronotus parnellii* (Gray 1843), *Pteronotus personatus* (Wagner 1843), *Pulsatrix*
perspicillata (Latham 1790), *Pyrocephalus rubinus*, *Quiscalus lugubris*, *Rhizophora mangle*, *Rivina*
humilis, *Rosenbergiodendron formosum*, *Ruellia paniculata*, *Ruprechtia ramiflora*, *Sakesphorus canadensis* (Linnaeus
 1766), *Saltator coerulescens* Vieillot 1817, *Sarcostemma glaucum*, *Scoparia dulcis*, *Senna atomaria*, *Senna*
bicapsularis, *Senna candolleana*, *Senna italica*, *Senna occidentalis*, *Senna tora*, *Serjania mexicana*, *Sesuvium*
portulacastrum, *Sida ciliaris*, *Solandra grandiflora*, *Solanum bicolor*, *Spiza americana*, *Sporobolus*
coromandelianus, *Sporobolus pyramidalis*, *Sporophila bouvronides* (Lesson 1831), *Sporophila intermedia* Cabanis
 1851, *Sporophila nigricollis* (Vieillot 1823), *Stelgidopteryx ruficollis* (Vieillot 1817), *Stemodia maritima*, *Streptoprocne*
zonaris (Shaw 1796), *Sturnella magna*, *Sublegatus arenarum* (Salvin 1863), *Synallaxis candei* Orbigny \& Lafresnaye
 1838, *Tabernaemontana amygdalifolia*, *Tachycineta albiventer* (Boddaert 1783), *Tachycineta bicolor* (Vieillot
 1808), *Talinum paniculatum*, *Tapera naevia* (Linnaeus 1766), *Tephrosia cinerea*, *Thamnophilus doliatus* (Linnaeus
 1764), *Thraupis glaucocolpa* Cabanis 1850, *Thraupis palmarum*, *Thryothorus leucotis* (Lafresnaye 1845), *Tiaris bicolor*
 (Linnaeus 1766), *Tiaris obscurus* (Orbigny \& Lafresnaye 1837), *Tillandsia flexuosa*, *Tityra inquisitor* (Lichtenstein
 1823), *Tolmomyias sulphurescens* (Spix 1825), *Tournefortia hirsutissima*, *Trianthema portulacastrum*, *Tribulus*
cistoides, *Tyrannus dominicensis* (Gmelin 1788), *Tyto alba*, *Vireo flavoviridis* (Cassin 1851), *Vitex*
compressa, *Wissadula periplocifolia*, *Zenaida auriculata*

institution:

address:

publisher:

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 417

issue:

year: 2010

0: Cerrejón

title: Monitoreo de Fauna en el Valle del Cerrejón

source:

type: report

tags: *Acacia glomerosa*, *Acacia tamarindifolia*, *Acacia tortuosa*, *Alternanthera halimifolia*, *Amazona ochrocephala*, *Ameiva festiva*, *Anas discors*, *Anemopaegma orbiculatum*, *Anhinga anhinga* (Linnaeus 1766), *Anoda crenatiflora*, *Aphelandra pulcherrima*, *Aramides cajanea*, *Aramus guarauna* (Linnaeus 1766), *Aratinga acuticaudata* (Vieillot 1818), *Ardea herodias*, *Aristolochia anguicida*, *Arremonops conirostris* (Bonaparte 1850), *Arremonops tocuyensis* (Todd 1912), *Artemisia vulgaris*, *Aspidosperma cuspa*, *Atalotriccus pilaris*, *Ayenia magna*, *Basileuterus flaveolus* (S. F. Baird 1865), *Bastardia viscosa*, *Batis maritima*, *Bauhinia pauletia*, *Boerhavia scandens*, *Bonellia frutescens*, *Bourreria cumanensis*, *Bouteloua aristidoides*, *Bromelia chrysantha*, *Bubo virginianus* (Gmelin 1788), *Burhinus bistriatus* (Wagler 1829), *Butorides virescens*, *Caesalpinia bonduc*, *Caesalpinia mollis*, *Calotropis gigantea*, *Campylorhynchus griseus* (Swainson 1838), *Campylorhynchus nuchalis* (Cabanis 1847), *Canavalia brasiliensis*, *Canavalia rosea*, *Capparis frondosa*, *Capparis linearis*, *Capparis pulcherrima*, *Caprimulgus cayennensis* (Gmelin 1789), *Capsicum baccatum*, *Cardinalis pheniceus* Bonaparte 1838, *Cardiospermum corindum*, *Carduelis psaltria* (Say 1823), *Castela erecta*, *Celtis iguanaea*, *Cenchrus brownii*, *Cenchrus ciliaris*, *Cenchrus echinatus*, *Certhiaxis cinnamomeus* (Gmelin 1788), *Chlorostilbon gibsoni* (Fraser 1840), *Chordeiles acutipennis* (Hermann 1783), *Chrysolampis mosquitos* (Linnaeus 1758), *Chrysomus icterocephalus*, *Cissus trifoliata*, *Citrullus lanatus*, *Cleome spinosa*, *Cnidoscolus urens*, *Coccoloba microstachya*, *Columbina minuta* (Linnaeus 1766), *Columbina passerina* (Linnaeus 1758), *Combretum fruticosum*, *Conirostrum leucogenys* (Lafresnaye 1852), *Conyza canadensis*, *Conyza perijaensis*, *Cordia macuirensis*, *Coryphospingus pileatus* (Wied-Neuwied 1821), *Craniolaria annua*, *Crotalaria purdiana*, *Crotalaria retusa*, *Croton ferrugineus*, *Croton malambo*, *Croton niveus*, *Croton ovalifolius*, *Croton punctatus*, *Crotophaga major*, *Crotophaga sulcirostris* Swainson 1827, *Cyanocorax affinis* (Pelzelin 1856), *Cyclarhis gujanensis* (J. F. Gmelin 1789), *Cyperus articulatus*, *Datura innoxia*, *Dendrocygna autumnalis*, *Desmodium incanum*, *Diphysa carthagenensis*, *Ditaxis argothamnoides*, *Dolichandra unguis-cati*, *Dryocopus lineatus* (Linnaeus 1766), *Dysphania ambrosioides*, *Egletes prostrata*, *Egretta thula*, *Egretta tricolor* (Statius Muller 1776), *Elaenia chiriquensis* Lawrence 1865, *Eleocharis elegans*, *Eleocharis interstincta*, *Engystomops pustulosus*, *Eragrostis ciliaris*, *Erythrina berteroana*, *Euphorbia hirta*, *Evolvulus convolvuloides*, *Evolvulus sericeus*, *Exostema caribaeum*, *Fluvicola pica* (Boddaert 1783), *Forpus passerinus* (Linnaeus 1758), *Forpus xanthopterygius* (Spix 1824), *Fridericia chica*, *Fridericia dichotoma*, *Fridericia mollissima*, *Funastrum clausum*, *Furnarius leucopus* Swainson 1838, *Galactia striata*, *Galbula ruficauda* Cuvier 1816, *Glaucidium brasilianum* (Gmelin 1788), *Glossophaga longirostris* Miller 1898, *Gonatodes vittatus*, *Handroanthus serratifolius*, *Heliotropium angiospermum*, *Heliotropium indicum*, *Heliotropium procumbens*, *Hemitriccus margaritaceiventer* (Orbigny & Lafresna), *Hibiscus pheniceus*, *Hillia costanensis*, *Himantopus mexicanus* (Statius Muller 1776), *Hippomane mancinella*, *Hylophilus flavipes* Lafresnaye 1845, *Hymenocallis caribaea*, *Hypnelus ruficollis* (Wagler 1829), *Icterus auricapillus* Cassin 1848, *Icterus galbula* (Linnaeus 1758), *Icterus nigrogularis* (Hahn 1819), *Inezia subflava* (P. L. Sclater & Salvin 1873), *Inezia tenuirostris* (Cory 1913), *Ipomoea incarnata*, *Jacquinia armillaris*, *Laguncularia racemosa*, *Lantana fucata*, *Lepidoblepharis sanctaemartae* Ruthven 1916, *Leptodactylus poecilochilus*, *Leptonycteris curasoae* Miller 1900, *Leptotila verreauxi* (Bonaparte 1855), *Licania cuspidata*, *Lonchocarpus atropurpureus*, *Lonchocarpus sanctae-marthae*, *Ludwigia octovalvis*, *Luffa operculata*, *Machetornis rixosa*, *Mallotus rhamnifolius*, *Manihot carthaginensis*, *Matelea maritima*, *Megaceryle alcyon* (Linnaeus 1758), *Megaceryle torquata* (Linnaeus 1766), *Megarynchus pitangua* (Linnaeus 1766), *Megascops choliba*, *Melanerpes rubricapillus*, *Melocactus intortus*, *Melochia parvifolia*, *Melochia tomentosa*, *Mentzelia aspera*, *Merremia aegyptia*, *Merremia umbellata*, *Micronycteris hirsuta* (Peters 1869), *Mimosa arenosa*, *Mimosa leiocarpa*, *Mimosa pellita*, *Mollugo verticillata*, *Molothrus bonariensis*, *Morisonia americana*, *Mormoops megalophylla* (Peters 1864), *Musa paradisiaca*, *Myiarchus crinitus*, *Myiarchus venezuelensis* Lawrence 1865, *Myiopagis gaimardii* (Orbigny 1840), *Myiozetetes similis* (Spix 1825), *Myospiza humeralis* (Bosc 1792), *Nemosia pileata* (Boddaert 1783), *Neurolaena lobata*, *Noctilio leporinus* (Linnaeus 1758), *Nycticorax nycticorax*, *Pachyramphus rufus* (Boddaert 1783), *Parkia velutina*, *Parkinsonia praecox*, *Passiflora foetida*, *Patagioenas corensis* (Jacquin 1784), *Paullinia cururu*, *Phaeomyias murina* (Spix 1825), *Phaseolus lunatus*, *Pheucticus ludovicianus*, *Phoradendron mucronatum*, *Phthirusa stelis*, *Phyla nodiflora*, *Piculus chrysochloros* (Vieillot 1818), *Picumnus cinnamomeus* Wagler 1829, *Pilherodius pileatus* (Boddaert 1783), *Pilosocereus lanuginosus*, *Pionus sordidus* (Linnaeus 1758), *Piptadenia viridiflora*, *Piranga flava* (Vieillot 1822), *Pitangus lictor* (Lichtenstein 1823), *Platalea ajaja* Linnaeus 1758, *Pleurodema brachyops*, *Polioptila plumbea* (J. F. Gmelin 1788), *Porophyllum ruderales*, *Pseudopaludicola pusilla*, *Pteronotus gymnotus* (Natterer 1843), *Pteronotus parnellii* (Gray 1843), *Pteronotus personatus* (Wagner 1843), *Pulsatrix perspicillata* (Latham 1790), *Pyrocephalus rubinus*, *Quiscalus lugubris*, *Rhizophora mangle*, *Rivina*

humilis, Rosenbergiodendron formosum, Ruellia paniculata, Ruprechtia ramiflora, Sakesphorus canadensis (Linnaeus 1766), Saltator coerulescens Vieillot 1817, Sarcostemma glaucum, Scoparia dulcis, Senna atomaria, Senna bicuspidata, Senna candolleana, Senna italica, Senna occidentalis, Senna tora, Serjania mexicana, Sesuvium portulacastrum, Sida ciliaris, Solandra grandiflora, Solanum bicolor, Spiza americana, Sporobolus coromandelianus, Sporobolus pyramidalis, Sporophila bouvronides (Lesson 1831), Sporophila intermedia Cabanis 1851, Sporophila nigricollis (Vieillot 1823), Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot 1817), Stemodia maritima, Streptoprocne zonaris (Shaw 1796), Sturnella magna, Sublegatus arenarum (Salvin 1863), Synallaxis candei Orbigny & Lafresnaye 1838, Tabernaemontana amygdalifolia, Tachycineta albiventer (Boddaert 1783), Tachycineta bicolor (Vieillot 1808), Talinum paniculatum, Tapera naevia (Linnaeus 1766), Tephrosia cinerea, Thamnophilus dolius (Linnaeus 1764), Thraupis glaucocolpa Cabanis 1850, Thraupis palmarum, Thryothorus leucotis (Lafresnaye 1845), Tiaris bicolor (Linnaeus 1766), Tiaris obscurus (Orbigny & Lafresnaye 1837), Tillandsia flexuosa, Tityra inquisitor (Lichtenstein 1823), Tolmomyias sulphureus (Spix 1825), Tournefortia hirsutissima, Trianthema portulacastrum, Tribulus cistoides, Tyrannus dominicensis (Gmelin 1788), Tyto alba, Vireo flavoviridis (Cassin 1851), Vitex compressa, Wissadula periplocifolia, Zenaida auriculata

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

feedingUnstructured: Cuando se encuentra en manglares se alimenta de cangrejos (Hilty & Brown 1986). En La Guajira se observó que los individuos forrajeaban en el suelo y el agua y su dieta se compone principalmente de invertebrados (Cerrejón 2010).

environmentalEnvelope

environmentalEnvelopeUnstructured:

ecologicalSignificance

ecologicalSignificanceUnstructured:

dispersal

dispersalUnstructured:

distance:

structureDispersed:

type:

purpose:

behavior

0

dataObject:

additionalInformation:

0

keywords: *Accipiter collaris*, *Accipiter cooperii*, *Accipiter poliogaster*, *Accipiter superciliosus*, *Amazona ochrocephala*, *Andigena hypoglaucha*, *Aramides cajanea*, *Aramus guarauna* (Linnaeus 1766), *Aratinga pertinax*, *Ardea alba*, *Ardea cocoi*, *Ardea herodias*, *Arremonops conirostris* (Bonaparte 1850), *Arremonops tocuyensis* (Todd 1912), *Atalotriccus pilaris*, *Attila spadiceus* (Gmelin 1789), *Basileuterus flaveolus* (S. F. Baird 1865), *Bubo virginianus* (Gmelin 1788), *Busarellus nigricollis*, *Buteogallus anthracinus*, *Buteogallus meridionalis*, *Buteogallus schistaceus*, *Buteogallus solitarius*, *Buteogallus urubitinga*, *Cacicus cela*, *Cairina moschata*, *Campylorhamphus trochilirostris* (Lichtenstein 1820), *Campylorhynchus griseus* (Swainson 1838), *Campylorhynchus nuchalis* (Cabanis 1847), *Caprimulgus cayennensis* (Gmelin 1789), *Cardinalis phoeniceus* Bonaparte 1838, *Carduelis psaltria* (Say 1823), *Cathartes aura*, *Cathartes burrovianus*, *Cathartes melambrotus*, *Certhiaxis cinnamomeus* (Gmelin 1788), *Ceryle torquata*, *Chlorostilbon gibsoni* (Fraser 1840), *Chondrohierax uncinatus*, *Chordeiles acutipennis* (Hermann 1783), *Chrysomus icterocephalus*, *Circus buffoni*, *Circus cinereus*, *Circus cyaneus*, *Coccyzus pumila*, *Columbina minuta* (Linnaeus 1766), *Conirostrum leucogenys* (Lafresnaye 1852), *Coragyps atratus*, *Coryphospingus pileatus* (Wied-Neuwied 1821), *Crax alector*, *Crotophaga major*, *Crotophaga sulcirostris* Swainson 1827, *Cryptoleucopteryx plumbea*, *Cyanocorax affinis* (Pelzelin 1856), *Cyclarhis gujanensis* (J. F. Gmelin 1789), *Dryocopus lineatus* (Linnaeus 1766), *Elaenia chiriquensis* Lawrence 1865, *Elanoides forficatus*, *Elanus leucurus*, *Falco deiroleucus*, *Fluvicola pica* (Boddaert 1783), *Forpus passerinus* (Linnaeus 1758), *Forpus xanthopterygius* (Spix 1824), *Furnarius leucopus* Swainson 1838, *Galbula ruficauda* Cuvier 1816, *Gallinula chloropus* (Linnaeus 1758), *Gampsonyx swainsonii*, *Geranospiza caerulescens*, *Glaucidium brasilianum* (Gmelin 1788), *Harpagus bidentatus*, *Harpia harpyja*, *Helicolestes hamatus*, *Hemitriccus margaritaceiventer* (Orbigny & Lafresnaye), *Himantopus mexicanus* (Statius Muller 1776), *Hylophilus flavipes* Lafresnaye 1845, *Hypnelus ruficollis* (Wagler 1829), *Icterus auricapillus* Cassin 1848, *Icterus galbula* (Linnaeus 1758), *Icterus nigrogularis* (Hahn 1819), *Ictinia mississippiensis*, *Ictinia plumbea*, *Inezia subflava* (P. L. Sclater & Salvin 1873), *Inezia tenuirostris* (Cory 1913), *Jabiru mycteria*, *Jacana jacana*, *Lepidopygia goudoti* (Bourcier 1843), *Leptotila verreauxi* (Bonaparte 1855), *Leucopternis melanops*, *Leucopternis semiplumbea*, *Machetornis rixosa*, *Megaceryle alcyon* (Linnaeus 1758), *Megaceryle torquata* (Linnaeus 1766), *Megarynchus pitangua* (Linnaeus 1766), *Megascops choliba*, *Melanerpes rubricapillus*, *Micrastur plumbeus*, *Mitu tomentosa*, *Molothrus bonariensis*, *Morphnarchus princeps*, *Morphnus guianensis*, *Myiarchus crinitus*, *Myiarchus venezuelensis* Lawrence 1865, *Myiopagis gaimardii* (Orbigny 1840), *Myiozetetes similis* (Spix 1825), *Myospiza humeralis* (Bosc 1792), *Nemosia pileata* (Boddaert 1783), *Neochen jubata*, *Opisthocomus hoazin*, *Oroaetus isidori*, *Ortalis ruficauda* Jardine 1847, *Pandion haliaetus*, *Parabuteo unicinctus*, *Patagioenas corensis* (Jacquin 1784), *Phaeomyias murina* (Spix 1825), *Pheucticus ludovicianus*, *Piculus chrysochloros* (Vieillot 1818), *Picumnus cinnamomeus* Wagler 1829, *Pilherodius pileatus* (Boddaert 1783), *Pionus sordidus* (Linnaeus 1758), *Pitangus lictor* (Lichtenstein 1823), *Pitangus sulphuratus*, *Polioptila plumbea* (J. F. Gmelin 1788), *Pseudastur albicollis*, *Pulsatrix perspicillata* (Latham 1790), *Pyrocephalus rubinus*, *Quiscalus lugubris*, *Quiscalus mexicanus* (Gmelin 1788), *Rostrhamus sociabilis*, *Sakesphorus canadensis* (Linnaeus 1766), *Saltator coerulescens* Vieillot 1817, *Sarcoramphus papa*, *Sarkidiornis melanotos* (Pennant 1769), *Spiza americana*, *Spizaetus tyrannus*, *Sporophila bouvronides* (Lesson 1831), *Sporophila intermedia* Cabanis 1851, *Sporophila nigricollis* (Vieillot 1823), *Stelgidopteryx ruficollis* (Vieillot 1817), *Sterna supercilialis*, *Sturnella magna*, *Sublegatus arenarum* (Salvin 1863), *Synallaxis candei* Orbigny & Lafresnaye 1838, *Tachycineta bicolor* (Vieillot 1808), *Tapera naevia* (Linnaeus 1766), *Thamnophilus doliatus* (Linnaeus 1764), *Thraupis glaucocolpa* Cabanis 1850, *Thraupis palmarum*, *Thryothorus leucotis* (Lafresnaye 1845), *Tyrannus dominicensis* (Gmelin 1788), *Tyto alba*, *Vireo flavoviridis* (Cassin 1851), *Zenaida auriculata*
institution:
address:
publisher: Princeton University Press
accessed:
websites:
chapter:
series:
issue:
year: 1986
0: Hilty, S
1: Brown, W. L.
title: A Guide to the Birds of Colombia

source:

type: book

tags: Accipiter collaris, Accipiter cooperii, Accipiter poliogaster, Accipiter superciliosus, Amazona ochrocephala, Andigena hypoglaucha, Aramides cajanea, Aramus guarauna (Linnaeus 1766), Aratinga pertinax, Ardea alba, Ardea cocoi, Ardea herodias, Arremonops conirostris (Bonaparte 1850), Arremonops tocuyensis (Todd 1912), Atalotriccus pilaris, Attila spadiceus (Gmelin 1789), Basileuterus flaveolus (S. F. Baird 1865), Bubo virginianus (Gmelin 1788), Busarellus nigricollis, Buteogallus anthracinus, Buteogallus meridionalis, Buteogallus schistaceus, Buteogallus solitarius, Buteogallus urubitinga, Cacicus cela, Cairina moschata, Campylorhamphus trochilirostris (Lichtenstein 1820), Campylorhynchus griseus (Swainson 1838), Campylorhynchus nuchalis (Cabanis 1847), Caprimulgus cayennensis (Gmelin 1789), Cardinalis phoeniceus Bonaparte 1838, Carduelis psaltria (Say 1823), Cathartes aura, Cathartes burrovianus, Cathartes melambrotus, Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin 1788), Ceryle torquata, Chlorostilbon gibsoni (Fraser 1840), Chondrohierax uncinatus, Chordeiles acutipennis (Hermann 1783), Chrysomus icterocephalus, Circus buffoni, Circus cinereus, Circus cyaneus, Coccyzus pumila, Columbina minuta (Linnaeus 1766), Conirostrum leucogenys (Lafresnaye 1852), Coragyps atratus, Coryphospingus pileatus (Wied-Neuwied 1821), Crax alector, Crotophaga major, Crotophaga sulcirostris Swainson 1827, Cryptoleucopteryx plumbea, Cyanocorax affinis (Pelzelin 1856), Cyclarhis gujanensis (J. F. Gmelin 1789), Dryocopus lineatus (Linnaeus 1766), Elaenia chiriquensis Lawrence 1865, Elanoides forficatus, Elanus leucurus, Falco deiroleucus, Fluvicola pica (Boddaert 1783), Forpus passerinus (Linnaeus 1758), Forpus xanthopterygius (Spix 1824), Furnarius leucopus Swainson 1838, Galbula ruficauda Cuvier 1816, Gallinula chloropus (Linnaeus 1758), Gampsonyx swainsonii, Geranospiza caerulescens, Glaucidium brasilianum (Gmelin 1788), Harpagus bidentatus, Harpia harpyja, Helicolestes hamatus, Hemitriccus margaritaceiventer (Orbigny & Lafresna, Himantopus mexicanus (Statius Muller 1776), Hylophilus flavipes Lafresnaye 1845, Hypnelus ruficollis (Wagler 1829), Icterus auricapillus Cassin 1848, Icterus galbula (Linnaeus 1758), Icterus nigrogularis (Hahn 1819), Ictinia mississippiensis, Ictinia plumbea, Inezia subflava (P. L. Sclater & Salvin 1873), Inezia tenuirostris (Cory 1913), Jabiru mycteria, Jacana jacana, Lepidopyga goudoti (Bourcier 1843), Leptotila verreauxi (Bonaparte 1855), Leucopternis melanops, Leucopternis semiplumbea, Machetornis rixosa, Megaceryle alcyon (Linnaeus 1758), Megaceryle torquata (Linnaeus 1766), Megarynchus pitangua (Linnaeus 1766), Megascops choliba, Melanerpes rubricapillus, Micrastur plumbeus, Mitu tomentosa, Molothrus bonariensis, Morphnarchus princeps, Morphnus guianensis, Myiarchus crinitus, Myiarchus venezuelensis Lawrence 1865, Myiopagis gaimardii (Orbigny 1840), Myiozetetes similis (Spix 1825), Myospiza humeralis (Bosc 1792), Nemosia pileata (Boddaert 1783), Neochen jubata, Opisthocomus hoazin, Oroaetus isidori, Ortalis ruficauda Jardine 1847, Pandion haliaetus, Parabuteo unicinctus, Patagioenas corensis (Jacquin 1784), Phaeomyias murina (Spix 1825), Pheucticus ludovicianus, Piculus chrysochloros (Vieillot 1818), Picumnus cinnamomeus Wagler 1829, Pilherodius pileatus (Boddaert 1783), Pionus sordidus (Linnaeus 1758), Pitangus lictor (Lichtenstein 1823), Pitangus sulphuratus, Polioptila plumbea (J. F. Gmelin 1788), Pseudastur albicollis, Pulsatrix perspicillata (Latham 1790), Pyrocephalus rubinus, Quiscalus lugubris, Quiscalus mexicanus (Gmelin 1788), Rostrhamus sociabilis, Sakesphorus canadensis (Linnaeus 1766), Saltator coerulescens Vieillot 1817, Sarcoramphus papa, Sarkidiornis melanotos (Pennant 1769), Spiza americana, Spizaetus tyrannus, Sporophila bouvronides (Lesson 1831), Sporophila intermedia Cabanis 1851, Sporophila nigricollis (Vieillot 1823), Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot 1817), Sterna supercilialis, Sturnella magna, Sublegatus arenarum (Salvin 1863), Synallaxis candei Orbigny & Lafresnaye 1838, Tachycineta bicolor (Vieillot 1808), Tapera naevia (Linnaeus 1766), Thamnophilus doliatus (Linnaeus 1764), Thraupis glaucocolpa Cabanis 1850, Thraupis palmarum, Thryothorus leucotis (Lafresnaye 1845), Tyrannus dominicensis (Gmelin 1788), Tyto alba, Vireo flavoviridis (Cassin 1851), Zenaida auriculata

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

behaviorUnstructured: Es un ave furtiva, suspicaz y difícil de ver, pero se puede oír a menudo. En ocasiones camina en terreno abierto pero siempre cerca de una cobertura densa. Permanece solitaria, en parejas o pequeños grupos. Reposa en perchas elevadas (Hilty & Brown 1986).

ancillaryData

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights:

license:

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

measurementOrFact

relatedTo:

measurementRemarks:

measurementMethod:

measurementDeterminedDate:

measurementUnit:

measurementAccuracy:

measurementValue:

measurementType:

measurementID:

annualCycle

annualCycleUnstructured:

habitat

0

dataObject:

additionalInformation:

0

keywords: Acacia glomerosa, Acacia tamarindifolia, Acacia tortuosa, Alternanthera halimifolia, Amazona ochrocephala, Ameiva festiva, Anas discors, Anemopaegma orbiculatum, Anhinga anhinga (Linnaeus 1766), Anoda crenatiflora, Aphelandra pulcherrima, Aramidés cajanea, Aramus guarauna (Linnaeus 1766), Aratinga acuticaudata (Vieillot 1818), Ardea herodias, Aristolochia anguicida, Arremonops conirostris (Bonaparte 1850), Arremonops tocuyensis (Todd 1912), Artemisia vulgaris, Aspidosperma cuspa, Atalotriccus pilaris, Ayenia magna, Basileuterus

flaveolus (S. F. Baird 1865), *Bastardia viscosa*, *Batis maritima*, *Bauhinia pauletia*, *Boerhavia scandens*, *Bonellia frutescens*, *Bourreria cumanensis*, *Bouteloua aristoides*, *Bromelia chrysantha*, *Bubo virginianus* (Gmelin 1788), *Burhinus bistriatus* (Wagler 1829), *Butorides virescens*, *Caesalpinia bonduc*, *Caesalpinia mollis*, *Calotropis gigantea*, *Campylorhynchus griseus* (Swainson 1838), *Campylorhynchus nuchalis* (Cabanis 1847), *Canavalia brasiliensis*, *Canavalia rosea*, *Capparis frondosa*, *Capparis linearis*, *Capparis pulcherrima*, *Caprimulgus cayennensis* (Gmelin 1789), *Capsicum baccatum*, *Cardinalis phoeniceus* Bonaparte 1838, *Cardiospermum corindum*, *Carduelis psaltria* (Say 1823), *Castela erecta*, *Celtis iguanaea*, *Cenchrus brownii*, *Cenchrus ciliaris*, *Cenchrus echinatus*, *Certhiaxis cinnamomeus* (Gmelin 1788), *Chlorostilbon gibsoni* (Fraser 1840), *Chordeiles acutipennis* (Hermann 1783), *Chrysolampis mosquitos* (Linnaeus 1758), *Chrysomus icterocephalus*, *Cissus trifoliata*, *Citrullus lanatus*, *Cleome spinosa*, *Cnidoscolus urens*, *Coccoloba microstachya*, *Columbina minuta* (Linnaeus 1766), *Columbina passerina* (Linnaeus 1758), *Combretum fruticosum*, *Conirostrum leucogenys* (Lafresnaye 1852), *Conyza canadensis*, *Conyza perijaensis*, *Cordia macuirensis*, *Coryphospingus pileatus* (Wied-Neuwied 1821), *Craniolaria annua*, *Crotalaria purdiana*, *Crotalaria retusa*, *Croton ferrugineus*, *Croton malambo*, *Croton niveus*, *Croton ovalifolius*, *Croton punctatus*, *Crotophaga major*, *Crotophaga sulcirostris* Swainson 1827, *Cyanocorax affinis* (Pelzeln 1856), *Cyclarhis gujanensis* (J. F. Gmelin 1789), *Cyperus articulatus*, *Datura innoxia*, *Dendrocygna autumnalis*, *Desmodium incanum*, *Diphysa carthaginensis*, *Ditaxis argothamnoides*, *Dolichandra unguis-cati*, *Dryocopus lineatus* (Linnaeus 1766), *Dysphania ambrosioides*, *Egletes prostrata*, *Egretta thula*, *Egretta tricolor* (Statius Muller 1776), *Elaenia chiriquensis* Lawrence 1865, *Eleocharis elegans*, *Eleocharis interstincta*, *Engystomops pustulosus*, *Eragrostis ciliaris*, *Erythrina berterioana*, *Euphorbia hirta*, *Evolvulus convolvuloides*, *Evolvulus sericeus*, *Exostema caribaeum*, *Fluvicola pica* (Boddaert 1783), *Forpus passerinus* (Linnaeus 1758), *Forpus xanthopterygius* (Spix 1824), *Fridericia chica*, *Fridericia dichotoma*, *Fridericia mollissima*, *Funastrum clausum*, *Furnarius leucopus* Swainson 1838, *Galactia striata*, *Galbula ruficauda* Cuvier 1816, *Glaucidium brasilianum* (Gmelin 1788), *Glossophaga longirostris* Miller 1898, *Gonatodes vittatus*, *Handroanthus serratifolius*, *Heliotropium angiospermum*, *Heliotropium indicum*, *Heliotropium procumbens*, *Hemitriccus margaritaceiventer* (Orbigny & Lafresna), *Hibiscus phoeniceus*, *Hillia costanensis*, *Himantopus mexicanus* (Statius Muller 1776), *Hippomane mancinella*, *Hylophilus flavipes* Lafresnaye 1845, *Hymenocallis caribaea*, *Hypnelus ruficollis* (Wagler 1829), *Icterus auricapillus* Cassin 1848, *Icterus galbula* (Linnaeus 1758), *Icterus nigrogularis* (Hahn 1819), *Inezia subflava* (P. L. Sclater & Salvin 1873), *Inezia tenuirostris* (Cory 1913), *Ipomoea incarnata*, *Jacquinia armillaris*, *Laguncularia racemosa*, *Lantana fucata*, *Lepidoblepharis sanctaemartae* Ruthven 1916, *Leptodactylus poecilochilus*, *Leptonycteris curasoae* Miller 1900, *Leptotila verreauxi* (Bonaparte 1855), *Licania cuspidata*, *Lonchocarpus atropurpureus*, *Lonchocarpus sanctae-marthae*, *Ludwigia octovalvis*, *Luffa operculata*, *Machetornis rixosa*, *Mallotus rhamnifolius*, *Manihot carthaginensis*, *Matelea maritima*, *Megaceryle alcyon* (Linnaeus 1758), *Megaceryle torquata* (Linnaeus 1766), *Megarynychus pitangua* (Linnaeus 1766), *Megascops choliba*, *Melanerpes rubricapillus*, *Melocactus intortus*, *Melochia parvifolia*, *Melochia tomentosa*, *Mentzelia aspera*, *Merremia aegyptia*, *Merremia umbellata*, *Micronycteris hirsuta* (Peters 1869), *Mimosa arenosa*, *Mimosa leiocarpa*, *Mimosa pellita*, *Mollugo verticillata*, *Molothrus bonariensis*, *Morisonia americana*, *Mormoops megalophylla* (Peters 1864), *Musa paradisiaca*, *Myiarchus crinitus*, *Myiarchus venezuelensis* Lawrence 1865, *Myiopagis gaimardii* (Orbigny 1840), *Myiozetetes similis* (Spix 1825), *Myospiza humeralis* (Bosc 1792), *Nemosia pileata* (Boddaert 1783), *Neurolaena lobata*, *Noctilio leporinus* (Linnaeus 1758), *Nycticorax nycticorax*, *Pachyrhamphus rufus* (Boddaert 1783), *Parkia velutina*, *Parkinsonia praecox*, *Passiflora foetida*, *Patagioenas corensis* (Jacquin 1784), *Paullinia cururu*, *Phaeomyias murina* (Spix 1825), *Phaseolus lunatus*, *Phaeucticus ludovicianus*, *Phoradendron mucronatum*, *Phthirusa stelis*, *Phyla nodiflora*, *Piculus chrysochloros* (Vieillot 1818), *Picumnus cinnamomeus* Wagler 1829, *Pilherodius pileatus* (Boddaert 1783), *Pilosocereus lanuginosus*, *Pionus sordidus* (Linnaeus 1758), *Piptadenia viridiflora*, *Piranga flava* (Vieillot 1822), *Pitangus lictor* (Lichtenstein 1823), *Platalea ajaja* Linnaeus 1758, *Pleurodema brachyops*, *Polioptila plumbea* (J. F. Gmelin 1788), *Porophyllum ruderales*, *Pseudopaludicola pusilla*, *Pteronotus gymnonotus* (Natterer 1843), *Pteronotus parnellii* (Gray 1843), *Pteronotus personatus* (Wagner 1843), *Pulsatrix perspicillata* (Latham 1790), *Pyrocephalus rubinus*, *Quiscalus lugubris*, *Rhizophora mangle*, *Rivina humilis*, *Rosenbergiodendron formosum*, *Ruellia paniculata*, *Ruprechtia ramiflora*, *Sakesphorus canadensis* (Linnaeus 1766), *Saltator coerulescens* Vieillot 1817, *Sarcostemma glaucum*, *Scoparia dulcis*, *Senna atomaria*, *Senna bicapsularis*, *Senna candolleana*, *Senna italica*, *Senna occidentalis*, *Senna tora*, *Serjania mexicana*, *Sesuvium portulacastrum*, *Sida ciliaris*, *Solandra grandiflora*, *Solanum bicolor*, *Spiza americana*, *Sporobolus coromandelianus*, *Sporobolus pyramidalis*, *Sporophila bouvronides* (Lesson 1831), *Sporophila intermedia* Cabanis 1851, *Sporophila nigricollis* (Vieillot 1823), *Stelgidopteryx ruficollis* (Vieillot 1817), *Stemodia maritima*, *Streptoprocne zonaris* (Shaw 1796), *Sturnella magna*, *Sublegatus arenarum* (Salvin 1863), *Synallaxis candei* Orbigny & Lafresnaye 1838, *Tabernaemontana amygdalifolia*, *Tachycineta albiventer* (Boddaert 1783), *Tachycineta bicolor* (Vieillot 1808), *Talinum paniculatum*, *Tapera naevia* (Linnaeus 1766), *Tephrosia cinerea*, *Thamnophilus doliatus* (Linnaeus

1764), *Thraupis glaucocolpa* Cabanis 1850, *Thraupis palmarum*, *Thryothorus leucotis* (Lafresnaye 1845), *Tiaris bicolor* (Linnaeus 1766), *Tiaris obscurus* (Orbigny \& Lafresnaye 1837), *Tillandsia flexuosa*, *Tityra inquisitor* (Lichtenstein 1823), *Tolmomyias sulphurescens* (Spix 1825), *Tournefortia hirsutissima*, *Trianthema portulacastrum*, *Tribulus cistoides*, *Tyrannus dominicensis* (Gmelin 1788), *Tyto alba*, *Vireo flavoviridis* (Cassin 1851), *Vitex compressa*, *Wissadula periplocifolia*, *Zenaida auriculata*

institution:

address:

publisher:

accessed:

websites:

chapter:

series:

pages: 417

issue:

year: 2010

0: Cerrejón

title: Monitoreo de Fauna en el Valle del Cerrejón

source:

type: report

tags: *Acacia glomerosa*, *Acacia tamarindifolia*, *Acacia tortuosa*, *Alternanthera halimifolia*, *Amazona ochrocephala*, *Ameiva festiva*, *Anas discors*, *Anemopaegma orbiculatum*, *Anhinga anhinga* (Linnaeus 1766), *Anoda crenatiflora*, *Aphelandra pulcherrima*, *Aramides cajanea*, *Aramus guarauna* (Linnaeus 1766), *Aratinga acuticaudata* (Vieillot 1818), *Ardea herodias*, *Aristolochia anguicida*, *Arremonops conirostris* (Bonaparte 1850), *Arremonops tocuyensis* (Todd 1912), *Artemisia vulgaris*, *Aspidosperma cuspa*, *Atalotriccus pilaris*, *Ayenia magna*, *Basileuterus flaveolus* (S. F. Baird 1865), *Bastardia viscosa*, *Batis maritima*, *Bauhinia pauletia*, *Boerhavia scandens*, *Bonellia frutescens*, *Bourreria cumanensis*, *Bouteloua aristidoides*, *Bromelia chrysantha*, *Bubo virginianus* (Gmelin 1788), *Burhinus bistriatus* (Wagler 1829), *Butorides virescens*, *Caesalpinia bonduc*, *Caesalpinia mollis*, *Calotropis gigantea*, *Campylorhynchus griseus* (Swainson 1838), *Campylorhynchus nuchalis* (Cabanis 1847), *Canavalia brasiliensis*, *Canavalia rosea*, *Capparis frondosa*, *Capparis linearis*, *Capparis pulcherrima*, *Caprimulgus cayennensis* (Gmelin 1789), *Capsicum baccatum*, *Cardinalis phoeniceus* Bonaparte 1838, *Cardiospermum corindum*, *Carduelis psaltria* (Say 1823), *Castela erecta*, *Celtis iguanaea*, *Cenchrus brownii*, *Cenchrus ciliaris*, *Cenchrus echinatus*, *Certhiaxis cinnamomeus* (Gmelin 1788), *Chlorostilbon gibsoni* (Fraser 1840), *Chordeiles acutipennis* (Hermann 1783), *Chrysolampis mosquitos* (Linnaeus 1758), *Chrysomus icterocephalus*, *Cissus trifoliata*, *Citrullus lanatus*, *Cleome spinosa*, *Cnidoscolus urens*, *Coccoloba microstachya*, *Columbina minuta* (Linnaeus 1766), *Columbina passerina* (Linnaeus 1758), *Combretum fruticosum*, *Conirostrum leucogenys* (Lafresnaye 1852), *Conyza canadensis*, *Conyza perijaensis*, *Cordia macuirensis*, *Coryphospingus pileatus* (Wied-Neuwied 1821), *Craniolaria annua*, *Crotalaria purdiana*, *Crotalaria retusa*, *Croton ferrugineus*, *Croton malambo*, *Croton niveus*, *Croton ovalifolius*, *Croton punctatus*, *Crotophaga major*, *Crotophaga sulcirostris* Swainson 1827, *Cyanocorax affinis* (Pelzelin 1856), *Cyclarhis gujanensis* (J. F. Gmelin 1789), *Cyperus articulatus*, *Datura innoxia*, *Dendrocygna autumnalis*, *Desmodium incanum*, *Diphysa carthagenensis*, *Ditaxis argothamnoides*, *Dolichandra unguis-cati*, *Dryocopus lineatus* (Linnaeus 1766), *Dysphania ambrosioides*, *Egletes prostrata*, *Egretta thula*, *Egretta tricolor* (Statius Muller 1776), *Elaenia chiriquensis* Lawrence 1865, *Eleocharis elegans*, *Eleocharis interstincta*, *Engystomops pustulosus*, *Eragrostis ciliaris*, *Erythrina berteroana*, *Euphorbia hirta*, *Evolvulus convolvuloides*, *Evolvulus sericeus*, *Exostema caribaeum*, *Fluvicola pica* (Boddaert 1783), *Forpus passerinus* (Linnaeus 1758), *Forpus xanthopterygius* (Spix 1824), *Fridericia chica*, *Fridericia dichotoma*, *Fridericia mollissima*, *Funastrum clausum*, *Furnarius leucopus* Swainson 1838, *Galactia striata*, *Galbula ruficauda* Cuvier 1816, *Glaucidium brasilianum* (Gmelin 1788), *Glossophaga longirostris* Miller 1898, *Gonatodes vittatus*, *Handroanthus serratifolius*, *Heliotropium angiospermum*, *Heliotropium indicum*, *Heliotropium procumbens*, *Hemitriccus margaritaceiventer* (Orbigny \& Lafresna), *Hibiscus phoeniceus*, *Hillia costanensis*, *Himantopus mexicanus* (Statius Muller 1776), *Hippomane mancinella*, *Hylophilus flavipes* Lafresnaye 1845, *Hymenocallis caribaea*, *Hypnelus ruficollis* (Wagler 1829), *Icterus auricapillus* Cassin 1848, *Icterus galbula* (Linnaeus 1758), *Icterus nigrogularis* (Hahn 1819), *Inezia subflava* (P. L. Sclater \& Salvin 1873), *Inezia tenuirostris* (Cory 1913), *Ipomoea incarnata*, *Jacquinia armillaris*, *Laguncularia racemosa*, *Lantana fucata*, *Lepidoblepharis sanctaemartae* Ruthven 1916, *Leptodactylus poecilochilus*, *Leptonycteris curasoae* Miller 1900, *Leptotila verreauxi* (Bonaparte 1855), *Licania cuspidata*, *Lonchocarpus atropurpureus*, *Lonchocarpus sanctae-marthae*, *Ludwigia octovalvis*, *Luffa operculata*, *Machetornis rixosa*, *Mallotus rhamnifolius*, *Manihot carthaginensis*, *Matelea maritima*, *Megaceryle alcyon* (Linnaeus 1758), *Megaceryle torquata*

(Linnaeus 1766), *Megarynychus pitangua* (Linnaeus 1766), *Megascops choliba*, *Melanerpes rubricapillus*, *Melocactus intortus*, *Melochia parvifolia*, *Melochia tomentosa*, *Mentzelia aspera*, *Merremia aegyptia*, *Merremia umbellata*, *Micronycteris hirsuta* (Peters 1869), *Mimosa arenosa*, *Mimosa leiocarpa*, *Mimosa pellita*, *Mollugo verticillata*, *Molothrus bonariensis*, *Morisonia americana*, *Mormoops megalophylla* (Peters 1864), *Musa paradisiaca*, *Myiarchus crinitus*, *Myiarchus venezuelensis* Lawrence 1865, *Myiopagis gaimardii* (Orbigny 1840), *Myiozetetes similis* (Spix 1825), *Myospiza humeralis* (Bosc 1792), *Nemosia pileata* (Boddaert 1783), *Neurolaena lobata*, *Noctilio leporinus* (Linnaeus 1758), *Nycticorax nycticorax*, *Pachyrhamphus rufus* (Boddaert 1783), *Parkia velutina*, *Parkinsonia praecox*, *Passiflora foetida*, *Patagioenas corensis* (Jacquin 1784), *Paullinia cururu*, *Phaeomyias murina* (Spix 1825), *Phaseolus lunatus*, *Pheucticus ludovicianus*, *Phoradendron mucronatum*, *Phthirusa stelis*, *Phyla nodiflora*, *Piculus chrysochloros* (Vieillot 1818), *Picumnus cinnamomeus* Wagler 1829, *Pilherodius pileatus* (Boddaert 1783), *Pilosocereus lanuginosus*, *Pionus sordidus* (Linnaeus 1758), *Piptadenia viridiflora*, *Piranga flava* (Vieillot 1822), *Pitangus lictor* (Lichtenstein 1823), *Platalea ajaja* Linnaeus 1758, *Pleurodema brachyops*, *Polioptila plumbea* (J. F. Gmelin 1788), *Porophyllum ruderales*, *Pseudopaludicola pusilla*, *Pteronotus gymnotus* (Natterer 1843), *Pteronotus parnellii* (Gray 1843), *Pteronotus personatus* (Wagner 1843), *Pulsatrix perspicillata* (Latham 1790), *Pyrocephalus rubinus*, *Quiscalus lugubris*, *Rhizophora mangle*, *Rivina humilis*, *Rosenbergiodendron formosum*, *Ruellia paniculata*, *Ruprechtia ramiflora*, *Sakesphorus canadensis* (Linnaeus 1766), *Saltator coerulescens* Vieillot 1817, *Sarcostemma glaucum*, *Scoparia dulcis*, *Senna atomaria*, *Senna bicapsularis*, *Senna candolleana*, *Senna italica*, *Senna occidentalis*, *Senna tora*, *Serjania mexicana*, *Sesuvium portulacastrum*, *Sida ciliaris*, *Solandra grandiflora*, *Solanum bicolor*, *Spiza americana*, *Sporobolus coromandelianus*, *Sporobolus pyramidalis*, *Sporophila bouvronides* (Lesson 1831), *Sporophila intermedia* Cabanis 1851, *Sporophila nigricollis* (Vieillot 1823), *Stelgidopteryx ruficollis* (Vieillot 1817), *Stemodia maritima*, *Streptoprocne zonaris* (Shaw 1796), *Sturnella magna*, *Sublegatus arenarum* (Salvin 1863), *Synallaxis candei* Orbigny & Lafresnaye 1838, *Tabernaemontana amygdalifolia*, *Tachycineta albiventer* (Boddaert 1783), *Tachycineta bicolor* (Vieillot 1808), *Talinum paniculatum*, *Tapera naevia* (Linnaeus 1766), *Tephrosia cinerea*, *Thamnophilus doliatus* (Linnaeus 1764), *Thraupis glaucocolpa* Cabanis 1850, *Thraupis palmarum*, *Thryothorus leucotis* (Lafresnaye 1845), *Tiaris bicolor* (Linnaeus 1766), *Tiaris obscurus* (Orbigny & Lafresnaye 1837), *Tillandsia flexuosa*, *Tityra inquisitor* (Lichtenstein 1823), *Tolmomyias sulphurescens* (Spix 1825), *Tournefortia hirsutissima*, *Trianthema portulacastrum*, *Tribulus cistoides*, *Tyrannus dominicensis* (Gmelin 1788), *Tyto alba*, *Vireo flavoviridis* (Cassin 1851), *Vitex compressa*, *Wissadula periplocifolia*, *Zenaida auriculata*

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

1

keywords: *Accipiter collaris*, *Accipiter cooperii*, *Accipiter poliogaster*, *Accipiter superciliosus*, *Amazona ochrocephala*, *Andigena hypoglaucha*, *Aramides cajanea*, *Aramus guarauna* (Linnaeus 1766), *Aratinga pertinax*, *Ardea alba*, *Ardea cocoi*, *Ardea herodias*, *Arremonops conirostris* (Bonaparte 1850), *Arremonops tocuyensis* (Todd 1912), *Atalotriccus pilaris*, *Attila spadiceus* (Gmelin 1789), *Basileuterus flaveolus* (S. F. Baird 1865), *Bubo virginianus* (Gmelin 1788), *Busarellus nigricollis*, *Buteogallus anthracinus*, *Buteogallus meridionalis*, *Buteogallus schistaceus*, *Buteogallus solitarius*, *Buteogallus urubitinga*, *Cacicus cela*, *Cairina moschata*, *Campylorhamphus trochilirostris* (Lichtenstein 1820), *Campylorhynchus griseus* (Swainson 1838), *Campylorhynchus nuchalis* (Cabanis 1847), *Caprimulgus cayennensis* (Gmelin 1789), *Cardinalis phoeniceus* Bonaparte 1838, *Carduelis psaltria* (Say 1823), *Cathartes aura*, *Cathartes burrovianus*, *Cathartes melambrotus*, *Certhiaxis cinnamomeus* (Gmelin 1788), *Ceryle torquata*, *Chlorostilbon gibsoni* (Fraser 1840), *Chondrohierax uncinatus*, *Chordeiles acutipennis* (Hermann 1783), *Chrysomus icterocephalus*, *Circus buffoni*, *Circus cinereus*, *Circus cyaneus*, *Coccyzus pumila*, *Columbina minuta* (Linnaeus 1766), *Conirostrum leucogenys* (Lafresnaye 1852), *Coragyps atratus*, *Coryphospingus pileatus* (Wied-Neuwied 1821), *Crax alector*, *Crotophaga major*, *Crotophaga sulcirostris* Swainson 1827, *Cryptoleucopteryx plumbea*, *Cyanocorax affinis* (Pelzelin 1856), *Cyclarhis gujanensis* (J. F. Gmelin 1789), *Dryocopus lineatus* (Linnaeus 1766), *Elaenia chiriquensis* Lawrence 1865, *Elanoides forficatus*, *Elanus leucurus*, *Falco deiroleucus*, *Fluvicola pica* (Boddaert 1783), *Forpus passerinus* (Linnaeus 1758), *Forpus xanthopterygius* (Spix 1824), *Furnarius leucopus* Swainson 1838, *Galbula ruficauda* Cuvier 1816, *Gallinula chloropus* (Linnaeus 1758), *Gampsonyx swainsonii*, *Geranospiza caerulescens*, *Glaucidium brasilianum* (Gmelin 1788), *Harpagus bidentatus*, *Harpia*

harpyja, Helicolestes hamatus, Hemitriccus margaritaceiventer (Orbigny \& Lafresna, Himantopus mexicanus (Statius Muller 1776), Hylophilus flavipes Lafresnaye 1845, Hypnelus ruficollis (Wagler 1829), Icterus auricapillus Cassin 1848, Icterus galbula (Linnaeus 1758), Icterus nigrogularis (Hahn 1819), Ictinia mississippiensis, Ictinia plumbea, Inezia subflava (P. L. Sclater \& Salvin 1873), Inezia tenuirostris (Cory 1913), Jabiru mycteria, Jacana jacana, Lepidopyga goudoti (Bourcier 1843), Leptotila verreauxi (Bonaparte 1855), Leucopternis melanops, Leucopternis semiplumbea, Machetornis rixosa, Megaceryle alcyon (Linnaeus 1758), Megaceryle torquata (Linnaeus 1766), Megarynchus pitangua (Linnaeus 1766), Megascops choliba, Melanerpes rubricapillus, Micrastur plumbeus, Mitu tomentosa, Molothrus bonariensis, Morphnarchus princeps, Morphnus guianensis, Myiarchus crinitus, Myiarchus venezuelensis Lawrence 1865, Myiopagis gaimardii (Orbigny 1840), Myiozetetes similis (Spix 1825), Myospiza humeralis (Bosc 1792), Nemosia pileata (Boddaert 1783), Neechen jubata, Opisthocomus hoazin, Oroaetus isidori, Ortalis ruficauda Jardine 1847, Pandion haliaetus, Parabuteo unicinctus, Patagioenas corensis (Jacquin 1784), Phaeomyias murina (Spix 1825), Pheucticus ludovicianus, Piculus chrysochloros (Vieillot 1818), Picumnus cinnamomeus Wagler 1829, Pilherodius pileatus (Boddaert 1783), Pionus sordidus (Linnaeus 1758), Pitangus lictor (Lichtenstein 1823), Pitangus sulphuratus, Polioptila plumbea (J. F. Gmelin 1788), Pseudastur albicollis, Pulsatrix perspicillata (Latham 1790), Pyrocephalus rubinus, Quiscalus lugubris, Quiscalus mexicanus (Gmelin 1788), Rostrhamus sociabilis, Sakesphorus canadensis (Linnaeus 1766), Saltator coerulescens Vieillot 1817, Sarcoramphus papa, Sarkidiornis melanotos (Pennant 1769), Spiza americana, Spizaetus tyrannus, Sporophila bouvronides (Lesson 1831), Sporophila intermedia Cabanis 1851, Sporophila nigricollis (Vieillot 1823), Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot 1817), Sterna supercilialis, Sturnella magna, Sublegatus arenarum (Salvin 1863), Synallaxis candei Orbigny \& Lafresnaye 1838, Tachycineta bicolor (Vieillot 1808), Tapera naevia (Linnaeus 1766), Thamnophilus doliatus (Linnaeus 1764), Thraupis glaucocolpa Cabanis 1850, Thraupis palmarum, Thryothorus leucotis (Lafresnaye 1845), Tyrannus dominicensis (Gmelin 1788), Tyto alba, Vireo flavoviridis (Cassin 1851), Zenaida auriculata

institution:

address:

publisher: Princeton University Press

accessed:

websites:

chapter:

series:

issue:

year: 1986

0: Hilty, S

1: Brown, W. L.

title: A Guide to the Birds of Colombia

source:

type: book

tags: Accipiter collaris, Accipiter cooperii, Accipiter poliogaster, Accipiter superciliosus, Amazona ochrocephala, Andigena hypoglaucha, Aramides cajanea, Aramus guarauna (Linnaeus 1766), Aratinga pertinax, Ardea alba, Ardea cocoi, Ardea herodias, Arremonops conirostris (Bonaparte 1850), Arremonops tocuyensis (Todd 1912), Atalotriccus pilaris, Attila spadiceus (Gmelin 1789), Basileuterus flaveolus (S. F. Baird 1865), Bubo virginianus (Gmelin 1788), Busarellus nigricollis, Buteogallus anthracinus, Buteogallus meridionalis, Buteogallus schistaceus, Buteogallus solitarius, Buteogallus urubitinga, Cacicus cela, Cairina moschata, Campylorhamphus trochilrostris (Lichtenstein 1820), Campylorhynchus griseus (Swainson 1838), Campylorhynchus nuchalis (Cabanis 1847), Caprimulgus cayennensis (Gmelin 1789), Cardinalis phoeniceus Bonaparte 1838, Carduelis psaltria (Say 1823), Cathartes aura, Cathartes burrovianus, Cathartes melambrotus, Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin 1788), Ceryle torquata, Chlorostilbon gibsoni (Fraser 1840), Chondrohierax uncinatus, Chordeiles acutipennis (Hermann 1783), Chrysomus icterocephalus, Circus buffoni, Circus cinereus, Circus cyaneus, Coccyzus pumila, Columbina minuta (Linnaeus 1766), Conirostrum leucogenys (Lafresnaye 1852), Coragyps atratus, Coryphospingus pileatus (Wied-Neuwied 1821), Crax alector, Crotophaga major, Crotophaga sulcirostris Swainson 1827, Cryptoleucopteryx plumbea, Cyanocorax affinis (Pelzelin 1856), Cyclarhis gujanensis (J. F. Gmelin 1789), Dryocopus lineatus (Linnaeus 1766), Elaenia chiriquensis Lawrence 1865, Elanoides forficatus, Elanus leucurus, Falco deiroleucus, Fluviicola pica (Boddaert 1783), Forpus passerinus (Linnaeus 1758), Forpus xanthopterygius (Spix 1824), Furnarius leucopus Swainson 1838, Galbula ruficauda Cuvier 1816, Gallinula chloropus (Linnaeus 1758), Gampsonyx swainsonii, Geranospiza caerulescens, Glaucidium brasilianum (Gmelin 1788), Harpagus bidentatus, Harpia harpyja, Helicolestes hamatus, Hemitriccus margaritaceiventer (Orbigny \& Lafresna, Himantopus mexicanus (Statius Muller 1776), Hylophilus flavipes Lafresnaye 1845, Hypnelus ruficollis (Wagler 1829), Icterus auricapillus Cassin

1848,Icterus galbula (Linnaeus 1758),Icterus nigrogularis (Hahn 1819),Ictinia mississippiensis,Ictinia plumbea,Inezia subflava (P. L. Sclater \& Salvin 1873),Inezia tenuirostris (Cory 1913),Jabiru mycteria,Jacana jacana,Lepidopyga goudoti (Bourcier 1843),Leptotila verreauxi (Bonaparte 1855),Leucopternis melanops,Leucopternis semiplumbea,Machetornis rixosa,Megaceryle alcyon (Linnaeus 1758),Megaceryle torquata (Linnaeus 1766),Megarynchus pitangua (Linnaeus 1766),Megascops choliba,Melanerpes rubricapillus,Micrastur plumbeus,Mitu tomentosa,Molothrus bonariensis,Morphnarchus princeps,Morphnus guianensis,Myiarchus crinitus,Myiarchus venezuelensis Lawrence 1865,Myiopagis gaimardii (Orbigny 1840),Myiozetetes similis (Spix 1825),Myospiza humeralis (Bosc 1792),Nemosia pileata (Boddaert 1783),Neochen jubata,Opisthocomus hoazin,Oroaetus isidori,Ortalis ruficauda Jardine 1847,Pandion haliaetus,Parabuteo unicinctus,Patagioenas corensis (Jacquin 1784),Phaeomyias murina (Spix 1825),Pheucticus ludovicianus,Piculus chrysochloros (Vieillot 1818),Picumnus cinnamomeus Wagler 1829,Pilherodius pileatus (Boddaert 1783),Pionus sordidus (Linnaeus 1758),Pitangus lictor (Lichtenstein 1823),Pitangus sulphuratus,Polioptila plumbea (J. F. Gmelin 1788),Pseudastur albicollis,Pulsatrix perspicillata (Latham 1790),Pyrocephalus rubinus,Quiscalus lugubris,Quiscalus mexicanus (Gmelin 1788),Rostrhamus sociabilis,Sakesphorus canadensis (Linnaeus 1766),Saltator coerulescens Vieillot 1817,Sarcoramphus papa,Sarkidiornis melanotos (Pennant 1769),Spiza americana,Spizaetus tyrannus,Sporophila bouvronides (Lesson 1831),Sporophila intermedia Cabanis 1851,Sporophila nigricollis (Vieillot 1823),Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot 1817),Sterna superciliaris,Sturnella magna,Sublegatus arenarum (Salvin 1863),Synallaxis candei Orbigny \& Lafresnaye 1838,Tachycineta bicolor (Vieillot 1808),Tapera naevia (Linnaeus 1766),Thamnophilus doliatus (Linnaeus 1764),Thraupis glaucocolpa Cabanis 1850,Thraupis palmarum,Thryothorus leucotis (Lafresnaye 1845),Tyrannus dominicensis (Gmelin 1788),Tyto alba,Vireo flavoviridis (Cassin 1851),Zenaida auriculata

abstract:

last_modified:

created:

group_id:

profile_id:

id:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

habitatUnstructured: Relativamente común en bosques pantanosos, orillas de ríos, manglares y charcas estacionales cerca de bosques de galería en los Llanos (Hilty & Brown 1986). En La Guajira habita el bosque deciduo tropical, de galería y secundario y en ambientes acuáticos como ríos, lagunas, cuerpos de agua estacionales y bahías ribereñas (Cerrejón 2010).

[endemicAtomized](#)

[distribution](#)

[ancillaryData](#)

dataObject:

additionalInformation:

[reference](#)

keywords: *Acacia glomerosa*, *Acacia tamarindifolia*, *Acacia tortuosa*, *Alternanthera halimifolia*, *Amazona ochrocephala*, *Ameiva festiva*, *Anas discors*, *Anemopaegma orbiculatum*, *Anhinga anhinga* (Linnaeus 1766), *Anoda crenatiflora*, *Aphelandra pulcherrima*, *Aramides cajanea*, *Aramus guaraua* (Linnaeus 1766), *Aratinga acuticaudata* (Vieillot 1818), *Ardea herodias*, *Aristolochia anguicida*, *Arremonops conirostris* (Bonaparte 1850), *Arremonops tocuyensis* (Todd 1912), *Artemisia vulgaris*, *Aspidosperma cuspa*, *Atalotriccus pilaris*, *Ayenia magna*, *Basileuterus flaveolus* (S. F. Baird 1865), *Bastardia viscosa*, *Batis maritima*, *Bauhinia pauletia*, *Boerhavia scandens*, *Bonellia frutescens*, *Bourreria cumanaensis*, *Bouteloua aristoides*, *Bromelia chrysantha*, *Bubo virginianus* (Gmelin 1788), *Burhinus bistratus* (Wagler 1829), *Butorides virescens*, *Caesalpinia bonduc*, *Caesalpinia mollis*, *Calotropis gigantea*, *Campylorhynchus griseus* (Swainson 1838), *Campylorhynchus nuchalis* (Cabanis 1847), *Canavalia brasiliensis*, *Canavalia rosea*, *Capparis frondosa*, *Capparis linearis*, *Capparis pulcherrima*, *Caprimulgus cayennensis* (Gmelin 1789), *Capsicum baccatum*, *Cardinalis phoeniceus* Bonaparte 1838, *Cardiospermum corindum*, *Carduelis psaltria* (Say 1823), *Castela erecta*, *Celtis iguanaea*, *Cenchrus brownii*, *Cenchrus ciliaris*, *Cenchrus echinatus*, *Certhiaxis cinnamomeus* (Gmelin 1788), *Chlorostilbon gibsoni* (Fraser 1840), *Chordeiles acutipennis* (Hermann 1783), *Chrysolampis mosquitus* (Linnaeus 1758), *Chrysomus icterocephalus*, *Cissus trifoliata*, *Citrullus lanatus*, *Cleome spinosa*, *Cnidioscolus urens*, *Coccoloba microstachya*, *Columbina minuta* (Linnaeus 1766), *Columbina passerina* (Linnaeus 1758), *Combretum fruticosum*, *Conirostrum leucogenys* (Lafresnaye 1852), *Conyza canadensis*, *Conyza perijaensis*, *Cordia macuirensis*, *Coryphospingus pileatus* (Wied-Neuwied 1821), *Craniolaria annua*, *Crotalaria purdiana*, *Crotalaria retusa*, *Croton ferrugineus*, *Croton malambo*, *Croton niveus*, *Croton ovalifolius*, *Croton punctatus*, *Crotophaga major*, *Crotophaga sulcirostris* Swainson 1827, *Cyanocorax affinis* (Pelzelin 1856), *Cyclarhis gujanensis* (J. F. Gmelin 1789), *Cyperus articulatus*, *Datura innoxia*, *Dendrocycna autumnalis*, *Desmodium incanum*, *Diphysa carthagenensis*, *Ditaxis argothamnoides*, *Dolichandra unguis-cati*, *Dryocopus lineatus* (Linnaeus 1766), *Dysphania ambrosioides*, *Egletes prostrata*, *Egretta thula*, *Egretta tricolor* (Statius Muller 1776), *Elaenia chiriquensis* Lawrence 1865, *Eleocharis elegans*, *Eleocharis interstincta*, *Engystomops pustulosus*, *Eragrostis ciliaris*, *Erythrina berteriana*, *Euphorbia hirta*, *Evolvulus convolvuloides*, *Evolvulus sericeus*, *Exostema caribaeum*, *Fluvicola pica* (Boddaert 1783), *Forpus passerinus* (Linnaeus 1758), *Forpus xanthopterygius* (Spix 1824), *Fridericia chica*, *Fridericia dichotoma*, *Fridericia mollissima*, *Funastrum clausum*, *Furnarius leucopus* Swainson 1838, *Galactia striata*, *Galbula ruficauda* Cuvier 1816, *Glaucidium brasilianum* (Gmelin 1788), *Glossophaga longirostris* Miller 1898, *Gonatodes vittatus*, *Handroanthus serratifolius*, *Heliotropium angiospermum*, *Heliotropium indicum*, *Heliotropium procumbens*, *Hemitriccus margaritaceiventer* (Orbigny & Lafresna), *Hibiscus phoeniceus*, *Hillia costanensis*, *Himantopus mexicanus* (Statius Muller 1776), *Hippomane mancinella*, *Hylophilus flavipes* Lafresnaye 1845, *Hymenocallis caribaea*, *Hypnelus ruficollis* (Wagler 1829), *Icterus auricapillus* Cassin 1848, *Icterus galbula* (Linnaeus 1758), *Icterus nigrogularis* (Hahn 1819), *Inezia subflava* (P. L. Sclater & Salvin 1873), *Inezia tenuirostris* (Cory 1913), *Ipomoea incarnata*, *Jacquinia armillaris*, *Laguncularia racemosa*, *Lantana fucata*, *Lepidoblepharis sanctaemartae* Ruthven 1916, *Leptodactylus poecilochilus*, *Leptonycteris curasoae* Miller 1900, *Leptotila verreauxi* (Bonaparte 1855), *Licania cuspidata*, *Lonchocarpus atropurpureus*, *Lonchocarpus sanctae-marthae*, *Ludwigia octovalvis*, *Luffa operculata*, *Machetornis rixosa*, *Mallotus rhamnifolius*, *Manihot carthaginensis*, *Matelea maritima*, *Megaceryle alcyon* (Linnaeus 1758), *Megaceryle torquata* (Linnaeus 1766), *Megarynchus pitangua* (Linnaeus 1766), *Megascops choliba*, *Melanerpes rubricapillus*, *Melocactus intortus*, *Melochia parvifolia*, *Melochia tomentosa*, *Mentzelia aspera*, *Merremia aegyptia*, *Merremia umbellata*, *Micronycteris hirsuta* (Peters 1869), *Mimosa arenosa*, *Mimosa leiocarpa*, *Mimosa peltata*, *Mollugo verticillata*, *Molothrus bonariensis*, *Morisonia americana*, *Mormoops megalophylla* (Peters 1864), *Musa paradisiaca*, *Myiarchus crinitus*, *Myiarchus venezuelensis* Lawrence 1865, *Myiopagis gaimardii* (Orbigny 1840), *Myiozetetes similis* (Spix 1825), *Myospiza humeralis* (Bosc 1792), *Nemosia pileata* (Boddaert 1783), *Neurolaena lobata*, *Noctilio leporinus* (Linnaeus 1758), *Nycticorax nycticorax*, *Pachyramphus rufus* (Boddaert 1783), *Parkia velutina*, *Parkinsonia praecox*, *Passiflora foetida*, *Patagioenas corensis* (Jacquin 1784), *Paullinia cururu*, *Phaeomyias murina* (Spix 1825), *Phaseolus lunatus*, *Pheucticus ludovicianus*, *Phoradendron mucronatum*, *Phthirusa stelis*, *Phyla nodiflora*, *Piculus chrysochloros* (Vieillot 1818), *Picumnus cinnamomeus* Wagler 1829, *Pilherodius pileatus* (Boddaert 1783), *Pilosocereus lanuginosus*, *Pionus sordidus* (Linnaeus 1758), *Piptadenia viridiflora*, *Piranga flava* (Vieillot 1822), *Pitangus lictor* (Lichtenstein 1823), *Platalea ajaja* Linnaeus 1758, *Pleurodema brachyops*, *Polioptila plumbea* (J. F. Gmelin 1788), *Porophyllum ruderales*, *Pseudopaludicola pusilla*, *Pteronotus gymnotus* (Natterer 1843), *Pteronotus parnellii* (Gray 1843), *Pteronotus personatus* (Wagner 1843), *Pulsatrix perspicillata* (Latham 1790), *Pyrocephalus rubinus*, *Quiscalus lugubris*, *Rhizophora mangle*, *Rivina humilis*, *Rosenbergiodendron formosum*, *Ruellia paniculata*, *Ruprechtia ramiflora*, *Sakesphorus canadensis* (Linnaeus 1766), *Saltator coerulescens* Vieillot 1817, *Sarcostemma glaucum*, *Scoparia dulcis*, *Senna atomaria*, *Senna bicapsularis*, *Senna candolleana*, *Senna italica*, *Senna occidentalis*, *Senna tora*, *Serjania mexicana*, *Sesuvium portulacastrum*, *Sida ciliaris*, *Solandra grandiflora*, *Solanum bicolor*, *Spiza americana*, *Sporobolus*

coromandelianus, Sporobolus pyramidalis, Sporophila bouvronides (Lesson 1831), Sporophila intermedia Cabanis 1851, Sporophila nigricollis (Vieillot 1823), Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot 1817), Stemodia maritima, Streptoprocne zonaris (Shaw 1796), Sturnella magna, Sublegatus arenarum (Salvin 1863), Synallaxis candei Orbigny & Lafresnaye 1838, Tabernaemontana amygdalifolia, Tachycineta albiventer (Boddaert 1783), Tachycineta bicolor (Vieillot 1808), Talinum paniculatum, Tapera naevia (Linnaeus 1766), Tephrosia cinerea, Thamnophilus doliatus (Linnaeus 1764), Thraupis glaucocolpa Cabanis 1850, Thraupis palmarum, Thryothorus leucotis (Lafresnaye 1845), Tiaris bicolor (Linnaeus 1766), Tiaris obscurus (Orbigny & Lafresnaye 1837), Tillandsia flexuosa, Tityra inquisitor (Lichtenstein 1823), Tolmomyias sulphurescens (Spix 1825), Tournefortia hirsutissima, Trianthema portulacastrum, Tribulus cistoides, Tyrannus dominicensis (Gmelin 1788), Tyto alba, Vireo flavoviridis (Cassin 1851), Vitex compressa, Wissadula periplocifolia, Zenaida auriculata

editors

institution:
address:
publisher:
accessed:
websites:
chapter:
series:
pages: 417
issue:
year: 2010

authors

authors: Cerrejón
title: Monitoreo de Fauna en el Valle del Cerrejón
source:

type: report

tags: Acacia glomerosa, Acacia tamarindifolia, Acacia tortuosa, Alternanthera halimifolia, Amazona ochrocephala, Ameiva festiva, Anas discors, Anemopaegma orbiculatum, Anhinga anhinga (Linnaeus 1766), Anoda crenatiflora, Aphelandra pulcherrima, Aramides cajanea, Aramus guarauna (Linnaeus 1766), Aratinga acuticaudata (Vieillot 1818), Ardea herodias, Aristolochia anguicida, Arremonops conirostris (Bonaparte 1850), Arremonops tocuyensis (Todd 1912), Artemisia vulgaris, Aspidosperma cuspa, Atalotriccus pilaris, Ayenia magna, Basileuterus flaveolus (S. F. Baird 1865), Bastardia viscosa, Batis maritima, Bauhinia pauletia, Boerhavia scandens, Bonellia frutescens, Bourreria cumanensis, Bouteloua aristidoides, Bromelia chrysantha, Bubo virginianus (Gmelin 1788), Burhinus bistriatus (Wagler 1829), Butorides virescens, Caesalpinia bonduc, Caesalpinia mollis, Calotropis gigantea, Campylorhynchus griseus (Swainson 1838), Campylorhynchus nuchalis (Cabanis 1847), Canavalia brasiliensis, Canavalia rosea, Capparis frondosa, Capparis linearis, Capparis pulcherrima, Caprimulgus cayennensis (Gmelin 1789), Capsicum baccatum, Cardinalis phoeniceus Bonaparte 1838, Cardiospermum corindum, Carduelis psaltria (Say 1823), Castela erecta, Celtis iguanaea, Cenchrus brownii, Cenchrus ciliaris, Cenchrus echinatus, Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin 1788), Chlorostilbon gibsoni (Fraser 1840), Chordeiles acutipennis (Hermann 1783), Chrysolampis mosquitus (Linnaeus 1758), Chrysomus icterocephalus, Cissus trifoliata, Citrullus lanatus, Cleome spinosa, Cnidoscolus urens, Coccoloba microstachya, Columbina minuta (Linnaeus 1766), Columbina passerina (Linnaeus 1758), Combretum fruticosum, Conirostrum leucogenys (Lafresnaye 1852), Conyza canadensis, Conyza perijaensis, Cordia macuirensis, Coryphospingus pileatus (Wied-Neuwied 1821), Craniolaria annua, Crotalaria purdiana, Crotalaria retusa, Croton ferrugineus, Croton malambo, Croton niveus, Croton ovalifolius, Croton punctatus, Crotophaga major, Crotophaga sulcirostris Swainson 1827, Cyanocorax affinis (Pelzelin 1856), Cyclarhis gujanensis (J. F. Gmelin 1789), Cyperus articulatus, Datura innoxia, Dendrocygna autumnalis, Desmodium incanum, Diphysa carthagenensis, Ditaxis argothamnoides, Dolichandra unguis-cati, Dryocopus lineatus (Linnaeus 1766), Dysphania ambrosioides, Egletes prostrata, Egretta thula, Egretta tricolor (Statius Muller 1776), Elaenia chiriquensis Lawrence 1865, Eleocharis elegans, Eleocharis interstincta, Engystomops pustulosus, Eragrostis ciliaris, Erythrina berteroana, Euphorbia hirta, Evolvulus convolvuloides, Evolvulus sericeus, Exostema caribaeum, Fluvicola pica (Boddaert 1783), Forpus passerinus (Linnaeus 1758), Forpus xanthopterygius (Spix 1824), Fridericia chica, Fridericia dichotoma, Fridericia mollissima, Funastrum clausum, Furnarius leucopus Swainson 1838, Galactia striata, Galbula ruficauda Cuvier 1816, Glaucidium brasilianum (Gmelin

1788), *Glossophaga longirostris* Miller 1898, *Gonatodes vittatus*, *Handroanthus serratifolius*, *Heliotropium angiospermum*, *Heliotropium indicum*, *Heliotropium procumbens*, *Hemitriccus margaritaceiventer* (Orbigny & Lafresna), *Hibiscus phoeniceus*, *Hillia costanensis*, *Himantopus mexicanus* (Statius Muller 1776), *Hippomane mancinella*, *Hylophilus flavipes* Lafresnaye 1845, *Hymenocallis caribaea*, *Hypnelus ruficollis* (Wagler 1829), *Icterus auricapillus* Cassin 1848, *Icterus galbula* (Linnaeus 1758), *Icterus nigrogularis* (Hahn 1819), *Inezia subflava* (P. L. Sclater & Salvin 1873), *Inezia tenuirostris* (Cory 1913), *Ipomoea incarnata*, *Jacquinia armillaris*, *Laguncularia racemosa*, *Lantana fucata*, *Lepidoblepharis sanctaemartae* Ruthven 1916, *Leptodactylus poecilochilus*, *Leptonycteris curasoae* Miller 1900, *Leptotila verreauxi* (Bonaparte 1855), *Licania cuspidata*, *Lonchocarpus atropurpureus*, *Lonchocarpus sanctae-marthae*, *Ludwigia octovalvis*, *Luffa operculata*, *Machetornis rixosa*, *Mallotus rhamnifolius*, *Manihot carthaginensis*, *Matelea maritima*, *Megaceryle alcyon* (Linnaeus 1758), *Megaceryle torquata* (Linnaeus 1766), *Megarynychus pitangua* (Linnaeus 1766), *Megascops choliba*, *Melanerpes rubricapillus*, *Melocactus intortus*, *Melochia parvifolia*, *Melochia tomentosa*, *Mentzelia aspera*, *Merremia aegyptia*, *Merremia umbellata*, *Micronycteris hirsuta* (Peters 1869), *Mimosa arenosa*, *Mimosa leiocarpa*, *Mimosa pellita*, *Mollugo verticillata*, *Molothrus bonariensis*, *Morisonia americana*, *Mormoops megalophylla* (Peters 1864), *Musa paradisiaca*, *Myiarchus crinitus*, *Myiarchus venezuelensis* Lawrence 1865, *Myiopagis gaimardii* (Orbigny 1840), *Myiozetetes similis* (Spix 1825), *Myospiza humeralis* (Bosc 1792), *Nemosia pileata* (Boddaert 1783), *Neurolaena lobata*, *Noctilio leporinus* (Linnaeus 1758), *Nycticorax nycticorax*, *Pachyramphus rufus* (Boddaert 1783), *Parkia velutina*, *Parkinsonia praecox*, *Passiflora foetida*, *Patagioenas corensis* (Jacquin 1784), *Paullinia cururu*, *Phaeomyias murina* (Spix 1825), *Phaseolus lunatus*, *Pheucticus ludovicianus*, *Phoradendron mucronatum*, *Phthirusa stelis*, *Phyla nodiflora*, *Piculus chrysochloros* (Vieillot 1818), *Picumnus cinnamomeus* Wagler 1829, *Pilherodius pileatus* (Boddaert 1783), *Pilosocereus lanuginosus*, *Pionus sordidus* (Linnaeus 1758), *Piptadenia viridiflora*, *Piranga flava* (Vieillot 1822), *Pitangus lictor* (Lichtenstein 1823), *Platalea ajaja* Linnaeus 1758, *Pleurodema brachyops*, *Polioptila plumbea* (J. F. Gmelin 1788), *Porophyllum ruderales*, *Pseudopaludicola pusilla*, *Pteronotus gymnotus* (Natterer 1843), *Pteronotus parnellii* (Gray 1843), *Pteronotus personatus* (Wagner 1843), *Pulsatrix perspicillata* (Latham 1790), *Pyrocephalus rubinus*, *Quiscalus lugubris*, *Rhizophora mangle*, *Rivina humilis*, *Rosenbergiodendron formosum*, *Ruellia paniculata*, *Ruprechtia ramiflora*, *Sakesphorus canadensis* (Linnaeus 1766), *Saltator coerulescens* Vieillot 1817, *Sarcostemma glaucum*, *Scoparia dulcis*, *Senna atomaria*, *Senna bicapsularis*, *Senna candolleana*, *Senna italica*, *Senna occidentalis*, *Senna tora*, *Serjania mexicana*, *Sesuvium portulacastrum*, *Sida ciliaris*, *Solandra grandiflora*, *Solanum bicolor*, *Spiza americana*, *Sporobolus coromandelianus*, *Sporobolus pyramidalis*, *Sporophila bouvronides* (Lesson 1831), *Sporophila intermedia* Cabanis 1851, *Sporophila nigricollis* (Vieillot 1823), *Stelgidopteryx ruficollis* (Vieillot 1817), *Stemodia maritima*, *Streptoprocne zonaris* (Shaw 1796), *Sturnella magna*, *Sublegatus arenarum* (Salvin 1863), *Synallaxis candei* Orbigny & Lafresnaye 1838, *Tabernaemontana amygdalifolia*, *Tachycineta albiventer* (Boddaert 1783), *Tachycineta bicolor* (Vieillot 1808), *Talinum paniculatum*, *Tapera naevia* (Linnaeus 1766), *Tephrosia cinerea*, *Thamnophilus doliatus* (Linnaeus 1764), *Thraupis glaucocolpa* Cabanis 1850, *Thraupis palmarum*, *Thryothorus leucotis* (Lafresnaye 1845), *Tiaris bicolor* (Linnaeus 1766), *Tiaris obscurus* (Orbigny & Lafresnaye 1837), *Tillandsia flexuosa*, *Tityra inquisitor* (Lichtenstein 1823), *Tolmomyias sulphurescens* (Spix 1825), *Tournefortia hirsutissima*, *Trianthema portulacastrum*, *Tribulus cistoides*, *Tyrannus dominicensis* (Gmelin 1788), *Tyto alba*, *Vireo flavoviridis* (Cassin 1851), *Vitex compressa*, *Wissadula periplocifolia*, *Zenaida auriculata*

identifiers

last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source:

audience

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

agent

mimeType:

dataType:

identifier:

distributionUnstructured: Se encuentra en alturas hasta 2300 m (Hilty & Brown 1986). En bases de datos y monitoreos de fauna se encontró que: *Aramides cajanea* se distribuye en : Antioquia, Arauca, Bogotá, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés (Arctos 2012, Cerrejón 2010, Collections MNH 2012). La subespecie *Aramides cajanea cajanea* se distribuye en: Antioquia, Arauca, Bogotá, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés (ICN 2004, Collections MNH 2012, Arctos 2012). Sus regiones naturales son la Amazonía, Andina, Caribe, Orinoquía y Pacífica de Colombia. A nivel mundial en las bases de datos y monitoreos de fauna se encontró que: *Aramides cajanea* se distribuye en : Colombia, México, Panamá, Surinam, Trinidad y Tobago (Arctos 2012)

La subespecie *Aramides cajanea cajanea* se distribuye en: Colombia, Panamá, Surinam (Arctos 2012)

distributionAtomized

stateProvince: Antioquia

ancillaryData

locality:

municipality:

country: Colombia

temporalCoverage

endDate:

startDate:

distributionScope

type:

threatStatus

ancillaryData

threatStatusUnstructured:

threatStatusAtomized

apendiceCITES:

locality:

municipality:

county:

stateProvince:

country: Global

0: IUCN
measurementValue: Preocupación menor (LC)
relatedTo:
measurementRemarks:
measurementMethod:

measurementDeterminedBy

measurementDeterminedDate:
measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementType: IUCN
measurementID:

territory

territoryUnstructured:
areaOfOccupancy:
extentOfOccurrence:

populationBiology

populationBiologyUnstructured:

legislation

legislationUnstructured:

directThreats

directThreatsUnstructured:

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights:
license:
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:

measurementOrFact

relatedTo:
measurementRemarks:
measurementMethod:
measurementDeterminedDate:
measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementValue:
measurementType:

measurementID:

abstract: Mide entre 36-38 cm. Tiene el pico moderadamente largo, amarillento en la base, verdoso en el extremo; los ojos, el anillo ocular desnudo y las patas de color rojo coral. La cabeza y el cuello de color gris, la garganta más pálida y la coronilla teñida de pardo. Las partes dorsales oliva; el pecho y los lados rufo canela; las partes posteriores junto con la rabadilla, la cola y el abdomen de color negro; las primarias castaño rufo (generalmente ocultas en reposo) (Hilty & Brown 1986).

associatedParty

role:

personnelIdentifier:

personnelDirectory:

homepage:

email: edgarestebanhc@gmail.com

phone:

postalCode:

country:

state:

city:

address:

organisation:

position:

lastName: Herrera Collazos

firstName: Edgar Esteban

ancillaryData

dataObject:

additionalInformation: Registros biológicos:

Portal de datos GBIF

reference

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

mediaURL: <http://data.gbif.org/species/2474659/>

description:

subject

source: <http://data.gbif.org/>

audience

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

agent

contentType:

dataType:

identifier:

_id

_bsontype: ObjectId
id: Vç—KfÄW Dä à