

Reporte de Fichas para el usuario: edith gómez

Ficha ID: 56d705bf3c16479905cba91a

Fecha de creación: 2016-03-02T15:24:49.826Z

annualCycles

annualCycleUnstructured:

habitats

0

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataObject:

identifier:

habitatUnstructured: Esta especie habita matorrales áridos y semiáridos, en ocasiones con árboles dispersos o parches de bosque, en zonas cultivadas y pastizales donde es considerada una plaga, también se encuentra en grandes ciudades; evita los bosques tropicales (del Hoyo et al. 1997). En La Guajira se ha reportado que habitan en matorrales o rastrojo (Cerrejón 2009-2010).

[commonNamesAtomized](#)

[ancillaryData](#)

usedBy:

usedIn

distributionUnstructured:

endDate:

startDate:

[ancillaryData](#)

type:

language: Inglés

name: Eared Dove

creation_date: 2016-03-02T15:24:49.826Z

usesManagementAndConservation

[ancillaryData](#)

managementAndConservationUnstructured:

[managementAndConservationAtomized](#)

identificationKeys

fullDescription

0

dataObject:
additionalInformation:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:
fullDescriptionUnstructured: De acuerdo a del Hoyo y colaboradores (1997) se reconocen once subespecies:
Zenaida auriculata antioquiae Chapman, 1917
Zenaida auriculata auriculata (Des Murs, 1847)
Zenaida auriculata caucæ Chapman, 1922
Zenaida auriculata hypoleuca Bonaparte, 1855
Zenaida auriculata jessieae Ridgway, 1888
Zenaida auriculata marajoensis Berlepsch, 1913
Zenaida auriculata noronha Sharpe, 1890
Zenaida auriculata rubripes Lawrence, 1885
Zenaida auriculata ruficauda Bonaparte, 1855
Zenaida auriculata vinaceorufa Ridgway, 1884
Zenaida auriculata virgata W. Bertoni, 1901
briefDescription:

references

taxonRecordName

ancillaryData

providerSpecificData

anyTwo:
providerLink:

publicationStatus

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:

note:
ruleConsidered:

replacementNameFor

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

sanctioned

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

laterHomonymOf

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

conservedAgainst

basedOn

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

basionym

microReference:
source:
datatype:
identifier:

source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

spellingCorrentionOf

typeNameEntity

source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:

typificacion

typeOfType:

lectotypeMicroReferenceVoucher

lectotypePublicationVoucher

voucherReference

simple:
microReference:
year:

publishedIn

simple:
source:
datatype:
identifier:

specialAuthorship

authors

year

simple:
canonicalAuthorship

authors

year

simple:
simple: (Des Murs, 1847)

canonicalName

infraspecificEpithet:

specificEpithet:

infragenericEpithet:

linkType:

ref:

uninomial:

simple: Zenaida auriculata

rank: SPECIES

simple: Zenaida auriculata (Des Murs, 1847)

attributes

nomenclaturalCode:

isAnamorphic:

id:

[synonymsAtomized](#)

[hierarchy](#)

[ancillaryData](#)

dataObject:

additionalInformation:

[reference](#)

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

[mediaURL](#)

description:

[subject](#)

source: The Catalogue of Life, 3rd January 2011

[audience](#)

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights:

license:

title:

modified: 2016-03-02T15:24:29.824Z

created: 2016-03-02T15:24:29.824Z

[agent](#)

homepage:

role:

email:

phone:

address:

position:

organisation:

lastName:
firstName:
mimeType:
dataType:
identifier:
parentTaxon: Zenaida
higherClassification:
infraspecificEpithet:
specificEpithet:
taxonRank: SPECIES
subGenus:
genus: Zenaida
family: Columbidae
order: Columbiformes
classHierarchy: Aves
phylum: Chordata
kingdom: Animalia
recommended:
classification:

invasiveness

invasivenessUnstructured:

reproduction

reproductionUnstructured:

molecularData

molecularDataUnstructured:

migratory

migratoryUnstructured:

lifeForm

lifeFormUnstructured:

lifeCycle

lifeCycleUnstructured:

interactions

interactionsUnstructured:

feeding

0

dataObject:
additionalInformation:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

feedingUnstructured: Forrajea la mayor parte del tiempo en el suelo (Hilty & Brown 1986). En La Guajira su dieta se compone principalmente de granos y forrajea desde el suelo hasta el subdosel (Cerrejón 2009-2010).

environmentalEnvelope

environmentalEnvelopeUnstructured:

ecologicalSignificance

ecologicalSignificanceUnstructured:

dispersal

dispersalUnstructured:

distance:

structureDispersed:

type:

purpose:

behavior

0

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

behaviorUnstructured: Durante la época no reproductiva esta especie es gregaria; en áreas agrícolas puede llegar a congregarse en bandadas inmensas y ser destructiva para cultivos de grano (Hilty & Brown 1986). Zenaida auriculata produce un arrullo bajo uuu-ah-uuu, que solamente puede ser escuchado a una corta distancia del animal; también entona un cuuu suave y ascendente (Hilty & Brown 1986).

ancillaryData

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights:
license:
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:

measurementOrFact

relatedTo:
measurementRemarks:
measurementMethod:
measurementDeterminedDate:
measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementValue:
measurementType:
measurementID:

endemicAtomized

distribution

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation:

reference

geoPoint:
location:
thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source:

audience

bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:

agent

mimeType:
dataType:
identifier:

distributionUnstructured: En bases de datos se encontró que: Esta especie se distribuye en: Colombia (Cerrejón 2009-2010); Argentina, Ecuador (Arctos 2012); Argentina, Brasil, Chile, Granada, México, Trinidad y Tobago (Collections MNH SI 2012)

Las siguientes subespecies se distribuyen en:

Zenaida auriculata antioquiae Colombia (Collections MNH SI 2012; ICN 2004)

Zenaida auriculata auriculata Brasil (Collections MNH SI 2012)

Zenaida auriculata cauae Colombia (Arctos 2012; ICN 2004)

Zenaida auriculata hypoleuca Ecuador, Perú (Arctos 2012)

Zenaida auriculata jessieae Brasil (Collections MNH SI 2012)

Zenaida auriculata pentheria Colombia (Arctos 2012; ICN 2004; Collections MNH SI 2012)

Zenaida auriculata ruficauda Venezuela (Collections MNH SI 2012)

Zenaida auriculata stenura Colombia (Arctos 2012; ICN 2004; Collections MNH SI 2012), Granada (Collections MNH SI 2012)

Zenaida auriculata vinaceorufa Antillas Neerlandesas (Collections MNH SI 2012)

Zenaida auriculata virgata Argentina (Arctos 2012)

Zenaida auriculata vulcania Colombia (ICN 2004)

En bases de datos, literatura y monitoreos de fauna se encontró que: Esta especie se distribuye en: La Guajira (Cerrejón 2009-2010).

Las siguientes subespecies se distribuyen en Colombia:

Zenaida auriculata antioquiae Antioquia (Collections MNH SI 2012); Caldas (ICN 2004)

Zenaida auriculata cauae Cauca (ICN 2004; Arctos 2012; Collections MNH SI 2012), Valle del Cauca (ICN 2004; Collections MNH SI 2012), Cundinamarca (ICN 2004)

Zenaida auriculata pentheria Boyacá (ICN 2004; Arctos 2012; Collections MNH SI 2012), Cundinamarca (ICN 2004; Collections MNH SI 2012), Bogotá (ICN 2004)

Zenaida auriculata stenura Vaupés (ICN 2004); Huila (Arctos 2012; Collections MNH SI 2012); Atlántico, Cesar, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Tolima (Collections MNH SI 2012)

Zenaida auriculata vulcania Guaviare, Vaupés (ICN 2004)

Se ubica entre los 600-3000 m (Hilty & Brown 1986) en las regiones Andina, Caribe y Pacífica de Colombia.

distributionAtomized

stateProvince: La Guajira

ancillaryData

locality:

municipality:

country: Colombia

temporalCoverage

endDate:

startDate:

distributionScope

type:

threatStatus

ancillaryData

threatStatusUnstructured:

threatStatusAtomized

apendiceCITES:

locality:

municipality:

county:
stateProvince:
country: Global
0: IUCN
measurementValue: Preocupación menor (LC)
relatedTo:
measurementRemarks:
measurementMethod:

measurementDeterminedBy

measurementDeterminedDate:
measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementType: IUCN
measurementID:

territory

territoryUnstructured:
areaOfOccupancy:
extentOfOccurrence:

populationBiology

populationBiologyUnstructured:

legislation

legislationUnstructured:

directThreats

directThreatsUnstructured:

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights:
license:
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:

measurementOrFact

relatedTo:
measurementRemarks:
measurementMethod:
measurementDeterminedDate:
measurementUnit:

measurementAccuracy:

measurementValue:

measurementType:

measurementID:

abstract: Los machos miden de 22-28 cm y las hembras entre 22-26 cm. Los machos tienen la coronilla y la nuca de color gris azulado; el resto de la cabeza, el cuello y el pecho de color rosáceo a purpúreo brillante, degradándose a color ante o crema en el vientre hasta las rémiges ventrales; las partes ventrales de color oliva marrón con marcas negras en las alas; las primarias y secundarias externas negras con bordes delgados de color blanco; tienen dos rayas faciales negras una por detrás y otra por debajo del ojo, la primera de color negro y la segunda de color azul iridiscente; a cada lado del cuello tienen un parche rosa iridiscente o bronceado; las plumas caudales centrales son oliva marrón, el siguiente par son grises con una barra central negra y el resto de color gris con una barra negra en el centro y un parche blanco terminal. El iris es marrón a rojizo marrón, la piel orbital azulada o gris, el pico de color gris oscuro a negro, las patas y dedos de color rojo. Las hembras son similares pero más opacas; la cabeza, el cuello y las partes ventrales menos rosáceos; las infracoberturas caudales son menos grises azuladas; los reflejos laterales del cuello son menos brillantes y extendidos. Las razas difieren en la coloración (del Hoyo et al. 1997).

associatedParty

role:

personnelIdentifier:

personnelDirectory:

homepage:

email: enataliagomez@gmail.com

phone:

postalCode:

country: Colombia

state: Bogotá Distrito Capital

city: Bogotá D.C.

address:

organisation:

position:

lastName: Gómez Melendro

firstName: Edith Natalia

ancillaryData

dataObject:

additionalInformation: Hilty S. L., Brown W. L. (1986) A Guide to the Birds of Colombia Princeton, New Jersey. U. S. A. | ARCTOS COLLECTION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (2012) Specimen Search | CERREJÓN Monitoreo de fauna en el Valle del Cerrejón. ASESORÍAS Y ESTUDIOS AMBIENTALES J.D.B. S.A.S. Contrato CON 00272009 | SMITHSONIAN NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY (2012) Search Museum Collections Records | CERREJÓN Monitoreo de fauna en el Valle del Cerrejón 2005-2006. FUNDACIÓN HIDROBIOLÓGICA GEORGE DAHL. Contrato CON 00412005 | INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia Colecciones en Línea | ORRELL T. (custodio) (2012) ITIS Global: The Integrated Taxonomic Information System (version Sept 12). En: Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, 20th November 2012 | BIRDLIFE INTERNATIONAL (2012) Zenaida auriculata. En: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2 | DEL HOYO, J., ELLIOTT, A. & CHRISTIE, D. A. (1997) Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos Barcelona

reference

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source:

audience

bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:

agent

contentType:
dataType:
identifier:

_id
_bsontype: ObjectID
id: Vx[óÁdy•É©