

Reporte de Fichas para el usuario: edith gómez

Ficha ID: 56e2dbaa83c45700544e3d81

Fecha de creación: 2016-03-11T14:52:33.032Z

annualCycles

annualCycleUnstructured:

habitats

0

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Nancy Carolina Rojas Riaño

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataObject:

identifier:

habitatUnstructured: Estas avispas habitan bosques húmedos tropicales.

[commonNamesAtomized](#)

[ancillaryData](#)

dataObject:

additionalInformation:

[reference](#)

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

[mediaURL](#)

description:

[subject](#)

source:

[audience](#)

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Nancy Carolina Rojas Riaño

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

[agent](#)

contentType:
dataFormat:
identifier:
usedBy:

usedIn

distributionUnstructured:
endDate:
startDate:

ancillaryData

type:
language: Español
name: Avispa
creation_date: 2016-03-11T14:52:33.032Z

usesManagementAndConservation

ancillaryData

managementAndConservationUnstructured:

managementAndConservationAtomized

identificationKeys

fullDescription

0

dataObject:
additionalInformation:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Nancy Carolina Rojas Riaño
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:
contentType:
dataFormat:
identifier:

fullDescriptionUnstructured: Hembra: longitud del ala 8.5 mm. Presencia de grandes punteaduras en la frente, espacio malar obliterado, quilla pronotal leve. Mesoscutum y propodeo con grande y gruesas punteaduras. Margen frontal del proespisterno fuertemente levantado en ángulos rectos y siguiendo un profundo surco. Macho parecido a la hembra pero un poco más pequeño, y con manchas amarillas más extensas. Mandíbulas con tres dientes, ojos más abultados ventralmente, clípeo un poco más largo que ancho, margen ventral débilmente redondeado, superficie con pelos plateados poco densos. Segmento 3 antenal tan largo como el 1, pero más largo que el 4 más 5, segmento 4, 1.5 veces tan largo como ancho, segmento 13 delgado, un poco más de dos veces su ancho.

briefDescription:

references

keywords: *Agelaia angulata angulata*, *Agelaia angulicollis*, *Agelaia brevistigma*, *Agelaia cajennensis*, *Agelaia fulvofasciata*, *Agelaia hamiltoni*, *Agelaia testacea*, *Angiopolybia obidensis*, *Angiopolybia pallens*, *Angiopolybia paraensis*, *Angiopolybia zischkai*, *Apoica thoracica*, *Asteloeca trilli*, *Brachygastra albula*, *Brachygastra augusti*, *Brachygastra lecheguana*, *Brachygastra propodealis*, *Brachygastra scutellaris*, *Chartergellus amazonicus*, *Chartergellus punctatior*, *Chartergus chartarius*, *Chartergus globiventris*, *Chartergus metanotalis*, *Clypearia sulcata*, *Clypearia weyrauchi*, *Epipona tatua*, *Leipomeles dorsata*, *Metapolybia acincta*, *Metapolybia docilis*, *Metapolybia nigra*, *Metapolybia suffusa*, *Mischocyttarus adolphi*, *Mischocyttarus alfkeni*, *Mischocyttarus alfkenii excrucians*, *Mischocyttarus alfkenii trinitatis*, *Mischocyttarus carbonarius carbonarius*, *Mischocyttarus flavicans*, *Mischocyttarus foveatus*, *Mischocyttarus injucundus tingomariae*, *Mischocyttarus insolitus*, *Mischocyttarus labiatus*, *Mischocyttarus latissimus*, *Mischocyttarus metoecus*, *Mischocyttarus petiolatus*, *Mischocyttarus pseudomimeticus*, *Mischocyttarus punctatus*, *Mischocyttarus tomentosus*, *Mischocyttarus vaqueroi*, *Parachartergus amazonensis*, *Parachartergus colobopterus*, *Parachartergus fasciipennis*, *Parachartergus fraternus*, *Parachartergus fulgidipennis*, *Parachartergus griseus*, *Parachartergus richardsi*, *Parachartergus weyrauchi*, *Polybia bistrata*, *Polybia catillifex*, *Polybia eberhardae*, *Polybia emaciata*, *Polybia fastidiosuscula*, *Polybia jurinei*, *Polybia liliacea*, *Polybia micans*, *Polybia occidentalis*, *Polybia platycephala sylvestris*, *Polybia quadricincta*, *Polybia raii raii*, *Polybia rejecta*, *Polybia scrobalis pronotalis*, *Polybia scrobalis scrobalis*, *Polybia sericea*, *Polybia striata*, *Polybia velutina*, *Protopolybia acutiscutis*, *Protopolybia amarella*, *Protopolybia chartergoides chartergoides*, *Protopolybia exigua binominata*, *Protopolybia exigua exigua*, *Protopolybia fuscatus*, *Protopolybia rugulosa*, *Protopolybia sedula*, *Pseudopolybia compressa*, *Pseudopolybia vespiceps*, *Synoeca septentrionalis*, *Synoeca surinama*, *Synoeca virginea*

editors

institution:
address:
publisher:
accessed:
websites:
chapter:
series:
pages: 585
issue:
year: 1978

authors

authors: Richards, O. W.
title: The social wasps of the Americas excluding the Vespinae
source:
type: book

tags: *Agelaia angulata angulata*, *Agelaia angulicollis*, *Agelaia brevistigma*, *Agelaia cajennensis*, *Agelaia fulvofasciata*, *Agelaia hamiltoni*, *Agelaia testacea*, *Angiopolybia obidensis*, *Angiopolybia pallens*, *Angiopolybia paraensis*, *Angiopolybia zischkai*, *Apoica thoracica*, *Asteloeca trilli*, *Brachygastra albula*, *Brachygastra augusti*, *Brachygastra lecheguana*, *Brachygastra propodealis*, *Brachygastra scutellaris*, *Chartergellus amazonicus*, *Chartergellus punctatior*, *Chartergus chartarius*, *Chartergus globiventris*, *Chartergus metanotalis*, *Clypearia sulcata*, *Clypearia weyrauchi*, *Epipona tatua*, *Leipomeles dorsata*, *Metapolybia acincta*, *Metapolybia docilis*, *Metapolybia nigra*, *Metapolybia suffusa*, *Mischocyttarus adolphi*, *Mischocyttarus alfkeni*, *Mischocyttarus alfkenii excrucians*, *Mischocyttarus alfkenii trinitatis*, *Mischocyttarus carbonarius carbonarius*, *Mischocyttarus flavicans*, *Mischocyttarus foveatus*, *Mischocyttarus injucundus tingomariae*, *Mischocyttarus insolitus*, *Mischocyttarus labiatus*, *Mischocyttarus latissimus*, *Mischocyttarus metoecus*, *Mischocyttarus petiolatus*, *Mischocyttarus pseudomimeticus*, *Mischocyttarus punctatus*, *Mischocyttarus tomentosus*, *Mischocyttarus vaqueroi*, *Parachartergus amazonensis*, *Parachartergus colobopterus*, *Parachartergus fasciipennis*, *Parachartergus fraternus*, *Parachartergus fulgidipennis*, *Parachartergus griseus*, *Parachartergus richardsi*, *Parachartergus weyrauchi*, *Polybia bistrata*, *Polybia catillifex*, *Polybia eberhardae*, *Polybia emaciata*, *Polybia fastidiosuscula*, *Polybia jurinei*, *Polybia liliacea*, *Polybia micans*, *Polybia occidentalis*, *Polybia platycephala sylvestris*, *Polybia quadricincta*, *Polybia raii raii*, *Polybia rejecta*, *Polybia scrobalis pronotalis*, *Polybia scrobalis scrobalis*, *Polybia sericea*, *Polybia striata*, *Polybia velutina*, *Protopolybia acutiscutis*, *Protopolybia amarella*, *Protopolybia*

chartergoides chartergoides,Protopolybia exigua binominata,Protopolybia exigua exigua,Protopolybia fuscatus,Protopolybia rugulosa,Protopolybia sedula,Pseudopolybia compressa,Pseudopolybia vespiceps,Synoeca septentrionalis,Synoeca surinama,Synoeca virginea

abstract:

identifiers

last_modified:
created:
group_id:
profile_id:
id:

taxonRecordName

ancillaryData

providerSpecificData

anyTwo:
providerLink:

publicationStatus

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

replacementNameFor

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

sanctioned

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

laterHomonymOf

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

[conservedAgainst](#)

basedOn

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

basionym

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

[spellingCorrentionOf](#)

typeNameEntity

source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:

typificacion

typeOfType:

[lectotypeMicroReferenceVoucher](#)

[lectotypePublicationVoucher](#)

[voucherReference](#)

simple:
microReference:
year:

publishedIn

simple:
source:
datatype:
identifier:

specialAuthorship

[authors](#)

[year](#)

simple:

canonicalAuthorship

[authors](#)

[year](#)

simple:
simple: Zikan, 1949

canonicalName

infraspecificEpithet:
specificEpithet:
infragenericEpithet:
linkType:
ref:
uninomial:
simple: Mischocyttarus vaqueroi
rank: SPECIES
simple: Mischocyttarus vaqueroi Zikan, 1949

attributes

nomenclaturalCode:
isAnamorphic:
id:

[synonymsAtomized](#)

[hierarchy](#)

[ancillaryData](#)

dataObject:
additionalInformation:

[reference](#)

geoPoint:
location:
thumbnailURL:

[mediaURL](#)

description:

[subject](#)

source: The Catalogue of Life, 3rd January 2011

[audience](#)

bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights:
license:
title:
modified: 2016-03-11T14:52:13.030Z
created: 2016-03-11T14:52:13.030Z

[agent](#)

homepage:
role:
email:
phone:
address:
position:
organisation:
lastName:
firstName:
mimeType:
dataType:
identifier:
parentTaxon: Mischocyttarus
higherClassification:
infraspecificEpithet:
specificEpithet:
taxonRank: SPECIES
subGenus:
genus: Mischocyttarus
family: Vespidae
order: Hymenoptera
classHierarchy: Insecta
phylum: Arthropoda
kingdom: Animalia
recommended:
classification:

invasiveness

invasivenessUnstructured:

reproduction

0

dataObject:
additionalInformation:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Nancy Carolina Rojas Riaño
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:
reproductionUnstructured:

0

dataObject:
additionalInformation:

[reference](#)

geoPoint:
location:
thumbnailURL:

[mediaURL](#)

description:

[subject](#)

[audience](#)

rightsHolder:
rights:
license:
modified:
created:

[agent](#)

mimeType:
dataType:
identifier:
relatedTo:
measurementRemarks:
measurementMethod:
measurementDeterminedBy: TraitBank
measurementDeterminedDate:
measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementValue: Sexual
measurementType: Tipo de Reproducción
measurementID:

molecularData

molecularDataUnstructured:

migratory

migratoryUnstructured:

lifeForm

lifeFormUnstructured:

lifeCycle

lifeCycleUnstructured:

interactions

interactionsUnstructured:

feeding

0

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Nancy Carolina Rojas Riaño

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

feedingUnstructured: Las avispas de este género caminan a lo largo de los hilos de las telarañas, presumiblemente gracias a una especial adaptación en los lóbulos tarsales de las patas medias y posteriores. Después de esto las avispas forrajeras retornan al nido y allí mastican la comida compartiéndola con otras avispas de la colonia, las larvas son alimentadas por regurgitación. El néctar recolectado de una amplia variedad de flores también es llevado al nido y guardado en sus celdas para luego ser consumido por los adultos.

0

0

strategy: Depredadores

type: Heterótrofos - Omnívoros

environmentalEnvelope

environmentalEnvelopeUnstructured:

ecologicalSignificance

ecologicalSignificanceUnstructured:

dispersal

dispersalUnstructured:
distance:
structureDispersed:
type:
purpose:

behavior

0

dataObject:
additionalInformation:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Nancy Carolina Rojas Riaño
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:
behaviorUnstructured: Es un insecto depredador con hábitos sociales al igual que las demás especies del género *Mischocyttarus*.

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights:
license:
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:

measurementOrFact

relatedTo:
measurementRemarks:
measurementMethod:
measurementDeterminedDate:
measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementValue:
measurementType:

measurementID:

[endemicAtomized](#)

[distribution](#)

[ancillaryData](#)

dataObject:

additionalInformation:

[reference](#)

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

[mediaURL](#)

description:

[subject](#)

source:

[audience](#)

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Nancy Carolina Rojas Riaño

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

[agent](#)

contentType:

dataType:

identifier:

distributionUnstructured: Se distribuye en áreas que alcanzan hasta los 600 msnm de altitud. En Colombia se ha registrado en las regiones de la Amazonia, Orinoquía, Pacífica y Caribe.

[distributionAtomized](#)

[ancillaryData](#)

locality:

municipality:

country: Ecuador

temporalCoverage

endDate:

startDate:

distributionScope

type:

[threatStatus](#)

territory

territoryUnstructured:

areaOfOccupancy:

extentOfOccurrence:

populationBiology

populationBiologyUnstructured:

legislation

legislationUnstructured:

directThreats

directThreatsUnstructured:

ancillaryData

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights:

license:

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

measurementOrFact

relatedTo:

measurementRemarks:

measurementMethod:

measurementDeterminedDate:

measurementUnit:

measurementAccuracy:

measurementValue:

measurementType:

measurementID:

abstract: Esta especie habita en áreas que alcanzan hasta los 600 msnm de Sudamérica. Es un insecto depredador con comportamiento eusocial que se alimenta de néctar y presas. El macho es parecido a la hembra pero un poco más pequeño, y con manchas amarillas más extensas.

associatedParty

role:

personnelIdentifier:

personnelDirectory:

homepage:

email: enataliagomezm@gmail.com

phone:

postalCode:

country: Colombia
state: Bogotá Distrito Capital
city: Bogotá D.C.
address:
organisation:
position:
lastName: Gómez Melendro
firstName: Edith Natalia

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation: Información de tipos: El holotipo se encuentra en el Departamento de Entomología de Instituto Oswaldo Cruz (FIOC), Sao Paulo, Brasil.
Créditos específicos: Al Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi. Al Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia Colombiana SIAT-AC. La elaboración de esta ficha fue posible gracias al apoyo del gobierno de Finlandia a través del convenio entre la Secretaria General de la CAN y el Instituto Sinchi para el proyecto “Sistema Regional Amazónico de Información Ambiental con énfasis en Biodiversidad de los países miembros de la CAN, (programa BIOCAN), componente SIAT-AC”.

reference

geoPoint:
location:
thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source:

audience

bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights:
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:

agent

contentType:
dataType:
identifier:

_id

_bsonType: ObjectID
id: VâÛªfÄW DãØ