

Reporte de Fichas para el usuario: edith gómez

Ficha ID: 56d6face3c16479905cba918

Fecha de creación: 2016-03-02T14:38:08.871Z

annualCycles

annualCycleUnstructured:

habitats

0

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataObject:

identifier:

habitatUnstructured: Común en áreas pobladas, claros con matorral, bordes; con menos frecuencia en bosque húmedo; regiones secas a húmedas (Hilty & Brown 1986). En La Guajira habita en el bosque deciduo tropical, de galería y secundario (Cerrejón 2009-2010).

[commonNamesAtomized](#)

[ancillaryData](#)

usedBy:

usedIn

distributionUnstructured:

endDate:

startDate:

[ancillaryData](#)

type:

language: Inglés

name: Palm Tanager

creation_date: 2016-03-02T14:38:08.871Z

usesManagementAndConservation

[ancillaryData](#)

managementAndConservationUnstructured:

[managementAndConservationAtomized](#)

identificationKeys

fullDescription

0

dataObject:
additionalInformation:
geoPoint:
location:
thumbnailURL:
description:
source:
bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:
mimeType:
dataType:
identifier:
fullDescriptionUnstructured: Se reconocen cuatro subespecies:
Thraupis palmarum atripennis Todd, 1922
Thraupis palmarum melanopectera (P. L. Sclater, 1857)
Thraupis palmarum palmarum (Wied-Neuwied, 1821)
Thraupis palmarum violilavata (Berlepsch & Taczanowski, 1884)
briefDescription:

references

taxonRecordName

ancillaryData

providerSpecificData

anyTwo:
providerLink:

publicationStatus

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

replacementNameFor

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:

datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

sanctioned

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

laterHomonymOf

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

[conservedAgainst](#)

basedOn

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

basionym

microReference:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
note:
ruleConsidered:

[spellingCorrentionOf](#)

typeNameEntity

source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:
source:
datatype:
identifier:

typificacion

typeOfType:

lectotypeMicroReferenceVoucher

lectotypePublicationVoucher

voucherReference

simple:
microReference:
year:

publishedIn

simple:
source:
datatype:
identifier:

specialAuthorship

authors

year

simple:
canonicalAuthorship

authors

year

simple:
simple: (Wied-Neuwied, 1821)

canonicalName

infraspecificEpithet:
specificEpithet:
infragenericEpithet:
linkType:

ref:
uninomial:
simple: *Thraupis palmarum*
rank: SPECIES

simple: *Thraupis palmarum* (Wied-Neuwied, 1821)

attributes

nomenclaturalCode:

isAnamorphic:

id:

synonymsAtomized

hierarchy

ancillaryData

dataObject:

additionalInformation:

reference

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source: The Catalogue of Life, 3rd January 2011

audience

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights:

license:

title:

modified: 2016-03-02T14:37:48.869Z

created: 2016-03-02T14:37:48.869Z

agent

homepage:

role:

email:

phone:

address:

position:

organisation:

lastName:

firstName:

mimeType:

dataType:

identifier:

parentTaxon: *Thraupis*

higherClassification:

infraspecificEpithet:

specificEpithet:

taxonRank: SPECIES

subGenus:

genus: Thraupis

family: Thraupidae

order: Passeriformes

classHierarchy: Aves

phylum: Chordata

kingdom: Animalia

recommended:

classification:

invasiveness

invasivenessUnstructured:

reproduction

reproductionUnstructured:

molecularData

molecularDataUnstructured:

migratory

migratoryUnstructured:

lifeForm

lifeFormUnstructured:

lifeCycle

lifeCycleUnstructured:

interactions

interactionsUnstructured:

feeding

0

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

mimeType:

data Type:

identifier:

feedingUnstructured: En La Guajira se observó que los individuos forrajean en el dosel y se alimentan de frutos e invertebrados (Cerrejón 2009-2010).

environmentalEnvelope

environmentalEnvelopeUnstructured:

ecologicalSignificance

ecologicalSignificanceUnstructured:

dispersal

dispersalUnstructured:

distance:

structureDispersed:

type:

purpose:

behavior

0

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

behaviorUnstructured: Sociable, se encuentra en pareja o en pequeños grupos y, mientras come, notablemente versátil; frecuente en copas de los árboles en el interior de bosques. Regularmente se cuelga cabeza debajo de ápices de frondas de palmas (Hilty & Brown 1986). Llamada similar a tsiup, seco y forzado (Hilty & Brown 1986).

ancillaryData

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights:

license:

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

measurementOrFact

relatedTo:

measurementRemarks:

measurementMethod:

measurementDeterminedDate:

measurementUnit:

measurementAccuracy:

measurementValue:

measurementType:

measurementID:

[endemicAtomized](#)

[distribution](#)

[ancillaryData](#)

dataObject:

additionalInformation:

[reference](#)

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

[mediaURL](#)

description:

[subject](#)

source:

[audience](#)

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

[agent](#)

contentType:

dataType:

identifier:

distributionUnstructured: En bases de datos se encontró que: Esta especie se distribuye en: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú (Arctos 2012)

Las siguientes subespecies se distribuyen en:

Thraupis palmarum atripennis Colombia (Collections MNH SI 2012); Colombia, Costa Rica, Panamá (Arctos 2012)

Thraupis palmarum melanopectera Colombia (Collections MNH SI 2012); Colombia, Perú, Suriname, Trinidad y Tobago (Arctos 2012)

En bases de datos, literatura y monitoreos de fauna se encontró que: Esta especie se distribuye en: Amazonas, (Arctos 2012). La Guajira (Cerrejón 2009-2010)

Las siguientes subespecies se distribuyen en Colombia:

Thraupis palmarum atripennis Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba,

Cundinamarca, Huila, Santander, Tolima, Valle del Cauca (ICN 2004); Antioquia, Bolívar, Chocó, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Santander, Sucre, Valle del Cauca (Collections MNH SI 2012); Huila, Valle del Cauca (Arctos 2012)
Thraupis palmarum melanoptera Amazonas, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Norte de Santander, Santander, Vaupés (ICN 2004); Caquetá, Meta (Collections MNH SI 2012); Boyacá, Meta, Santander (Arctos 2012)
Thraupis palmarum violilavata Bogotá, Nariño (ICN 2004); Cauca (Collections MNH SI 2012); Valle del Cauca (Arctos 2012)
Thraupis palmarum palmarum Brasil (Arctos 2012)
Thraupis palmarum violilavata Colombia (Arctos 2012; Collections MNH SI 2012)
Se encuentra en las regiones de la Amazonía, Andina, Caribe, Orinoquía y Pacífica hasta los 2600 m (Hilty & Brown 1986).

distributionAtomized

stateProvince: Amazonas

ancillaryData

locality:
municipality:
country: Colombia

temporalCoverage

endDate:
startDate:

distributionScope

type:

threatStatus

ancillaryData

threatStatusUnstructured:

threatStatusAtomized

apendiceCITES:
locality:
municipality:
county:
stateProvince:
country: Global
0: IUCN
measurementValue: Preocupación menor (LC)
relatedTo:
measurementRemarks:
measurementMethod:

measurementDeterminedBy

measurementDeterminedDate:
measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementType: IUCN
measurementID:

territory

territoryUnstructured:

areaOfOccupancy:

extentOfOccurrence:

populationBiology

populationBiologyUnstructured:

legislation

legislationUnstructured:

directThreats

0

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia

license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

directThreatsUnstructured: Thraupis palmarum está sometida a la caza con fines de consumo, deportivos, comerciales y de ornamentación en La Guajira (Cerrejón 2009-2010).

ancillaryData

dataObject:

additionalInformation:

geoPoint:

location:

thumbnailURL:

description:

source:

bibliographicCitation:

rightsHolder:

rights:

license:

modified:

created:

contentType:

dataType:

identifier:

measurementOrFact

relatedTo:

measurementRemarks:

measurementMethod:
measurementDeterminedDate:
measurementUnit:
measurementAccuracy:
measurementValue:
measurementType:
measurementID:

abstract: Mide 16,5 cm. Principalmente oliva grisáceo, más oscuro y más sucio en la espalda y con lustre violáceo o azulosos; frente, bajas partes ventrales y cobertoras alares fuertemente teñidas amarillento; mitad distal del ala cerrada negra (conspicua en vuelo o en reposo), formando un extenso triángulo negro (Hilty & Brown 1986).

associatedParty

role:
personnelIdentifier:
personnelDirectory:
homepage:
email: enataliagomezm@gmail.com
phone:
postalCode:
country: Colombia
state: Bogotá Distrito Capital
city: Bogotá D.C.
address:
organisation:
position:
lastName: Gómez Melendro
firstName: Edith Natalia

ancillaryData

dataObject:
additionalInformation: Hilty S. L., Brown W. L. (1986) A Guide to the Birds of Colombia Princeton, New Jersey. U. S. A. | ARCTOS COLLECTION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM Specimen Search | CERREJÓN Monitoreo de fauna en el Valle del Cerrejón. ASESORÍAS Y ESTUDIOS AMBIENTALES J.D.B. S.A.S. Contrato CON 00272009 | SMITHSONIAN NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY (2012) Search Museum Collections Records | CERREJÓN Monitoreo de fauna en el Valle del Cerrejón 2005-2006. FUNDACIÓN HIDROBIOLÓGICA GEORGE DAHL. Contrato CON 00412005 | INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia Colecciones en Línea | ORRELL T. (custodio) (2012) ITIS Global: The Integrated Taxonomic Information System (version Sept 12). En: Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, 20th November 2012 | BIRDLIFE INTERNATIONAL (2012) *Thraupis palmarum*. En: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Versión 2012.2

reference

geoPoint:
location:
thumbnailURL:

mediaURL

description:

subject

source:

audience

bibliographicCitation:
rightsHolder:
rights: Equipo Coordinador del SiB Colombia
license: Atribución - No Comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA 4.0)
modified:
created:

agent

mimeType:
dataType:
identifier:

_id
_bsontype: ObjectID
id: VÖúÍ< G™\0'€