

Curva glicêmica (3 horas): orientações ao paciente

Código: KB-EXM-CUR | Versão 1.0 | Tipo: exame

Documento fictício, criado para fins didáticos. As regras aqui descritas não constituem orientação médica.

Para que serve

A curva glicêmica mede como o açúcar no sangue se comporta ao longo de 3 horas depois de beber uma solução de glicose. Muitas pessoas a chamam de "exame do xarope" ou "teste de tolerância à glicose".

Como se preparar

- Jejum de 8 horas.
- É permitida água em pequena quantidade.
- Evite exercício físico intenso na véspera.
- Leve um lanche para comer ao terminar.

Atenção: este exame ocupa a manhã inteira e interrompe o jejum. Exames que exigem jejum, como o ultrassom de abdome total, precisam ser feitos ANTES da curva no mesmo dia, ou em outro dia.

No dia do exame

Chegue com 15 minutos de antecedência. Faz-se uma primeira coleta de sangue, você bebe a solução de glicose e novas coletas são feitas ao longo de 3 horas. Durante a espera, permaneça no local, sem comer, sem fumar e sem fazer esforço.

Quanto tempo leva

Cerca de 180 minutos (3 horas) dentro do laboratório.

Se você errou o preparo

Se comeu algo durante o jejum, avise na chegada. O exame perde a validade com jejum incorreto, e a equipe poderá sugerir remarcar.

Perguntas frequentes

Posso sair durante a espera? Não, as coletas têm horários definidos.

Posso sentir enjoo ou tontura? Pode acontecer. Avise a equipe imediatamente.

É igual à glicemia de jejum? Não. A glicemia de jejum é uma única coleta.

Quando falar com um atendente

Se você tem dúvidas sobre o seu preparo para este exame por causa dos seus medicamentos, peça um atendente. O atendimento digital não decide sobre medicamentos.