

Ultrassom pélvico: orientações ao paciente

Código: KB-EXM-USP | Versão 1.0 | Tipo: exame

Documento fictício, criado para fins didáticos. As regras aqui descritas não constituem orientação médica.

Para que serve

O ultrassom pélvico avalia a bexiga e os órgãos da região da pelve. Muitas pessoas o chamam de "ultrassom da bexiga".

Como se preparar

- Este exame não exige jejum.
- A bexiga precisa estar cheia. Beba cerca de 1 litro de água (aproximadamente 4 copos grandes), terminando até 60 minutos antes do horário do exame.
- Depois de beber a água, não urine até o exame.

Como a água é permitida em qualquer jejum, este exame pode ser feito no mesmo dia de exames em jejum.

No dia do exame

Chegue com 15 minutos de antecedência, já com a bexiga cheia. Um gel é aplicado na pele da parte baixa da barriga.

Quanto tempo leva

Cerca de 30 minutos.

Se você errou o preparo

Se sentir muita vontade de urinar antes do exame, avise a equipe, e não esvazie a bexiga por conta própria. Se urinou antes, informe: a equipe orienta a beber água novamente e aguardar.

Perguntas frequentes

Preciso estar em jejum? Não. Mas, se o exame for no mesmo dia de outro em jejum, siga o jejum do outro.

Posso beber mais que 1 litro? Siga a quantidade indicada neste documento.

Quando falar com um atendente

Se você tem dificuldade para segurar a urina ou não consegue beber a quantidade indicada, peça um atendente antes do exame.