

Como combinar vários exames no mesmo dia

Código: KB-GER-002 | Versão 1.0 | Tipo: geral

Documento fictício, criado para fins didáticos. As regras aqui descritas não constituem orientação médica.

Visão geral

Quando o pedido tem vários exames, alguns podem ser agrupados, outros precisam de uma ordem e outros exigem dia separado. Esta é a regra geral do laboratório.

Exames que combinam bem

- Exames de sangue em jejum (hemograma, glicemia, perfil lipídico, ureia e creatinina) podem ser coletados juntos, seguindo o MAIOR jejum entre eles. Exemplo: com perfil lipídico no pedido, o jejum de todos passa a ser de 12 horas.
- O TSH não exige jejum e pode ser coletado junto com os demais.
- O ultrassom pélvico não exige jejum e pode ser feito no mesmo dia de exames em jejum, porque a água é permitida.
- Quando possível, concentre os exames em jejum na mesma manhã.

Ordem obrigatória

- Ultrassom de abdome total e Curva glicêmica: no mesmo dia, o ultrassom vem ANTES da curva, porque a solução de glicose da curva interrompe o jejum. Também é possível marcar em dias separados.
- Ressonância de abdome com contraste: exige creatinina realizada nos últimos 30 dias. A creatinina deve ser agendada ANTES da ressonância.

Dia exclusivo

- Colonoscopia: deve ser feita em um dia só dela, sem outros exames no mesmo dia.

Quando não houver horário que respeite essas regras

Informe ao paciente quais exames puderam ser organizados e quais não puderam, explique o motivo e sugira alternativas (outro dia, outra ordem, outro período). Não invente horários.