МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра робототехники и автоматизации производственных систем

Пояснительная записка к курсовой работе по дисциплине «Информатика»

Взам. инв. № Санкт-Петербург 2018 Подп. и дата Вариант N 32 Изм. Лист Подп. Дата № докум. Пояснтельня записка к Разраб. Веренёв А.А. Лит. Лист Листов Инв. № подл. Пров. Π рокшин A.F.курсовой работе по дисциплине Н. контр. "Информатика" y_{TB} .

Содержание 1. Цель и тема курсовой работы 2. Задание на курсовую работу 3. Введение 4. Исследование функции 5. Исследование кубического сплайна 6. Задача оптимального распределения неоднородных ресурсов 7. Список литературы Лист Вариант N 32 № докум. Подп. Изм Лист Дата

Взам. инв. №

Инв. № подл.

1 ЦЕЛЬ И ТЕМА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Уметь применять персональный компьютер и математические пакеты прикладных программ в инженерной деятельности.

Тема курсовой работы: решение математических задач с использованием математического пакета «SciLab» и системы компьютерной алгебры «Reduce».

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	 T.

2 ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время при решении различных как прикладных инженерных, так и чисто исследовательских задач, возникает необходимость в использовании широкого круга алгоритмов из множества разделов математики. Между тем самостоятельная реализация многих алгоритмов на некотором языке программирования может быть сложна и избыточна. Вследствие этого широкое распространение получили математические пакеты и системы компьютерной алгебры, такие как: MatLab, Octave, SciLab, Mathematica, Reduce, Mapple, призванные избавить пользователя от рутинных процедур, предоставить удобный интерфейс взаимодействия с уже написанным программным кодом и быстрым созданием нового. К сожалению, некоторые из перечисленных выше математических пакетов, будучи коммерческими по природе, имеют пакетом SciLab и системой компьютерной алгебры Reduce.

Подп. и дат		
Инв. № дубл.		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.	Вариант N 32 Изм Лист № докум. Подп. Дата Вариант N 32	

- б) Исследовать функцию h(x)=f(x)-g(x) на промежутке $[0;\frac{5\pi}{6}]$
- 2. Найти коэффициенты кубического сплайна, интерполирующего данные, представленные в векторах:

$$V_x = [0, 0.5, 1.4, 2.25, 3.5] V_y = [3.0, 2.7, 3.7, 3.333, 3.667]$$

Построить на графике функции f(x),полученную после нахождения коэффициентов кубического сплайна.

Представить графическое изображение результатов интерполяции исходных данных различными методами с использованием встроенных функций $\mathrm{splin}(x,y,\text{``natural''}), \ \mathrm{splin}(x,y,\text{``clamped''}), \ \mathrm{splin}(x,y,\text{``not}_a_k\mathrm{not''}), \ \mathrm{splin}(x,y,\text{``fast''}), \ \mathrm{splin}(x,y,\text{``monotone''}), \ \mathrm{interp}(xx,x,y,d)$

3. Решить задачу оптимального распределения неоднородных ресурсов. Требуется решить следующую задачу оптимального распределения неоднородных ресурсов. Пусть в распоряжении завода железобетонных изделий (ЖБИ) имеется \mathbf{m} видов сырья (песок, щебень, цемент) в объемах $\mathbf{a_i}$. Требуется произвести продукцию \mathbf{n} видов. Дана технологическая норма $c_i j$ требления отдельного і-го вида сырь для изготовления единицы продукции каждого ј-го вида. Известна прибыль π_j получаема от выпуска единицы продукции ј-го вида. Требуется определить, какую продукцию и в каком количестве должен производить завод ЖБИ, чтобы получить максимальную прибыль.

Используемые	Изготавливаемые изделия				Наличие
ресурсы, a_i	И1	И2	ИЗ	И4	ресурсов, a_i
Трудовые	4	4	4	6	14
Материальные	4	6	6	3	12
Финансовые	6	4	5	8	35
Прибыль, Π_j	40	55	35	25	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Взам. инв. №

4 РЕШЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ

Решение уравнение - поиск его корней:

$$h(x) = \sqrt{3}\sin(x) + \cos(x) - \cos(2x + \frac{\pi}{3}) + 1$$

Для нахождения численного решения воспользуемся функцией "fsolve".

Для начала построим график.

function y=h(x)

$$y = sqrt(3)*sin(x)+cos(x)-cos(2*x+\%pi/3)+1$$

endfunction

Взам. инв. №

Инв. № подл.

plot(0:0.01:2*%pi,h)

Полученный график изображен на Рис.1.




Рис 1. График функции h(x)

					ı
					ı
					ı
TΤ	TT	Mo.	П	TT	
V13M.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Изучив график, допустимо предположить наличие трех корней. Зададим приближные значения и воспользуемся функцией "fsolve".

$$-->x0=[2.6,4.2,5.6]$$
 $x0=$

2.6 4.2 5.6


$$->[x,v]=fsolve(x0,h)$$

$$10^{(-15)} *$$

$$-\ 0.2220446\ \ 0.\ \ 0.7771561$$


$$x =$$

$2.6179939\ \, 4.1887902\ \, 5.7595865$



ī	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.



2)Иследование на четность или нечетность. Если f(-x)=f(x), то фунция четная. Если f(-x)=-f(x) - нечетная. Если фунция не является четной или нечетной, то ее обычно называют - функцией общего вида. Листинг: -->y=1 y=

$$--> e(y) = sqrt(3) * sin(x) + cos(x) - cos(2 * x + \%pi/3) - 1$$

- 2.4965694

$$4->x=-1$$

x =

z =

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

- 1.

$$--> z(-x) = sqrt(3) * sin(x) + cos(x) - cos(2 * x + \%pi/3) - 1$$


- 2.4965694

 $h(x) = h(-x) \Longleftrightarrow -2.4965694 = -2.4965694 \Longrightarrow$ Функция чётная.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

	3) Точки экстремум	1a	
ата			
Подп. и дата			
Инв. № дубл.			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.	Изм Лист № докум. Подп. Даг	Вариант N 32	Лист 10

	6) точки перегиба		
Подп. и дата			
Инв. № дубл.			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.	Изм Лист № докум. Подп. Дата	Вариант N 32	<i>Лист</i> 11



5 ИССЛЕДОВАНИЕ КУБИЧЕСКОГО СПЛАЙНА

5.0.1 Задания и исходные данные для решения

- 1. Найти коэффициенты кубического сплайна, интерполирующего данные, представленные в векторах \vec{V}_x и \vec{V}_y .
- 2. Построить на одном графике: функцию f(x) и $f_1(x)$,полученную после нахождения коэффициентов кубического сплайна.
- 3. Представить графическое изображение результатов интерполяции исходных данных.

$$\vec{V}_x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.5 \\ 1.4 \\ 2.25 \\ 3.5 \end{pmatrix}, \quad \vec{V}_y = \begin{pmatrix} 3 \\ 2.7 \\ 3.7 \\ 3.333 \\ 3.667 \end{pmatrix}$$

Необходимо оценить погрешность в точке x=2.4. Вычислить значение функции в точке x=1.2.

Подп. и дата	
$H_{ m HB}$. $N^{ar e}$ ду 6 л.	
B зам. инв. $\mathcal{N}^{\underline{o}}$	
Подп. и дата	
HB . $N^{\underline{o}}$ подл.	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Уравнение сплайна находится по пяти точкам $(x_1; y_1), (x_2; y_2), (x_3; y_3), (x_4; y_4), (x_5; y_5)$

Представим сплайн полиномом третьей степени на каждом отрезке $[x_i, x_{i+1}]$.

$$F_i(x) = A_i 0 + A_{i1} x + A_{i2} x^2 + A_{i3} x^3, (1)$$

 $x \in [x_i, x_{i+1}].$

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Найдем коэффициенты A_{ij} исходя из того, что в точках склейки функция не имеет разрывов, изломов и изгиб ее слева и справа совпадает.

На каждом из отрезков $[x_i, x_{i+1}]$ график $F_i(x)$ проходит через точки y_i, y_{i+1} .

$$y_i = A_{i0} + A_{i1}x_i + A_{i2}x_i^2 + A_{i3}x_i^3 (2)$$

Получаем 8 уравнений:

$$y_{1} = A_{10} + A_{11}x_{1} + A_{12}x_{1}^{2} + A_{13}x_{1}^{3}$$

$$y_{2} = A_{10} + A_{11}x_{2} + A_{12}x_{2}^{2} + A_{13}x_{2}^{3}$$

$$y_{2} = A_{20} + A_{21}x_{2} + A_{22}x_{2}^{2} + A_{23}x_{2}^{3}$$

$$y_{3} = A_{20} + A_{21}x_{3} + A_{22}x_{3}^{2} + A_{23}x_{3}^{3}$$

$$y_{3} = A_{30} + A_{31}x_{3} + A_{32}x_{3}^{2} + A_{33}x_{3}^{3}$$

$$y_{4} = A_{30} + A_{31}x_{4} + A_{32}x_{4}^{2} + A_{33}x_{4}^{3}$$

$$y_{4} = A_{40} + A_{41}x_{4} + A_{42}x_{4}^{2} + A_{43}x_{4}^{3}$$

$$y_{5} = A_{40} + A_{41}x_{5} + A_{42}x_{5}^{2} + A_{43}x_{5}^{3}$$

$$(3)$$

Производные первого порядка во внутренних точках x_i должны совпадать, т.е. производная слева

$$F_{i}'(x_{i}) = A_{i1} + 2A_{i2}x_{i} + 3A_{i3}x_{i}^{2}$$

должна быть равна производной справа

$$F'_{(i+1)}(x_i) = A_{(i+1)1} + 2A_{(i+1)2}x_i + 3A_{(i+1)3}x_i^2$$

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Вариант N 32

$$A_{11} + 2A_{12}x_2 + 3A_{13}x_2^2 = A_{21} + 2A_{22}x_2 + 3A_{23}x_2^2$$

$$A_{21} + 2A_{22}x_3 + 3A_{23}x_3^2 = A_{31} + 2A_{32}x_3 + 3A_{33}x_3^2$$

$$A_{31} + 2A_{32}x_4 + 3A_{33}x_4^2 = A_{41} + 2A_{42}x_4 + 3A_{43}x_4^2$$

$$(4)$$

Производные второго порядка в точках склейки x_i должны совпадать, т.е. вторая производная слева

$$F_i''(x_i) = 2A_{i2} + 6A_{i3}x_i$$

должна быть равна второй производной справа

$$F''_{(i+1)}(x_i) = 2A_{(i+1)2} + 6A_{(i+1)3}x_i$$

Физический смысл равенства вторых производных состоит в том, что в точках склейки изгиб сплайна справа и слева должен быть одинаковым.

$$2A_{12} + 6A_{13}x_2 = 2A_{22} + 6A_{23}x_2$$

$$2A_{22} + 6A_{23}x_3 = 2A_{32} + 6A_{33}x_3$$

$$2A_{32} + 6A_{33}x_4 = 2A_{42} + 6A_{43}x_4$$
(5)

Еще два уравнения - из граничных условий в крайних точках x_1, x_n :

$$C_{11}F'x_1 + C_{12} + F''(x_1) = C_{13}$$

$$C_{n1}F'n_1 + C_{n2} + F''(n_2) = C_{n3}$$
(6)

Найдем график сплайна в случае, когда концы сплайна оставлены свободными в граничных точках $(x1,y1),\ (x5,y5).$ Соответственно, уравнения имеют вид:

$$2A_{12} + 6A_{13}x_1 = 0$$

$$2A_{42} + 6A_{43}x_5 = 0$$
(7)

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Вариант N 32

Лист

```
В итоге - 16 уравнений для определения 16 коэффициэнтов A_{ij} .
```

Коэффициенты A_{ij} :


A_{10}	3
A_{11}	-1.0237
A_{12}	0
A_{13}	1.6949
A_{20}	3.4317
A_{21}	-3.6139
A_{22}	5.1803
A_{23}	-1.7586
A_{30}	-4.7853
A_{31}	13.9939
A_{32}	-7.3967
A_{33}	1.2359
A_{40}	12.1651
A_{41}	-8.6065
A_{42}	2.6479
A_{43}	-0.2522
1 10	

Подп. и дата	
$H_{ m HB}$. № Ду 6 л.	
B3 a M. N 1 e 1	
Подп. и дата	
в. № подл.	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Уравнение сплайна имеет вид: $F(x) = \begin{cases} F_1(x) = 1.69x^3 + 0.0x^2 - 1.0237x + 3, \text{ где } x \in [0, 0.5]; \\ F_2(x) = -1.7586x^3 + 5.1803x^2 - 3.6139x + 3.4317, \text{ где } x \in [0.5, 1.4]; \\ F_3(x) = 1.2359x^3 - 7.3967x^2 + 13.9939x_4.7853, \text{ где } x \in [1.4, 2.25]; \\ F_4(x) = -0.2522x^3 + 2.6479x^2 - 8.6065x + 12.1651, \text{ где } x \in [2.25, 3.5] \end{cases}$

График средствами ТЕХ:



Проводя оценки для функций разных классов. Если S(x) эрмитов кубический сплайн интерполирует на сетке функцию f(x) то имеют место оценки:

$$|S(x) - f(x)| \le R$$

Поскольку функция является достаточно гладкой, то её можно упростить до

$$|S(x) - f(x)| \le \frac{1}{384} h^4 |f''''(x)|$$

Из представленной формулы видно, что нам неизвеста функция f(x), с которой изначально были взяты координаты. Следственно для оценки погрешности нам необходимо рассчитать только правую часть неравенства. В этой части тоже присутствует неизвестная нам функция. От которой необходимо взять четвёртую производную.

$$N(x) = A_0 + A_1(x - x_0) + A_2(x - x_0)(x - x_1) + A_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) + A_4(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$$

$$f(x_i; x_{i+1}; \dots; x_{j+k-1}; x_{j+k-1}) = \frac{f(x_i; x_{i+1}; \dots; x_{j+k-1}; x_{j+k-1} - f(x_i; x_{i+1}; \dots; x_{j+k-1}))}{x_{j+k} - x_j}$$

Переменная h есть разница ближайшей табличной координаты и координаты просчитываемой точки погрешности.

$$h = |x_v - x_b|$$

NHB. $\hat{N}^{\underline{o}}$

$$F'1 = \frac{Y2-Y1}{X2-X1}$$
; $F'2 = \frac{Y3-Y2}{X3-X2}$; $F'3 = \frac{Y4-Y3}{X4-X3}$; $F'41 = \frac{Y5-Y4}{X5-X4}$;

$$F'1 = -0.6$$
; $F'2 = 1.1111$; $F'3 = -0.4318$; $F'4 = 0.2672$;

$$F''1 = \frac{F'2 - F'1}{X3 - X1}$$
; $F''2 = \frac{F'3 - F'2}{X4 - X2}$; $F''3 = \frac{F'4 - F'3}{X5 - X3}$;

$$F''1 = 1.2222$$
; $F''2 = -0.86$; $F''3 = 0.3328$;

$$F'''1 = \frac{F''2 - F''1}{X4 - X1}$$
; $F'''2 = \frac{F''3 - F''1}{X5 - X2}$;

$$F'''1 = -0.9351$$
; $F'''2 = 0.4048$;

$$F''''1 = \frac{F'''2 - F'''1}{X5 - X1}$$
;

$$F''''1 = 0.3828;$$

	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

```
В математическом пакете «SciLab» можно провести интерполяцию пользуясь парой команд: d = \mathrm{splin}(x,y,\text{"method"}); is = \mathrm{interp}(xx,x,y,d); \Gamma_{\text{Де }} x = [x_1,x_1,...,x_{n-1},x_1]
```

у – значения функции в узлах интерполяции

is – значения интерполянта (кубического сплайна,

интерполирующего заданную функцию) вычисленные в точках хх.

"method" – параметр, отвечающий за граничное условие, налагаеме на интерполянт

Граничные условия, соответствющие различным параметрам:

- 1)"natural"-производные в точках х1,хn интерполянты равны нулю
- 2)"clamped"-явное задание производных в точках x_1, x_n
- 3)"not_a_knot"-третья производная слева и справа равна для точек x_2, x_{n-1}
- 4) "fast" «быстрый» расчет сплайна на основе обычной интерполяции кубическим полиномом
- 5) "monotone" на интервалах между узлами интерполяции интерполянт является монотонным

Для построения графиков интерполянтов, полученных различными методами будем применять код общего вида, подставляя нужный параметр:

```
xx=[0:0.01:3.5];

x=[0,0.5,1.4,2.25,3.5];

y=[3.0,2.7,3.7,3.333,3.667];

d=splin(x,y,"parameter");

is=interp(xx,x,y,d);

plot(xx,is);

plot(x,y,"red o");
```

Подп. и дата

Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Инв. № подл.

Изм Лист № докум. Подп. Дата

Вариант N 32

Лист



6 ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОДНОРОДНЫХ РЕСУРСОВ.

Требуется решить следующую задачу оптимального распределения неоднородных ресурсов. Пусть в распоряжении завода железобетонных изделий (ЖБИ) имеется m видов сырья (песок, щебень, цемент) в объемах $\mathbf{a_i}$. Требуется произвести продукцию \mathbf{n} видов. Дана технологическая норма $c_i j$ требления отдельного і-го вида сырь для изготовления единицы продукции каждого ј-го вида. Известна прибыль π_j получаема от выпуска единицы продукции ј-го вида. Требуется определить, какую продукцию и в каком количестве должен производить завод ЖБИ, чтобы получить максимальную прибыль.

Исходные данные:

 $_{IHB.}~N^{\underline{\varrho}}$

Используемые	Изготавливаемые изделия			Наличие	
ресурсы, a_i	И1	И2	ИЗ	И4	ресурсов, a_i
Трудовые	4	4	4	6	14
Материальные	4	6	6	3	12
Финансовые	6	4	5	8	35
Прибыль, Π_j	40	55	35	25	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

```
Листинг: C = [4,4,4,6;4,6,6,3;6,4,5,8]; b = [14;12;35]; ci = [0;0;0;0]; cs = []; p = [40;55;35;25]; x, lagr, f = linpro(-p,C,b,ci,cs);
```

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

```
Командное окно Scilab 5.5.0

40.
55.
35.
25.

-->[x,lagr,f]=linpro(-p,C,b,ci,cs)
f =

- 120.
lagr =

0.
- 5.
- 25.
- 5.
0.
10.
0.
x =

3.
0.
0.
0.
0.
-->
```

Максимальная прибыль в размере 120 д.е. будет получена, если объем производства продукции $\Pi 1$ составит 3 ед.

Изм Лист № докум. Подп. Дата

Вариант N 32

Лист

7 ВЫВОД:
В ходе работы, были привиты базовые навыки использования математических пакетов, улучшена вёрстка в ТЕХ'е. Иследованна функция, построен сплайн, решена экономическая задача.
Вариант N 32 Изм Лист № докум. Подп. Дата Вариант N 32

Взам. инв. $\mathbb{N}^{\underline{a}}$ Инв. $\mathbb{N}^{\underline{a}}$ Дубл.

Подп. и дата

Инв. $N^{\underline{o}}$ подл.

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Scilab: Решение инженерных и математических задач / Е. Р. Алексеев, О. В. Чеснокова, Е. А. Рудченко. М. : ALT Linux ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 260 с. : ил. ; 8 с. цв. вклейки.— (Библиотека ALT Linux).
- 2. Андриевский А.Б., Андриевский Б.Р., Капитонов А.А., Фрадков А.Л. Решение инженерных задач в среде Scilab. Учебное пособие.— СПб.: НИУ ИТМО, 2013.-97 с.
- 3. Решение задач оптимизации средствами Scilab и Excel : Методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Математическая экономика» / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; Сост.: Л.М. Бакусов, О.В. Кондратьева Уфа, 2011. 33 с.
- 4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Интерполяционный_многочлен_Лагранжа
- 5. Калиткин. Численные методы. М.,Мир, 1980.
- 6. Ю.С. Завьялов. Методы сплайн-функций. М.Наука, 1980.

Подп. и дата		
Инв. № дубл.		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.	III Вариант № 32 — —	ист 24