

Varietà Differenziabili 2.5
Corso di Laurea in Matematica A.A. 2021-2022
Docente: Andrea Loi

1. Sia N una sottovarietà di una varietà differenziabile M . Dimostrare che TN è una sottovarietà di TM .
2. Una varietà differenziabile è detta *orientabile* se esiste un atlante di M rispetto al quale il determinante Jacobiano dei cambi di carte è positivo. Dimostrare che:

- (a) $\mathbb{R}P^3$ è una varietà orientabile;
- (b) il fibrato tangente TM di una varietà differenziabile M è orientabile.

3. Dimostrare che l'applicazione che associa ad ogni varietà differenziabile il suo fibrato tangente e ad ogni applicazione $F : N \rightarrow M$ tra varietà differenziabili l'applicazione $F_* : TN \rightarrow TM$ definita come $F_*((p, v)) = (F(p), F_{*p}(v))$ per ogni $(p, v) \in TN$ definisce un funtore covariante dalla categoria delle varietà differenziabili in se stessa.
4. Una *derivazione* di un'algebra di Lie $(V, [\cdot, \cdot])$ su un campo \mathbb{K} è un'applicazione lineare $D : V \rightarrow V$ tale che

$$D([Y, Z]) = [DY, Z] + [Y, DZ], \quad \forall Y, Z \in V.$$

Dimostrare che dato $X \in V$ l'applicazione

$$D_X : V \rightarrow V, Y \mapsto [X, Y]$$

è una derivazione.

5. Sia $M = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ e $X = \frac{d}{dx} \in \chi(M)$. Trovare la curva integrale di X massimale che inizia in un generico punto $p \in \mathbb{R}$.
6. Trovare il flusso (locale) dei seguenti campi di vettori:

$$X = x \frac{\partial}{\partial x} - y \frac{\partial}{\partial y}, \quad Y = x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}, \quad Z = \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \in \chi(\mathbb{R}^2).$$

Nel caso siano completi calcolare il loro gruppo di diffeomorfismi ad un parametro.

7. Dimostrare che il campo di vettori $X = \frac{\partial}{\partial x} \in \chi(\mathbb{R}^2 \setminus (0, 0))$ non è completo.
8. Sia M una varietà differenziabile e $X \in \chi(M)$ tale che $X_p = 0$ per ogni $p \in M$. Dimostrare che la curva integrale di X che inizia in p è la curva costante $c(t) = p$.
9. Sia M una varietà differenziabile e $X \in \chi(M)$ il campo di vettori nullo, $X = 0$. Descrivere il gruppo dei diffeomorfismi ad un parametro associato a X .
10. Sia $F : N \rightarrow M$ un diffeomorfismo tra varietà differenziabili, $X \in \chi(N)$ e $f \in C^\infty(N)$. Dimostrare che

$$F_*(fX) = (f \circ F^{-1})F_*X.$$