

SOLUSI PART 4

Creative Problem Solving in School Mathematics

1. Nilai dari $\sin 18^\circ$ adalah

Solusi:

$$x = 18^\circ$$

$$5x = 90^\circ$$

$$2x = 90^\circ - 3x$$

$$\sin 2x = \sin(90^\circ - 3x)$$

$$\sin 2x = \cos 3x$$

$$2 \sin x \cos x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x, \text{ dengan } \cos x > 0$$

$$2 \sin x = 4 \cos^2 x - 3$$

$$2 \sin x = 4(1 - \sin^2 x) - 3$$

$$4 \sin^2 x + 2 \sin x - 1 = 0$$

$$\sin x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 16}}{8} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{4}$$

$$\text{Karena } \sin x > 0, \text{ maka } \sin x = \frac{-1 + \sqrt{5}}{4}$$

$$\therefore \sin 18^\circ = \frac{1}{4}(\sqrt{5} - 1)$$

2. Jika $0^\circ \leq x \leq 90^\circ$ dan $\cos \theta - \sin \theta = \frac{\sqrt{5}}{3}$, maka nilai dari $\cos \theta + \sin \theta$ adalah

Solusi:

$$\cos \theta - \sin \theta = \frac{\sqrt{5}}{3} \text{ (kedua ruas dikuadratkan)}$$

$$\cos 2\theta + \sin^2 \theta - 2 \cos \theta \sin \theta = \frac{5}{9}$$

$$1 - \sin 2\theta = \frac{5}{9}$$

$$\sin 2\theta = \frac{4}{9}$$

$$\cos 2\theta = \sqrt{1 - \sin^2 2\theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{4}{9}\right)^2} = \frac{1}{9}\sqrt{65}$$

$$\cos \theta + \sin \theta = \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{\cos \theta - \sin \theta} = \frac{\cos 2\theta}{\cos \theta - \sin \theta} = \frac{\frac{1}{9}\sqrt{65}}{\frac{\sqrt{5}}{3}} = \frac{1}{3}\sqrt{13}$$


3. Dalam segitiga ABC , $\angle ACB = 3\angle BAC$, $BC = 5$, $AB = 11$. Panjang AC adalah

Solusi:

Alternatif 1:

$$\text{Menurut aturan Sinus: } \frac{5}{\sin x} = \frac{11}{\sin 3x} = \frac{AC}{\sin(180^\circ - 4x)}$$

$$\frac{5}{\sin x} = \frac{11}{\sin 3x} = \frac{AC}{\sin 4x}$$



$$\frac{5}{\sin x} = \frac{11}{\sin 3x}$$

$$5 \sin 3x = 11 \sin x$$

$$5(3 \sin x - 4 \sin^3 x) = 11 \sin x \quad (x \text{ sudut lancip dan } \sin x \neq 0)$$

$$15 - 20 \sin^2 x = 11$$

$$20 \sin^2 x = 4$$

$$\sin^2 x = \frac{1}{5}$$

$$\sin x = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\cos x = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\frac{5}{\sin x} = \frac{AC}{\sin 4x}$$

$$AC = \frac{5 \sin 4x}{\sin x} = \frac{10 \sin 2x \cos 2x}{\sin x} = \frac{20 \sin x \cos x (1 - 2 \sin^2 x)}{\sin x} = 20 \cos x (1 - 2 \sin^2 x)$$

$$= 20 \times \frac{2}{\sqrt{5}} \left\{ 1 - 2 \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \right)^2 \right\} = \frac{40}{\sqrt{5}} \left(1 - \frac{2}{5} \right) = \frac{24}{5} \sqrt{5}$$

Alternatif 2:

Tarik garis CD , dengan titik D pada AB , sehingga $\angle ACD = \angle BAC = x$.

Jadi, segitiga ACD sama kaki.

$$\angle CDB = \angle DAC + \angle ACD = x + x = 2x.$$

Jadi, segitiga BDC sama kaki.

$$BC = BD = 5$$

$$AD = 11 - 5 = 6$$


$$AD = CD = 6$$

Perhatikan segitiga DBC .

$$\cos \angle DBC = \frac{5^2 + 5^2 - 6^2}{2 \cdot 5 \cdot 5} = \frac{25 + 25 - 36}{2 \cdot 5 \cdot 5} = \frac{7}{25}$$

$$AC^2 = 11^2 + 5^2 - 2 \cdot 11 \cdot 5 \cdot \cos \angle DBC = 121 + 25 - 110 \times \frac{7}{25} = \frac{576}{5}$$

$$AC = \sqrt{\frac{576}{5}} = \frac{24}{5} \sqrt{5}$$



4. Jika $\cos \phi = \frac{1}{7}$ dan $\sin \phi = \frac{3}{14} \sqrt{3}$, maka nilai $\phi - \phi = \dots$

Solusi:

$$\sin \phi = \sqrt{1 - \cos^2 \phi} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{7} \right)^2} = \frac{4}{7} \sqrt{3}$$


$$\cos \phi = \sqrt{1 - \sin^2 \phi} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{14} \sqrt{3} \right)^2} = \frac{13}{14}$$

$$\cos(\phi - \phi) = \cos \phi \cos \phi + \sin \phi \sin \phi$$

$$\cos(\phi - \phi) = \frac{1}{7} \times \frac{13}{14} + \frac{4}{7} \sqrt{3} \times \frac{3}{14} \sqrt{3} = \frac{1}{98} (13 + 36) = \frac{1}{2}$$

$$\phi - \phi = 60^\circ$$

5. Pada gambar dua lingkaran masing-masing berjari-jari 8 cm dan 6 cm dan pusatnya berjarak 12 cm. Melalui sebuah titik perpotongan P , sebuah garis digambarkan sehingga tali busur QP dan PR sama panjang. Panjang tali busur PQ adalah



Solusi:

Karena $PQ = PR$, maka $8\cos\alpha = 6\cos\beta$.

$$\cos\gamma = \frac{8^2 + 6^2 - 12^2}{2 \cdot 8 \cdot 6} = -\frac{11}{24}$$

$$\cos\gamma = \cos\{180^\circ - (\alpha + \beta)\} = -\frac{11}{24}$$

$$\cos\gamma = -\cos(\alpha + \beta) = -\frac{11}{24}$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \frac{11}{24}$$

$$\cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta = \frac{11}{24}$$

$$\frac{6}{8} \cos\beta \times \cos\beta - \sqrt{1 - \cos^2\alpha} \times \sqrt{1 - \cos^2\beta} = \frac{11}{24}$$

$$\frac{3}{4} \cos^2\beta - \sqrt{1 - \left(\frac{6}{8} \cos\beta\right)^2} \times \sqrt{1 - \cos^2\beta} = \frac{11}{24}$$

$$\frac{3}{4} \cos^2\beta - \sqrt{1 - \frac{9}{16} \cos^2\beta} \times \sqrt{1 - \cos^2\beta} = \frac{11}{24}$$

$$\frac{3}{4} \cos^2\beta - \frac{1}{4} \sqrt{16 - 9\cos^2\beta} \times \sqrt{1 - \cos^2\beta} = \frac{11}{24}$$

$$18\cos^2\beta - 6\sqrt{16 - 25\cos^2\beta} + 9\cos^4\beta = 11$$

$$18\cos^2\beta - 11 = 6\sqrt{16 - 25\cos^2\beta} + 9\cos^4\beta$$


$$324\cos^4\beta - 396\cos^2\beta + 121 = 36(16 - 25\cos^2\beta + 9\cos^4\beta)$$

$$324\cos^4\beta - 396\cos^2\beta + 121 = 576 - 900\cos^2\beta + 324\cos^4\beta$$

$$504\cos^2\beta = 455$$

$$\cos\beta = \sqrt{\frac{455}{504}} = \sqrt{\frac{65}{72}}$$

$$PQ = 2 \times 6 \cos\beta = 2 \times 6 \sqrt{\frac{65}{72}} = \sqrt{130} \text{ cm}$$




6. Dalam segitiga ABC , $AB = 8 \text{ cm}$, $BC = 6 \text{ cm}$, dan $\angle ABC = 90^\circ$. Jika garis bagi $\angle ACB$ memotong AB di R dan $CR = 3\sqrt{a} \text{ cm}$, maka nilai dari a adalah

Solusi:

$$\tan 2\theta = \frac{8}{6}$$

$$\frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} = \frac{4}{3}$$

$$3 \tan \theta = 2 - 2 \tan^2 \theta$$



$$2 \tan^2 \theta + 3 \tan \theta - 2 = 0$$

$$(2 \tan \theta - 1)(\tan \theta + 2) = 0$$

$$\tan \theta = \frac{1}{2} \text{ (diterima) atau } \tan \theta = -2 \text{ (ditolak)}$$

$$\tan \theta = \frac{1}{2} = \frac{RB}{6}$$

$$RB = 3 \text{ cm}$$

$$CR^2 = RB^2 + BC^2$$

$$(3\sqrt{a})^2 = 3^2 + 6^2$$

$$9a = 9 + 36$$

$$a = 5$$

7. Jika nilai minimum fungsi $f(x) = 4 \cos x + p \sin x + 8$ adalah 2, maka nilai maksimum fungsi tersebut adalah

Solusi:

$$f(x) = a \cos x + b \sin x + c$$

$$\frac{f(x)}{a} = \cos x + \frac{b}{a} \sin x + \frac{c}{a} \text{ (ambil } \tan \theta = \frac{b}{a}, \text{ maka } \cos \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \text{)}$$

$$\frac{f(x)}{a} = \cos x + \tan \theta \sin x + \frac{c}{a}$$

$$\frac{f(x)}{a} = \cos x + \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \sin x + \frac{c}{a}$$

$$\frac{f(x)}{a} \times \cos \theta = \cos x \cos \theta + \sin x \sin \theta + \frac{c}{a} \times \cos \theta$$

$$\frac{f(x)}{a} \times \cos \theta = \cos(x - \theta) + \frac{c}{a} \times \cos \theta$$

$$f(x) = \frac{a}{\cos \theta} \times \cos(x - \theta) + c$$

$$f(x) = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \times \cos(x - \theta) + c$$

$$f(x) = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(x - \theta) + c$$

Nilai minimum fungsi f adalah $\sqrt{a^2 + b^2} + c$ yang dicapai untuk $\cos(x - \theta) = -1$ dan nilai maksimum

fungsi f adalah $-\sqrt{a^2 + b^2} + c$ yang dicapai untuk $\cos(x - \theta) = 1$.

Nilai minimum fungsi $f(x) = 4 \cos x + p \sin x + 8$ adalah 2.

$$-\sqrt{4^2 + p^2} + 8 = 2$$

$$\sqrt{16 + p^2} = 6$$

$$16 + p^2 = 36$$

$$p^2 = 20$$

Nilai maksimum fungsi $f(x) = 4 \cos x + p \sin x + 8$ adalah

$$\sqrt{4^2 + p^2} + 8 = \sqrt{16 + 20} + 8 = 6 + 8 = 14$$

8. Jika nilai maksimum $\frac{m}{15 \sin x - 8 \cos x + 25}$ adalah 2, maka nilai m adalah

Solusi:

$$\frac{m}{-\sqrt{15^2 + (-8)^2} + 25} = 2$$

$$\frac{m}{-17 + 25} = 2$$

$$m = 16$$

9. Diberikan $5\cos x + 12\cos y = 13$, nilai maksimum dari $5\sin x + 12\sin y$ adalah

Solusi:

$$(5\cos x + 12\cos y)^2 = 13^2$$

$$(5\cos x + 12\cos y)^2 + (5\sin x + 12\sin y)^2 = 13^2 + (5\sin x + 12\sin y)^2$$

$$25(\cos^2 x + \sin^2 x) + 144(\cos^2 y + \sin^2 y) + 120(\cos x \cos y + \sin x \sin y)$$

$$= 13^2 + (5\sin x + 12\sin y)^2$$

$$25 + 144 + 120\cos(x - y) = 169 + (5\sin x + 12\sin y)^2$$


$$120\cos(x - y) = (5\sin x + 12\sin y)^2$$

$$5\sin x + 12\sin y = \sqrt{120\cos(x - y)}$$

Persamaan terakhir akan menjadikan $5\sin x + 12\sin y$ mempunyai nilai maksimum, jika $\cos(x - y) = 1$.

Jadi, nilai maksimum $5\sin x + 12\sin y$ adalah $\sqrt{120 \cdot 1} = 2\sqrt{30}$.

10. Jari-jari lingkaran adalah $\sqrt{50}$ satuan, panjang AB adalah 6 satuan, dan panjang BC adalah 2 satuan. Sudut ABC adalah siku-siku. Kuadrat jarak dari B ke pusat lingkaran adalah



Solusi:

Alternatif 1:

$$AC = \sqrt{BC^2 + AB^2} = \sqrt{6^2 + 2^2} = \sqrt{40}$$

$$\sin \beta = \frac{2}{\sqrt{40}}$$

$$\cos \beta = \frac{6}{\sqrt{40}}$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \frac{OA^2 + AC^2 - OC^2}{2 \times OA \times AC}$$


$$\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \frac{(\sqrt{50})^2 + (\sqrt{40})^2 - (\sqrt{50})^2}{2 \times \sqrt{50} \times \sqrt{40}}$$

$$\frac{6}{\sqrt{40}} \cos \alpha - \frac{2}{\sqrt{40}} \sin \alpha = \frac{40}{40\sqrt{5}}$$

$$6\cos \alpha - 2\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} \times \sqrt{40}$$

$$6\cos \alpha - 2\sin \alpha = \sqrt{8}$$

$$3\cos \alpha - \sin \alpha = \sqrt{2}$$



$$3\cos\alpha - \sqrt{1 - \cos^2\alpha} = \sqrt{2}$$

$$3\cos\alpha - \sqrt{2} = \sqrt{1 - \cos^2\alpha}$$

$$9\cos^2\alpha - 6\sqrt{2}\cos\alpha + 2 = 1 - \cos^2\alpha$$

$$10\cos^2\alpha - 6\sqrt{2}\cos\alpha + 1 = 0$$

$$\cos\alpha = \frac{6\sqrt{2} \pm \sqrt{72 - 40}}{20} = \frac{6\sqrt{2} \pm 4\sqrt{2}}{20}$$

$$\cos\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ (diterima) atau } \cos\alpha = \frac{\sqrt{2}}{10} \text{ (ditolak)}$$

Perhatikan segitiga AOB :

$$OB^2 = OA^2 + AB^2 - 2 \times OA \times AB \times \cos\alpha$$

$$OB^2 = (\sqrt{50})^2 + 6^2 - 2 \times \sqrt{50} \times 6 \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$OB^2 = 50 + 36 - 60$$

$$OB^2 = 26$$

Jadi, kuadrat jarak dari B ke pusat lingkaran adalah 26 satuan.

Alternatif 2:

Ambillah $OD = y$ dan $BD = x$, maka $AD = 6 - x$.

$$OE = BD = x \text{ dan } BE = y$$

$$OD^2 = OA^2 - AD^2$$

$$y^2 = 50 - (6 - x)^2$$

$$y^2 = 50 - 36 + 12x - x^2$$

$$x^2 + y^2 = 12x + 14 \dots\dots\dots (1)$$

$$OC^2 = OE^2 + EC^2$$

$$50 = x^2 + (2 + y)^2$$

$$50 = x^2 + 4 + 4y + y^2$$

$$x^2 + y^2 = 46 - 4y \dots\dots\dots (2)$$

Dari persamaan (1) dan (2) diperoleh:

$$12x + 14 = 46 - 4y$$

$$4y = 32 - 12x$$

$$y = 8 - 3x$$

$$y = 8 - 3x \rightarrow x^2 + y^2 = 12x + 14$$

$$x^2 + (8 - 3x)^2 = 12x + 14$$

$$x^2 + 64 - 48x + 9x^2 = 12x + 14$$

$$10x^2 - 60x + 50 = 0$$

$$x^2 - 6x + 5 = 0$$

$$(x - 5)(x - 1) = 0$$

$$x = 5 \text{ (ditolak) atau } x = 1 \text{ (diterima)}$$

$$x = 1 \rightarrow y = 8 - 3x = 8 - 3 \times 1 = 5$$

$$OB^2 = x^2 + y^2 = 1^2 + 5^2 = 26$$

Jadi, kuadrat jarak dari B ke pusat lingkaran adalah 26 satuan.


Alternatif 3:

$$OB^2 - BD^2 = OD^2 \dots\dots (1)$$

$$OA^2 - AD^2 = OD^2 \dots\dots (2)$$

Dari persamaan (1) dan (2) diperoleh:

$$OB^2 - BD^2 = OA^2 - AD^2$$



$$OB^2 - x^2 = (\sqrt{50})^2 - (6-x)^2$$

$$OB^2 - x^2 = 50 - 36 + 12x - x^2$$

$$OB^2 = 14 + 12x$$

Karena $OB <$ jari-jari OA , maka diambil $x = 1$ (?), sehingga diperoleh

$$OB^2 = 14 + 12 \cdot 1 = 26.$$

Jadi, kuadrat jarak dari B ke pusat lingkaran adalah 26 satuan.

11. Diketahui trapesium $ABCD$, dengan $AB \parallel CD$, $AB \perp CB$, $BC \perp DC$, $AD = \sqrt{1001}$ cm, dan $AB = \sqrt{11}$ cm. Panjang BC adalah

Solusi:

Alternatif 1:

Ambillah $OA = a$ dan $OB = ar$

Perhatikan $\triangle AOB \sim \triangle BOC$

$$\frac{OA}{OB} = \frac{OB}{OC}$$

$$\frac{a}{ar} = \frac{ar}{OC}$$

$$OC = ar^2$$

Perhatikan $\triangle BOC \sim \triangle COD$

$$\frac{OB}{OC} = \frac{OC}{OD}$$

$$\frac{ar}{ar^2} = \frac{ar^2}{OD}$$

$$OD = ar^3$$

Perhatikan $\triangle AOB$:

$$AB = \sqrt{OA^2 + OB^2} = \sqrt{a^2 + (ar)^2} = a\sqrt{1 + r^2}$$

Perhatikan $\triangle AOD$:

$$AD = \sqrt{OA^2 + OD^2} = \sqrt{a^2 + (ar^3)^2} = a\sqrt{1 + r^6}$$

$$\frac{AD^2}{AB^2} = \frac{(\sqrt{1001})^2}{(\sqrt{11})^2}$$

$$\frac{a^2 + a^2 r^6}{a^2 + a^2 r^2} = \frac{1001}{11}$$

$$\frac{1 + r^6}{1 + r^2} = 91$$

$$\frac{(1 + r^2)(1 - r^2 + r^4)}{1 + r^2} = 91$$

$$1 - r^2 + r^4 = 91$$

$$r^4 - r^2 - 90 = 0$$

$$(r^2 - 10)(r^2 + 9) = 0$$

$$r^2 = 10 \text{ atau } r^2 = -9 \text{ (ditolak)}$$

$$r^2 = 10 \rightarrow AB = a\sqrt{1 + r^2} = \sqrt{11}$$


$$a\sqrt{1 + 10} = \sqrt{11}$$

$$a = 1$$

Perhatikan $\triangle BOC$:

$$BC = \sqrt{OB^2 + OC^2} = \sqrt{(ar)^2 + (ar^2)^2} = \sqrt{(1 \cdot \sqrt{10})^2 + (1 \cdot 10)^2} = \sqrt{110} \text{ cm.}$$

Alternatif 2:



$$\text{Gradien } m_{BD} = \frac{d}{c}$$

$$\text{Gradien } m_{AC} = \frac{\sqrt{11}}{-c}$$

$$AC \perp BD$$

$$m_{AC} \times m_{BD} = -1$$

$$\frac{\sqrt{11}}{-c} \times \frac{d}{c} = -1$$

$$c^2 = d\sqrt{11}$$

$$AD^2 = c^2 + (\sqrt{11} - d)^2$$

$$(\sqrt{1001})^2 = c^2 + \left(\sqrt{11} - \frac{c^2}{\sqrt{11}} \right)^2$$

$$1001 = c^2 + 11 - 2c^2 + \frac{c^4}{11}$$

$$0 = -990 - c^2 + \frac{c^4}{11}$$

$$c^4 - 11c^2 - 10890 = 0$$

$$(c^2 - 110)(c^2 + 99) = 0$$

$$c^2 = 110 \text{ (diterima) atau } c^2 = -99 \text{ (ditolak)}$$

$$c = \sqrt{110}$$

Jadi, panjang BC adalah $\sqrt{110}$ cm.

