


## 8 Selección del Modelo



## Contenido

## 1 Introducción

- Selección de variables

## 2 Especificación incorrecta del modelo

- Subespecificación:
- Sobrespecificación:

### 3 Criterios para evaluar modelos con subconjuntos de variables

- Coeficiente de determinación múltiple  $R^2$  y ajustado  $R^2_{adj}$
- Error cuadrático medio (ECM) y  $C_p$  de Mallows
- Criterio de Akaike (AIC) y Error de predicción (PRESS)

#### 4 Procedimientos computacionales

- Todos los posibles regresores y búsqueda directa en  $t$
- Regresión por pasos:  $F$ -parcial y AIC
- Ejemplo

### 5 Importancia relativa de los regresores

- Coeficientes beta
- Ejemplo

## Selección de variables

En la mayoría de los casos prácticos el analista tiene una base de posibles regresores candidatos para explicar/ajustar la variable respuesta bajo estudio.

Elegir el subconjunto de regresores que finalmente modelen la respuesta es el *problema de selección de variables (modelos)*.

En el proceso de elegir el modelo más adecuado uno considera que, a mayor sea el número de regresores, se tendrá una “*mejor explicación*” de la respuesta. Por otro lado, mientras menos regresores haya en el modelo, menor será la variabilidad en la respuesta. El compromiso entre ambos es lo que se conoce como seleccionar el *mejor modelo*.

El problema de selección de variables se discute idealmente suponiendo que los regresores están en las escalas adecuadas, que no hay datos atípicos ni observaciones de influencia.

Los procedimientos que se verán a continuación son de gran ayuda pero no garantizan que se llegue al mejor modelo, que quizás no es único.

## Consecuencias de la incorrecta especificación del modelo de RLM

### Subespecificación:

Suponga que

$$\mathbb{E}[y] = X_1\beta_1 + X_2\beta_2 = X\beta$$

con  $X_{1 \times (1+p)}$  y  $X_{2 \times (r)}$ , pero que en realidad se ajusta el modelo  $y = X_1\beta_1 + \epsilon$ . Entonces,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\hat{\beta}_1] &= (X_1'X_1)^{-1}X_1'\mathbb{E}[y] \\ &= (X_1'X_1)^{-1}X_1'(X_1\beta_1 + X_2\beta_2) \\ &= \beta_1 + \underbrace{(X_1'X_1)^{-1}X_1'X_2\beta_2}_{\text{sesgo de } \beta_1} \\ &= \beta_1 + \Delta\beta_2\end{aligned}$$

y donde  $\Delta = (X_1'X_1)^{-1}X_1'X_2$  se conoce como *matriz alias*.

#### Notas:

- En esta situación  $\hat{\beta}_1$  es *insesgado* sólo si  $X_1'X_2 = 0$ . Esto es, solamente si los regresores (columnas) de  $X_1$  son *ortogonales* a los regresores de  $X_2$  (caso del *diseño de experimentos*).
- Los estimadores  $\hat{\beta}_1$  tienen la misma varianza:  $\text{var}(\hat{\beta}_1) = \sigma^2(X_1'X_1)^{-1}$ .

## Consecuencias de la incorrecta especificación del modelo de RLM

### Subespecificación:

- $s^2$  sobreestima  $\sigma^2$

$$s^2 = \frac{1}{n-q} \hat{e}'\hat{e} \quad \text{entonces} \quad \mathbb{E}[s^2] = \sigma^2 + \frac{\beta_2' X_2'(I-H)X_2\beta_2}{n-q} > \sigma^2$$

Por lo tanto **se detectan menos regresores significativos de los debidos.**

- Para el caso de la respuesta,

$$\begin{aligned} \hat{y} &= X_1(X_1'X_1)^{-1}X_1'y \\ &= X_1(X_1'X_1)^{-1}X_1'(X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + \epsilon) \\ &= X_1\beta_1 + X_1(X_1'X_1)^{-1}X_1'X_2\beta_2 + \eta \end{aligned}$$

donde  $\eta = X_1(X_1'X_1)^{-1}X_1'\epsilon$ . Entonces, puesto que  $\mathbb{E}[\eta] = 0$ , se tiene

$$\mathbb{E}[\hat{y}] = X_1\beta_1 + X_1(X_1'X_1)^{-1}X_1'X_2\beta_2 \quad \text{y} \quad \text{var}(\hat{y}) = \sigma^2 X_1(X_1'X_1)^{-1}X_1' = \sigma^2 H$$

Esto es, **la respuesta ajustada es sesgada** y para el residual  $\hat{e} = y - \hat{y}$ , se tiene que

$$\mathbb{E}[\hat{e}] = (I-H)X_2\beta_2 \quad \text{y} \quad \text{var}(\hat{e}) = \text{var}[(I-H)y] = \sigma^2(I-H)$$

**la subestimación sesga los residuales  $\hat{e}$  pero no afecta la varianza.**

## Consecuencias de la incorrecta especificación del modelo de RLM

### Sobre-especificación:

Por otro lado, supongamos ahora que ajustamos el modelo

$$y = X_1\beta_1 + X_2\beta_2 = X\beta + \epsilon$$

pero que en realidad  $\mathbb{E}[y] = X_1\beta_1$ . Entonces,

$$\mathbb{E}[\hat{\beta}] = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad y \quad \mathbb{E}[\hat{y}] = X_1\beta_1$$

Esto es, **el estimador  $\hat{\beta}$  es insesgado, al igual que  $\hat{y}$ , la respuesta ajustada**. Sin embargo, se tiene que

$$(X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} (X_1'X_1)^{-1} + LML' & -LM \\ -ML' & M \end{pmatrix}$$

con  $M = I - H$  y  $L = (X_1'X_1)^{-1}X_1'X_2$ . Luego,

$$\text{varianza "aparente"}(\hat{\beta}_i) = \text{varianza "real"}(\hat{\beta}_i) + (LML)_{ii}$$

Esto es, **la varianza de  $\hat{\beta}_1$  esta "inflada" ( $LML' > 0$ ), y por lo tanto se notarían menos regresores significativos de los debidos**.

## Criterios para evaluar modelos con subconjuntos de variables

Supóngase que hay una base de  $K$  posibles variables independientes o regresores para ser incluidos en el modelo de regresión lineal

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_p x_{ip} + \epsilon_i; \quad i = 1, \dots, n$$

### 1. Coeficiente de determinación múltiple

$$R^2_{(q)} = \frac{SC_{\text{Reg}}(\beta_{(q)})}{SC_{\text{Tot}}}$$

- Hay  $\binom{K}{p}$  distintas combinaciones que incluyen  $p = q - 1$  regresores.
- $R^2_{(q)}$  necesariamente crece con  $q$ .
- $R^2$  indica el porcentaje de la variación explicado por la regresión (siempre que incluya el término constante  $\beta_0$ ).

### 2. Coeficiente de determinación múltiple ajustado

$$\bar{R}^2_{(q)} = 1 - \frac{n-1}{n-q} (1 - R^2_{(q)})$$

- No necesariamente aumenta al aumentar  $q$ .
- En casos extremos  $\bar{R}^2$  puede ser negativo.

## Criterios para evaluar modelos con subconjuntos de variables

### 3. Error cuadrático medio (ECM)

$$\text{ECM}_{(q)} = \frac{\text{SC}_{\text{Res}}(q)}{n - q} = s_q^2$$

- Aquel subconjunto de  $p$  regresores que minimiza  $\text{ECM}_{(q)}$ , maximiza  $R^2_{(q)}$ .

### 4. $C_p$ de Mallows

$$C_p = \frac{\text{SC}_{\text{Res}}(p)}{\hat{\sigma}^2} - n + 2(p+1)$$

- Si el modelo de  $p$  regresores tiene un sesgo despreciable, entonces

$$\mathbb{E}[C_p | \text{Sesgo} = 0] = \frac{(n - (p+1))\sigma^2}{\sigma^2} - n + 2(p+1) = p+1,$$

donde  $\hat{\sigma}^2$  es  $\text{CM}_{\text{Res}}$  del modelo completo.

- Elija aquel modelo de  $p$  regresores “*más cercano a la recta*”.
- Elija aquel modelo con mínimo  $C_p$ .



## Criterios para evaluar modelos con subconjuntos de variables

### 5. Criterio de Información de Akaike (AIC)

Si la varianza es desconocida,

$$AIC = n \log \left( \frac{SC_{Res}}{n} \right) + 2p + cte.$$

Si la varianza es conocida, AIC es equivalente a  $C_p$  de Mallows.

- Elija aquel modelo con menor AIC.

### 6. Suma de cuadrados de los errores de predicción (PRESS)

Si el modelo se desea para predicción, elija aquel que minimice el PRESS:

$$PRESS_{(p)} = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_{(i)})^2 = \sum_{i=1}^n \left( \frac{\hat{e}_i}{1 - h_{ii}} \right)^2$$

## Procedimientos computacionales

### 1. Todas las posibles regresiones

Si hay  $K$  regresores potenciales, entonces hay  $2^K$  distintos modelos de regresión lineal.

$$y = \beta_0 + \epsilon$$

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \epsilon$$

$$\vdots$$

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_K + \epsilon$$

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \epsilon$$

$$\vdots$$

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_{K-1} + \beta_2 x_K + \epsilon$$

$$\vdots$$

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_K x_K + \epsilon$$

### 2. Búsqueda directa en $t$ Ajuste el modelo

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_K x_K + \epsilon$$

y quédese con aquellos regresores con más grande

$$t_j = \frac{\hat{\beta}_j}{\text{ee}(\hat{\beta}_j)}, \quad j = 1, \dots, K$$

### 3. Regresión por pasos - Criterio $F$ -parcial

- 1 **Selección hacia adelante.** Se selecciona aquel regresor  $x_j$  con máxima correlación con la respuesta  $y$ . Después, se elige aquel regresor con máxima correlación con el residual de la primer regresión,  $r_1 = y - \hat{\alpha}_0 - \hat{\alpha}_1 x_j$ . Se continua así hasta que el regresor por entrar no tenga un valor mínimo de  $F$ -parcial ( $F_{in}$ ).
- 2 **Selección hacia atrás.** Se incluyen los  $K$  regresores y se eliminan aquellos con mínima  $|t_j|$  hasta que el siguiente candidato tenga un valor de  $F$ -parcial (ó  $t$ ) mínimo. ( $F_{out}$ ).
- 3 **Selección a pasos.** A cada paso se revisan todos los regresores. Puede suceder que un regresor que ya haya sido incluido en el modelo termine excluido del mismo.

### 4. Regresión por pasos - Criterio de Akaike (AIC)

Similar a los procedimientos anteriores, se busca eficientemente el modelo con el menor AIC.

**Los distintos criterios no terminan necesariamente con los mismos modelos.**

## Ejemplo: Datos sobre cemento de Hald<sup>1</sup>

El siguiente juego de datos es sobre el endurecimiento de cemento Portland, famoso por su nada fácil modelación.

| variable | concepto   |
|----------|--|
| $x_1$    | Cantidad de tricalcio de aluminato, $3 \text{ CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ .                                    |
| $x_2$    | Cantidad de tricalcio de silicato, $3 \text{ CaO} \cdot \text{SiO}_2$ .  |
| $x_3$    | Cantidad de tricalcio de aluminio ferrito, $4 \text{ CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_2$ . |
| $x_4$    | Cantidad de dicalcio de silicato, $2 \text{ CaO} \cdot \text{SiO}_2$ .   |
| $y$      | Calor en calorías por gramo de cemento.  |

Los regresores,  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  son medidos como porcentaje del peso de las *ollas* donde se hace el cemento.

| obs | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $y$   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | 7     | 26    | 6     | 60    | 78.5  |
| 2   | 1     | 29    | 15    | 52    | 74.3  |
| 3   | 11    | 56    | 8     | 20    | 104.3 |
| 4   | 11    | 31    | 8     | 47    | 87.6  |
| 5   | 7     | 52    | 6     | 33    | 95.9  |
| 6   | 11    | 55    | 9     | 22    | 109.2 |
| 7   | 3     | 71    | 17    | 6     | 102.7 |
| 8   | 1     | 31    | 22    | 44    | 72.5  |
| 9   | 2     | 54    | 18    | 22    | 93.1  |
| 10  | 21    | 47    | 4     | 26    | 115.9 |
| 11  | 1     | 40    | 23    | 34    | 83.8  |
| 12  | 11    | 66    | 9     | 12    | 113.3 |
| 13  | 10    | 68    | 8     | 12    | 109.4 |

<sup>1</sup>Draper & Smith (1998).

## Ejemplo: Datos sobre cemento de Hald (cont.)

### Criterios para la selección de modelos

| $k$ | $p$ | $q$ | Estadísticos |        |       |             |        |        | Coeficientes    |                 |                 |                 |                 |
|-----|-----|-----|--------------|--------|-------|-------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |     |     | $s$          | $S^2$  | $R^2$ | $\bar{R}^2$ | $C_p$  | AIC    | $\hat{\beta}_0$ | $\hat{\beta}_1$ | $\hat{\beta}_2$ | $\hat{\beta}_3$ | $\hat{\beta}_4$ |
| 1   | 0   | 1   | 15.04        | 226.31 | .     | .           | 442.92 | .      | 95.42           | .               | .               | .               | .               |
| 2   | 1   | 2   | 10.73        | 115.06 | 0.53  | 0.49        | 202.55 | 102.41 | 81.48           | 1.869           | .               | .               | .               |
| 3   | 1   | 2   | 9.08         | 82.39  | 0.67  | 0.64        | 142.49 | 98.07  | 57.42           | .               | 0.789           | .               | .               |
| 4   | 1   | 2   | 13.28        | 176.31 | 0.29  | 0.22        | 315.15 | 107.96 | 110.20          | .               | .               | -1.256          | .               |
| 5   | 1   | 2   | 8.96         | 80.35  | 0.67  | 0.64        | 138.73 | 97.74  | 117.57          | .               | .               | .               | -0.738          |
| 6   | 2   | 3   | 2.41         | 5.79   | 0.98  | 0.97        | 2.68   | 64.31  | 52.58           | 1.468           | 0.662           | .               | .               |
| 7   | 2   | 3   | 11.08        | 122.71 | 0.55  | 0.46        | 198.09 | 104.01 | 72.34           | 2.312           | .               | 0.494           | .               |
| 8   | 2   | 3   | 2.73         | 7.48   | 0.97  | 0.97        | 5.50   | 67.63  | 103.10          | 1.400           | .               | .               | -0.614          |
| 9   | 2   | 3   | 6.45         | 41.54  | 0.85  | 0.82        | 62.44  | 89.93  | 72.08           | .               | 0.731           | -1.008          | .               |
| 10  | 2   | 3   | 9.32         | 86.89  | 0.68  | 0.62        | 138.23 | 99.52  | 94.16           | .               | 0.311           | .               | -0.457          |
| 11  | 2   | 3   | 4.19         | 17.57  | 0.94  | 0.92        | 22.37  | 78.74  | 131.28          | .               | .               | -1.200          | -0.724          |
| 12  | 3   | 4   | 2.31         | 5.35   | 0.98  | 0.98        | 3.04   | 63.90  | 48.19           | 1.696           | 0.657           | 0.250           | .               |
| 13  | 3   | 4   | 2.31         | 5.33   | 0.98  | 0.98        | 3.02   | 63.87  | 71.65           | 1.452           | 0.416           | .               | -0.237          |
| 14  | 3   | 4   | 2.38         | 5.65   | 0.98  | 0.98        | 3.50   | 64.62  | 203.64          | .               | -0.923          | -1.448          | -1.557          |
| 15  | 3   | 4   | 2.86         | 8.20   | 0.97  | 0.96        | 7.34   | 69.47  | 111.68          | 1.052           | .               | -0.410          | -0.643          |
| 16  | 4   | 5   | 2.45         | 5.98   | 0.98  | 0.97        | 5.00   | 65.84  | 62.41           | 1.551           | 0.510           | 0.102           | -0.144          |

### Ejemplo: Datos sobre cemento de Hald (cont.)

### Regresión por pasos - criterio Akaike (AIC)

## Función stepAIC del paquete MASS

El paquete *MASS* de R ofrece la búsqueda de “el mejor modelo” lineal (y otras familias) con base en el *criterio de Akaike*.

La función `stepAIC` es la utilizada para la selección del modelo.

```
R > dat <- read.table('../data/Hald.dat', header=TRUE)
R > names(dat) <- c("C1", "C2", "C3", "C4", "Y")
R > modAIC <- stepAIC(lm(Y~1,data=dat), scope=Y~C1+C2+C3+C4,
                      direction=c("both","forward","backward")[2], trace=3)
```

## Ejemplo: Datos sobre cemento de Hald (cont.)

## Función stepAIC

Start: AIC=71.44

Y ~ 1

|        | Df | Sum of Sq | RSS     | AIC    |
|--------|----|-----------|---------|--------|
| + C4   | 1  | 1831.90   | 883.87  | 58.852 |
| + C2   | 1  | 1809.43   | 906.34  | 59.178 |
| + C1   | 1  | 1450.08   | 1265.69 | 63.519 |
| + C3   | 1  | 776.36    | 1939.40 | 69.067 |
| <none> |    |           | 2715.76 | 71.444 |

Step: AIC=58.85

Y ~ C4

|        | Df | Sum of Sq | RSS    | AIC    |
|--------|----|-----------|--------|--------|
| + C1   | 1  | 809.10    | 74.76  | 28.742 |
| + C3   | 1  | 708.13    | 175.74 | 39.853 |
| <none> |    |           | 883.87 | 58.852 |
| + C2   | 1  | 14.99     | 868.88 | 60.629 |

Step: AIC=28.74

Y ~ C4 + C1

|        | Df | Sum of Sq | RSS    | AIC    |
|--------|----|-----------|--------|--------|
| + C2   | 1  | 26.789    | 47.973 | 24.974 |
| + C3   | 1  | 23.926    | 50.836 | 25.728 |
| <none> |    |           | 74.762 | 28.742 |

Step: AIC=24.97

Y ~ C4 + C1 + C2

|        | Df | Sum of Sq | RSS    | AIC    |
|--------|----|-----------|--------|--------|
| <none> |    |           | 47.973 | 24.974 |
| + C3   | 1  | 0.10909   | 47.864 | 26.944 |

## Ejemplo: Datos sobre cemento de Hald (cont.)

### Modelo seleccionado mediante criterio AIC

```
R > print(summary(modAIC))
```

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 71.6483 14.1424 5.066 0.000675

x4 -0.2365 0.1733 -1.365 0.205395

x1 1.4519 0.1170 12.410 5.78e-07

x2 0.4161 0.1856 2.242 0.051687

Residual standard error: 2.309 on 9 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9823, Adjusted R-squared: 0.9764

F-statistic: 166.8 on 3 and 9 DF, p-value: 3.323e-08

```
R > print(anova(modAIC))
```

Analysis of Variance Table



Response: Y

|           | Df | Sum Sq  | Mean Sq | F value  | Pr(>F)    |
|-----------|----|---------|---------|----------|-----------|
| x4        | 1  | 1831.90 | 1831.90 | 343.6758 | 1.771e-08 |
| x1        | 1  | 809.10  | 809.10  | 151.7934 | 6.150e-07 |
| x2        | 1  | 26.79   | 26.79   | 5.0259   | 0.05169   |
| Residuals | 9  | 47.97   | 5.33    |          |           |



## Ejemplo: Datos sobre cemento de Hald (cont.)

### Análisis de Residuales



## Ejemplo: Datos sobre cemento de Hald (cont.)

### Modelo seleccionado mediante criterio $C_p$ de Mallows

```
R > print(summary(mod2Reg))
```

Coefficients:

|             | Estimate | Std. Error | t value | Pr(> t ) |
|-------------|----------|------------|---------|----------|
| (Intercept) | 52.57735 | 2.28617    | 23.00   | 5.46e-10 |
| x1          | 1.46831  | 0.12130    | 12.11   | 2.69e-07 |
| x2          | 0.66225  | 0.04585    | 14.44   | 5.03e-08 |

Residual standard error: 2.406 on 10 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9787, Adjusted R-squared: 0.9744

F-statistic: 229.5 on 2 and 10 DF, p-value: 4.407e-09

```
R > print(anova(mod2Reg))
```


Analysis of Variance Table

Response: y

|           | Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F)    |
|-----------|----|--------|---------|---------|-----------|
| x1        | 1  | 1450.1 | 1450.08 | 250.43  | 2.088e-08 |
| x2        | 1  | 1207.8 | 1207.78 | 208.58  | 5.029e-08 |
| Residuals | 10 | 57.9   | 5.79    |         |           |

## Ejemplo: Datos sobre cemento de Hald (cont.)

### Análisis de Residuales



### Coeficientes estandarizados - Coeficientes Beta

En el modelo de regresión

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_p x_{ip} + \epsilon_i; \quad i = 1, \dots, n$$

las unidades de los coeficientes  $\beta_j$  son las de la respuesta y sobre las del correspondiente regresor  $x_j$ . Luego, la *importancia relativa* de los regresores comparando la magnitud de los coeficientes es válida *solamente* si las unidades y los niveles de los regresores es la misma. Una manera de facilitar la comparación es entonces mediante la estandarización de la variable respuesta y los regresores.

Considere las variables *estandarizadas*, para  $i = 1, \dots, n$ ,

$$Y_i = \frac{y_i - \bar{y}}{s_y}; \quad X_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_{.j}}{s_{x_j}}, \quad j = 1, \dots, p$$

donde  $s_y^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$  y  $s_{x_i}^2 = \sum_{j=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{.j})^2$ .

Entonces, se tiene que  $\bar{Y} = 0$ ,  $\bar{X}_j = 0$ ,  $j = 1, \dots, p$ , y

$$\sum_{i=1}^p (Y_i - \bar{Y})^2 = 1 = \sum_{j=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_{.j})^2, \quad j = 1, \dots, p$$

## Coeficientes estandarizados - *Coeficientes Beta*

Así el modelo de regresión se puede escribir ahora como  $Y = \underline{X}B + \epsilon$ , donde

$$Y_i = B_1 X_{i1} + \cdots + B_p X_{ip} + \epsilon_i; \quad i = 1, \dots, n$$

y la importancia de los regresores se puede valorar comparando la magnitud del coeficiente estimado (MCO), donde

$$\hat{B} = (\underline{X}^T \underline{X})^{-1} \underline{X}^T Y$$

Note que el modelo no tiene término constante, pues al estar la respuesta centrada  $\hat{B}_0 = \bar{Y} = 0$ . Finalmente, para recuperar los coeficientes  $\hat{\beta}$  a partir de  $\hat{B}$ ,

$$\hat{\beta}_j = \hat{B}_j \left( \frac{s_y}{s_{x_j}} \right)^{1/2}, \quad j = 1, \dots, p$$

y

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \sum_{j=1}^p \hat{\beta}_j \bar{x}_{.j}$$

## Ejemplo: Televisión por cable (cont.)

### Coeficientes estandarizados - *Coeficientes Beta*

```
dat <- read.table("cableTV.dat",header=1)
dat$valCat <- dat$valor/1000

mod1 <- lm(renta ~ ninos + adultos + tvttot + valCat, data=dat)
print(summary(mod1)$coefficients)

cat("\n>>> Coeficientes Beta <<<\n")
library(lsr)
print(standardCoefs(mod1))
```

|             | Estimate   | Std. Error  | t value    | Pr(> t )     |
|-------------|------------|-------------|------------|--------------|
| (Intercept) | 9.8056592  | 10.32633150 | 0.9495782  | 0.3488378682 |
| ninos       | -4.9143208 | 2.73477110  | -1.7969770 | 0.0809733319 |
| adultos     | 2.6400570  | 2.44211099  | 1.0810553  | 0.2870653625 |
| tvttot      | 0.4505260  | 0.11444988  | 3.9364482  | 0.0003750645 |
| valCat      | 0.1298918  | 0.03140986  | 4.1353819  | 0.0002106499 |

```
>>> Coeficientes Beta <<<
              b      beta
ninos    -4.9143208 -0.2935141
adultos   2.6400570  0.1331888
tvttot    0.4505260  0.6115323
valCat    0.1298918  0.5646786
```