


Конспект по математическому анализу

v. 04/06 19:42



Оглавление

Вопрос 1. Метод интегрирования по частям в неопределенном интеграле	2
Вопрос 2. Метод замены переменной (подстановки) в неопределенном интеграле	3
Вопрос 3. Complex method v veschestvennom analize	4
Вопрос 4. Методы нахождения неопределенных коэффициентов	5
Вопрос 5. Интегрирование элементарных дробей IV типа	7
Вопрос 6. Метод Остроградского	9
Вопрос 7. Интегрирование дробно-линейных иррациональностей	10
Вопрос 8. Подстановки Эйлера: геометрия и алгебра	11
Вопрос 9. Дифференциальный бином Чебышёва	12
Вопрос 10. Определенный интеграл Римана	13
Вопрос 11. Нижние и верхние суммы Дарбу при изменении разбиения	15
Вопрос 12. Критерий интегрируемости в терминах сумм Дарбу	16
Вопрос 13. Интегрируемость непрерывных функций	17
Вопрос 14. Интегрируемость монотонных функций	18
Вопрос 15. Интегрируемость функций с конечным числом разрывов	19
Вопрос 16 (lucky). Свойства определенного интеграла (линейность и аддитивность)	21
Вопрос 17. Первая теорема о среднем	21
Вопрос 18. Интеграл с переменным верхним пределом	22
Вопрос 19. Формула Ньютона-Лейбница	23
Вопрос 20. Замена переменной и интегрирование по частям	24

Пятёрка 1. Вопросы 1–5

Вопрос 1. Метод интегрирования по частям в неопределённом интеграле

Проведите вывод формулы интегрирования по частям, опираясь на дифференциал произведения двух функций. Перечислите и классифицируйте три основных типа интегралов, берущихся данным методом (с примерами шаблонов для каждого типа).

Теоретическое обоснование и вывод формулы. Пусть на некотором промежутке заданы две функции $u(x)$ и $v(x)$, непрерывно дифференцируемые на этом промежутке. По правилу дифференцирования произведения, дифференциал функции $u(x)v(x)$ имеет вид:

$$d(uv) = u dv + v du$$

В силу операции интегрирования, которая является обратной к дифференцированию, непрерывные функции в правой части равенства имеют первообразные. Интегрируя левую и правую части, в силу свойства линейности неопределённого интеграла получаем:

$$\int d(uv) = \int (u dv + v du) = \int u dv + \int v du$$

По свойству неопределённого интеграла от дифференциала функции, левая часть равна uv (с точностью до константы). Таким образом:

$$uv = \int u dv + \int v du$$

Выражая интеграл $\int u dv$, получаем классическую формулу интегрирования по частям:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Смысл данной формулы заключается в том, что вычисление интеграла $\int u dv$ сводится к вычислению другого интеграла $\int v du$, который при правильном выборе функций u и v оказывается существенно проще исходного.

Классификация трех основных типов интегралов:

- Тип I (Понижение степени многочлена):** Интегралы вида $\int P_n(x)e^{ax}dx$, $\int P_n(x)\sin(bx)dx$, $\int P_n(x)\cos(bx)dx$, где $P_n(x)$ — многочлен степени n . В данном случае за u целесообразно выбирать многочлен $u = P_n(x)$, так как при его дифференцировании степень уменьшается ($du = P'_n(x)dx$), а в качестве dv берется оставшаяся тригонометрическая или показательная часть, легко интегрируемая методом табличных значений. Шаг повторяется n раз до полного исчезновения многочлена.
- Тип II (Переход к алгебраическим дробям):** Интегралы вида $\int P_n(x)\ln x dx$, $\int P_n(x)\arcsin x dx$, $\int P_n(x)\arctan x dx$. Здесь за u выбирается трансцендентная функция ($u = \ln x$ или $u = \arctan x$), поскольку операция дифференцирования превращает её в алгебраическое выражение. В качестве dv берется многочлен с дифференциалом $dv = P_n(x)dx$, интегрирование которого дает функцию v , являющуюся многочленом степени $n + 1$. После применения формулы интегрирования по частям новый интеграл представляет собой интегрирование рациональной дроби.
- Тип III (Циклические интегралы):** Интегралы вида $\int e^{ax}\sin(bx)dx$ и $\int e^{ax}\cos(bx)dx$. Особенность данного типа заключается в том, что ни показательная, ни тригонометрическая функции не упрощаются при дифференцировании или интегрировании. Применяя формулу по частям дважды (выбирая на каждом шаге за u функции одного класса — либо всегда экспоненту, либо всегда тригонометрию), мы возвращаемся к исходному интегралу, формируя линейное уравнение относительно искомого интеграла.

Бонус-пример на каждый тип:

- **Пример для Типа I:** Вычислим интеграл $\int x e^{2x} dx$. Пусть $u = x \implies du = dx$, а $dv = e^{2x} dx \implies v = \frac{1}{2} e^{2x}$. Тогда:

$$\int x e^{2x} dx = x \cdot \left(\frac{1}{2} e^{2x} \right) - \int \frac{1}{2} e^{2x} dx = \frac{x}{2} e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C = \frac{e^{2x}}{4} (2x - 1) + C.$$

- **Пример для Типа II:** Вычислим интеграл $\int \ln x dx$. Пусть $u = \ln x \implies du = \frac{1}{x} dx$, а $dv = dx \implies v = x$. Применяем формулу:

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C.$$

- **Пример для Типа III:** Найдем интеграл $I = \int e^x \cos x dx$. Пусть $u = e^x \implies du = e^x dx$, а $dv = \cos x dx \implies v = \sin x$. Получаем:

$$I = e^x \sin x - \int e^x \sin x dx$$

Применим метод по частям к полученному интегралу повторно, удерживая выбор u за экспонентой: $u = e^x \implies du = e^x dx$, $dv = \sin x dx \implies v = -\cos x$.

$$I = e^x \sin x - \left(-e^x \cos x - \int (-\cos x) e^x dx \right) = e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x dx$$

Замечаем, что последний интеграл равен I . Получаем алгебраическое уравнение:

$$I = e^x (\sin x + \cos x) - I \implies 2I = e^x (\sin x + \cos x) \implies I = \frac{e^x (\sin x + \cos x)}{2} + C.$$

Вопрос 2. Метод замены переменной (подстановки) в неопределенном интеграле

Сформулируйте и докажите теорему о замене переменной. Покажите на конкретном примере, как этот метод применяется для раскрытия циклических тригонометрических интегралов.

Теорема 1 (О замене переменной). Пусть функция $x = \varphi(t)$ определена и дифференцируема на промежутке T , а её множество значений представляет собой промежуток X . Пусть функция $f(x)$ определена на промежутке X и имеет на нем первообразную $F(x)$, то есть $F'(x) = f(x)$. Тогда на промежутке T функция $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ имеет первообразную $F(\varphi(t))$, и справедлива формула:

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \int f(x)dx \Big|_{x=\varphi(t)} = F(\varphi(t)) + C$$

Доказательство. Для доказательства данного тождества достаточно показать, что функция $F(\varphi(t))$ является первообразной для подынтегральной функции в левой части равенства. Согласно определению, продифференцируем сложную функцию $F(\varphi(t))$ по переменной t , используя правило дифференцирования сложной функции:

$$\frac{d}{dt} (F(\varphi(t))) = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$$

Так как по условию теоремы $F'(x) = f(x)$, то, подставляя аргумент $x = \varphi(t)$, имеем $F'(\varphi(t)) = f(\varphi(t))$. Отсюда получаем:

$$\frac{d}{dt} (F(\varphi(t))) = f(\varphi(t))\varphi'(t)$$

Поскольку производная функции $F(\varphi(t))$ по переменной t в точности совпадает с подынтегральной функцией, то по определению неопределенного интеграла множество всех первообразных имеет вид $F(\varphi(t)) + C$, что завершает доказательство теоремы. $\square$

Пример (Раскрытие циклического тригонометрического интеграла). Рассмотрим интеграл от нечетной степени тригонометрической функции, порождающий циклический переход при неверном подходе, но эффективно раскрываемый подстановкой: $I = \int \sin^3 x \cos^2 x dx$. Используем основное тригонометрическое тождество, чтобы выделить один дифференциал синуса: $\sin^3 x = \sin^2 x \cdot \sin x = (1 - \cos^2 x) \sin x$. Тогда:

$$I = \int (1 - \cos^2 x) \cos^2 x \cdot \sin x dx$$

Сделаем замену переменной $t = \cos x$. Находим дифференциал: $dt = -\sin x dx \implies \sin x dx = -dt$. Пересчитаем интеграл относительно переменной t :

$$I = \int (1 - t^2)t^2(-dt) = \int (t^4 - t^2)dt = \frac{t^5}{5} - \frac{t^3}{3} + C$$

Возвращаясь к исходной переменной x , получаем окончательный ответ:

$$I = \frac{\cos^5 x}{5} - \frac{\cos^3 x}{3} + C.$$

Бонус-пример (Универсальная тригонометрическая подстановка): Вычислим $I = \int \frac{dx}{2 + \cos x}$. Сделаем стандартную подстановку $t = \tan \frac{x}{2}$. Тогда выразим $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$ и $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$. Подставляем в интеграл:

$$I = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{2 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{2dt}{2(1+t^2) + (1-t^2)} = \int \frac{2dt}{3+t^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right) + C$$

Выполняя обратную замену, находим: $I = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{\tan(x/2)}{\sqrt{3}}\right) + C$.

Вопрос 3. Complex method v veschestvennom analize

Опираясь на свойства комплексной экспоненты и формулу Эйлера, проведите вывод формул для интегралов вида $I_1 = \int e^{ax} \cos(bx) dx$ и $I_2 = \int e^{ax} \sin(bx) dx$, где $a, b \in \mathbb{R}$. Докажите корректность перехода к комплексному интегралу $\int e^{(a+ib)x} dx$ и последующего разделения вещественной и мнимой частей.

Суть метода и итоговые формулы. При классическом подходе интегралы вида $I_1 = \int e^{ax} \cos(bx) dx$ и $I_2 = \int e^{ax} \sin(bx) dx$ вычисляются двукратным интегрированием по частям, что приводит к громоздким циклическим уравнениям.

Комплексный метод позволяет найти оба интеграла одновременно и чисто алгебраическим путём. Для этого вводится вспомогательный комплексный интеграл $J = \int e^{(a+ib)x} dx$. Согласно формуле Эйлера, его вещественная часть ($\operatorname{Re} J$) в точности равна интегралу I_1 , а мнимая часть ($\operatorname{Im} J$) — интегралу I_2 .

В результате интегрирования комплексной экспоненты получаются следующие ****итоговые формулы****:

$$\int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C$$

$$\int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C$$

Ниже приведено строгое обоснование этого перехода и пошаговый алгебраический вывод.

Доказательство корректности перехода. Пусть задана комплексная функция вещественного аргумента $w(x) = u(x) + iv(x)$, где $u(x), v(x)$ — вещественные функции, непрерывные на рассматриваемом промежутке. По определению, интеграл от такой функции равен:

$$\int w(x) dx = \int (u(x) + iv(x)) dx = \int u(x) dx + i \int v(x) dx$$

Формула Эйлера задает связь комплексной экспоненты с тригонометрическими функциями: $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$. Применим её к функции $e^{(a+ib)x}$:

$$e^{(a+ib)x} = e^{ax} \cdot e^{ibx} = e^{ax}(\cos(bx) + i \sin(bx)) = e^{ax} \cos(bx) + i e^{ax} \sin(bx)$$

Интегрируя это выражение по определению, получаем:

$$\int e^{(a+ib)x} dx = \int e^{ax} \cos(bx) dx + i \int e^{ax} \sin(bx) dx = I_1 + i I_2$$

Поскольку операция выделения вещественной (Re) и мнимой (Im) частей коммутирует с интегрированием, мы можем утверждать:

$$I_1 = \operatorname{Re} \left(\int e^{(a+ib)x} dx \right), \quad I_2 = \operatorname{Im} \left(\int e^{(a+ib)x} dx \right)$$

Так как закон дифференцирования $\frac{d}{dx} e^{kx} = k e^{kx}$ выполняется на комплексной плоскости для любого $k = a + ib \in \mathbb{C}$, операция вычисления первообразной от комплексной экспоненты полностью эквивалентна вещественному аналогу: $\int e^{kx} dx = \frac{1}{k} e^{kx} + C$.

Вывод формул. Вычислим комплексный интеграл в явном виде:

$$\int e^{(a+ib)x} dx = \frac{e^{(a+ib)x}}{a+ib} = \frac{e^{ax}(\cos bx + i \sin bx)}{a+ib}$$

Для разделения вещественной и мнимой частей избавимся от комплексности в знаменателе, умножив числитель и знаменатель на сопряженное число $(a - ib)$:

$$\frac{e^{ax}(\cos bx + i \sin bx)(a - ib)}{(a+ib)(a-ib)} = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx - ib \cos bx + ia \sin bx - i^2 b \sin bx)$$

Учитывая, что $i^2 = -1$, сгруппируем слагаемые на вещественные и мнимые компоненты:

$$\int e^{(a+ib)x} dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} ((a \cos bx + b \sin bx) + i(a \sin bx - b \cos bx))$$

Выделяя вещественную и мнимую части, получаем искомые формулы для интегралов:

$$I_1 = \int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C$$

$$I_2 = \int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C$$

Бонус-пример: Вычислим интеграл $\int e^{3x} \sin(2x) dx$. В данном случае параметры $a = 3$, $b = 2$. Прямым подстановлением в выведенную формулу для I_2 получаем:

$$\int e^{3x} \sin(2x) dx = \frac{e^{3x}(3 \sin 2x - 2 \cos 2x)}{3^2 + 2^2} + C = \frac{e^{3x}(3 \sin 2x - 2 \cos 2x)}{13} + C.$$

Вопрос 4. Методы нахождения неопределенных коэффициентов

Проведите сравнительный анализ метода приравнивания коэффициентов при одинаковых степенях и метода частных значений. Дайте обоснование методу вычетов Хевисайда для случая простых линейных множителей в знаменателе.

Правила формирования структуры числителей элементарных дробей. При разложении правильной рациональной дроби $\frac{P(x)}{Q(x)}$ вид многочлена в числителе каждой элементарной дроби однозначно определяется структурой сомножителей в знаменателе:

- **Принцип формирования:** Степень многочлена в числителе должна быть строго на единицу меньше степени базового многочлена, находящегося внутри скобки знаменателя (без учета внешней кратности этой скобки).
- **Линейный сомножитель $(x - a)^k$:** Внутреннее выражение $x - a$ является многочленом первой степени (x^1). Следовательно, в числителе формируется многочлен нулевой степени — константа (A). Количество дробей в группе равно кратности k :

$$\frac{A_1}{x - a} + \frac{A_2}{(x - a)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x - a)^k}$$

- **Квадратичный сомножитель $(x^2 + px + q)^m$ с отрицательным дискриминантом ($D < 0$):** Внутреннее выражение является многочленом второй степени (x^2). Следовательно, в числителе формируется линейный двухчлен — многочлен первой степени ($Bx + C$). Количество дробей равно кратности m :

$$\frac{B_1x + C_1}{x^2 + px + q} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2 + px + q)^2} + \dots + \frac{B_mx + C_m}{(x^2 + px + q)^m}$$

Теоретическое обоснование разложения. Любая правильная рациональная дробь $\frac{P(x)}{Q(x)}$ над полем действительных чисел допускает единственное разложение на сумму элементарных дробей указанных типов.

- Каждому действительному корню $x = a$ кратности k соответствует группа из k дробей вида: $\sum_{i=1}^k \frac{A_i}{(x-a)^i}$, где $A_i \in \mathbb{R}$.
- Каждой паре комплексно-сопряженных корней кратности m соответствует группа из m дробей вида: $\sum_{j=1}^m \frac{B_jx + C_j}{(x^2 + px + q)^j}$, где $B_j, C_j \in \mathbb{R}$.

Сравнительный анализ методов определения коэффициентов. После приведения всех элементарных дробей к общему знаменателю $Q(x)$ фиксируется тождественное равенство исходного числителя $P(x)$ и полученного многочлена с неопределенными коэффициентами $M(x)$: $P(x) \equiv M(x)$. Для нахождения неизвестных применяются два метода:

1. Метод частных значений:

Основан на свойстве тождественности: равенство справедливо при любых значениях переменной x . В уравнение подставляются действительные корни знаменателя $Q(x)$, что приводит к занулению большинства слагаемых и мгновенному нахождению части коэффициентов.

Преимущества: Высокая скорость вычислений. При наличии только простых действительных корней исключает необходимость решения систем уравнений.

Недостатки: При наличии комплексных или кратных корней метод не позволяет напрямую определить все неизвестные. Требуется подстановка искусственных значений (например, $x = 0$, $x = 1$) и комбинирование с другими подходами.

2. Метод приравнивания коэффициентов:

Основан на теореме о равенстве многочленов: два многочлена тождественно равны тогда и только тогда, когда равны их коэффициенты при одинаковых степенях переменной x^k . Проводится полное раскрытие скобок в $M(x)$, группировка по степеням x и составление системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).

Преимущества: Абсолютная универсальность. Метод применим для любых типов и кратностей корней знаменателя.

Недостатки: Высокая вычислительная трудоемкость. При больших степенях знаменателя приводит к громоздким СЛАУ, требующим применения метода Гаусса.

Обоснование метода вычетов Хевисайда. Пусть рациональная дробь имеет вид $\frac{P(x)}{Q(x)}$, где знаменатель содержит простой линейный корень $x = x_1$ кратности 1. Тогда многочлен знаменателя представим в виде $Q(x) = (x - x_1)R(x)$, причем $R(x_1) \neq 0$.

Выделим из общего разложения дробь с искомым коэффициентом A_1 :

$$\frac{P(x)}{(x - x_1)R(x)} = \frac{A_1}{x - x_1} + \sum \text{оставшиеся дроби}$$

Умножим обе части тождества на линейный множитель $(x - x_1)$:

$$\frac{P(x)}{R(x)} = A_1 + (x - x_1) \cdot \sum \text{оставшиеся дроби}$$

Перейдем к пределу при $x \rightarrow x_1$. Поскольку сумма оставшихся дробей представляет собой правильную рациональную функцию, не имеющую особенностей в точке x_1 , произведение второго слагаемого на $(x - x_1)$ стремится к нулю. Получаем явное выражение для коэффициента:

$$A_1 = \lim_{x \rightarrow x_1} \frac{P(x)}{R(x)} = \frac{P(x_1)}{R(x_1)}$$

Применим правило дифференцирования произведения к знаменателю: $Q'(x) = R(x) + (x - x_1)R'(x)$. При подстановке значения $x = x_1$ второе слагаемое обращается в нуль: $Q'(x_1) = R(x_1)$. Таким образом, получаем классическую предельную формулу Хевисайда:

$$A_1 = \frac{P(x_1)}{Q'(x_1)}$$

Пример практического применения (Метод Хевисайда): Разложим правильную дробь $\frac{2x+3}{(x-2)(x+3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+3}$.

- Нахождение коэффициента A при корне $x = 2$ путем исключения сомножителя $(x - 2)$ из исходного знаменателя:

$$A = \left. \frac{2x+3}{x+3} \right|_{x=2} = \frac{2(2)+3}{2+3} = \frac{7}{5}$$

- Нахождение коэффициента B при корне $x = -3$ путем исключения сомножителя $(x + 3)$ из исходного знаменателя:

$$B = \left. \frac{2x+3}{x-2} \right|_{x=-3} = \frac{2(-3)+3}{-3-2} = \frac{-3}{-5} = \frac{3}{5}$$

Результат разложения: $\frac{2x+3}{(x-2)(x+3)} = \frac{7}{5(x-2)} + \frac{3}{5(x+3)}$.

Вопрос 5. Интегрирование элементарных дробей IV типа

Выведите рекуррентную формулу для вычисления интеграла от элементарной дроби IV типа: $I_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}$, $n \in \mathbb{N}$. Покажите этап интегрирования по частям и алгоритм понижения степени знаменателя.

План вывода кратко:

1. **Подмена в числителе:** $1 = \frac{1}{a^2} \cdot \frac{(x^2+a^2)-x^2}{(x^2+a^2)^n} \implies$ разбиваем на I_{n-1} и «хвост» с x^2 .

2. **Части для «хвоста»:** Интеграл $\int \frac{x \cdot x \, dx}{(x^2+a^2)^n}$ берем по частям:

- $u = x \implies du = dx$
- $dv = \frac{x \, dx}{(x^2+a^2)^n} \implies v = \frac{(x^2+a^2)^{-n+1}}{2(1-n)}$

3. **Сборка:** Подставляем всё в уравнение $I_n = \frac{1}{a^2}I_{n-1} - \frac{1}{a^2}I^*$ и приводим подобные при I_{n-1} .

$$I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2a^2(n-1)}I_{n-1}$$

Математический вывод формулы. Рассмотрим интеграл элементарной дроби IV типа: $I_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}$. Реализуем первый этап алгоритма:

$$I_n = \frac{1}{a^2} \int \frac{a^2}{(x^2+a^2)^n} dx = \frac{1}{a^2} \int \frac{(x^2+a^2) - x^2}{(x^2+a^2)^n} dx$$

Используя свойство линейности неопределенного интеграла, разобьем выражение на два отдельных слагаемых:

$$I_n = \frac{1}{a^2} \int \frac{x^2+a^2}{(x^2+a^2)^n} dx - \frac{1}{a^2} \int \frac{x^2}{(x^2+a^2)^n} dx$$

После сокращения первой дроби получаем соотношение, связывающее I_n и I_{n-1} :

$$I_n = \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \frac{1}{a^2} I^*, \quad \text{где } I^* = \int \frac{x \cdot x dx}{(x^2+a^2)^n}$$

Перейдем ко второму этапу — интегрированию по частям интеграла I^* . Пусть:

$$u = x \implies du = dx$$

$$dv = \frac{x dx}{(x^2+a^2)^n} = \frac{1}{2} (x^2+a^2)^{-n} d(x^2+a^2) \implies v = \frac{1}{2(1-n)(x^2+a^2)^{n-1}}$$

Применяя классическую формулу $\int u dv = uv - \int v du$, преобразуем интеграл I^* :

$$I^* = \frac{x}{2(1-n)(x^2+a^2)^{n-1}} - \int \frac{dx}{2(1-n)(x^2+a^2)^{n-1}}$$

Вынесем константу за знак интеграла, сводя его к определению I_{n-1} :

$$I^* = \frac{x}{2(1-n)(x^2+a^2)^{n-1}} - \frac{1}{2(1-n)} I_{n-1}$$

Перейдем к третьему этапу. Подставим полученное выражение для I^* в исходное уравнение для I_n :

$$I_n = \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \frac{1}{a^2} \left[\frac{x}{2(1-n)(x^2+a^2)^{n-1}} - \frac{1}{2(1-n)} I_{n-1} \right]$$

Для упрощения знаков преобразуем константу в знаменателе: $\frac{1}{2(1-n)} = -\frac{1}{2(n-1)}$. Раскроем скобки:

$$I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \frac{1}{2a^2(n-1)} I_{n-1}$$

Сгруппируем слагаемые при интеграле I_{n-1} , приведя их коэффициенты к общему знаменателю $2a^2(n-1)$:

$$\frac{1}{a^2} - \frac{1}{2a^2(n-1)} = \frac{2(n-1) - 1}{2a^2(n-1)} = \frac{2n-3}{2a^2(n-1)}$$

В результате получаем окончательную рекуррентную формулу понижения степени для интегралов IV типа:

$$I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2a^2(n-1)} I_{n-1}$$

Пример практического применения: Вычислим интеграл $I_2 = \int \frac{dx}{(x^2+4)^2}$. В данном случае параметры имеют значения $a^2 = 4 \implies a = 2$, начальная степень $n = 2$. Базовый табличный интеграл первого порядка ($n = 1$) равен:

$$I_1 = \int \frac{dx}{x^2+4} = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x}{2}\right)$$

Подставим параметры $n = 2$ и $a^2 = 4$ в выведенную рекуррентную формулу:

$$I_2 = \frac{x}{2 \cdot 4 \cdot (2-1)(x^2+4)^{2-1}} + \frac{2(2)-3}{2 \cdot 4 \cdot (2-1)} I_1 = \frac{x}{8(x^2+4)} + \frac{1}{8} I_1$$

Подставляя явный вид интеграла I_1 и добавляя константу интегрирования, получаем финальный результат:

$$I_2 = \frac{x}{8(x^2+4)} + \frac{1}{16} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) + C$$

Пятёрка 2. Вопросы 6–10

Вопрос 6. Метод Остроградского

Дайте обоснование методу выделения рациональной части интеграла от правильной рациональной дроби, знаменатель которой имеет кратные корни. Докажите корректность дифференцирования основного уравнения Остроградского для перехода к алгебраической системе линейных уравнений.

Суть метода (Краткая справка). Зачем нужен? Чтобы обойти мучительное интегрирование дробей с кратными корнями (например, когда в знаменателе стоит $(x-1)^4$ или $(x^2+1)^3$) и не использовать длинные рекуррентные формулы.

Что делает? Чисто алгебраически отщепляет от ответа готовую рациональную дробь (алгебраическую часть), оставляя под интегралом только дроби первых степеней (которые дадут логарифмы и арктангенсы).

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \frac{X(x)}{Q_1(x)} + \int \frac{Y(x)}{Q_2(x)} dx$$

Алгоритм сборки формулы:

1. **Знаменатель $Q_1(x)$:** Ищется как НОД($Q(x), Q'(x)$). На практике он просто забирает все скобки исходного знаменателя, понизив их степени ровно на 1. (Например, из $(x-1)^3$ в Q_1 пойдет $(x-1)^2$).
2. **Знаменатель $Q_2(x)$:** Ищется как деление исходного знаменателя на первый: $Q_2(x) = \frac{Q(x)}{Q_1(x)}$. На практике он содержит все те же скобки, но строго в **первой** степени.
3. **Числители $X(x)$ и $Y(x)$:** Это многочлены с неизвестными коэффициентами ($Ax+B$ и т.д.). Их степени берутся строго на **1 меньше**, чем степени соответствующих знаменателей Q_1 и Q_2 .
4. **Поиск коэффициентов:** Обе части формулы в рамке дифференцируются по x , приравниваются коэффициенты при одинаковых степенях, и решается линейная система (СЛАУ).

Теоретическое обоснование метода. Пусть задан интеграл от правильной рациональной дроби $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$, где знаменатель $Q(x)$ имеет каноническое разложение с кратными корнями: $Q(x) = (x-x_1)^{k_1} \dots (x^2+p_1x+q_1)^{m_1} \dots$. Традиционное разложение приводит к дробям высоких порядков, интегрирование которых трудоемко.

Метод Остроградского постулирует представление интеграла в виде суммы рациональной функции и интеграла от правильной дроби с простыми корнями в знаменателе (основное уравнение Остроградского). Структура знаменателей $Q_1(x)$ и $Q_2(x)$ вытекает из свойства производной многочлена: кратность каждого корня в производной $Q'(x)$ на единицу меньше его кратности в $Q(x)$. Следовательно, их наибольший общий делитель $Q_1(x) = \text{НОД}(Q(x), Q'(x))$ забирает "кратную" часть, а оставшийся множитель $Q_2(x)$ содержит только простые корни.

Доказательство корректности дифференцирования. Для нахождения коэффициентов в числителях $X(x)$ и $Y(x)$ продифференцируем обе части основного уравнения по переменной x . По теореме о производной интеграла с переменным верхним пределом получаем:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{X'(x)Q_1(x) - X(x)Q_1'(x)}{Q_1^2(x)} + \frac{Y(x)}{Q_2(x)}$$

Докажем, что это выражение сводится к строгой алгебраической системе без дробей. Умножим обе части равенства на исходный многочлен $Q(x)$. Так как $Q(x) = Q_1(x)Q_2(x)$, имеем:

$$P(x) = \frac{(X'(x)Q_1(x) - X(x)Q_1'(x)) \cdot Q_1(x)Q_2(x)}{Q_1^2(x)} + \frac{Y(x) \cdot Q_1(x)Q_2(x)}{Q_2(x)}$$

После сокращения дробей на $Q_1(x)$ и $Q_2(x)$ соответственно, получаем:

$$P(x) = X'(x)Q_2(x) - X(x)\frac{Q_1'(x)Q_2(x)}{Q_1(x)} + Y(x)Q_1(x)$$

Необходимо доказать, что дробь $\frac{Q_1'(x)Q_2(x)}{Q_1(x)}$ является целым многочленом. Найдем производную $Q'(x) = (Q_1(x)Q_2(x))' = Q_1'(x)Q_2(x) + Q_1(x)Q_2'(x)$. Выразим интересующее нас произведение: $Q_1'(x)Q_2(x) = Q'(x) - Q_1(x)Q_2'(x)$. Разделим его на $Q_1(x)$:

$$\frac{Q_1'(x)Q_2(x)}{Q_1(x)} = \frac{Q'(x)}{Q_1(x)} - Q_2'(x)$$

Поскольку $Q_1(x)$ является делителем $Q'(x)$ по построению (как НОД), то отношение $\frac{Q'(x)}{Q_1(x)}$ является целым многочленом. Следовательно, всё уравнение становится строгим тождеством двух многочленов:

$$P(x) = X'(x)Q_2(x) - X(x)\left(\frac{Q'(x)}{Q_1(x)} - Q_2'(x)\right) + Y(x)Q_1(x)$$

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях x в левой и правой частях, мы получаем совместную СЛАУ для нахождения неизвестных букв в многочленах $X(x)$ и $Y(x)$.

Пример применения метода: Вычислим $\int \frac{dx}{(x^2-1)^2}$. Здесь $Q(x) = (x^2 - 1)^2$.

- **Сборка знаменателей:** $Q'(x) = 2(x^2 - 1) \cdot 2x = 4x(x^2 - 1)$.
Тогда $Q_1(x) = \text{НОД}(Q, Q') = x^2 - 1$. Соответственно, $Q_2(x) = \frac{Q(x)}{Q_1(x)} = x^2 - 1$.
- **Сборка числителей:** Так как $\deg Q_1 = 2$ и $\deg Q_2 = 2$, степени числителей равны 1:
 $X(x) = Ax + B$, $Y(x) = Cx + D$.
- **Уравнение Остроградского:** $\int \frac{dx}{(x^2-1)^2} = \frac{Ax+B}{x^2-1} + \int \frac{Cx+D}{x^2-1} dx$.
- **Дифференцируем:**

$$\frac{1}{(x^2 - 1)^2} = \frac{A(x^2 - 1) - 2x(Ax + B)}{(x^2 - 1)^2} + \frac{Cx + D}{x^2 - 1}$$

Умножаем на $(x^2 - 1)^2 \implies 1 = A(x^2 - 1) - 2x(Ax + B) + (Cx + D)(x^2 - 1)$.

Раскрывая скобки и приравнивая коэффициенты, находим: $A = 0, B = -1/2, C = 0, D = -1/2$.

- **Итог:** $\int \frac{dx}{(x^2-1)^2} = -\frac{x}{2(x^2-1)} - \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C$.

Вопрос 7. Интегрирование дробно-линейных иррациональностей

Опираясь на понятие рационализирующей подстановки, подробно разберите метод интегрирования выражений, содержащих дробно-линейные иррациональности вида $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$. Докажите теорему о сведении таких интегралов к интегралам от рациональных функций.

Теорема 2 (О рационализации дробно-линейных иррациональностей). Интеграл вида $\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$, где R — рациональная функция своих аргументов, а $ad - bc \neq 0$, с помощью подстановки $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ всегда сводится к интегралу от рациональной функции переменной t .

Доказательство. Пусть $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$. Для доказательства теоремы необходимо показать, что переменная x и её дифференциал dx выражаются через целые рациональные степени переменной t . Возведем обе части равенства в степень n :

$$t^n = \frac{ax+b}{cx+d}$$

Выразим отсюда x . Для этого умножим обе части на знаменатель $cx + d$:

$$t^n(cx + d) = ax + b \implies cxt^n + dt^n = ax + b \implies x(ct^n - a) = b - dt^n$$

Отсюда получаем явное выражение для переменной x как рациональной функции от t :

$$x = \frac{b - dt^n}{ct^n - a} = \psi(t)$$

Поскольку функция $\psi(t)$ является дробно-рациональной (отношение двух многочленов), её производная по переменной t также будет являться дробно-рациональной функцией. Найдем дифференциал dx :

$$dx = \psi'(t)dt = \frac{(-d \cdot nt^{n-1})(ct^n - a) - (b - dt^n)(c \cdot nt^{n-1})}{(ct^n - a)^2}dt = \frac{nt^{n-1}(ad - bc)}{(ct^n - a)^2}dt$$

Подставим полученные выражения в исходный интеграл:

$$\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)dx = \int R(\psi(t), t) \psi'(t)dt$$

Так как суперпозиция и произведение рациональных функций представляют собой рациональную функцию, подынтегральное выражение становится чистой рациональной дробью от переменной t . Теорема доказана. $\square$

Бонус-пример: Вычислим интеграл $\int \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$. Данный интеграл содержит простую линейную иррациональность $\sqrt{x}$. Сделаем замену $t = \sqrt{x} \implies x = t^2$, следовательно, $dx = 2t dt$. Подставляем выражения в исходный интеграл:

$$\int \frac{2t dt}{(1+t^2) \cdot t} = 2 \int \frac{dt}{1+t^2} = 2 \arctan t + C$$

Выполняя обратную замену $t = \sqrt{x}$, получаем окончательный ответ: $2 \arctan \sqrt{x} + C$.



Вопрос 8. Подстановки Эйлера: геометрия и алгебра

Сформулируйте геометрические и алгебраические предпосылки трех подстановок Эйлера для интегралов вида $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})dx$. Выведите формулы для первой и второй подстановок Эйлера.

Идейные предпосылки (Зачем мы это делаем?) Главная проблема интеграла — иррациональность (квадратный корень). Идея Эйлера состоит в том, чтобы приравнять корень к такому выражению с новым параметром t , при возведении которого в квадрат **уничтожится либо квадратичный член ax^2 , либо свободный член c** . Это превратит сложное квадратное уравнение в линейное, откуда x легко выразится через t без всяких корней.

- **1-я подстановка:** Если $a > 0$. Замена: $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm\sqrt{a}x + t$. (Уничтожается ax^2).
- **2-я подстановка:** Если $c > 0$. Замена: $\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt \pm \sqrt{c}$. (Уничтожается c).
- **3-я подстановка:** Если $D \geq 0$. Замена: $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - x_1)$. (Сокращается скобка с корнем).

Геометрический смысл (Параметризация кривой) Геометрически мы ищем точки пересечения кривой второго порядка $y^2 = ax^2 + bx + c$ с пучком прямых, зависящих от параметра t . Уравнение прямой подбирается так, чтобы одна точка пересечения была известна заранее (или уходила на бесконечность), тогда вторая точка находится из простого линейного уравнения.



Вывод Первой подстановки ($a > 0$). Положим $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{ax} + t$. Возводим обе части в квадрат:

$$ax^2 + bx + c = ax^2 + 2\sqrt{ax}t + t^2$$

Члены с ax^2 взаимно уничтожаются, уравнение становится линейным. Выражаем x :

$$x(b - 2\sqrt{at}) = t^2 - c \implies x = \frac{t^2 - c}{b - 2\sqrt{at}}$$

Так как x — рациональная дробь от t , то дифференциал dx и сам радикал также выражаются рационально. Интеграл избавлен от иррациональности.

Вывод Второй подстановки ($c > 0$). Положим $\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt + \sqrt{c}$. Возводим в квадрат:

$$ax^2 + bx + c = x^2t^2 + 2\sqrt{c}xt + c$$

Константы c уничтожаются. Разделим обе части на x (предполагая $x \neq 0$):

$$ax + b = xt^2 + 2\sqrt{c}t \implies x(a - t^2) = 2\sqrt{c}t - b \implies x = \frac{2\sqrt{c}t - b}{a - t^2}$$

Снова получили строго рациональное выражение для x , что гарантирует успешную рационализацию всего интеграла.

Бонус-пример (1-я подстановка): Вычислим $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$. Здесь $a = 1 > 0$.

$$\sqrt{x^2+1} = -x + t \implies x^2+1 = x^2 - 2xt + t^2 \implies x = \frac{t^2-1}{2t}$$

Выражаем дифференциал и сам корень:

$$dx = d\left(\frac{t^2-1}{2t}\right) = \frac{t^2+1}{2t^2}dt, \quad \sqrt{x^2+1} = t - x = \frac{t^2+1}{2t}$$

Подставляем всё в интеграл:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}} = \int \frac{\frac{t^2+1}{2t^2}dt}{\frac{t^2+1}{2t}} = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C = \ln\left|x + \sqrt{x^2+1}\right| + C$$

Вопрос 9. Дифференциальный бином Чебышёва

Сформулируйте теорему Чебышёва об интегрировании дифференциального бинома. Проведите подробный разбор трех условий Чебышёва с указанием замен, переводящих интеграл вида $\int x^m(a+bx^n)^p dx$ к интегралу от рациональной функции.

Краткая памятка (Алгоритм Чебышёва) Интеграл вида $\int x^m(a+bx^n)^p dx$. Пусть $p = \frac{r}{s}$, а λ — наименьшее общее кратное (НОК) знаменателей m и n . Считаем показатели и делаем замену:

- **Случай 1:** $p \in \mathbb{Z} \implies$ замена $x = t^\lambda$.
- **Случай 2:** $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z} \implies$ замена $a + bx^n = t^s$.
- **Случай 3:** $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z} \implies$ замена $ax^{-n} + b = t^s$ (или $\frac{a+bx^n}{x^n} = t^s$).

Во всех остальных случаях интеграл в элементарных функциях не берется.

Теорема и подробное обоснование

Теорема 3 (Чебышёва). *Интеграл от дифференциального бинома $\int x^m(a + bx^n)^p dx$, где $m, n, p \in \mathbb{Q}$, $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, интегрируется в конечном виде тогда и только тогда, когда выполняется одно из трех вышеуказанных условий.*

Обоснование замен базируется на предварительной подстановке $z = x^n \implies dx = \frac{1}{n} z^{\frac{1}{n}-1} dz$, которая приводит интеграл к виду $\frac{1}{n} \int z^{\frac{m+1}{n}-1} (a + bz)^p dz$. Отсюда логически вытекают три случая:

- Первое условие** ($p \in \mathbb{Z}$): Если p целое, подынтегральное выражение — это просто сумма дробно-рациональных степеней x . Замена $x = t^\lambda$ извлекает все корни нацело, так как λ делится без остатка и на знаменатель m , и на знаменатель n . В итоге получаем интеграл от многочлена или рациональной дроби.
- Второе условие** ($\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$): Степень перед скобкой ($\frac{m+1}{n} - 1$) становится целой. Единственным источником иррациональности остается скобка $(a + bz)^{r/s}$. Мы уничтожаем её, заменяя содержимое скобки целиком на новую переменную в степени знаменателя: $a + bx^n = t^s$.
- Третье условие** ($\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$): Ни одно из предыдущих условий не выполнено, но их сумма — целое число. Искусственно выносим x^n из бинома:

$$x^m(a + bx^n)^p = x^m \cdot x^{np} \cdot (ax^{-n} + b)^p = x^{m+np} (ax^{-n} + b)^p$$

В новых переменных показатель степени перед скобкой равен $(\frac{m+1}{n} + p) - 1$, что по условию является целым числом. Иррациональность из скобки ликвидируется аналогичной заменой содержимого на t^s : $ax^{-n} + b = t^s$.

Бонус-пример (Второе условие Чебышёва): Вычислим $I = \int \frac{\sqrt{1+\sqrt[3]{x}}}{x} dx = \int x^{-1} (1 + x^{1/3})^{1/2} dx$. Здесь $m = -1, n = 1/3, p = 1/2$. Проверяем условия: p не целое. Считаем $\frac{m+1}{n} = \frac{-1+1}{1/3} = 0 \in \mathbb{Z}$. Работает Второй случай! Знаменатель дроби p равен $s = 2$. Делаем замену:

$$1 + x^{1/3} = t^2 \implies x = (t^2 - 1)^3 \implies dx = 3(t^2 - 1)^2 \cdot 2t dt = 6t(t^2 - 1)^2 dt$$

Подставляем в I :

$$\int \frac{t}{(t^2 - 1)^3} \cdot 6t(t^2 - 1)^2 dt = 6 \int \frac{t^2}{t^2 - 1} dt = 6 \int \left(1 + \frac{1}{t^2 - 1} \right) dt = 6t + 3 \ln \left| \frac{t - 1}{t + 1} \right| + C$$

где $t = \sqrt{1 + \sqrt[3]{x}}$.

Вопрос 10. Определенный интеграл Римана

Сформулируйте понятие определенного интеграла Римана через конструкции разбиения, размеченного разбиения и интегральных сумм. Докажите теорему о необходимом условии интегрируемости функции по Риману (ограниченность функции).

Суть интеграла Римана (Кратко) Площадь под кривой ищется как предел суммы площадей прямоугольников:


- Делим ось x на отрезки (ширина Δx_k).
- На каждом выбираем точку ξ_k . Значение $f(\xi_k)$ — это высота.
- Прямоугольники могут «вылезать» за график или не доставать до него.
- При сужении ширины к нулю эти погрешности исчезают, давая точную площадь.

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} = b$$

$$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

Интегральная сумма:

$$s_i = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$



$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} s_i$$

3

Строгие определения Пусть $f(x)$ задана на $[a, b]$.

1. **Разбиение T :** Набор точек $x_0 < x_1 < \dots < x_n$. Длины отрезков Δx_k . Мелкость $\delta(T) = \max \Delta x_k$.
2. **Разметка ξ :** Набор произвольных точек $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$.
3. **Интегральная сумма:** $\sigma = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$.
4. **Интеграл Римана $I = \int_a^b f(x) dx$:** Это предел σ при $\delta(T) \rightarrow 0$. Строго: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_0 > 0$, такое что при $\delta(T) < \delta_0$ для любой разметки $|\sigma - I| < \varepsilon$.

Теорема (Необходимое условие интегрируемости)

Теорема 4. Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$ (интегрируема по Риману), то $f(x)$ ограничена на $[a, b]$.

Доказательство. От противного. Пусть предел I существует, но $f(x)$ **неограничена** на $[a, b]$.

- Возьмем $\varepsilon = 1$. По определению предела $\exists \delta_0 > 0$, что для любого достаточно мелкого разбиения верно: $|\sigma| < |I| + 1$.
- Зафиксируем разбиение T , где $\delta(T) < \delta_0$. Т.к. функция неограничена на всем $[a, b]$, она неограничена хотя бы на одном отрезке $[x_{k-1}, x_k]$.
- Разобьем сумму: $\sigma = f(\xi_k) \Delta x_k + \sum_{i \neq k} f(\xi_i) \Delta x_i$.
- Зафиксируем все точки ξ_i (где $i \neq k$). Тогда вторая сумма — это константа C . Имеем: $\sigma = f(\xi_k) \Delta x_k + C$.
- Т.к. на k -м отрезке функция не имеет потолка, выберем точку ξ_k так, чтобы высота прямоугольника стала огромной: $|f(\xi_k)| > \frac{|I| + 1 + |C|}{\Delta x_k}$.
- Умножаем на Δx_k : $|f(\xi_k) \Delta x_k| > |I| + 1 + |C|$.
- Оценим модуль суммы (через $|A + B| \geq |A| - |B|$):

$$|\sigma| = |f(\xi_k) \Delta x_k + C| \geq |f(\xi_k) \Delta x_k| - |C| > (|I| + 1 + |C|) - |C| = |I| + 1$$

Получили $|\sigma| > |I| + 1$, что противоречит условию $|\sigma| < |I| + 1$. Значит, функция обязана быть ограниченной. $\square$

Бонус-пример (Функция Дирихле): $\chi(x)$ на $[0, 1]$ равна 1 (если $x \in \mathbb{Q}$) и 0 (если $x \notin \mathbb{Q}$). Функция ограничена. Но предел σ не существует: если брать ξ_k только рациональными, $\sigma = 1$. Если иррациональными, $\sigma = 0$. Предел зависит от разметки $\implies$ интеграл не существует.

Вопрос 11. Нижние и верхние суммы Дарбу при изменении разбиения

Сформулируйте и докажите лемму об изменении сумм Дарбу при измельчении разбиения (при добавлении к исходному разбиению T конечного числа p новых точек). Покажите, как ведут себя нижние суммы (возрастают/не убывают) и верхние суммы (убывают/не возрастают) при этой процедуре.

Формулировка леммы. Пусть $f(x)$ — ограниченная функция на $[a, b]$, где $m = \inf f(x)$, $M = \sup f(x)$. Если разбиение T' получено из T добавлением p новых точек, а $\lambda(T)$ — мелкость (максимальный шаг) исходного разбиения, то:

$$s(f, T) \leq s(f, T') \quad \text{и} \quad S(f, T') \leq S(f, T)$$

$$s(f, T') - s(f, T) \leq p(M - m)\lambda(T) \quad \text{и} \quad S(f, T) - S(f, T') \leq p(M - m)\lambda(T)$$

Геометрическая суть и смысл оценки. Нижняя сумма — площадь под ступенчатым «полом», верхняя — под «потолком».




Рис. 11.1: А вот и они

- **Монотонность:** Добавление точки делит один столбик на два узких. Локальные минимумы на половинках могут стать только выше общего старого минимума. «Пол» приподнимается (площадь растет). Локальные максимумы — только ниже, «потолок» проседает (площадь падает).
- **Смысл оценки $p(M - m)\lambda(T)$:** При добавлении одной точки изменение площади происходит только внутри одного исходного отрезка. Его ширина не превышает $\lambda(T)$, а максимальный перепад высоты функции от самого дна до пика равен $(M - m)$. Значит, от одной точки мы выигрываем/теряем максимум площадь одного такого прямоугольника: $(M - m)\lambda(T)$. Если точек p штук, то суммарный эффект не превысит $p(M - m)\lambda(T)$.

Доказательство в 4 коротких шага.

1. **Выделение изменяемого участка ($p = 1$):** Пусть в разбиение T добавлена одна точка x^* , попавшая внутрь отрезка $[x_{k-1}, x_k]$. Обозначим инфимумы на двух новых половинках как m'_1 и m'_2 . Поскольку точная нижняя грань на подмножестве не может быть меньше грани на всем множестве, имеем: $m'_1 \geq m_k$ и $m'_2 \geq m_k$.

Разность новых и старых нижних сумм возникает исключительно на этом отрезке:

$$s(f, T') - s(f, T) = m'_1(x^* - x_{k-1}) + m'_2(x_k - x^*) - m_k \Delta x_k$$

2. **Алгебраический трюк с точкой x^* :** Распишем длину старого отрезка через тождественное добавление и вычитание точки x^* : $\Delta x_k = x_k - x_{k-1} = (x^* - x_{k-1}) + (x_k - x^*)$. Подставим это в формулу разности и сгруппируем члены при одинаковых скобках длины:

$$s(f, T') - s(f, T) = \underbrace{(m'_1 - m_k)}_{\geq 0} \underbrace{(x^* - x_{k-1})}_{> 0} + \underbrace{(m'_2 - m_k)}_{\geq 0} \underbrace{(x_k - x^*)}_{> 0} \geq 0 \implies s(f, T) \leq s(f, T')$$

Для верхних сумм аналогично через супремумы ($M'_1 \leq M_k, M'_2 \leq M_k$):

$$S(f, T) - S(f, T') = \underbrace{(M_k - M'_1)}_{\geq 0} (x^* - x_{k-1}) + \underbrace{(M_k - M'_2)}_{\geq 0} (x_k - x^*) \geq 0 \implies S(f, T') \leq S(f, T)$$

3. **Вывод оценки для одной точки:** Оценим сверху разность нижних сумм из предыдущего шага. Так как $m'_1 \leq M$ (глобальный супремум), а $m_k \geq m$ (глобальный инфимум), то каждая разность инфимумов не превышает полный размах функции: $(m'_1 - m_k) \leq M - m$ и $(m'_2 - m_k) \leq M - m$. Вынесем $(M - m)$ за скобки:

$$s(f, T') - s(f, T) \leq (M - m)[(x^* - x_{k-1}) + (x_k - x^*)] = (M - m)\Delta x_k$$

Учитывая, что длина любого отрезка не больше мелкости разбиения ($\Delta x_k \leq \lambda(T)$), получаем:

$$s(f, T') - s(f, T) \leq (M - m)\lambda(T)$$

4. **Переход к произвольному числу p точек:** Если добавляется p точек, будем вводить их поочередно, выстраивая цепочку разбиений: $T = T_0 \subset T_1 \subset \dots \subset T_p = T'$. При каждом добавлении одной точки мелкость текущего разбиения не превосходит исходную: $\lambda(T_i) \leq \lambda(T)$. Складывая p полученных на каждом шаге одинаковых оценок, по правилу телескопической суммы имеем:

$$s(f, T') - s(f, T) = \sum_{i=1}^p (s(f, T_i) - s(f, T_{i-1})) \leq \sum_{i=1}^p (M - m)\lambda(T) = p(M - m)\lambda(T)$$

Доказательство для верхних сумм проводится зеркально. Лемма полностью доказана.

Вопрос 12. Критерий интегрируемости в терминах сумм Дарбу

Сформулируйте и проведите доказательство теоремы: Критерий интегрируемости Дарбу. Проработайте доказательство в обе стороны (необходимость и достаточность).

Базовые понятия и обозначения. Для любого разбиения T отрезка $[a, b]$ определены нижняя $s(f, T)$ и верхняя $S(f, T)$ суммы Дарбу.

- **Интегралы Дарбу:** Нижним интегралом Дарбу I_* называется супремум всех нижних сумм, а верхним интегралом I^* — инфимум всех верхних сумм по всем возможным разбиениям:

$$I_* = \sup_T s(f, T), \quad I^* = \inf_T S(f, T)$$

- **Интегрируемость по Риману:** Ограниченная функция $f(x)$ называется интегрируемой по Риману ($f \in \mathcal{R}[a, b]$), если её верхний и нижний интегралы Дарбу совпадают. Их общее значение равно интегралу Римана: $I_* = I^* = I$.
- **Смысл оценки:** Разность $S(f, T) - s(f, T)$ — это суммарная площадь «зазоров» между накрывающей и вписанной ступенчатыми фигурами. Функция интегрируема тогда и только тогда, когда этот зазор можно сжать до сколь угодно малой величины ε .

Формулировка теоремы (Критерий Дарбу). Ограниченная на отрезке $[a, b]$ функция $f(x)$ интегрируема по Риману на этом отрезке тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует такое разбиение T , при котором:

$$f \in \mathcal{R}[a, b] \iff \forall \varepsilon > 0 \exists T : S(f, T) - s(f, T) < \varepsilon$$

Доказательство необходимости ($\implies$). Пусть функция интегрируема, то есть $I_* = I^* = I$. Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$.

1. По определению супремума, для величины $\frac{\varepsilon}{2}$ найдется разбиение T_1 , нижняя сумма которого близка к I :

$$s(f, T_1) > I - \frac{\varepsilon}{2}$$

2. По определению инфимума, для величины $\frac{\varepsilon}{2}$ найдется разбиение T_2 , верхняя сумма которого близка к I :

$$S(f, T_2) < I + \frac{\varepsilon}{2}$$

3. Построим общее измельчение $T = T_1 \cup T_2$. По лемме об изменении сумм, при добавлении новых точек нижняя сумма может только вырасти, а верхняя — только уменьшиться. Тогда справедливы два отдельных неравенства:

$$s(f, T) \geq s(f, T_1) > I - \frac{\varepsilon}{2} \implies -s(f, T) < -I + \frac{\varepsilon}{2}$$

$$S(f, T) \leq S(f, T_2) < I + \frac{\varepsilon}{2}$$

Сложим эти два неравенства для одного и того же разбиения T :

$$S(f, T) - s(f, T) < \left(I + \frac{\varepsilon}{2}\right) + \left(-I + \frac{\varepsilon}{2}\right) = \varepsilon$$

Необходимость доказана.

Доказательство достаточности ($\impliedby$). Пусть условие выполнено: для любого $\varepsilon > 0$ существует разбиение T , при котором $S(f, T) - s(f, T) < \varepsilon$.

По определению интегралов Дарбу как точных граней, для абсолютно любого разбиения T выполнены стандартные ограничения: $s(f, T) \leq I_*$ и $I^* \leq S(f, T)$. Избавимся от тройного неравенства и запишем это в виде двух простых утверждений:

1. Так как $I^* \leq S(f, T)$ и $-I_* \leq -s(f, T)$, мы можем оценить разность интегралов сверху через разность сумм на данном разбиении:

$$I^* - I_* \leq S(f, T) - s(f, T)$$

2. Поскольку по условию эта разность сумм меньше ε , получаем:

$$0 \leq I^* - I_* < \varepsilon$$

Постоянная величина $I^* - I_*$ неотрицательна и при этом строго меньше любого сколь угодно малого положительного числа ε . Это возможно только если эта разность равна нулю:

$$I^* - I_* = 0 \implies I_* = I^*$$

По определению это означает, что функция интегрируема по Риману. Достаточность доказана.

Вопрос 13. Интегрируемость непрерывных функций

Сформулируйте и докажите теорему об интегрируемости по Риману любой функции, непрерывной на сегменте $[a, b]$ ($C[a, b] \subset \mathcal{R}[a, b]$). Покажите, на каком именно этапе доказательства и для чего необходимо применять теорему Кантора о равномерной непрерывности.

Используемые теоремы. Для доказательства опираемся на три факта:

- **Вторая теорема Вейерштрасса:** Непрерывная на отрезке функция всегда достигает на нем своих точных граней (максимума и минимума).
- **Теорема Кантора:** Непрерывная на замкнутом отрезке функция равномерно непрерывна. То есть для любого $\varepsilon > 0$ существует единое $\delta > 0$, такое что при $|x' - x''| < \delta$ всегда выполняется $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$.
- **Критерий Дарбу:** Функция интегрируема, если $\forall \varepsilon > 0 \exists T : S(f, T) - s(f, T) < \varepsilon$.

Формулировка теоремы. Если функция $f(x)$ непрерывна на сегменте $[a, b]$, то она интегрируема по Риману на этом сегменте.

Тезисное доказательство.

1. Зададим произвольное $\varepsilon > 0$.
2. **Применяем теорему Кантора:** Для величины $\frac{\varepsilon}{b-a} > 0$ существует *общее* $\delta > 0$, такое что для любых точек, расстояние между которыми меньше δ , разность значений функции строго меньше $\frac{\varepsilon}{b-a}$.
3. Возьмем любое разбиение T с мелкостью $\lambda(T) < \delta$. Это значит, что длина каждого k -го отрезка $\Delta x_k < \delta$.
4. На каждом отрезке $[x_{k-1}, x_k]$ функция непрерывна. По **теореме Вейерштрасса** она достигает внутри него инфимума m_k и супремума M_k в конкретных точках x'_k и x''_k .
5. Так как обе эти точки лежат внутри одного отрезка, расстояние между ними меньше δ . Значит, размах функции на этом участке ограничен:

$$M_k - m_k < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

6. Составим разность сумм Дарбу для всего разбиения и заменим скобки с размахом на нашу оценку:

$$S(f, T) - s(f, T) = \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) \Delta x_k < \sum_{k=1}^n \frac{\varepsilon}{b-a} \Delta x_k$$

7. Выносим константу за сумму. Сумма длин всех подотрезков равна $(b-a)$:

$$\frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{k=1}^n \Delta x_k = \frac{\varepsilon}{b-a} (b-a) = \varepsilon$$

8. Получили $S(f, T) - s(f, T) < \varepsilon$. По критерию Дарбу функция интегрируема.

Интуитивный смысл («на пальцах»). Обычная непрерывность гарантирует, что график плавный, но масштаб этой плавности (свое δ) в каждой точке может быть разным. Теорема Кантора спасает ситуацию: она разрешает выбрать **одно общее, самое строгое** δ для всего отрезка. Если нарезать ось x на кусочки мельче этого δ , колебания графика внутри *каждой* ячейки одновременно станут микроскопическими. Суммарная площадь "зазоров" между ступенчатыми фигурами Дарбу схлопнется до нуля, и интеграл возьмется.

Вопрос 14. Интегрируемость монотонных функций

Сформулируйте и доказите теорему об интегрируемости монотонной функции на сегменте $[a, b]$. Проведите доказательство через телескопическую оценку разности сумм Дарбу. Проведите сравнительный анализ: почему для монотонных функций не нужна теорема Кантора?

Формулировка теоремы. Если функция $f(x)$ монотонна на сегменте $[a, b]$, то она интегрируема на этом сегменте.

Доказательство. Пусть $f(x)$ монотонно не убывает. Если $f(a) = f(b)$, функция константна и интегрируема. Рассмотрим случай $f(b) > f(a)$.

Зададим $\varepsilon > 0$. Разделим $[a, b]$ на n равных частей длиной $\Delta x = \frac{b-a}{n}$. Из-за монотонности точные грани на каждом отрезке $[x_{k-1}, x_k]$ достигаются на его концах:

$$m_k = f(x_{k-1}), \quad M_k = f(x_k)$$

Разность сумм Дарбу принимает вид:

$$S(f, T) - s(f, T) = \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) \Delta x = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n (f(x_k) - f(x_{k-1}))$$

Сумма внутри — телескопическая: все промежуточные значения $f(x_k)$ сокращаются, остаются только края:

$$\sum_{k=1}^n (f(x_k) - f(x_{k-1})) = f(x_n) - f(x_0) = f(b) - f(a)$$

Итоговая разность:

$$S(f, T) - s(f, T) = \frac{b-a}{n} (f(b) - f(a))$$

Для любого заданного ε мы можем выбрать столь большое количество разбиений n , чтобы это выражение стало меньше ε . Так как при любом n мы можем подобрать такое разбиение, условие критерия Дарбу выполняется. Интегрируемость доказана.

Почему не нужна теорема Кантора? Для непрерывных функций мы не знаем, где внутри отрезка лежат экстремумы, поэтому вынуждены принудительно ограничивать колебания через равномерную непрерывность (теорему Кантора). У монотонной функции экстремумы всегда «сидят» на концах отрезков. Из-за этого суммарная ошибка разбиения зависит только от разности значений в крайних точках всего сегмента $[a, b]$, а не от «поведения» функции внутри. Монотонность сама по себе жестко ограничивает накопленную погрешность: сколько бы разрывов ни было внутри, они все «схлопываются» при телескопическом сокращении.

Вопрос 15. Интегрируемость функций с конечным числом разрывов

Сформулируйте и доказите теорему об интегрируемости ограниченной функции, имеющей конечное число точек разрыва на сегменте $[a, b]$. Примените метод «изоляции». Обоснуйте важность ограниченности функции (пример $1/x$).

Формулировка теоремы. Если функция $f(x)$ ограничена на сегменте $[a, b]$ и имеет на нем конечное число точек разрыва, то она интегрируема на этом сегменте.

Доказательство (Метод «изоляции»). Пусть функция ограничена: существует такое число $M > 0$, что $-M \leq f(x) \leq M$ для всех $x \in [a, b]$ (функция зажата в коридоре высотой $2M$).

Проведем доказательство для одной точки разрыва $c \in (a, b)$ (для k точек алгоритм аналогичен). Зададим произвольное $\varepsilon > 0$.

- Шаг 1. Изолируем разрыв.** Окружим точку c интервалом $(c - \delta, c + \delta)$. Длина этого центрального отрезка разбиения равна $\Delta x_c = (c + \delta) - (c - \delta) = 2\delta$.
- Шаг 2. Выбираем ширину.** Мы сами вправе выбрать δ сколь угодно малым. Сожмем его так, чтобы выполнялось условие: $4M\delta < \frac{\varepsilon}{2}$.
- Шаг 3. Работаем с остатком.** Вне этого интервала остаются два чистых сегмента: $[a, c - \delta]$ и $[c + \delta, b]$. На них функция непрерывна, а значит, интегрируема. По критерию Дарбу для них найдутся такие разбиения T_1 и T_2 , что разности их сумм ничтожно малы:

$$S(T_1) - s(T_1) < \frac{\varepsilon}{4} \quad \text{и} \quad S(T_2) - s(T_2) < \frac{\varepsilon}{4}$$

Объединим разбиения T_1, T_2 и центральный отрезок $[c - \delta, c + \delta]$ в единое полное разбиение T всего сегмента $[a, b]$. Полная разность сумм Дарбу распадается на три части:

$$S(f, T) - s(f, T) = \underbrace{(S(T_1) - s(T_1))}_{< \varepsilon/4} + \underbrace{(M_c - m_c)\Delta x_c}_{\text{окрестность } c} + \underbrace{(S(T_2) - s(T_2))}_{< \varepsilon/4}$$


Подробная оценка центрального слагаемого:

- Так как функция зажата в пределах от $-M$ до $+M$, её максимальное значение $M_c \leq M$, а минимальное $m_c \geq -M$.
- Значит, максимальный размах (колебание) функции на отрезке не может превысить: $(M_c - m_c) \leq M - (-M) = 2M$.
- Длина отрезка равна $\Delta x_c = 2\delta$.
- Перемножаем их: $(M_c - m_c)\Delta x_c \leq 2M \cdot 2\delta = 4M\delta$.
- А так как на Шаге 2 мы сами зафиксировали, что $4M\delta < \frac{\varepsilon}{2}$, то центральное слагаемое железно меньше $\frac{\varepsilon}{2}$.

Собираем все три части суммы вместе:

$$S(f, T) - s(f, T) < \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{4} = \varepsilon$$

Разность сумм Дарбу оказалась меньше ε . По критерию Дарбу функция интегрируема.




Важность условия ограниченности (Пример $1/x$). Метод изоляции работает ****только**** если высота изолирующего прямоугольника ограничена константой M . Если функция улетает в бесконечность, метод ломается. Рассмотрим функцию $f(x) = \frac{1}{x}$ на интервале $(0, 1)$, доопределив её в нулю ($f(0) = 0$). У неё одна точка разрыва ($x = 0$).

Для любого разбиения T самый первый отрезок $[0, x_1]$ содержит разрыв. Точная верхняя грань функции на нём бесконечна: $M_1 = \sup_{[0, x_1]} \frac{1}{x} = +\infty$. Из-за этого верхняя сумма Дарбу всегда «взрывается»:

$$S(f, T) = \underbrace{M_1 \cdot \Delta x_1}_{+\infty} + \sum_{k=2}^n M_k \Delta x_k = +\infty$$

Разность $S(f, T) - s(f, T) = +\infty$. Критерий Дарбу не выполняется, интеграл Римана не существует.



Вопрос 16 (lucky). Свойства определенного интеграла (линейность и аддитивность)

Сформулируйте основные свойства определенного интеграла Римана. Докажите свойства линейности и аддитивности интеграла по промежутку интегрирования.

Суть на пальцах (Краткая памятка) Интеграл — это, грубо говоря, площадь. Из этого логично вытекает:

- **Линейность:** Если растянуть график в k раз, площадь тоже вырастет в k раз (константу выносим). Площадь суммы двух фигур равна сумме их площадей.
- **Аддитивность:** Если разрезать фигуру вертикальной линией на две части, то общая площадь равна сумме площадей левой и правой частей: $\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b$.

Строгие формулировки Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на отрезке $[a, b]$ (обозначается $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$).

1. **Линейность:** Для любых констант $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ функция $(\alpha f(x) + \beta g(x))$ также интегрируема на $[a, b]$, причем:

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

2. **Аддитивность:** Для любой точки $c \in (a, b)$ функция интегрируема на $[a, c]$ и $[c, b]$, причем:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Доказательство линейности Основано на свойствах конечных сумм. Запишем интегральную сумму для линейной комбинации:

$$\sigma(\alpha f + \beta g, T, \xi) = \sum_{k=1}^n (\alpha f(\xi_k) + \beta g(\xi_k)) \Delta x_k = \alpha \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k + \beta \sum_{k=1}^n g(\xi_k) \Delta x_k$$

Переходя к пределу при мелкости разбиения $\delta(T) \rightarrow 0$, пределы правых сумм существуют (т.к. $f, g \in \mathcal{R}$), следовательно, предел левой части тоже существует и равен сумме интегралов.

Доказательство аддитивности

- Пусть предел $\int_a^b$ существует. Так как предел интегральных сумм не зависит от выбора разбиения T , мы можем рассматривать **только такие разбиения**, которые обязательно включают точку c в качестве одной из точек деления ($x_m = c$).
- Тогда любая интегральная сумма на $[a, b]$ жестко распадается на две независимые суммы:

$$\sum_{[a,b]} f(\xi_k) \Delta x_k = \sum_{[a,c]} f(\xi_k) \Delta x_k + \sum_{[c,b]} f(\xi_k) \Delta x_k$$

- Переходя к пределу при $\delta(T) \rightarrow 0$, предел левой части существует по условию, следовательно, существуют и пределы слагаемых (интегралы по частям отрезка), и их сумма равна исходному интегралу.

Вопрос 17. Первая теорема о среднем

Сформулируйте и докажите первую теорему о среднем значении для определенного интеграла. Дайте геометрическую интерпретацию.

(Суть на пальцах (Краткая памятка)) Представь кривую гору песка (наш график). Если этот песок разровнять бульдозером, получится плоский прямоугольник той же ширины и такой же площади. Высота этого ровного прямоугольника — это и есть **среднее значение функции**. Теорема гласит: если функция непрерывна (без разрывов), то на графике обязательно найдется хотя бы одна точка c , в которой реальная высота горы совпадает с этой «усредненной» высотой.

Формулировка теоремы Если функция $f(x)$ **непрерывна** на отрезке $[a, b]$, то на этом отрезке существует хотя бы одна точка $c \in [a, b]$, такая что:

$$\int_a^b f(x)dx = f(c) \cdot (b - a)$$

Число $f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$ называется средним значением функции на отрезке.

Доказательство (Строго по шагам)

1. Так как $f(x)$ непрерывна на замкнутом отрезке $[a, b]$, по теореме Вейерштрасса она достигает на нем своего минимума m и максимума M . То есть: $\forall x \in [a, b] \implies m \leq f(x) \leq M$.
2. Проинтегрируем это двойное неравенство на отрезке $[a, b]$ (используем свойство сохранения знака и линейность интеграла):

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b M dx$$

3. Вычислим крайние интегралы, Эм большое и маленькое тут константы, вынесем. (константы выносятся, остается интеграл от dx , равный длине отрезка):

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b - a)$$

4. Разделим всё на положительную длину отрезка $(b - a)$:

$$m \leq \underbrace{\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx}_{\text{Обозначим это число за } \mu} \leq M$$

5. Мы получили число μ , которое лежит между минимумом m и максимумом M функции. По теореме Коши (о промежуточном значении непрерывной функции), функция обязана принимать любое значение между своим минимумом и максимумом. Значит, найдется точка $c \in [a, b]$, где $f(c) = \mu$.
6. Подставляя $\mu = f(c)$ обратно в дробь из пункта 4, получаем: $\int_a^b f(x)dx = f(c)(b - a)$. Теорема доказана.

Вопрос 18. Интеграл с переменным верхним пределом

Введите понятие интеграла с переменным верхним пределом. Сформулируйте и докажите теорему Барроу (о производной интеграла по верхнему пределу). Какова роль этой теоремы в матанализе?

Суть на пальцах (Краткая памятка) Мы привыкли, что $\int_a^b$ — это конкретное число (площадь). А что если мы зафиксируем только старт a , а правую границу x будем двигать вправо-влево? Площадь будет меняться в зависимости от x . Получается **функция площади** $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$. Букву под интегралом поменяли на t , чтобы не путать её с движущейся границей x . **Теорема Барроу:** Скорость, с которой прирастает площадь ($\Phi'(x)$), в точности равна высоте графика в этой точке ($f(x)$).

Формулировка (Теорема Барроу) Пусть $f(t)$ интегрируема на $[a, b]$. Рассмотрим функцию верхнего предела $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$. Если подынтегральная функция $f(t)$ **непрерывна** в точке x , то функция $\Phi(x)$ дифференцируема в этой точке, причем её производная равна:

$$\Phi'(x) = f(x)$$

Роль теоремы: Она доказывает, что у любой непрерывной функции гарантированно существует первообразная (и это функция $\Phi(x)$).

Доказательство Докажем по определению производной: $\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x+\Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x}$.

1. Запишем приращение функции площади $\Delta\Phi$:

$$\Delta\Phi = \Phi(x + \Delta x) - \Phi(x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt$$

2. По свойству аддитивности, разность этих площадей — это просто площадь маленького довеска от x до $x + \Delta x$:

$$\Delta\Phi = \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt$$

3. Применим к этому маленькому интегралу Первую теорему о среднем (Вопрос 17). Найдется точка c , лежащая между x и $x + \Delta x$, такая что:

$$\Delta\Phi = f(c) \cdot ((x + \Delta x) - x) = f(c) \cdot \Delta x$$

4. Составим отношение приращения функции к приращению аргумента:

$$\frac{\Delta\Phi}{\Delta x} = f(c)$$

5. Перейдем к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$. Так как точка c зажата между x и $x + \Delta x$, по теореме о двух милиционерах точка $c \rightarrow x$.

6. А так как f непрерывна в точке x , то $\lim_{c \rightarrow x} f(c) = f(x)$. Следовательно:

$$\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta\Phi}{\Delta x} = \lim_{c \rightarrow x} f(c) = f(x)$$

Вопрос 19. Формула Ньютона-Лейбница

Сформулируйте и докажите формулу Ньютона-Лейбница, связывающую определенный интеграл с первообразной. Приведите пример вычисления.

Суть на пальцах (Краткая памятка) Это главная теорема в матанализе. Это БАЗА.. Она связывает две абсолютно разные вещи: поиск первообразной (действие, обратное производной) и поиск площади под кривой (предел дробных сумм прямоугольников). Формула говорит: не нужно считать бесконечные пределы сумм! Найди первообразную $F(x)$, подставь верхнюю границу, вычти нижнюю границу — и площадь готова.

Формулировка Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, а $F(x)$ — любая её первообразная на этом отрезке (т.е. $F'(x) = f(x)$), то справедлива формула:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) \equiv F(x) \Big|_a^b$$

Доказательство

1. Из теоремы Барроу (Вопрос 18) мы знаем, что интеграл с переменным верхним пределом $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ является первообразной для $f(x)$, так как $\Phi'(x) = f(x)$.
2. По теореме о первообразных, любые две первообразные одной и той же функции отличаются только на константу C . Следовательно, наша произвольная первообразная $F(x)$ связана с $\Phi(x)$ уравнением:

$$F(x) = \Phi(x) + C = \int_a^x f(t)dt + C$$

3. Чтобы найти константу C , подставим $x = a$. Интеграл от a до a равен нулю (площадь отрезка нулевой ширины):

$$F(a) = \int_a^a f(t)dt + C = 0 + C \implies C = F(a)$$

4. Теперь перепишем уравнение из пункта 2, зная C , и подставим верхнюю границу $x = b$:

$$F(b) = \int_a^b f(t)dt + F(a)$$

5. Переносим $F(a)$ в левую часть и получаем искомую формулу:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Вопрос 20. Замена переменной и интегрирование по частям

Сформулируйте и докажите теоремы о замене переменной и формуле интегрирования по частям для определенного интеграла Римана. Укажите главное отличие от неопределенного интеграла.

Главное отличие от неопределенного интеграла

- **Замена переменной** ($x \rightarrow t$): Пределы интегрирования a, b **обязательно пересчитываются** в новые числа α, β . Возвращаться к старой переменной x в конце не нужно.
- **Интегрирование по частям**: Переменная не меняется, пределы те же, но внеинтегральный член сразу вычисляется на границах: $\left[U(x)V(x) \right]_a^b$.

Теорема 1 (Замена переменной) Пусть $f(x) \in C[a, b]$, а $x = \varphi(t)$ непрерывно дифференцируема на $[\alpha, \beta]$, причем $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$ и $\varphi([\alpha, \beta]) \subseteq [a, b]$. Тогда:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)dt$$

Идея доказательства: Дифференцирование сложной функции + формула Ньютона-Лейбница (ФНЛ).

Доказательство. Пусть $F(x)$ — первообразная для $f(x)$, то есть $F'(x) = f(x)$. По правилу сложной функции:

$$(F(\varphi(t)))'_t = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$$

Значит, $F(\varphi(t))$ — первообразная для правой части. Применим ФНЛ к обоим интегралам:

- Левый: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$
- Правый: $\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = F(\varphi(t)) \Big|_{\alpha}^{\beta} = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = F(b) - F(a)$

Левые части равны, так как равны правые. □

Теорема 2 (Интегрирование по частям) Пусть $U(x), V(x)$ непрерывно дифференцируемы на $[a, b]$. Тогда:

$$\int_a^b U(x)V'(x)dx = \left[U(x)V(x) \right]_a^b - \int_a^b V(x)U'(x)dx$$

Идея доказательства: Интегрирование производной произведения функций + ФНЛ.

Доказательство. По правилу Лейбница: $(UV)' = U'V + UV'$. Проинтегрируем равенство на $[a, b]$:

$$\int_a^b (UV)'dx = \int_a^b U'Vdx + \int_a^b UV'dx$$

По ФНЛ левый интеграл равен $\int_a^b (UV)'dx = [UV]_a^b$. Подставим и выразим нужный интеграл:

$$\left[U(x)V(x) \right]_a^b = \int_a^b VdU + \int_a^b UdV \implies \int_a^b UdV = \left[U(x)V(x) \right]_a^b - \int_a^b VdU$$

□

Бонус-пример (Комбо: Замена с пересчетом пределов $\rightarrow$ По частям) Вычислим $I = \int_0^{\pi^2/4} \cos(\sqrt{x})dx$.

1. Замена переменной: Пусть $t = \sqrt{x} \implies x = t^2 \implies dx = 2t dt$. Пересчет пределов:

- Нижний: $x = 0 \implies t = 0 \equiv \alpha$
- Верхний: $x = \pi^2/4 \implies t = \pi/2 \equiv \beta$

Получаем новый интеграл (работаем только в пределах от 0 до $\pi/2$ по переменной t):

$$I = \int_0^{\pi/2} \cos(t) \cdot 2t dt = 2 \int_0^{\pi/2} t \cos t dt$$

2. Интегрирование по частям (в новых пределах α, β): Пусть $U = t \implies dU = dt$

Пусть $dV = \cos t dt \implies V = \sin t$.

$$\int_0^{\pi/2} t \cos t dt = \left[t \sin t \right]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin t dt$$

- Вычисляем внеинтегральный член на новых пределах: $\left[t \sin t \right]_0^{\pi/2} = \left(\frac{\pi}{2} \cdot \sin \frac{\pi}{2} \right) - (0 \cdot \sin 0) = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}$
- Добиваем оставшийся интеграл: $\int_0^{\pi/2} \sin t dt = \left[-\cos t \right]_0^{\pi/2} = (-\cos \frac{\pi}{2}) - (-\cos 0) = 0 + 1 = 1$

Собираем всё вместе, не забывая внешнюю двойку:

$$I = 2 \cdot \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = \pi - 2$$