

1 Уравнение на хармоничния осцилатор.

Разглеждаме задачата на Коши за уравнението на хармоничния осцилатор

$$\begin{aligned}y''(t) + ky'(t) + \omega^2 y(t) &= f(t), \quad t > 0 \\ y(0) &= y_0, \quad y'(0) = v_0,\end{aligned}\tag{1}$$

където коефициентът на триене $k \geq 0$ и собствената честота $\omega > 0$ са параметри, зависеща от конкретната физична система, а y_0 и v_0 са константи.

Задача 1. Решете символно задачата на Коши (1) и начертайте графиките на решението $y(t)$ и неговата първа производна $y'(t)$, както и кривата $\phi := \{(y(t), y'(t))\}$ за $t \in [0, 30]$ при $y_0 = 1$, $v_0 = 1$, $\omega = 4$, и

а) $k = 0$, $f(t) = 0$ - свободни трептения без триене;

б) $k = 0.5$, $f(t) = 0$ - свободни трептения с триене;

в) $k = 0$, $f(t) = 3 \sin \frac{t}{2}$ - принудени трептени;

г) $k = 0$, $f(t) = 3 \sin(4t)$ - резонанс;

д) $k = 0$, $f(t) = 3 \sin(4, 6t)$ - биене.

Ще направим анимация на движението на съответните точки върху кривите с нарастване на t .

```
function hoscilator
```

```
clear
```

```
clf
```

```
%HARMONICHEN OSCILATOR s dsolve
```

```
t0=0;y0=1;v0=1; tmax=30;k=0;w=4;
```

```
y=simplify ( dsolve ( 'D2y+0.5*Dy+16*y=3*sin ((0)*t) ', 'y(0)=1 ', 'Dy(0)=1 ') )  
dy=diff(y);
```

```
% bez triene (k=0) i bez vunshna sila
```

```
% s triene k=0.5
```

```
% s vunshna sila k=0,f= 3sin(w1 x), chestota w1= 0.5; rezonans s w1=w
```

```
% i biene s w1=w+0.6
```

```
t=t0:0.05:tmax;
```

```
Y=eval(y);dY=eval(dy);
```

```
for k = 1: length(t)
```

```
subplot(4,1,1)
```

```
plot(t(1:k),Y(1:k), 'LineWidth', 2)
```

```
axis([t0,tmax,-2,2])
```

```
grid on
```

```
xlabel('t')
```

```
ylabel('y(t)')
```

```
title('solution')
```

```

subplot(4,1,2)
plot(t(1:k),dY(1:k),'r','LineWidth',2)
axis([t0,tmax,-5,5])
grid on
xlabel('t')
ylabel('y{\prime}(t)')
title('velocity')

```

```


subplot(4,1,3:4)
plot(Y(1:k),dY(1:k),'b','LineWidth',2)
axis([-8,8,-8,8]/2)
grid on
xlabel('y(t)')
ylabel('y{\prime}(t)')
title('phase curve')

```


```

M(k)=getframe;
end
end


```




Фигура 1: Периодично движение.




Фигура 2: Триене.



Фигура 3: Принудени трептения.



Фигура 4: Резонанс.



Фигура 5: Биене.

Задача 2. Дадена е задачата на Коши за уравнението на хармоничния осцилатор

$$\begin{cases} y'' + 5y = a \cos(\omega_0 t) \\ y(0) = 2, y'(0) = -1. \end{cases}$$

1. Сведете дадената задача до задача на Коши за нормална система от първи ред.

2. Решете символно получената задача на Коши при $a = 0$. Начертайте графиката на намереното решение на изходната задача в интервала $[0, 60]$.

2. При $a = 2$ изберете подходяща стойност на честота ω_0 на външната сила, така че да демонстрирате явлението биене. Решете числено получената задача и начертайте графиката на намереното приближение на решението на дадената задача в същия интервал, както в подточка (1). Разположете графиките от двете подточки една под друга.

Решение. Полагаме $y_1(t) = y(t)$, $y_2(t) = y'(t)$ и получаваме задачата на Коши

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2 \\ \dot{y}_2 = -5y_1 + a \cos(\omega_0 t) \\ y_1(0) = 2, y_2(0) = -1. \end{cases}$$

```
function hoscilator2
```

```
clear
```

```
clf
```

```
t0=0;tmax=60;
```

```
y0=2;v0=-1;w=sqrt(5);
```

```
[y1,y2]=dsolve('Dy1=y2','Dy2=-5*y1','y1(0)=y0','y2(0)=v0')
```

```
t=t0:0.05:tmax;
```

```
subplot(2,1,1)
```

```

plot(t,eval(y1))
grid on
xlabel('t')
ylabel('y(t)')
title('periodichno dvijenie')

```

```

a=2; omega0=w+0.2;
function u=f(t,y)
    u=[y(2);-5*y(1)+a*cos(omega0*t)];
end

```

```

[T,Y]=ode45(@f,[t0,tmax],[y0;v0]);

```

```

subplot(2,1,2)

```

```


plot(T,Y(:,1))
grid on
xlabel('t')
ylabel('y(t)')
title('biene')

```

```


end

```



2 Математическо махало

Ще разгледаме движението на тежка частица P с маса m по окръжност C с център точката O и радиус l , разположена във вертикална равнина. Избираме оста Ox да е насочена в посока на земното ускорение g . Нека φ е ъгълът между оста Ox и OP , а движението на точката да започва в момента t_0 от положение $P_0(\varphi_0)$. Друга поста-



Фигура 6: Математическо махало.

новка на задачата, която води до същия модел е движението във вертикална равнина на тежка частица P с маса m , закачена посредством безтегловен неразтеглив прът с дължина l за една фиксирана точка O .

Първоначална ще предполагаме, че няма триене. Тогава уравнението описващо движението на тежката частица е

$$\ddot{\varphi} + \omega^2 \sin \varphi = 0. \quad (2)$$

Това уравнение се нарича уравнение на математическото махало и често се среща в различни задачи на механиката в една от двете си форми, написани по-горе. В случая, когато разглеждаме малки осцилации около равновесното положение, можем да смятаме, че $\sin \varphi \approx \varphi$. Тогава уравнението (2) приема вида

$$\ddot{\varphi} + \omega^2 \varphi = 0. \quad (3)$$

Това е линейно уравнение от втори ред и ако знаем началното положение $\varphi(t_0)$ и началната скорост $\dot{\varphi}(t_0)$, можем еднозначно да определим положението на частицата във всеки момент $t \geq t_0$.

Периодът на това движение е

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}. \quad (4)$$

Този период не зависи от началното отклонение, тоест осцилирането е изохронно. Ако отчетем и съпротивлението γ , което оказва средата, в която се движи частицата P , то уравнението на движението ще има следния вид

$$ml\ddot{\varphi} + \gamma\dot{\varphi} + mg\sin\varphi = 0. \quad (5)$$

Пример 2.1 Да се визуализира движението на математическото махало за $t \in [0, 30]$, ако дължината на пръта е 6 m., масата на точката е 2 kg., а коефициента на съпротивление на средата е 0.4. Първоначално точката е отклонена от равновесното си положение на ъгъл $\pi/3$, а началната и скорост е 0.3 m/sec.

Решение. За малки отклонения от равновесното положение можем да използваме следното линейно приближение на уравнението на движението (5)

$$ml\ddot{\varphi} + \gamma\dot{\varphi} + mg\varphi = 0.$$

Въвеждаме нови функции $y_1(t) = \varphi(t)$, $y_2(t) = \dot{\varphi}(t)$ и достигаем до следната задача на Коши

$$\begin{cases} y_1' = y_2, \\ y_2' = -\frac{g}{l}y_1 - \frac{\gamma}{m}y_2, \\ y_1(0) = \pi/6, y_2(0) = 0.3, \end{cases} \quad (6)$$

която ще решим числено.

Следния примерен Matlab код визуализира движението на махалото.

```
function pendulum

clear; clf;

gamma=0.4; m=2; g=9.81; l=6; tmax=30;

%дясна страна на системата
function z=rhs(t,y)
z= [y(2); -(g/l)*y(1) - (gamma/m)*y(2)];
end

% решаване на системата
[T,Y]=ode45(@rhs,[0,tmax],[pi/3, 0.3]);

% координатите на частицата
x=l*sin(Y(:,1)); y=-l*cos(Y(:,1));

% движението частицата

for k = 1:length(T)
```

```

subplot(4,4,1:12)

plot(x(k),y(k),'LineWidth',2)
hold on
axis([-1-1 1+1 -1-1 1+1]);
daspect([1,1,1])

p=0:pi/50:2*pi;
plot(l*cos(p),l*sin(p),'g')
line([0,x(k)],[0,y(k)'],'LineWidth',2);

plot([-1 1],[0 0],':k');
plot([0 0],[-1 1],':k');

rectangle('Position',[x(k)-0.4 y(k)-0.4 0.8 0.8]...
'Curvature',[1,1],'FaceColor','r')
rectangle('Position',[-0.15 -0.15 0.3 0.3]...
'Curvature',[1,1],'FaceColor','k')


hold off

subplot(4,4,13:16)
plot(T(1:k),Y(1:k,1),'LineWidth',2)
axis([0,tmax,-1.3,1.3])
grid on
xlabel('t')
set(0,'DefaultTextInterpreter','latex');
ylabel('$\varphi(t)$')


getframe;

end
end

```

Фигура 7: Движение на математическото махало от Пример 2.1 в моментите $t = 0$.



Фигура 8: Движение на математическото махало от Пример 2.1 в моментите $t = 14$.