

## СЕМ, лекция 2

(2020-10-08)

**Дефиниция: (Вероятност)** Нека  $\mathcal{A}$  е  $\sigma$ -алгебра върху множество от елементарни събития  $\Omega$ . Тогава изображението  $\mathbb{P} : \mathcal{A} \rightarrow [0,1]$  се нарича вероятност, ако са изпълнени следните три условия:

- 1)  $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
- 2) Ако  $A \in \mathcal{A}$  и  $A^c = \Omega \setminus A$ , то  $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$
- 3) Ако  $A_i \in \mathcal{A}$ ,  $\forall i \geq 1$  и  $A_i \cap A_j = \emptyset$  за  $i \neq j$ , то  $\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_k)$


(Ако имаме редица от непресичащи се събития, то вероятността поне едно от тях да се случи (операцията „или“) е сумата на индивидуалните вероятности. В този смисъл вероятността е мярка, тъй като това е най-класическото свойство на мярката)

**Следствие:** Нека имаме  $\mathbb{P} : \mathcal{A} \rightarrow [0,1]$  е вероятност. Тогава са изпълнени следните свойства ( $A, B \in \mathcal{A}$ ) :

- a)  $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
- b) Ако  $B \subseteq A$ , то  $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A^c \cap B)$ ,  $\forall A \in \mathcal{A}$
- c) Ако  $A \subseteq B$ , то  $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$  (Монотонност)
- d)  $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$
- e)  $A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \dots$ , то  $\mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n)$  (Непрекъснатост)
- f) Ако имаме  $A_i, i \geq 1$ , то  $\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$ . Това свойство е изпълнено и за всяко крайно обединение от събития:  $\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$ , за някое  $n \in \mathbb{N}$ .

**Доказателство:**


- a)  $\emptyset = \Omega^c \xRightarrow{2)} \mathbb{P}(\emptyset) = 1 - \mathbb{P}(\Omega) = 0$
- b)  $A, B \in \mathcal{A}$



$$\Rightarrow B = (A \cap B) \cup (A^c \cap B) \Rightarrow \mathbb{P}(B) \stackrel{3)}{=} \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A^c \cap B)$$

c)  $B = A \cup (B \cap A^c)$

$$\mathbb{P}(B) \stackrel{3)}{=} \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \cap A^c) \geq \mathbb{P}(A)$$




d)  $A \cup B = (A \cap B^c) \cup (A \cap B) \cup (B \cap A^c)$

$$\mathbb{P}(A \cup B) \stackrel{3)}{=} \mathbb{P}(A \cap B^c) + \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(B \cap A^c) =$$

$$\stackrel{b)}{=} \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \cap A^c) + \underbrace{\mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap B)}_{\text{добавяме и изваждаме}} =$$

$$\stackrel{b)}{=} \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$



e)  $A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \dots$

$A = \bigcap_{j=1}^{\infty} A_j$  е множеството, което

принадлежи на всяко едно от събитията.

Под  $A \setminus B$  разбираме множеството  $A$  без множеството  $B$ , т.е.  $A \setminus B = A \cap B^c$ .


Цел: Да докажем, че  $\mathbb{P}(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n)$ .

$$A_1 = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \setminus A_{j+1} \cup A \stackrel{3)}{\Rightarrow}$$

$$1 \geq \mathbb{P}(A_1) = \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_j \setminus A_{j+1}) + \mathbb{P}(A) \Rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_j \setminus A_{j+1}) < \infty \text{ е сходящ ред.}$$

$$\text{От друга страна, } A_n = \bigcup_{j=n}^{\infty} A_j \setminus A_{j+1} \cup A \Rightarrow \mathbb{P}(A_n) = \sum_{j=n}^{\infty} \mathbb{P}(A_j \setminus A_{j+1}) + \mathbb{P}(A).$$

$$\text{Граничен преход: } \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A) + \underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=n}^{\infty} \mathbb{P}(A_j \setminus A_{j+1})}_{=0} = \mathbb{P}(A).$$




f)  $\mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_j)$

$\left(\sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_j) \geq \mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^n A_j\right)\right)$ , това може да се докаже по индукция, използвайки

$\mathbb{P}(A \cup B) \stackrel{d)}{\leq} \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ , но ние ще докажем директно по-общия случай за безкраен брой множества.)

$$\begin{aligned}
A_1 &= B_1 \\
B_2 &= A_2 \setminus A_1 = A_2 \cap A_1^c \\
B_3 &= A_3 \setminus (A_1 \cup A_2) \\
&\dots \\
B_n &= A_n \setminus \left( \bigcup_{j=1}^{n-1} A_j \right) \subseteq A_n \\
&\dots
\end{aligned}$$



$$B_i \cap B_j = \emptyset, i \neq j$$

От друга страна имаме, че:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} B_j\right) \stackrel{3)}{=} \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_j), \text{ но } B_j \subseteq A_j \stackrel{c)}{\Rightarrow} \mathbb{P}(B_j) \leq \mathbb{P}(A_j). \text{ Т.е. е в сила}$$

$\mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} B_j\right) \stackrel{3)}{=} \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_j) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_j)$ . Остана да докажем, че  $\bigcup_{j=1}^{\infty} B_j = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j$  (тъй като, ако това е изпълнено, то ще може да го заместим в предходното равенство и да получим желанния резултат).

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} B_j \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \text{ е очевидно, тъй като } B_j \subseteq A_j, \forall j. \text{ Защо, обаче } \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j \supseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j?$$

Нека вземем елемент  $\omega \in \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \Rightarrow \omega \in A_k$  за някое  $k$ . Да вземем

$k = \min\{j \geq 1 : \omega \in A_j\}$  (най-малкия номер  $k$  на множество, в което елемента  $\omega$  принадлежи – знаем, че със сигурност ще има поне едно такова множество)

$$B_k = A_k \setminus \bigcup_{j=1}^{k-1} A_j, \text{ но } \omega \notin \bigcup_{j=1}^{k-1} A_j \Rightarrow \omega \in B_k \Rightarrow \omega \in \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} B_j\right) \stackrel{3)}{=} \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_j) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_j), \text{ което искахме да докажем.}$$

Примери:

$$\oplus_1: \Omega = \{0,1\}; \mathcal{A} = \{\emptyset, \Omega, \{0\}, \{1\}\} = 2^\Omega$$

$\mathbb{P}(\{0\}) := p, \mathbb{P}(\{1\}) := 1 - p, p \in [0,1]$ , то  $\mathbb{P}$  е вероятност.

$\oplus_2$  : Дискретна вероятност:

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\} \simeq \{1, 2, \dots, N\}$$

$$\mathcal{A} = 2^\Omega, (p_i)_{i=1}^N : p_i \geq 0, \forall i \geq 1 \text{ и } \sum_{i=1}^N p_i = 1.$$

$$\forall A \subseteq \Omega, \mathbb{P}(A) := \sum_{i \in A} p_i$$


$\mathbb{P} : \mathcal{A} \rightarrow [0,1]$  е вероятност

$$A = \{1, 3, 5\}, \mathbb{P}(A) = p_1 + p_3 + p_5.$$

$$\text{Проверка: По дефиниция } \mathbb{P}(\Omega) = \sum_{i \in \Omega} p_i = \sum_{i=1}^N p_i = 1$$

$$\text{Ако } A \subseteq \Omega, \text{ то } \mathbb{P}(A^c) = \sum_{i \in A^c} p_i = \sum_{i \notin A} p_i = \sum_{i=1}^N p_i - \sum_{i \in A} p_i = 1 - \mathbb{P}(A).$$

Нека  $A_1, \dots, A_k$  са непресичащи се събития:



$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^k A_j\right) = \sum_{i \in \bigcup_{j=1}^k A_j} p_i = \sum_{j=1}^k \sum_{i \in A_j} p_i = \left( i \text{ принадлежи на точно едно от събитията} \right) = \sum_{j=1}^k \mathbb{P}(A_j).$$

$$\oplus_3 : \Omega = \{1, 2, \dots, N\}$$

$$\text{Ако дефинираме } p_i = \frac{1}{N}, 1 \leq i \leq N, \text{ то } \mathbb{P}(A) = \sum_{i \in A} \frac{1}{N} = \frac{|A|}{N} \text{ се нарича}$$

равномерна вероятност! Това означава, че всяко едно от елементарните събития има равен шанс да се събдне.

$$\oplus_4 : \Omega = \{1, 2, \dots, N\}$$

$$A = \{i \leq N : i \text{ е четно}\}$$

$$A^c = \{i \leq N : i \text{ е нечетно}\}$$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{N} = p$$

$$\mathbb{P}(A^c) = \frac{N - |A|}{N} = 1 - p$$

$$\Omega = \{0, 1\}, \mathcal{A} = (\Omega, \emptyset, A, A^c) \subseteq 2^\Omega$$

$\oplus_5$  : Дискретни вероятности

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\} \simeq \{1, 2, \dots\}$$

$$\mathcal{A} = 2^\Omega$$

Дадена е редица  $(p_i)_{i=1}^\infty : p_i \geq 0, \forall i \geq 1$  и  $\sum_{i=1}^\infty p_i = 1$ .

Ако  $A \subseteq \mathcal{A}$ ,  $\mathbb{P}(A) := \sum_{i \in A} p_i$ , то  $\mathbb{P} : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$  задава вероятност.

$$\oplus_6 : \Omega = \{1, 2, \dots\}$$

$$p_i = \frac{c}{i^2}, i \geq 1$$

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i \in A} p_i = c \sum_{i \in A} \frac{1}{i^2}; \quad c \sum_{i=1}^\infty \frac{1}{i^2} = 1 \Leftrightarrow c = \frac{6}{\pi^2}, \text{ тъй като } \sum_{i=1}^\infty \frac{1}{i^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Следователно само за  $c = \frac{6}{\pi^2}$  ще може да дефинираме вероятност.

$$\oplus_7 : \Omega = \{0, 1, \dots\}$$

$$p_i = qp^i, i \geq 0, p + q = 1, p \in (0, 1).$$

$$\sum_{i=0}^\infty qp^i = \frac{q}{1-p} = 1 \text{ (геометрична прогресия и дефиниране на геометрично}$$

рзпределение)

$\oplus_8 : \Omega = \{1, 2, \dots\}$  тук не може да дефинираме равномерно разпределение, т.е.

$$p_i = p_j \text{ за всяко } i, j.$$