

### Упражнение 3 по СЕМ

19 октомври 2020 г.

**Задача 1.** С цел намаляване броя на играните мачове,  $2k$  отбора с жребий се разбиват на две равни по брой групи. Да се определи вероятността двата най-силни отбора да са в различни групи.

**Решение:**

Нека двата най-силни отбора са 1 и 2 и нека

$A = \{\text{първата група, в която сме фиксирали отбор 1}\}$

$B = \{\text{влиза отбор 1, но не влиза отбор 2}\}$

$$\text{Тогава } \mathbb{P}(B) = \frac{|B|}{|A|} = \frac{\binom{2k-2}{k-1}}{\binom{2k-1}{k-1}}.$$

**Задача 2.** От урна, която съдържа топки с номера  $1, 2, \dots, n$ ,  $k$  пъти последователно се вади по една топка. Да се пресметне вероятността номерата на извадените топки, записани по реда на изваждането, да образуват растяща редица, ако:

- a) извадката е без връщане;
- b) извадката е с връщане.

**Решение:**

a) Всички възможни избори без връщане са  $\Omega = V(n; k)$ . Избираме редица  $(i_1, i_2, \dots, i_k)$ .

$A = \{\text{строго растяща редица}\} = \{(i_1, i_2, \dots, i_k) \in \mathbb{Z}^k \mid 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n\}$

$A \rightarrow C_n^k$

$(i_1, i_2, \dots, i_k) \mapsto \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$

$$\mathbb{P} = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\binom{n}{k}}{V_n^k} = \frac{1}{k!}.$$

b)  $\Omega = V(n; k)$

$B = \{(i_1, i_2, \dots, i_k) \in \mathbb{Z}^k \mid 1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_k \leq n\}$

$B \rightarrow C(n; k)$

$(i_1, i_2, \dots, i_k) \xrightarrow{\varphi} [i_1, i_2, \dots, i_k]$  – мултимножество

$\Rightarrow \varphi$  е биекция

$$|B| = |C(n; k)| \Rightarrow \mathbb{P} = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{\binom{n+k-1}{k}}{n^k}.$$

**Задача 3.** Парадокс на дьо Мере: Да се пресметне вероятността при хвърляне на 2 зара да се падне поне една шестица, ако всички изходи са равновероятни и:

- a) заровете са различни;
- b) заровете са неразличими.

Кой модел отразява вярно действителността?

**Решение:**

Всички възможни събития са  $\Omega = V(6; 2) = 36$ .

а) Нека  $A = \{\text{не се пада нито една шестлица}\}$ . Тогава  $\bar{A} = \{\text{пада се поне една шестлица}\}$  е  $\bar{A} = \Omega \setminus A$ .

$$\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A) = 1 - \frac{5.5}{36} = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}.$$

б)  $\bar{A} = \{[1 \div 5, 1 \div 5]\}$  - двueleментните мултимножества на числата от едно до пет.

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \frac{|C(5; 2)|}{|C(6; 2)|} = 1 - \frac{\binom{5+2-1}{2}}{\binom{6+2-1}{2}} = 1 - \frac{\binom{6}{2}}{\binom{7}{2}} = 1 - \frac{5}{7} = \frac{2}{7}.$$

В действителността може да приемем, че всеки два обекта са различни. Следователно първия модел отразява вярно действителността.

**Задача 4.** Вероятността стрелец да улучи мишена е  $\frac{2}{3}$ , ако улучи той получава право на втори изстрел. Вероятността за улучване и на двете мишени е  $\frac{1}{2}$ . Каква е вероятността за улучване на втората мишена, ако стрелецът е получил право да стреля втори път?

**Решение:**

Нека  $A_i = \{\text{стрелеца улучва } i\text{-тата мишена}\}$

$$\mathbb{P}(A_1) = \frac{2}{3}; \mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \frac{1}{2}. \text{ Търси се } \mathbb{P}(A_2 | A_1).$$

$$\mathbb{P}(A_2 | A_1) = \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2)}{\mathbb{P}(A_1)} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{4}.$$

**Задача 5.** Застрахователна компания води статистика за воите клиенти:

- всички клиенти посещават поне веднъж годишно лекар;
- 60 % посещават повече от веднъж годишно лекар;
- 17 % посещават хирург;
- 15 % от тези, които посещават повече от веднъж годишно лекар, посещават хирург.

Каква е вероятността случайно избран клиент, който посещава само веднъж годишно лекар, да не е бил при хирург?

**Решение:**

Разбиваме множеството на клиентите на:

$$A = \{\text{клиент, който е посещавал лекар точно веднъж}\}$$

$$\bar{A} = \{\text{клиент, който е посещавал лекар повече от веднъж}\}$$

$$H = \{\text{клиент който е бил при хирург}\}$$

Имаме, че:

$$\mathbb{P}(\bar{A}) = 60\%, \mathbb{P}(A) = 1 - \bar{A} = 1 - 60\% = 40\%, \mathbb{P}(H) = 17\%, \mathbb{P}(H | \bar{A}) = 15\%$$

Търси се:  $\mathbb{P}(\bar{H} | A)$ .

$$\mathbb{P}(\bar{H} | A) = \frac{\mathbb{P}(\bar{H} \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(\bar{H} \cap \bar{A})}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(\overline{H \cup \bar{A}})}{\mathbb{P}(A)}, \text{ но от принципа на включването и изключването имаме, че}$$

$$\mathbb{P}(H \cap \bar{A}) = \mathbb{P}(H) + \mathbb{P}(\bar{A}) - \mathbb{P}(H \cup \bar{A}) \text{ или } \mathbb{P}(H \cup \bar{A}) = \mathbb{P}(H) + \mathbb{P}(\bar{A}) - \mathbb{P}(H \cap \bar{A}).$$

$$\text{Следователно } \mathbb{P}(\bar{H} | A) = \frac{1 - \mathbb{P}(H \cup \bar{A})}{\mathbb{P}(A)} = \frac{1 - \mathbb{P}(H) - \mathbb{P}(\bar{A}) + \mathbb{P}(H \cap \bar{A})}{\mathbb{P}(A)} \quad \star$$

$$\text{От друга страна, от формулата за условна вероятност имаме, че } \mathbb{P}(H | \bar{A}) = \frac{\mathbb{P}(H \cap \bar{A})}{\mathbb{P}(\bar{A})}$$

$$\text{или } \mathbb{P}(H \cap \bar{A}) = \mathbb{P}(\bar{A})\mathbb{P}(H | \bar{A}).$$

Сега заместваме с горното равенство в  $\star$  и получаваме:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\bar{H} | A) &= \frac{1 - \mathbb{P}(H) - \mathbb{P}(\bar{A}) + \mathbb{P}(\bar{A})\mathbb{P}(H | \bar{A})}{\mathbb{P}(A)} \\ &= \frac{1 - 17\% - 60\% + 60\% \times 15\%}{40\%} = \frac{23\% + 9\%}{40\%} = \frac{4}{5} = 80\% \end{aligned}$$

**Задача 6. Да се определи вероятността, случайно избрано естествено число, да не се дели:**

- a) нито на две, нито на три;
- b) на две или на три.

**Решение:**

Нека всички естествени числа, без ограничение на общността са  $n$ .

Тези, които се делят на 2 са  $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$  и нека ги отбележим с  $D_2$ ;

Тези, които се делят на 3 са  $\left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor$  и нека ги отбележим с  $D_3$ ;

Тези, които се делят на 6 са  $\left\lfloor \frac{n}{6} \right\rfloor$  и нека ги отбележим с  $D_{23}$ ;

Нека  $A = \{\text{тези, които не се делят нито на 2 нито на 3}\} = \Omega \setminus \{\text{тези, които се делят и на 2 и на 3}\}$

Следователно  $\bar{A} = D_2 \cup D_3$ ;

$$|D_2 \cup D_3| = |D_2| + |D_3| - |D_2 \cap D_3|$$

$$|A| = 1 - |D_2 \cup D_3| = 1 - |D_2| - |D_3| + |D_2 \cap D_3| = 1 - \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{6} \right\rfloor$$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1 - \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{6} \right\rfloor}{n} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}.$$

В подточка b) отговора е  $\mathbb{P}(A) = \frac{\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{3} \right\rfloor - 2\left\lfloor \frac{n}{6} \right\rfloor}{n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$ . От тези, които се делят на две, вадим тези които се делят и на три и аналогично обратното. Тук сме допуснали, че ако числото се дели на 2, то не искаме да се дели на 3 и обатното.

**Задача 7.** Хвърлят се два зара. Каква е вероятността сумата от падналите числа да е по-малка от 8, ако се знае, че тя е нечетна? Независими ли са двете събития?

**Решение:**

Нека  $A = \{\text{сумата от двата зара е по-малка от } 8\} = \{(a, b) \mid a + b \leq 7\}$  и

$B = \{\text{сумата от двата зара е нечетна}\} = \{a + b \equiv 1 \pmod{2}\}$

$\Omega = \{\text{множеството от всички възможни събития}\} = V(6; 2), |\Omega| = |V(6; 2)| = 36$

Всевъзможните суми са:  $x_1 + x_2 = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$

Всевъзможните начини за съставяне на всяка сума са съответно:

$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36$

Възможните конфигурации, в които сумата е по-малка от 8 са:

$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 16$

От тях  $2 + 4 + 6 = 12$  дават нечетна сума  $\Rightarrow \mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ .