# Lentille
# Bilan de campagne 2019
## National

06 décembre 2019

*La campagne 2019 s'est caractérisée par un climat sec et des températures très élevées au cours de la floraison et du remplissage des gousses, plutôt défavorables à la lentille par rapport à une année classique. L'absence de maladies dans la majorité des territoires n'a pas pu contrebalancer les effets du stress liés aux variations de températures subies (gelées tardives, amplitudes thermiques, fortes températures en fin de cycle) qui ont abouti à un nombre d'étage de gousses et un PMG faibles pour un rendement globalement en baisse par rapport aux années précédentes (hors bassin de la Haute-Loire).*

Pour ce bilan de campagne, une sélection d'illustrations a été réalisée à partir de données des stations météorologiques.

**Les résultats présentés dans ce bilan de campagne sont le fruit d'un travail collectif réalisé avec l'ensemble des partenaires et techniciens au niveau national.**
**Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué au réseau.**

**Gwénola RIQUET –** Référente nationale lentille
g.riquet@terresinovia.fr

# Évolution des surfaces – rendements 2019

- **Surfaces**

Depuis 2015, la lentille a bénéficié d'un engouement réel et ses surfaces ont triplé passant de 17 000 ha en 2015 à quasiment 37 000 ha en 2018 – un record. Les surfaces officielles pour 2019 n'étant pas disponibles au moment de la rédaction de ce bilan, une estimation plausible pour 2019 est une stagnation voire un léger recul des surfaces implantées du fait d'une saturation du marché observée pour cette campagne.




**Figure 1 : Evolution des surfaces nationales de lentille - octobre 2019**

| Surfaces 2018 par bassin de production (ha) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Aube, Marne et Yonne** | **Centre-Val de Loire** | **Gers** | **Haute-Loire** | **Charente et Vendée** |
| 7 665 | 10 313 | 2 240 | 3 992 | 2 726 |
| **36 855 ha** | | | | |

**Tableau 1 : Surfaces par bassin de production de lentille en 2018 -** Source : Terres Inovia et Terres Univia d'après les données du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) – octobre 2019

- **Rendement 2019**

Après une excellente campagne en 2018, 2019 recense des rendements globalement en baisse - à noter qu'une grande variabilité est observée en fonction des bassins (Tableau 2). Deux exceptions sont toutefois notables : la Haute-Loire a enregistré un rendement moyen de 7,5 q/ha, soit une nette amélioration par rapport aux trois dernières années ; et le Sud-Ouest, fortement impacté en 2018 par des orages ayant compromis la récolte.

| Rendement 2019 (2018) en q/ha | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Aube, Marne et Yonne** | **Centre-Val de Loire** | **Gers (AB)** | **Haute-Loire** | **Charente et Vendée** |
| 27 (35) | 17 (21) | 10 (7) | 7,5 (5,5) | 19 (20) |

**Tableau 2 : Moyenne de rendement lentille sur 2019 et 2018 par bassin de production**

# Bilan de campagne

- **Des semis dans le sec et le froid : une levée hétérogène.**

Dans la majorité des situations, les levées et les développements végétatifs en début de campagne ont été hétérogènes. Dans la plupart des secteurs, les semis se sont déroulés dans des sols en déficit hydrique (Figure 2). Le cumul de précipitations du 01/01 au 31/04 est en deçà de la normale, avec entre 20 % et 50 % de déficit des pluies selon les zones.




**Figure 2 : Cumul des précipitations par rapport à la normale (%)**




**Figure 3 : Cumul des précipitations de janvier à juin (station Issoudun)**

Des températures plus élevées que la normale ont été relevées tout au long du mois de février, d'où le déclenchement de semis opportunistes dans certaines zones. Mais globalement, les températures relevées ont été en deçà de la normale à partir de mars (Figure 4 – station Issoudun).




**Figure 4 : Ecarts de températures moyennes 2019 par rapport à la normale**

### Plus de détails sur deux bassins

Haute-Loire : semis plutôt précoces globalement (début à mi-mars), s'étalant jusqu'à mi-avril pour les plus tardifs dans des conditions de fortes amplitudes thermiques journalières. Levées lentes et hétérogènes car les températures froides en début de campagne ont freiné le développement. Le froid persiste tardivement jusqu'à fin mai puis on observe un rattrapage de retard de croissance avec températures douces favorables durant mai et juin.

Sud-Ouest : semis autour de fin février ou début mars, dans des conditions sèches et températures douces. Pluies dans les 7 jours après le semis. Les semis en agriculture biologique ont été réalisés en majorité avec plante associée : cameline ou céréale (70 % de la sole).

- **Un retard de croissance observé dans la majorité des bassins**

Dans la plupart des bassins, le début de cycle a été difficile avec des températures globalement froides et de grandes amplitudes journalières. D'autre part, des gelées ont été observées jusque début mai en plaine avec des températures comprises entre 0 et -3°C voire -4°C localement (Figure 5). Le développement de la lentille a donc été hétérogène, et un retard de croissance a été observé dans la majorité des bassins (excepté Sud-Ouest et Ouest).




**Figure 5 : Températures minimum observées lors de la première quinzaine de mai**

Ce début de cycle froid a induit des symptômes de phytotoxicité parfois importants suite aux traitements herbicides de prélevée et à des semis peu profonds. Des feuilles recroquevillées ainsi que des plantes nanifiées ont été rapportées dans plusieurs bassins (Figure 6).

**Figure 6 : Plante nanifiée présentant des symptômes de phytotoxicité**

- **Une floraison impactée par le manque d'eau et des températures extrêmes**

Le redoux et les pluies de début juin ont permis à la lentille de rattraper son retard de croissance et d'entrer en floraison à partir de début juin. Une belle floraison a pu s'installer, avec de nombreux étages florifères et un couvert végétal dense (Photo 1). Cependant, avec un déficit hydrique en place depuis l'automne 2018, les réserves des sols étaient bien en deçà des normales (Figure 2). De fait, la lentille n'a pas pu faire face aux chaleurs relevées à partir du 20 juin. Le potentiel de rendement a fortement été impacté par ces deux facteurs. En effet, une perte massive d'étages de gousses et de fleurs a pu être observée au moment de ce « coup de chaud ». (Photo 2 et 3).

**Photo 1 : Champ de lentille noire en floraison – Champagne - Source Terres Inovia**

**Photo 2 : Fleurs avortées – Source Terres Inovia**

**Photo 3 : Fleurs avortées desséchées**

Pour les gousses ayant résisté à ces conditions, il a été majoritairement constaté le remplissage d'une seule graine par gousse (les gousses à deux graines étant rares cette année). De plus, la graine présentait un petit calibre.

Le Sud-Ouest enregistre une bien meilleure récolte en agriculture biologique en 2019 par rapport à 2018 qui avait été marquée par des orages de fin de cycle, ne permettant pas la récolte de nombreuses parcelles.

- **Etat sanitaire correct du fait du mois de juin sec**

Très peu de symptômes de maladies aériennes ont été rapportés pour cette campagne. Les conditions climatiques ont été défavorables à leur développement sur la globalité du cycle de la culture. En Haute-Loire, pour des semis tardifs et d'altitude, des symptômes de rouille brune et d'ascochytose ont été signalés mais restent très peu répandus par rapport à la sole totale du département.

Comme en 2018, les vols de bruches ont été répertoriés au sein du réseau Association Nationale Interprofessionnelle des Légumes Secs (ANILS). Bien que moins précoces qu'en 2018, les vols de colonisation ont à nouveau débuté avant la floraison des parcelles suivies. Les relevés indiquent une population moins importante cette année mais il est difficile de juger de l'impact réel sur la qualité des graines car la relation entre présence au champ et taux de graines bruchées n'a pas été validée à ce jour.

- **Conditions de récolte**

La fin de cycle a été rapide, avec des températures toujours élevées jusqu'à mi-juillet. Une semaine d'avance par rapport aux dates de récolte habituelles a été observée, pour les bassins les plus précoces. Ce sont donc à la fois le PMG et le nombre de graines/m² qui ont été impactés cette année.